

EUKLEIDOVY  
ZÁKLADY


(ELEMENTA).

PŘELOŽIL

FRANTIŠEK SERVÍT,

professor českého gymnasia vinohradského.

*Slad*  
*Sign. B 462*  
*č. 698/47*  
(+)



*698/47*

*G. 132*

## Předmluva.

Předkládaje Eukleidovy Základy řídil jsem se vydáním Heibergovým, ježto se zdá nejlepším a také nepřístupnějším. Kde novověké názvosloví geometrické věc označuje jiným výrazem, než shledáváme u Eukleida, tam užil jsem z pravidla rovněž názvu nyní obvyklého; jen místy podržel jsem výraz Eukleidův, na př. »přímka« místo »úsečka«, rozdělení »poměrem krajním a středním« a j., nebo sám jsem utvořil slovo nové, na př. s o u d ě l n í k (gnómon); zvláště v kn. X. o přímkách nezměrných dovolil jsem si užití výrazův nově utvořených. Volil-li jsem pokaždé slovo vhodné, o tom rozhodnouti zůstavuji shovívavému čtenáři.

Kde jsem co pozměnil v textu neb obrazcích, poznamenáno pod čarou; tam jsem přidal i některé vysvětlivky. Dle potřeby uvádím v závorkách také místo, kde věta, již právě k důkazu jest užito, byla odůvodněna. Vůbec snažil jsem se, aby byl překlad aspoň tak srozumitelný, jakým se jeví originál.

Korrekturu měl jsem na starosti jen já; co mi přese všecku bedlivost proklouzlo chybného, na konci opraveno zvlášť. Malá nedopatření račiž si laskavý čtenář opravit sám.

Slavné »Jednotě českých matematiků«, která nemalým nákladem umožnila vydání tohoto překladu, jakož i slovutnému panu vládnímu radovi Dru Josefu Bernhardovi, řediteli c. k. českého gymnasia na Král. Vinohradech, za všeliké ochotné přispění, zvláště pokud se týká obrazců, vzdávám srdečné díky.

Na Král. Vinohradech v únoru 1905.

*František Servít.*



## Úvod.

### O Eukleidovi a jeho spisech.

Eukleides, slavný matematik řecký (rozdílný od Eukleida, filosofo megarského), žil kolem r. 300. př. Kr., tedy asi 100 let po Platonovi, za vlády egyptského Ptolemaia I. a ještě před ní. O jeho životě málo je známo; neví se, ani kdy ani kde se narodil, ani kdy zemřel. Pravdě podobno, že vzdělání své ve vědě mathematické dovršil v Athenách. Později vyučoval v Alexandrii, kdež založil školu. Od té doby vědění mathematické se ponenáhlu soustředilo v tomto městě, takže mnozí, mimo jiné prý též Archimedes, podnikali tam studijní cesty.

Spisy jeho většinou se týkaly geometrie, některé fysiky neb astronomie a jeden hudby.

Díla zachovaná: *Z á k l a d y* (*Στοιχεῖα*, *Elementa*); *D a n é p r v k y* (*Δεδομένα*, *Data* — 95 vět o prvcích, jimiž určeny prvky jiné); *Ú k a z y* (*Φαινόμενα* — počátky astronomie, valně porušeno); *N a u k a o s v ě t l e* (*Ὀπτικά*, asi 60 pouček — valně porušeno nebo dle nynějšího stavu vědy nesprávně); *O h u d e b n í c h i n t e r v a l l í c h* (*Κατατομή κανόνος*). Úryvkovitě mimo to zachovány spisy: *O d ě l e n í ú t v a r ů* (*Περὶ διαιρέσεων* — 36 vět objevených u spisovatelův arabských) a *P o r i s m a t a*\*) o III. kn. (ze spisů, jež napsal vykladatel Eukleidův Pappos kol. r. 300. po Kr.). Díla ztracená: *M í s t a n a p l o š e* (*Τόποι πρὸς ἐπιφανείᾳ*, o II. kn.); *O k u ž e l o s e č k á c h* (*Κωνικά*, o IV. kn.); *K l a m n é z á v ě r y* (*Ψευδάρια*).

Nejdůležitější ze spisův Eukleidových jsou *Z á k l a d y*, t. j. počátky geometrie, o XIII. knihách; ve vydáních bývá i kn. XIV. a XV., ona však jest prací Hypsikleovou (asi 120 let po Eukl.), tato pochází od neznámého, snad až ze 6. stol. po Kr. Část díla toho věnována ovšem též arithmetice, bylo však toho třeba k důkazům geometrickým a tyto poučky se dokazují rovněž na základě geometrickém. V díle tom užil bez pochybnosti také prací předchůdcův a vrstevníků svých,

\*) *Porisma* tuto jest úkol, jímž se žádá, by se na základech daných vyhledala veličina určitých vlastností (Heiberg: *Literargeschichtl. Studien ü. Euklid*, str. 56. nn.). V základech *porisma* značí poučku, jež z důkazu poučky jiné vysvitá jasně sama sebou (důsledek), kdežto *lémma* (*λήμμα*, *výtěžek*) jest věta z důkazu poučky jiné, abych tak řekl, vytěžena, ovšem ještě nedokázaná nebo nevysvětlená.

jež dle potřeby opravil, doplnil a soustavně spořádal. Metodu do té doby uznávanou a přijatou zachoval důsledně.

Známost a sláva díla toho se rozšířila rychle, takže práce odboru toho dosavadní upadly téměř v zapomenutí. Nástupcům jeho, když se ho kde dokládali, na místě výslovného jmenování stačilo pouze připomenouti, že to neb ono praví spisovatel Základů (στοιχειωτής). Pilně se dílem tím zaměstnávali matematikové byzantijští; z Římanův o Eukleidovi nejprve se zmiňuje Cicero (de orat. III. 132.); s dílem jeho však seznámili se Římané jen poněmáhle a čítali je v původním jazyce. Teprve Boëthius koncem 5. stol. po Kr. jal se je překládati na jazyk latinský. Později zvl. Arabové horlivě se jím zabývali. Ve středověku studium matematické vůbec ochablo, a tak i dílo Eukleidovo teprve po r. 1500 opět hojněji vydáváno a vysvětlováno, a dosud se nižší geometrie zakládá na jeho Základech. V některých zemích (na př. v Anglii) prý se jich ještě nedávno užívalo za učebnici.

Z rukopisů, jichž je řada, nejlepší jest codex Vaticanus č. 190. z 10. stol.

První vydání Základů tiskem pořídil Grynaeus (v Basileji 1533); z pozdějších nejlepší E. F. Augustovo (v Berlíně 1826 nn.); ze souborných uvéstí sluší F. Peyrardovo (Oeuvres d'Euclide, řec., lat. a franc. — v Paříži 1814) a vydání Heibergovo i Mengeovo (Euclidis opera omnia — u Teubnera ve sbírce Bibl. script. Graec. et Rom., v Lipsku 1883 nn., řec. a lat.).

## Obsah Základů.

Kn. I. O přímkách, trojúhelnících, rovnoběžnících a vzájemnosti jejich.

II. O dělení přímek a jeho důsledcích.

III. O kruhu a jeho vlastnostech. 34

IV. O kruhu ve spojení s jinými útvary (vpisování, opisování).

V. O úměrnosti veličin na základě přímek. 68

VI. Upotřebením úměrnosti veličin v geometrii.

VII.—IX. O číslech prostých a mocninách na základě přímek.

X. O souměřitelnosti a nesouměřitelnosti a na základě toho o veličinách geometrických změrných (rationalních) a nezměrných (irrationalních).

XI. Základní věty o protínání a styku rovin.

XII. Útvary prostorové (jehlan, hranol, kužel, válec, koule).

XIII. O pěti pravidelných (Platonských) tělesích.

# Eukleidovy Základy.

## Knih první.

### Výměry.

1. Bod jest, co nemá dílu.
2. Čára pak délka bez šířky.
3. Hranicemi čáry jsou body.
4. Přímá jest čára (přímka), která svými body táhne se rovně.
5. Plocha jest, co jen délku a šířku má.
6. Hranicemi plochy jsou čáry.
7. Rovinná jest plocha (rovina), která přímkami na ní jsoucími prostírá se rovně.
8. Rovinný pak úhel je vzájemný sklon dvou čar, v rovině se stýkajících a neležících k sobě v přímce.
9. Když pak čáry úhel svírající jsou přímky, úhel zove se přímkovým.
10. Když se postaví přímka na přímku tak, že sousední úhly činí navzájem stejnými, jeden i druhý z těch stejných úhlů jest pravý, a přímka postavená zove se kolmicí té, na níž jest postavena.
11. Tupý jest úhel pravého větší.
12. Ostrý pak pravého menší.
13. Meze jest, co jest něčeho hranicí.
14. Útvar jest, co nějaká nebo nějaké meze objímají.
15. Kruh jest útvar rovinný, objímáný jednou čarou (jež se nazývá obvodem), k níž od jednoho bodu vnitř útvaru vedené přímky všechny sobě rovny jsou.
16. Středem pak kruhu zove se ten bod.
17. Průměrem kruhu jest přímka některá vedená středem a končící se na obou stranách obvodem kruhu, jež také rozděluje kruh na polovice.
18. Polokruh pak jest útvar omezený průměrem a částí obvodu jím usečeného. Střed polokruhu je týž jako kruhu.

19. Útvary přímkové jsou, které jsou přímkami omezeny, třístranné třemi, čtyřstranné čtyřmi, mnohostranné více než čtyřmi přímkami omezené.
20. Z třístranných útvarů jest trojúhelník stejnostranný, který má tři strany stejné, rovnoramenný pak, který má jen dvě strany stejné, a různostranný, který má tři strany nejstejně.
21. Mimo to z útvarů třístranných jest trojúhelník pravouhlý, který má pravý úhel, tupouhlý pak, který má úhel tupý, a ostroúhlý, mající tři úhly ostré.
22. Ze čtyřstranných útvarů je čtverec, který jest stejnostranný a pravouhlý; obdélník, pravouhlý sice, však nestejnostranný; kosočtverec, stejnostranný, ne však pravouhlý; kosodélník, jenž má protější strany i úhly navzájem stejné, jenž není ani stejnostranný ani stejnoúhlý; mimo to pak čtyřstranné útvary nazývány buďte lichoběžníky.\*)
23. Rovnoběžky jsou přímkami, které jsou v téže rovině a prodlouženy jsou na obě strany do nekonečna nikde se nesbíhají.

### Úkoly prvotné.

1. Budiž úkolem od kteréhokoli bodu ke kterémukoli bodu vésti přímkou.
2. A přímkou omezenou nepřetržitě rovně prodloužiti.
3. A z jakéhokoli středu a jakýmukoli poloměrem narýsovat kruh.
4. A že všechny pravé úhly sobě rovny jsou.
5. A když přímka protíná dvě přímky tvoří na téže straně vnitřní (přílehlé) úhly menší dvou pravých, ty dvě přímky prodlouženy jsou do nekonečna že se sbíhají na té straně, kde jsou úhly menší dvou pravých.

### Zásady.

1. Veličiny téměř rovné i navzájem rovny jsou.
2. Když se přidají veličiny rovné k rovným, i celky jsou rovny.
3. A odejmou-li se od rovných rovné, zbývající části rovny jsou.
4. A když se přidají k nerovným rovné, celky jsou nerovny.
5. A dvojnásobky téhož vespolek rovny jsou.
6. A polovičky téhož vespolek rovny jsou.)
7. A co se navzájem kryje, navzájem rovno jest.
8. A celek větší než díl.
9. A dvě přímky místa neomezují.)

(\*) Snad míní různoběžníky; ač v kn. I. 35. jsou to lichoběžníky.


\*) Snad míní různoběžníky; ač v kn. I. 35. jsou to lichoběžníky.

### I.

Na dané přímce omezené postav trojúhelník rovnostranný.

Danou přímkou omezenou buď  $AB$ . Má se tedy na přímce  $AB$  postaviti trojúhelník rovnostranný.

Ze středu  $A$  poloměrem  $AB$  buď narýsován kruh  $BCD$ , a opět ze středu  $B$  poloměrem  $BA$  buď narýsován kruh  $ACE$ , a od bodu  $C$ , v němž kruhy se protínají, k bodům  $A, B$  buďte vedeny spojnice  $AC, CB$ . A ježto bod  $A$  je středem kruhu  $CDB$ ,  $AC$  je stejné s  $AB$ ; ježto dále bod  $B$  je středem kruhu  $CAE$ , jest  $BC$  stejné s  $BA$ . Bylo pak dokázáno, že i  $CA$  je stejné s  $AB$ ; tedy jedna i druhá z  $CA, CB$  je stejná s  $AB$ . Veličiny však téměř rovné i navzájem rovny jsou; tedy též  $CA$  jest rovna  $CB$ ; ty tři tedy,  $CA, AB, BC$  jsou si rovny.



Je tedy trojúhelník  $ABC$  rovnostranný a postaven jest na dané přímce omezené  $AB$ ; což právě bylo vykonati.<sup>1)</sup>

### II.


Z daného bodu zříd přímku rovnou přímce dané.

Daným bodem buď  $A$ , danou přímkou  $BC$ ; má se tedy z bodu  $A$  zříditi přímka dané přímce  $BC$  rovná.

Nuže vedme z bodu  $A$  do bodu  $B$  spojnicí  $AB$  a sestavme na ní trojúhelník rovnostranný  $DAB$  (I. 1.) a prodlužme rovně přímky  $DA, DB$  v přímky  $AE, BF$  a ze středu  $B$  poloměrem  $BC$  narýsujme kruh  $CGH$  a též ze středu  $D$  poloměrem  $DG$  narýsujme kruh  $GKL$ .

Ježto tedy bod  $B$  je středem kruhu  $CGH$ ,  $BC = BG$ . Ježto dále bod  $D$  je středem kruhu  $GKL$ ,  $DL = DG$ , z čehož  $DA = DB$ . Zbytek tedy  $AL = BG$ . Bylo pak dokázáno, že též  $BC = BG$ . Veličiny však téměř rovné i navzájem rovny jsou; tedy  $AL = BC$ .


Tedy z daného bodu  $A$  vedena jest přímka  $AL$  rovná dané přímce  $BC$ , což bylo vykonati.



<sup>1)</sup> Eukl. neuzívá znamének, jako jsou:  $=, ||, \infty, \sphericalangle, \triangle, AB^3$  a pod., tak nestalo se ani v překladě tohoto úkolu; dále jich užíváno bude.

## III.

Dány-li dvě přímky nestejně, odejmi od větší přímky rovnou přímce menší.



Buďtež dvěma danými přímkami nestejnými  $AB$ ,  $C$ , z nichž větší buď  $AB$ ; má se tedy od větší  $AB$  odnítí přímka rovná přímce menší  $C$ .


Při bodě  $A$  ležící  $AD$  stejná s přímkou  $C$ ; ze středu  $A$  poloměrem  $AD$  narýsujeme kruh  $DEF$ . A ježto bod  $A$  je středem kruhu  $DEF$ ,  $AE = AD$ . Tedy každá z přímek  $AE$  a  $C$  rovná se  $AD$ , a tak i  $AE = C$ .

Ze dvou tedy daných přímek nestejných  $AB$  a  $C$  jest od větší odňata  $AE$ , rovná přímce menší  $C$ ; což právě bylo vykonati.

## IV.

Když mají dva trojúhelníky dvě strany (střídavě) s dvěma stranami stejné a úhly stejnými stranami sevřené mají stejné, budou i základnu základně míti rovnou a trojúhelník s trojúhelníkem bude stejný i ostatní úhly s ostatními úhly, proti nimž leží stejné strany, (střídavě) budou stejné.

Buďte dva trojúhelníky  $ABC$ ,  $DEF$  mající dvě strany  $AB$ ,  $AC$  se dvěma stranami  $DE$ ,  $DF$  jednotlivě stejné, a to  $AB$  s  $DE$ ,  $AC$  pak s  $DF$  a  $\sphericalangle BAC$  s  $\sphericalangle EDF$  stejný; pravím, že i základna  $BC$  rovná se základně  $EF$ , i trojúhelník  $ABC$  s trojúhelníkem  $DEF$  bude stejný i ostatní úhly budou střídavě stejné s ostatními úhly, proti nimž leží stejné strany, úhel pak  $ABC$  s  $DEF$  a úhel  $ACB$  s  $DFE$ .



Neboť přikládáme-li  $\triangle ABC$  na  $\triangle DEF$  a klademe-li bod  $A$  na bod  $D$  a přímku  $AB$  na  $DE$ , také bod  $B$  bude krýti  $E$ , ježto  $AB = DE$ ; a když  $AB$  bude krýti  $DE$ , též přímka  $AC$  bude krýti  $DF$ , ježto  $\sphericalangle BAC = \sphericalangle EDF$ ; a tak i bod  $C$  bude krýti bod  $F$ , protože opět  $AC = DF$ . Avšak zajisté  $B$  krylo  $E$ ; a tak základna  $BC$  krýti bude  $EF$ . Neboť bude-li se krýti  $B$  s  $E$  a  $C$  s  $F$ , nikoli však základna  $BC$  s  $EF$ , dvě přímky budou místo omezovati, což právě nemožno<sup>2)</sup>. Bude se tedy základna

$BC$  krýti s  $EF$  a bude jí rovna; a tak i celý trojúhelník  $ABC$  bude se krýti s celým  $\triangle DEF$  a bude mu roven, i ostatní úhly budou se krýti s úhly ostatními a budou jim rovny,  $\sphericalangle ABC = \sphericalangle DEF$ ,  $\sphericalangle ACB = \sphericalangle DFE$ .

Když tedy mají dva trojúhelníky — —<sup>3)</sup>.

<sup>2)</sup> Vznikla by plocha uzavřená dvěma přímkami, což dle zásady 9. nemožno.

<sup>3)</sup> Eukl. opakuje do slova jako v záhlaví.


## V.

V trojúhelnících rovnoramenných úhly při základně jsou si rovny, a prodlouží-li se stejné přímky (ramena), úhly pod základnou budou si rovny.

Trojúhelníkem rovnoramenným buď  $ABC$ , rameno  $AB$  buď  $= AC$ , a prodlouženy buďte přímky  $AB$ ,  $AC$  o přímky  $BD$ ,  $CE$ ; pravím, že  $\sphericalangle ABC = \sphericalangle ACB$  a  $\sphericalangle CBD = \sphericalangle BCE$ .

Nuže vezměme na  $BD$  kterýkoli bod  $F$  a od delšího  $AE$  odřízneme  $AG$  rovné menšímu  $AF$  a vedme přímky  $FC$ ,  $GB$ . Ježto tedy  $AF = AG$ , jakož i  $AB = AC$ , obě ovšem strany  $FA$ ,  $AC$  střídavě stejné jsou s oběma  $GA$ ,  $AB$ ; také společný úhel svírají, totiž  $FAG$ ; základna tedy  $FC = BG$  a bude  $\triangle AFC = \triangle AGB$  i ostatní úhly ostatním úhlům, proti nimž leží stejné strany, střídavě budou rovny,  $\sphericalangle ACF = \sphericalangle ABG$ ,  $\sphericalangle AFC = \sphericalangle AGB$ . A ježto celé  $AF$  rovno celému  $AG$ , z čehož  $AB = AC$ , zbytek tedy  $BF = CG$ . Dokázáno však, že též  $FC = GB$ , patrně obě,  $BF$  i  $FC$ , oběma,  $CG$  i  $GB$ , střídavě se rovnají; rovněž  $\sphericalangle BFC = \sphericalangle CGB$ , a základna jejich  $BC$  je společná; také tedy bude  $\triangle BFC = \triangle CGB$ , i ostatní úhly úhlům ostatním, proti nimž leží stejné strany, střídavě budou rovny; tedy  $\sphericalangle FBC = \sphericalangle GCB$  a  $\sphericalangle BCF = \sphericalangle CBG$ . Ježto tedy celý  $\sphericalangle ABG$  úhlu  $ACF$  ukázal se rovným, z nichž  $CBG = BCF$ , zbývající tedy  $ABC$  rovná se zbývajícímu  $ACB$ , a jsou při základně trojúhelníku  $ABC$ . Dokázáno pak bylo, že i  $\sphericalangle FBC = \sphericalangle GCB$ , a jsou pod základnou.


Tedy v trojúhelnících rovnoramenných — —.



## VI.

Když jsou si v trojúhelníku dva úhly rovny, též strany proti stejným úhlům ležící budou si rovny.

Trojúhelníkem, majícím  $\sphericalangle ABC = \sphericalangle ACB$ , budiž  $ABC$ ; pravím, že i strana  $AB = AC$ . Neboť jest-li  $AB \leq AC$ , jedna z nich jest větší. Buď větší  $AB$ , a budiž od větší  $AB$  odříznuta  $DB$ , rovná straně menší  $AC$ , a vedena buď  $DC$ . Ježto tedy  $DB = AC$  a společnou jest  $BC$ , tož  $DB$  a  $BC$  s  $AC$  a  $CB$  jednotlivě stejné jsou, a  $\sphericalangle DBC = \sphericalangle ACB$ ; tedy základna  $DC = AB$ , a  $\triangle DBC = \triangle ACB$ , menší většímu, což nesmyslné; není tedy strana  $AB$  s  $AC$  nestejná; tedy stejná.




Když jsou si tedy v trojúhelníku — —.

## VII.

Na téže přímce z bodu jiného a jiného nezřídíš dvou přímek jiných týmž dvěma přímkám střídavě rovných, majících tytéž paty na téže straně jako přímky prvotní.

Neboť možno-li to, zřízeny buďte na téže přímce  $AB$  týmž dvěma přímkám  $AC$ ,  $CB$  jiné jednotlivě rovné přímky  $AD$ ,  $DB$  z jiného a jiného bodu  $C$  a  $D$ , na téže straně tytéž paty mající, takže by byla  $CA = DA$  majíc s ní touž patu  $A$ , a  $CB = DB$ , majíc s ní touž patu  $B$ ; a budiž vedena  $CD$ .




Tedy na téže přímce — —

Ježto tedy  $AC = AD$ , též  $\sphericalangle ACD = ADC$ ; větší tedy jest  $\sphericalangle ADC$  než  $DCB$ , tedy  $\sphericalangle CDB$  jest mnohem větší než  $DCB$ . Ježto zase  $CB = DB$ , také  $\sphericalangle CDB = DCB$ ; ukázalo se však, že nad něj dokonce mnohem jest větší; což právě jest nemožné.

## VIII.

Když mají dva trojúhelníky dvě a dvě strany střídavě stejné a mají též základnu základně rovnou, budou též úhly stejnými přímkami sevřeně míti stejné.

Dvěma trojúhelníky buďtež  $ABC$  a  $DEF$  a mějte dvě strany  $AB$ ,  $AC$  dvěma stranám  $DE$ ,  $DF$  střídavě rovné, totiž  $AB = DE$ ,  $AC = DF$ , a mějtež i základnu  $BC$  rovnou základně  $EF$ ; pravím, že též  $\sphericalangle BAC = EDF$ .



Neboť přiložíme-li  $\triangle ABC$  na  $\triangle AEF$ , kladouce bod  $B$  na bod  $E$  a přímku  $BC$  na  $EF$ , také bod  $C$  bude se krýti s bodem  $F$ , ježto  $BC = EF$ . Když pak ovšem  $BC$  pokryje  $EF$ , budou se krýti též  $BA$ ,  $CA$  s  $ED$ ,  $DF$ . Neboť bude-li se základna  $BC$  krýti se základnou  $EF$ , strany však  $BA$ ,  $AC$  nebudou-li se krýti s  $ED$ ,  $DF$ , nýbrž budou-li se uchylovati jako  $EG$ ,  $GF$ , postaveny budou na téže přímce z jiného (a jiného) bodu týmž dvěma přímkám jiné dvě přímky střídavě rovné, na téže straně paty mající. Nelze jich však postaviti (I. VII.). Položí-li se tedy základna  $BC$  na základnu  $EF$ , nelze, aby se nekryly též strany  $BA$ ,  $AC$  s  $ED$ ,  $DF$ . Budou se tedy krýti; a tak i úhel  $BAC$  bude se krýti s úhlem  $EDF$  a jemu se rovnati.

Když mají tedy dva trojúhelníky — —


## IX.

Daný úhel přímkový jest rozpůliti.

Daným úhlem přímkovým buď  $BAC$ ; má se tedy rozpůliti. Vezměmež na  $AB$  kterýkoli bod  $D$  a odřízněmež od  $AC$  část  $AE$  rovnou  $AD$  a vedme  $DE$  a na  $DE$  zřídme trojúhelník rovnostranný  $DEF$  a vedme  $AF$ ; pravím, že  $\sphericalangle BAC$  přímkou  $AF$  je rozpůlen.

Neboť ježto  $AD = AE$  a  $AF$  společnou, tož obě přímky  $DA$ ,  $AF$  oběma  $EA$ ,  $AF$  střídavě rovný jsou. Těž základna  $DF$  rovná se základně  $EF$ ; tedy  $\sphericalangle DAF = EAF$  (I. VIII.).

Daný tedy úhel  $BAC$  přímkou  $AF$  je rozpůlen; což se právě mělo vykonati.



## X.


Danou přímku omezenou jest rozpůliti.

Danou přímku omezenou buď  $AB$ ; tož má se omezená přímka  $AB$  rozpůliti.

Sestrojen buď na ní trojúhelník rovnostranný  $ABC$  a úhel  $ACB$  přímkou  $CD$  buď rozpůlen; pravím, že přímka  $AB$  jest v bodě  $D$  rozpůlena.

Neboť ježto  $AC = CB$ , společnou pak  $CD$ , obě tedy  $AC$ ,  $CD$  oběma  $BC$ ,  $CD$  jsou střídavě rovný; též  $\sphericalangle ACD = BCD$ ; tedy základna  $AD$  rovná se základně  $BD$ .

Daná tedy omezená přímka  $AB$  je v  $D$  rozpůlena; což právě bylo vykonati.




## XI.

Na dané přímce buď z daného na ní bodu vztýčena kolmice.

Danou přímku buď  $AB$  a daným bodem na ní  $C$ ; tož má se z bodu  $C$  na přímce  $AB$  vztýčiti kolmice.<sup>4)</sup>

Vezměmež na  $AC$  kterýkoli bod  $D$  a odřízněme  $CE = CD$  a zřídme na  $DE$  trojúhelník rovnostranný  $FDE$  a vedme  $FC$ ; pravím, že

<sup>4)</sup> Eukl. praví: εὐθεία γραμμὴ πρὸς ὀρθὰς γωνίας.



$DCF$  a  $FCE$  jsou pravé.


Tedy na dané přímce  $AB$  z daného na ní bodu  $C$  je vztýčena kolmice; což právě bylo vykonati.

## XII.

K dané přímce neomezené buď z daného bodu mimo ni spuštěna kolmice.

Danou přímkou neomezenou buď  $AB$ , daným pak bodem mimo ni  $C$ ; tož má se k dané přímce neomezené  $AB$  z daného bodu  $C$  mimo ni spustiti kolmice.

Nuže, vezměme na druhé straně přímky  $AB$  kterýkoli bod  $D$  a ze středu  $C$  poloměrem  $CD$  opišme kruh  $EFG$  a rozpolme přímku  $EG$  v  $H$  a vedme spojnice  $CG$ ,  $CH$ ,  $CE$ ; pravím, že na danou přímku neomezenou  $AB$  z daného mimo ni bodu  $C$  spuštěna jest kolmice  $CH$ .



Neboť ježto  $GH = HE$ ,  $HC$  pak společná, patrně obě přímky  $GH$ ,  $HC$  rovný jsou jednotlivě oběma  $EH$ ,  $CH$ , též základna  $CG = CE$ ; tedy úhel  $CHG = EHC$ .

Když pak se postaví přímka na přímku tak, že tvoří vedlejší úhly navzájem stejné,

každý z těch stejných úhlů jest pravý, a postavená přímka zove se kolmicí té, na které stojí.

K dané tedy přímce neomezené  $AB$  z daného mimo ni bodu  $C$  spuštěna jest kolmice  $CH$ ; což právě bylo vykonati.

## XIII.

Když přímka na přímku postavena jsouc tvoří úhly, buď dva pravé bude tvořiti buď dvěma pravým rovné.

Nuže, přímka nějaká  $AB$  na přímku  $CD$  postavena jsouc tvoří úhly  $CBA$ ,  $ABD$ ; pravím, že úhly  $CBA$ ,  $ABD$  jsou buď dva pravé, buď dvěma pravým rovné.


Jest-li tedy  $\sphericalangle CBA = ABD$ , jsou to dva pravé. Pakli ne, vedme z bodu  $B$  ku přímce  $CD$  kolmici  $BE$ ; tedy  $\sphericalangle CBE$  a  $EBD$  jsou pravé.

na dané přímce  $AB$  z daného na ní bodu vztýčena jest kolmice  $CF$ .

Neboť ježto  $DC = CE$  a  $CF$  je společná; tož obě strany  $DC$ ,  $CF$  jsou střídavě rovný oběma  $EC$ ,  $CF$  a základna  $DF = FE$ , tedy  $\sphericalangle DCF = ECF$  a jsou vedlejší (výplňkové). Když pak se postaví přímka na přímku tak, že tvoří vedlejší úhly navzájem stejné, každý z těch stejných úhlů jest pravý; tedy oba úhly

A ježto  $CBE = CBA + ABE$ , k oběma přičtíme  $\sphericalangle EBD$ ; tedy  $CBE + EBD = CBA + ABE + EBD$ . Dále, ježto  $DBA = DBE + EBA$ , k oběma přičtíme  $ABC$ ; tedy  $DBA + ABC = DBE + EBA + ABC$ . Ukázalo pak se, že i  $CBE + EBD$  týmž třem se rovnají. Veličiny však téměř rovné jsou i navzájem rovný; tedy též  $CBE + EBD = DBA + ABC$ ; avšak úhly  $CBE$ ,  $EBD$  jsou pravé; tedy též  $DBA$ ,  $ABC$  rovnají se dvěma pravým.

Když tedy přímka na přímku — —



## XIV.


Když na nějaké přímce a v bodě na ní dvě přímky na rozličných stranách ležící tvoří styčné úhly dvěma pravým rovné, ty přímky budou navzájem k sobě v přímce.

Nuže na nějaké přímce  $AB$  a v bodě na ní  $B$  tvořte přímky  $BC$ ,  $BD$ , na rozličných stranách ležící, styčné úhly  $ABC$ ,  $ABD$  dvěma pravým rovné; pravím, že bude  $BD$  ku  $BC$  v přímce.

Neboť není-li  $BD$  ku  $BC$  v přímce, budiž  $BE$  ku  $BC$  v přímce.

Ježto tedy přímka  $AB$  stojí na přímce  $CBE$ , tedy  $\sphericalangle ABC + ABE = 2R$ ; avšak též  $\sphericalangle ABC + ABD = 2R$ ; tedy  $CBA + ABE = CBA + ABD$ . Od nich společně buď odečten  $\sphericalangle CBA$ ; zbývající tedy  $\sphericalangle ABE = ABD$ , menší většímu, což jest nemožno. Není tedy  $BE$  v přímce ku  $BC$ . Podobně ovšem dokážeme, že žádná jiná kromě  $BD$ ; tedy  $CB$  je v přímce ku  $BD$ .

Když tedy na nějaké přímce — —




## XV.

Když se dvě přímky navzájem protínají, tvoří úhly vrcholové navzájem rovné.

Nuže protínají se navzájem dvě přímky  $AB$ ,  $CD$  v bodě  $E$ ; pravím, že  $\sphericalangle AEC = DEB$  a  $\sphericalangle CEB = AED$ .

Neboť přímka  $AE$  stojí na přímce  $CD$  tvoříc úhly  $CEA$ ,  $AED$ , tedy  $CEA + AED = 2R$ ; Dále, ježto přímka  $DE$  stojí na přímce  $AB$  tvoříc úhly  $AED$ ,  $DEB$ , tedy úhly  $AED + DEB = 2R$ . Bylo pak dokázáno, že též  $CEA + AED = 2R$ ; tedy





$CEA + AED = AED + DEB$ . Odečten budš společný  $AED$ ; zbývající tedy  $CEA = BED$ . Podobně ovšem se dokáže, že též  $\sphericalangle CEB = DEA$ .

Když se tedy dvě přímky — —.

## XVI.

V každém trojúhelníku, jehož jedna strana se prodlouží, vnější úhel větší jest než kterýkoli protější úhel vnitřní.

Trojúhelníkem budš  $ABC$ , a prodloužena budš jedna jeho strana  $BC$  do  $D$ ; pravím, že vnější úhel  $ACD$  je větší než kterýkoli z protějších úhlů vnitřních  $CBA$ ,  $BAC$ .

Rozpůlena budš  $AC$  v  $E$  a spojnice  $BE$  prodloužena budš (v přímce) do  $F$ , a budš  $BE = EF$  a vedena budš spojnice  $FC$ , a budš  $AC$  prodloužena do  $G$ . Ježto tedy  $AE = EC$  a  $BE = EF$ , patrně  $AE + EB = CE + EF$  a  $\sphericalangle AEB = FEC$ , neboť jsou vrcholové; základna tedy  $AB = FC$  a  $\triangle ABE = FEC$ , i zbývající úhly zbývajícím úhlům, proti nimž leží stejné strany, jeden druhému se rovnají; tedy  $\sphericalangle BAE = ECF$ . Avšak  $\sphericalangle ECD > ECF$ , tedy  $\sphericalangle ACD > BAE$ . Podobně ovšem, když se rozpůlí  $BC$ , též  $\sphericalangle BCG$ , t. j.  $ACD > ABC$ .

V každém tedy trojúhelníku — —.

## XVII.

V každém trojúhelníku součet kterýchkoli dvou úhlů jest menší dvou pravých.

Trojúhelníkem budiž  $ABC$ ; pravím, že v trojúhelníku  $ABC$  součet kterýchkoli dvou úhlů<sup>5)</sup> jest menší dvou pravých.

Nuže budiž  $BC$  prodloužena do  $D$ .

A ježto v  $\triangle ABC$  vnějším úhlem jest  $ACD$ , jest větší vnitřního a protějšího  $ABC$ , spolu pak přičteme  $ACB$ ; tedy  $(\sphericalangle ACD + \sphericalangle ABC) > (\sphericalangle ABC + \sphericalangle BCA)$ . Avšak  $\sphericalangle ACD + \sphericalangle ACB = 2R$ ; tedy  $(\sphericalangle ABC + \sphericalangle BCA) < 2R$ . Podobně ovšem dokážeme, že i  $(\sphericalangle BAC + \sphericalangle ACB) < 2R$  a rovněž  $\sphericalangle CAB + \sphericalangle ABC$ .

Tedy v každém trojúhelníku — —.

<sup>5)</sup> Eukl. dí: »dva úhly jakkoli střídány jsou«, roz. součet jejich.


## XVIII.

V každém trojúhelníku proti delší straně jest větší úhel.

Nuže budiž  $ABC$  trojúhelníkem a měj stranu  $AC$  delší než  $AB$ ; pravím, že též úhel  $ABC > BCA$ .

Nuže ježto  $AC > AB$ , odřízněme  $AD = AB$  a vedme  $BD$ . A ježto vnějším úhlem trojúhelníku  $BCD$  jest  $ADB$ , jest větší úhlu vnitřního protějšího  $DCB$ ; avšak  $\sphericalangle ADB = ABD$ , ježto i strana  $AB = AD$ ; tedy též  $\sphericalangle ABD > ACB$ ; mnohem větší tedy jest  $ABC$  než  $ACB$ .

V každém tedy trojúhelníku — —.




## XIX.

V každém trojúhelníku proti většímu úhlu leží delší strana.

Trojúhelníkem budš  $ABC$  a budš  $\sphericalangle ABC > BCA$ ; pravím, že též strana  $AC$  delší je než strana  $AB$ . Neboť není-li tomu tak, budš ovšem  $AC = AB$  budš  $AC < AB$ . Stejnou zajisté není  $AC$  s  $AB$ , neboť stejným byl by též  $\sphericalangle ABC$  s  $ACB$ ; avšak není. Tedy  $AC$  nerovná se  $AB$ . Ani zajisté  $AC < AB$ ; neboť i  $\sphericalangle ABC$  byl by menší než  $ACB$ ; avšak není; tedy není  $AC < AB$ . Ukázalo se však, že není ani stejný. Jest tedy  $AC$  delší než  $AB$ .

Tedy v každém trojúhelníku — —.



## XX.


V každém trojúhelníku kterékoli dvě strany (součet) jsou delší než strana zbývající.

Nuže budiž trojúhelníkem  $ABC$ ; pravím, že v  $\triangle ABC$  kterékoli dvě strany (dohromady) delší jsou než zbývající, t. j.  $(BA + AC) > BC$ ,  $(AB + BC) > AC$ ,  $(BC + CA) > AB$ .

Nuže budiž  $BA$  prodloužena do bodu  $D$  a učinme  $AD = AC$  a vedme spojnicí  $DC$ .

Ježto tedy  $DA = AC$ , také  $\sphericalangle ADC = ACD$ ; tedy  $\sphericalangle BCD > ADC$ ; a ježto v  $\triangle DCB$   $\sphericalangle BCD > BDC$  a proti většímu úhlu leží delší strana, tedy  $DB$  jest delší než  $BC$ .  $DA$  však  $= AC$ ; tedy  $BA + AC$  jsou delší než  $BC$ . Podobně dokážeme, že též  $(AB + BC) > CA$  jakož i  $(BC + CA) > AB$ .


Tedy v každém trojúhelníku — —.



## XXI.

Když sestavíme v trojúhelníku od mezních bodů jedné strany uvnitř dvě přímky, sestavené budou kratší než ostatní dvě strany trojúhelníku, budou však svírat větší úhel.

Nuže sestavme v  $\triangle ABC$  na jedné straně  $BC$  od mezních bodů  $B, C$ , uvnitř dvě přímky  $BD, DC$ ; pravím, že  $BD + DC$  ostatních v trojúhelníku dvou stran  $BA + AC$  jsou kratší, avšak svírají  $\sphericalangle BDC$  větší než  $BAC$ .



Nuže prodlužme  $BD$  do  $E$ . A ježto v každém trojúhelníku dvě strany jsou delší než zbývající, tedy v  $\triangle ABE$  strany  $AB + AE > BE$ ; spolu přiběrne  $EC$ ; tedy  $(BA + AC) > (BE + EC)$ . Dále, ježto v  $\triangle CED$  dvě strany  $CE + ED > CD$ ; spolu přiběrne  $DB$ ; tedy  $(CE + EB) > (CD + DB)$ . Avšak ukázalo se, že  $(BA + AC) > (BE + EC)$ ; tedy  $BA + AC$  mnohem delší jsou než  $BD + DC$ .


Dále, ježto v každém trojúhelníku vnější úhel jest větší než protější vnitřní, tedy v  $\triangle CDE$  vnější  $\sphericalangle BDC > CED$ . Proto ovšem též v  $\triangle ABE$  vnější  $\sphericalangle CEB > BAC$ . Avšak ukázalo se, že  $\sphericalangle BDC > CEB$ ; tedy  $\sphericalangle BDC$  mnohem větší jest než  $BAC$ .

Když tedy sestavíme v trojúhelníku — —.

## XXII.

Ze tří přímek, jež se rovnají třem daným přímкам, má se sestrojiti trojúhelník; nutno však, aby kterékoli dvě spolu byly větší než zbývající

Buďte danými třemi přímkami  $A, B, C$ , z nichž dvě kterékoli spolu větší buďte než zbývající, tedy  $(A + B) > C$ ,  $(A + C) > B$ , a též  $(B + C) > A$ ; tož má se z přímek délkám  $A, B, C$  rovných sestrojiti trojúhelník.



Mějme nějakou přímku  $DE$ , při  $D$  omezenou, při  $E$  pak neomezenou a odřízněme  $DF = A$ ,  $FG = B$ ,  $GH = C$ ; a ze středu  $F$  poloměrem  $FD$  opišme kruh  $DKL$ ; dále ze středu  $G$  poloměrem  $GH$  opišme kruh  $KLH$  a veďme spojnice  $KF, KG$ ; pravím, že ze tří přímek, stejných s  $A, B, C$ , je sestrojen trojúhelník  $KFG$ .

Neboť ježto  $F$  je středem kruhu  $DKL$ , jest  $FD = FK$ ; avšak  $FD = A$ ; tedy i  $KF = A$ . Dále, ježto  $G$  je středem kruhu  $LKH$ , jest  $GH = GK$ ; avšak  $GH = C$ , tedy i  $KG = C$ . Avšak i  $FG = B$ ; tedy tři přímky  $KF, FG, GK$  stejné jsou s  $A, B, C$ .

Tedy ze tří přímek  $KF, FG, GK$ , jež se rovnají třem daným přímкам  $A, B, C$ , je sestrojen  $\triangle KFG$ ; což právě bylo vykonati.

## XXIII.


Na dané přímce a z daného na ní bodu má se sestrojiti přímkový úhel danému úhlu přímkovému rovný.

Danou přímku budiž  $AB$ , bodem na ní  $A$  a daným úhlem přímkovým  $DCE$ ; tož má se na dané přímce  $AB$  a v bodě na ní  $A$  sestrojiti úhel přímkový danému úhlu přímkovému  $DCE$  rovný.

Veźmeme na obou  $CD, CE$  kterékoli body  $D, E$  a veďme spojnici  $DE$  a ze tří přímek, jež se rovnají přímкам  $CD, DE, CE$ , sestrojme  $\triangle AFG$  (I. xxii.) tak, aby  $CD = AF$ ,  $EC = AG$  a rovněž  $DE = FG$ .

Ježto tedy obě  $DC, CE$  rovnají se jednotlivě oběma  $FA, AG$  i základna  $DE = FG$ , tedy  $\sphericalangle DCE = \sphericalangle FAG$ .

Na dané tedy přímce — —.



## XXIV.


Když mají dva trojúhelníky dvě strany dvěma stranám střídavě sobě rovné, úhel však stejnými přímkami sevřený jeden větší než druhý, bude také základna jednoho delší než druhého.

Dvěma trojúhelníky buďtež  $ABC, DEF$  a dvě strany  $AB, AC$  buďte střídavě stejné s  $DE, DF$ , totiž  $AB = DE, AC = DF$ , úhel pak buď při  $A >$  než při  $D$ ; pravím, že též základna  $BC$  je delší základny  $EF$ .

Neboť ježto  $\sphericalangle BAC > \sphericalangle EDF$ , sestrojme na přímce  $DE$  a z bodu na ní  $D$   $\sphericalangle EDG = \sphericalangle BAC$  a veďme  $DG = AC = DF$  a spojnice  $EG, FG$ .

Ježto tedy  $AB = DE$  a  $AC = DG$ , tož obě  $BA, AC$  oběma  $ED, DG$  střídavě rovny jsou; také  $\sphericalangle BAC = \sphericalangle EDG$ ; tedy základna  $BC = EG$ . Dále, ježto  $DF = DG$ ; též  $\sphericalangle DGF = \sphericalangle DFG$ ; tedy  $\sphericalangle DFG > \sphericalangle EGF$ , tedy mnohem větší jest  $\sphericalangle EFG$  než  $\sphericalangle EGF$ . A ježto  $\triangle EFG$  má  $\sphericalangle EFG$  větší než  $\sphericalangle EGF$  a proti většímu úhlu jest delší strana, tedy též strana  $EG$  je delší než  $EF$ . Avšak  $EG = BC$ , tedy  $BC > EF$ .

Když tedy mají dva trojúhelníky — —.




## XXV.

Když mají dva trojúhelníky dvě strany dvěma stranám střídavě rovné, základnu však jeden delší než druhý, bude též úhel stejnými stranami sevřený v jednom větší než ve druhém.

Dvěma trojúhelníky buďtež  $ABC$ ,  $DEF$  a mějte dvě strany  $AB$ ,  $AC$  střídavě rovné dvěma stranám  $DE$ ,  $DF$ , totiž  $AB = DE$ ,  $AC = DF$ , základna však  $BC$  buď delší než  $EF$ ; pravím, že též  $\sphericalangle BAC > EDF$ . Neboť není-li tomu tak, buď jest mu roven buď jest menší; stejný ovšem není  $\sphericalangle BAC$  jako  $EDF$ , neboť byla by též základna  $BC = EF$  (I. iv.); není však. Tedy není  $\sphericalangle BAC = EDF$ . Ani zajisté  $\sphericalangle BAC < EDF$ , neboť byla by též základna  $BC < EF$  (I. xxiv.); není však. Tedy není  $BAC < EDF$ . Bylo však dokázáno, že ani stejné nejsou; tedy  $\sphericalangle BAC > EDF$ .

Když tedy mají dva trojúhelníky — —




## XXVI.

Když mají dva trojúhelníky dva úhly dvěma úhlům jednotlivě rovné a jednu stranu jedné straně rovnou buď při stejných úhlech nebo proti jednomu ze stejných úhlů, budou mít též ostatní strany rovné ostatním stranám i zbývající úhel úhlu zbývajícím.

Dvěma trojúhelníky buďtež  $ABC$ ,  $DEF$  a mějtež úhly  $ABC$ ,  $BCA$  dvěma úhlům  $DEF$ ,  $EFD$  střídavě rovné, totiž  $\sphericalangle ABC = DEF$  a  $\sphericalangle BCA = EFD$  a mějtež i jednu stranu jedné straně rovnou, nejprve při stejných úhlech, t.  $BC = EF$ ; pravím, že budou mít střídavě i ostatní strany ostatním stranám rovné, totiž  $AB = DE$ ,  $AC = DF$ , i zbývající úhel úhlu zbývajícím, totiž  $BAC = EDF$ .

Neboť není-li  $AB = DE$ , jedna z nich jest větší. Buď větší  $AB$  a buď  $BG = DE$  a vedena buď spojnice  $GC$ .

Ježto tedy  $BG = DE$ , jakož i  $BC = EF$ , obě ovšem  $BG$ ,  $BC$  s  $DE$ ,  $EF$  jsou střídavě stejné, též  $\sphericalangle GBC = DEF$ ; základna



tedy  $GC = DF$  a  $\triangle GBC = DEF$ , i zbývající úhly budou rovny zbývajícím úhlům, proti nimž leží stejné strany, tedy  $\sphericalangle GCB = DFE$ ; avšak  $\sphericalangle DFE$  vzat za stejný s  $\sphericalangle BCA$ , tedy též  $\sphericalangle BCG = BCA$ , menší většímu; což právě nemožno. Tedy  $AB$  není nestejná s  $DE$ ; tedy stejná. Jest pak též  $BC = EF$ ; tož obě  $AB$ ,  $BC$  oběma  $DE$ ,  $EF$  jednotlivě rovny jsou, i  $\sphericalangle ABC = DEF$ ; základna tedy  $AC = DF$ , i zbývající  $\sphericalangle BAC$  roven zbývajícím  $\sphericalangle EDF$  (I. iv.).

Avšak již dále buďte strany proti rovným úhlům ležící stejné, na př.  $AB$  s  $DE$ ; pravím opět, že též zbývající strany zbývajícím stranám budou rovny, t.  $AC = DF$ ,  $BC = EF$ , a rovněž zbývající úhel  $BAC = EDF$ .

Neboť není-li  $BC = EF$ , jedna z nich jest větší. Větší buď, možno-li,  $BC$ , a dejme tomu, že  $BH = EF$ , a vedme spojnicí  $AH$ . A ježto  $BH = EF$ ,  $AB = DE$ , tož obě  $AB$ ,  $BH$  oběma  $DE$ ,  $EF$  střídavě rovny jsou, též úhly svírají stejné; tedy základna  $AH = DF$  a  $\triangle ABH = DEF$ , i zbývající úhly budou rovny zbývajícím úhlům, proti nimž leží stejné strany, tedy  $\sphericalangle BHA = EFD$ . Avšak  $\sphericalangle EFD = BCA$ ; tož v  $\triangle AHC$  vnější  $\sphericalangle BHA$  rovná se vnitřnímu protějšímu  $BCA$ ; což právě nemožno (I. xvi.). Tedy  $BC$  není nestejná s  $EF$ . Avšak  $AB = DE$ . Obě patrně  $AB$ ,  $BC$  jsou střídavě stejné s oběma  $DE$ ,  $EF$ , také svírají stejné úhly; tedy základna  $AC = DF$  a  $\triangle ABC = DEF$  i zbývající  $\sphericalangle BAC = EDF$ .

Když mají tedy dva trojúhelníky — —


## XXVII.

Když přímka protínající přímky dvě tvoří střídavě úhly navzájem stejné, budou ty přímky navzájem rovnoběžné.

Nuže přímka  $EF$  protínající dvě přímky  $AB$ ,  $CD$  tvoří úhly střídavé  $AEF$ ,  $EFD$  navzájem stejné; pravím, že  $AB \parallel CD$ .


Neboť jinak  $AB$ ,  $CD$  prodlouženy jsou setkají se buď na straně  $B$ ,  $D$  buď na straně  $A$ ,  $C$ . Buďte prodlouženy a stýkejte se na straně  $B$ ,  $D$  v  $G$ . V  $\triangle GEF$  ovšem vnější  $\sphericalangle AEF$  rovná se vnitřnímu protějšímu  $EFG$ , což nemožno; tedy  $AB$ ,  $CD$  jsou prodlouženy nesetkají se na straně  $B$ ,  $D$ . Podobně se dokáže, že ani na straně  $A$ ,  $C$ ; přímky však na žádné straně se nestýkající jsou rovnoběžné (I. vým. 23.); tedy  $AB$ ,  $CD$  jsou rovnoběžky.

Když tedy přímka protínající přímky dvě — —



## XXVIII.

Když přímka protínající přímky dvě tvoří úhel vnější rovný úhlu vnitřnímu protějšímu na téže straně (souhlasné úhly) neb úhly vnitřní na téže straně (přílehlé) dvěma pravým rovné, budou ty přímky navzájem rovnoběžné.



Nuže přímka  $EF$  protínající dvě přímky  $AB, CD$  tvoří úhel vnější  $EGB$  rovný úhlu vnitřnímu protějšímu  $GHD$  neb úhly vnitřní na téže straně  $BGH, GHD$  dvěma pravým rovné; pravím, že  $AB \parallel CD$ .

Neboť ježto  $\sphericalangle EGB = GHD$  a  $EGB = AGH$ , tedy též  $AGH = GHD$ , a jsou střídavé; tedy  $AB \parallel CD$  (I. xxvii.).


Dále, ježto  $\sphericalangle BGH + GHD = 2R$ , jsou pak též  $\sphericalangle AGH + BGH = 2R$ , tedy  $\sphericalangle AGH + BGH = BGH + GHD$ ; odečteme společný  $\sphericalangle BGH$ , zbývající tedy  $\sphericalangle AGH = GHD$ , a jsou střídavé; tedy  $AB \parallel CD$ .

Když tedy přímka protínající přímky dvě — —.

## XXIX.

Přímka protínající rovnoběžky tvoří střídavé úhly navzájem stejné a úhel vnější vnitřnímu protějšímu rovný a vnitřní na téže straně dvěma pravým rovné.

Nuže protínej rovnoběžky  $AB, CD$  přímka  $EF$ ; pravím, že tvoří střídavé úhly  $AGH, GHD$  stejné a vnější  $\sphericalangle EGB$  rovný vnitřnímu protějšímu (souhlasnému)  $GHD$  a vnitřní na téže straně (přílehlé)  $BGH + GHD$  rovné dvěma pravým.



Neboť není-li  $\sphericalangle AGH = GHD$ , jeden z nich jest větší. Větším buď  $AGH$ ; společným buď  $BGH$ ; tedy  $(\sphericalangle AGH + BGH) > (BGH + GHD)$ . Avšak  $\sphericalangle AGH + BGH = 2R$ . Tedy  $(BGH + GHD) < 2R$ . Avšak ramena menších úhlů než dva pravé, prodlužována jsouce do nekonečna, se stýkají; tedy  $AB, CD$ , prodlužována jsouce do nekonečna, se setkají; avšak nestýkají se, ježto je pokládáme za rovnoběžky; tedy  $\sphericalangle AGH$  není roven úhlu  $GHD$ ; tedy roven. Avšak  $\sphericalangle AGH = EGB$ ; tedy též  $\sphericalangle EGB = GHD$ . Společným buď  $BGH$ ; tedy  $\sphericalangle EGB + BGH = BGH + GHD$ . Avšak  $\sphericalangle EGB + BGH = 2R$ ; tedy též  $\sphericalangle BGH + GHD = 2R$ .

Když tedy přímka protínající rovnoběžky — —.

## XXX.


Rovnoběžky téže přímky též vespolek jsou rovnoběžné.

Buď  $AB$  i  $CD$  rovnoběžná s  $EF$ ; pravím, že též  $AB \parallel CD$ .

Nuže protínej je přímka  $GK$ .

A ježto rovnoběžky  $AB, EF$  protíná přímka  $GK$ , tedy  $\sphericalangle AGK = GHF$ . Dále ježto rovnoběžky  $EF, CD$  protíná přímka  $GK$ , jest  $\sphericalangle GHF = GKD$ . Dokázáno však bylo, že též  $\sphericalangle AGK = GHF$ . Tedy též  $\sphericalangle AGK = GKD$ , a jsou střídavé. Tedy  $AB \parallel CD$ .

Tedy rovnoběžky téže přímky — —.



## XXXI.


Daným bodem ved rovnoběžku s přímku danou.

Daným bodem buď  $A$ , danou pak přímku  $BC$ ; tož má se bodem  $A$  vésti rovnoběžka s  $BC$ .

Vezměme na  $BC$  kterýkoli bod  $D$  a vedme spojnicí  $AD$ ; a sestroj jen buď na přímce  $DA$  a v bodě na ní  $A$   $\sphericalangle DAE = ADC$  a přímka  $EA$  prodloužena buď o  $AF$ .

A ježto  $AD$  protínající dvě přímky  $BC, EF$  tvoří úhly střídavé  $EAD, ADC$  navzájem rovné, tedy  $EAF \parallel BC$ .

Tedy daným bodem  $A$  vedena jest přímka  $EAF$  s  $BC$  rovnoběžná; což právě bylo vykonati.




## XXXII.

V každém trojúhelníku, prodlouží-li se jedna strana, vnější úhel rovná se dvěma vnitřním protějšími a tři úhly vnitřní rovnají se dvěma pravým.

Trojúhelníkem buď  $ABC$  a jedna strana jeho  $BC$  prodloužena buď do  $D$ ; pravím, že se vnější  $\sphericalangle ACD$  rovná dvěma vnitřním protějšími,  $CAB + ABC$ , a tři vnitřní úhly trojúhelníku, t.  $ABC + BCA + CAB = 2R$ .

Nuže budiž bodem  $C$  vedena  $EC$  rovnoběžně s  $AB$ . A ježto  $AB \parallel CE$  a je protíná  $AC$ , střídavé úhly  $BAC, ACE$  jsou si rovny. Dále, ježto  $AB \parallel CE$  a je protíná přímka  $BD$ , vnější  $\sphericalangle ECD$  rovná se vnitřnímu protějšímu  $ABC$  (úhly souhlasné I. xxix.). Bylo



však dokázáno, že též  $\sphericalangle ACE = BAC$ ; celý tedy  $\sphericalangle ACD$  rovná se oběma vnitřním protějším  $BAC + ABC$ .

Společným buď  $\sphericalangle ACB$ ; tedy  $\sphericalangle ACD + ACB = ABC + BCA + CAB$ . Avšak  $\sphericalangle ACD + ACB = 2R$ ; tedy též  $\sphericalangle ACB + CBA + BAC = 2R$ .

V každém tedy trojúhelníku, prodlouží-li se — —.

## XXXIII.

Přímky spojující dvě stejné rovnoběžky na téže straně též samy jsou stejné a rovnoběžné.

Stejnými rovnoběžkami buďtež  $AB, CD$  a spojujtež je na téže straně<sup>6)</sup> přímky  $AC, BD$ ; pravím, že též  $AC, BD$  jsou stejné a rovnoběžné.

Veďme spojnicí  $BC$ . A ježto  $AB \parallel CD$  a je protíná  $BC$ , jsou střídavé úhly  $ABC, BCD$  sobě rovny. A ježto  $AB = CD$  a společnou  $BC$ , tož obě  $AB, BC$  rovnají se střídavě oběma  $BC, CD$ , a  $\sphericalangle ABC = BCD$ ; základna tedy  $AC$  rovná se základně  $BD$  a  $\triangle ABC = BCD$ , i zbývající úhly budou jednotlivě rovny úhlům zbývajícím, proti nimž leží stejné strany, tedy  $\sphericalangle ACB = CBD$ . A ježto přímka  $BC$  protíná obě přímky  $AC, BD$  tvoří střídavé úhly navzájem stejné, tedy  $AC \parallel BD$ . Bylo však dokázáno, že jest jí též rovna.

Tedy přímky spojující — —.

## XXXIV.


Rovnoběžníky mají protější strany i úhly navzájem stejné a úhlopříčkou se půlí.

Buď rovnoběžníkem  $ACDB$ , úhlopříčkou jeho pak  $BC$ ; pravím, že v rovnoběžníku  $ACDB$  protější strany i úhly jsou navzájem stejné a že úhlopříčka  $BC$  jej půlí.

Neboť ježto  $AB \parallel CD$  a je protíná přímka  $BC$ , střídavé úhly  $ABC, BCD$  jsou si rovny. Dále, ježto  $AC \parallel BD$  a je protíná  $BC$ , střídavé úhly  $ACB, CBD$  jsou si rovny. Oba zajisté trojúhelníky  $ABC, BCD$  mají dva úhly  $ABC, BCA$  dvěma  $BCD, CBD$  jednotlivě stejné a jednu stranu jedné straně rovnou, totiž společnou  $BC$  při stejných úhlech; tedy též zbývající strany zbývajícím stranám jednotlivě bude mít rovné a zbývající úhel úhlu zbývajícimu; tedy strana  $AB = CD$ ,  $AC = BD$ , a rovněž

$\sphericalangle BAC = CDB$ . A ježto  $\sphericalangle ABC = BCD$  a  $\sphericalangle CBD = ACB$ , tedy celý  $\sphericalangle ABD$  roven celému  $\sphericalangle ACD$ . Bylo pak dokázáno, že též  $\sphericalangle BAC = CDB$ .

<sup>6)</sup> T. j. nikoli na př.  $B$  s  $C$ .



Tedy rovnoběžníky mají protější strany i úhly navzájem stejné. Pravím ovšem, že též úhlopříčka je půlí. Neboť ježto  $AB = CD$  a společnou  $BC$ , tož obě  $AB, BC$  oběma  $CD, BC$  jsou jednotlivě rovny; též  $\sphericalangle ABC = BCD$ . Tedy též základna  $AC = DB$ . A trojúhelník  $ABC = \triangle BCD$ .

Tedy úhlopříčka  $BC$  rovnoběžník  $ABCD$  půlí; což právě bylo dokázati.


## XXXV.

Rovnoběžníky na téže základně a mezi týmiž rovnoběžkami jsou navzájem stejné.

Rovnoběžníky buďtež  $ABCD, EBCF$  na téže základně  $BC$  a mezi týmiž rovnoběžkami  $AF, BC$ ; pravím, že  $ABCD = EBCF$ .

Neboť ježto  $ABCD$  jest rovnoběžník,  $AD = BC$ , z téže příčiny ovšem též  $EF = BC$ , a tak i  $AD = EF$  a společnou je  $DE$ . Celá tedy  $AE = DF$ . Také však  $AB = DC$ ; obě tedy  $EA, AB$  jednotlivě rovnají se oběma  $FD, DC$  a  $\sphericalangle FDC = EAB$ , vnější vnitřnímu (souhlasnému), tedy základna  $EB = FC$ , a  $\triangle EAB$  bude roven  $\triangle DFC$ . Odečten pak buď společný  $DGE$ ; zbývající tedy lichoběžník  $ABGD = EGCF$ . Společným buď přičten  $\triangle GBC$ ; celý tedy rovnoběžník  $ABCD$  rovná se celému rovnoběžníku  $EBCF$ .

Tedy rovnoběžníky na téže základně — —.




## XXXVI.

Rovnoběžníky na stejných základnách a mezi týmiž rovnoběžkami jsou navzájem stejné.

Buďtež  $ABCD, EFGH$  rovnoběžníky na stejných základnách  $BC, FG$  a mezi týmiž rovnoběžkami  $AH, BG$ ; pravím, že rovnoběžník  $ABCD = EFGH$ .

Nuže veďme spojnice  $BE, CH$ , a ježto  $BC = FG$ , avšak  $FG = EH$ , tedy  $BC = EH$ . Jsou pak též rovnoběžné, a spojují je  $EB, HC$ ; přímky pak, jež spojují stejné a rovnoběžné na téže straně, jsou stejné a rovnoběžné (I. xxxiii.). Tedy  $EBCH$  jest rovnoběžník a je stejný s  $ABCD$  (I. xxxv.), neboť i základnu  $BC$  tož má i jest mezi týmiž rovnoběžkami  $BC, AH$ . Z téže příčiny ovšem též  $EFGH = EBCH$ ; a tak i rovnoběžník  $ABCD = EFGH$ .


Tedy rovnoběžníky na stejných základnách — —.



## XXXVII.

Trojúhelníky na téže základně a mezi týmiž rovnoběžkami jsou si rovny.

Buďtež  $ABC$ ,  $BCD$  trojúhelníky na téže základně  $BC$  a mezi týmiž rovnoběžkami  $AD$ ,  $BC$ ; pravím, že  $\triangle ABC = \triangle DBC$ .



Prodlužme  $AD$  na obě strany do  $E$ ,  $F$  a z  $B$  vedme  $BE \parallel CA$ , z  $C$  pak vedme  $CF \parallel BD$ ; tedy  $EBCA$  i  $DBCF$  jsou rovnoběžníky a jsou stejné, neboť jsou na téže základně  $BC$  a mezi týmiž rovnoběžkami  $BC$ ,  $EF$ ; a trojúhelník  $ABC$  jest polovina rovnoběžníku  $EBCA$ ,


neboť úhlopříčka  $AB$  jej půlí (I. xxxiv.); a  $\triangle DBC = \frac{DBCF}{2}$ , neboť úhlopříčka  $DC$  jej půlí. Tedy  $\triangle ABC = \triangle DBC$ .

Tedy trojúhelníky na téže základně — —.

## XXXVIII.

Trojúhelníky na stejných základnách a mezi týmiž rovnoběžkami jsou si rovny.

Buďtež  $ABC$ ,  $DEF$  trojúhelníky na stejných základnách  $BC$ ,  $EF$  a mezi týmiž rovnoběžkami  $BF$ ,  $AD$ ; pravím, že  $\triangle ABC = \triangle DEF$ .




Nuže prodlužme  $AD$  na obě strany do  $G$ ,  $H$  a z  $B$  vedme  $BG \parallel CA$ , z  $F$  pak vedme  $FH \parallel DE$ . Tedy  $GBCA$  i  $DEFH$  jsou rovnoběžníky, a  $GBCA = DEFH$ , neboť jsou na stejných základnách  $BC$ ,  $EF$  a mezi týmiž rovnoběžkami  $BF$ ,  $GH$ ; a polovina rovnoběžníku

$GBCA$  jest  $\triangle ABC$ , neboť úhlopříčka  $AB$  jej půlí. Polovina pak rovnoběžníku  $DEFH$  jest  $\triangle FED$ , neboť úhlopříčka  $DF$  jej půlí. Tedy  $\triangle ABC = \triangle DEF$ .

Tedy trojúhelníky na stejných základnách — —.

## XXXIX.

Stejně trojúhelníky na téže základně a na téže straně jsou též mezi týmiž rovnoběžkami.



Buďtež  $ABC$ ,  $DBC$  stejnými trojúhelníky na téže základně  $BC$ , a na téže straně (základny); pravím, že jsou též mezi týmiž rovnoběžkami.

Nuže vedme spojnici  $AD$ ; pravím, že  $AD \parallel BC$ . Neboť není-li, buď z bodu  $A$  vedena přímka  $AE \parallel BC$  a spojnice  $EC$ ; tedy

$\triangle ABC = \triangle EBC$ , neboť jsou na téže základně  $BC$  a mezi týmiž rovnoběžkami. Avšak  $\triangle ABC = \triangle DBC$ , tedy  $\triangle DBC = \triangle EBC$ , totiž větší menšímu; což právě nemožno. Tedy  $AE$  není s  $BC$  rovnoběžná. Podobně ovšem dokážeme, že ani žádná jiná kromě  $AD$ ; tedy  $AD \parallel BC$ .


Tedy stejné trojúhelníky na téže základně — —.

## XL.

Stejně trojúhelníky na stejných základnách a na téže straně jsou též mezi týmiž rovnoběžkami.

Buďtež  $ABC$  a  $CDE$  stejnými trojúhelníky na stejných základnách  $BC$ ,  $CE$  a na téže straně (základny, jež činí jednu přímku); pravím, že jsou též mezi týmiž rovnoběžkami.

Nuže vedme spojnici  $AD$ ; pravím, že  $AD \parallel BE$ . Neboť není-li, buď z  $A$  vedena  $AF \parallel BE$  a spojnice  $FE$ . Tedy  $\triangle ABC = \triangle FCE$ , neboť jsou na stejných základnách  $BC$ ,  $CE$  a mezi týmiž rovnoběžkami  $BE$ ,  $AF$ . Avšak  $\triangle ABC = \triangle DCE$ , tedy též  $\triangle DCE = \triangle FCE$ , totiž větší menšímu, což právě nemožno. Tedy není  $AF \parallel BE$ . Podobně dokážeme, že ani žádná jiná kromě  $AD$ ; tedy  $AD \parallel BE$ .



Tedy stejné trojúhelníky na stejných základnách — —.


## XLI.

Když má rovnoběžník s trojúhelníkem touž základnu a jest mezi týmiž rovnoběžkami, rovnoběžník je dvakrát větší než trojúhelník.

Nuže rovnoběžník  $ABCD$  měj s  $\triangle EBC$  touž základnu  $BC$  a buď mezi týmiž rovnoběžkami  $BC$ ,  $AE$ ; pravím, že rovnoběžník  $ABCD$  je dvakrát větší než  $\triangle BEC$ .

Nuže vedme spojnici  $AC$ . Stejný zajisté je  $\triangle ABC$  s  $\triangle EBC$ , neboť jest na téže základně  $BC$  a mezi týmiž rovnoběžkami  $BC$ ,  $AE$  (I. xxxvii.). Avšak rovnoběžník  $ABCD = 2 \triangle ABC$ ; neboť úhlopříčka  $AC$  jej půlí; a tak rovnoběžník  $ABCD$  je dvakrát větší také než  $\triangle EBC$ .


Když tedy má rovnoběžník — —.



## XLII.

Sestroj na daném úhlu přímkovém rovnoběžník danému trojúhelníku rovný.

Buď daným trojúhelníkem  $ABC$ , daným pak úhlem přímkovým  $D$ ; tož má se na daném úhlu přímkovém  $D$  sestrojiti rovnoběžník trojúhelníku  $ABC$  rovný.




Rozpolme  $BC$  v  $E$  a vedme spojnicí  $AE$  a sestrojme na přímce  $EC$  a v bodě na ní  $E$   $\sphericalangle CEF = D$  a z  $A$  vedme  $AG \parallel EC$ , z  $C$  pak vedme  $CG \parallel EF$ ; tedy  $FECG$  jest rovnoběžník. A ježto  $BE = EC$ , též  $\triangle ABE = AEC$ . Je však také rovnoběžník  $FECG = 2AEC$ , neboť má touž základnu a jest mezi týmiž rovnoběžkami (I. XLII.); tedy rovnoběžník  $FECG = \triangle ABC$ . Také má  $\sphericalangle CEF$  rovný danému  $D$ .

Tedy na úhlu  $CEF$ , jenž je stejný s  $D$ , sestrojen jest rovnoběžník  $FECG$  rovný danému  $\triangle ABC$ ; což právě bylo vykonati.

XLIII.

V každém rovnoběžníku doplňky rovnoběžníkův objímajících úhlopříčku jsou si rovny.

Rovnoběžníkem buď  $ABCD$ , úhlopříčkou jeho  $AC$ , rovnoběžníky  $AC$  objímajícími buďtež  $EH$ ,  $FG$ , tak řečenými doplňky  $BK$ ,  $KD$ ; pravím, že doplněk  $BK$  rovná se doplňku  $KD$ .



Něboť ježto  $ABCD$  jest rovnoběžník,  $AC$  pak jeho úhlopříčka,  $\triangle ABC = \triangle ACD$ . Dále, ježto  $EH$  jest rovnoběžník,  $AK$  pak jeho úhlopříčka,  $\triangle AEK = \triangle AHK$ . Z téže příčiny ovšem  $\triangle FKC = \triangle KGC$ . Ježto tedy  $\triangle AEK = \triangle AHK$  a  $\triangle FKC = \triangle KGC$ , jest  $\triangle AEK + \triangle KGC = \triangle AHK + \triangle FKC$ ; jest pak též celý  $ABC = ADC$ ; tedy zbývající doplněk  $BK$  rovná se zbývajícímu doplňku  $KD$ .

V každém tedy rovnoběžníku doplňky — —.

XLIV.

K dané přímce přistav daným úhlem přímkovým rovnoběžník rovný danému trojúhelníku.


Danou přímkou buď  $AB$ , daným trojúhelníkem  $C$ , daným pak úhlem přímkovým  $D$ ; tož má se k dané přímce  $AB$  úhlem stejným s  $D$  přistaviti rovnoběžník danému trojúhelníku  $C$  rovný.

Sestrojen buď rovnoběžník  $BEPG = \triangle C$  úhlem  $EBG$ , který je stejný s  $D$ ; i položen buď tak, aby  $BE$  s  $AB$  bylo v přímce, a prodloužena buď  $FG$  k  $H$ , a z bodu  $A$  vedena buď  $AH$ <sup>7)</sup>, s kteroukoli se stran  $BG$ ,  $EF$  rovnoběžná, i spojnice  $HB$ .

<sup>7)</sup>  $H$  označ, až tato rovnoběžka protne prodlouženou  $FG$ .

A ježto rovnoběžky  $AH$ ,  $EF$  protala přímka  $HF$ , tedy  $\sphericalangle AHF + \sphericalangle HFE = 2R$ . Pročež  $\sphericalangle (BHG + GFE) < 2R$ ; tedy přímky při úhlech menších než dva pravé, prodlouží-li se do nekonečna, setkávají se; tedy se  $HB$ ,  $FE$  prodloužovány jsouce setkají. Buďte prodlouženy a stýkají se v  $K$ , a z bodu  $K$  vedena buď  $KL$ , a prodlouženy buďte  $HA$ ,  $GB$  do bodů  $L$ ,  $M$ . Tedy  $HLKF$  jest rovnoběžníkem a  $HK$  jeho úhlopříčkou, a tuto  $HK$  objímají rovnoběžníky  $AG$ ,  $ME$ , a tak řečené doplňky jsou  $LB$ ,  $BF$ ; tedy  $LB = BF$  (I. XLIII.). Avšak  $BF = \triangle C$ ; tedy též  $LB = C$ . A ježto  $\sphericalangle GBE = \triangle ABM$ , avšak  $GBE = D$ , tedy též  $\triangle ABM = D$ .

K dané tedy přímce  $AB$  daným úhlem  $ABM$ , který je stejný s  $D$ , přistaven jest rovnoběžník rovný danému  $\triangle C$ ; což právě bylo vykonati.




XLV.

Sestroj na daném úhlu přímkovém rovnoběžník rovný danému útvaru přímkovému.

Daným útvarem přímkovým buď  $ABCD$ , daným pak úhlem přímkovým  $E$ ; tož má se sestrojiti na daném úhlu  $E$  rovnoběžník danému útvaru přímkovému  $ABCD$  rovný.

Vedme spojnicí  $DB$  a sestrojme rovnoběžník  $FH$  rovný trojúhelníku  $ABD$  na  $\sphericalangle HKF = E$  a přistavme ku přímce  $GH$  rovnoběžník  $GM$  rovný trojúhelníku  $DBC$  na  $\sphericalangle GHM = E = \sphericalangle HKF$ . Společným buď  $KHG$ ; tedy  $\sphericalangle FKH + \sphericalangle KHG = \sphericalangle KHG + \sphericalangle GHM$ . Avšak  $\sphericalangle FKH + \sphericalangle KHG = 2R$ ; tedy též  $\sphericalangle KHG + \sphericalangle GHM = 2R$ . Tedy na jakési přímce  $GH$  a v jejím bodě  $H$  dvě přímky  $KH$ ,  $HM$  na rozličných stranách ležící tvoří stýkané úhly rovné dvěma pravým; tedy  $KH$ ,  $HM$  jsou v přímce (I. XIV.); a ježto rovnoběžky  $KM$ ,  $FG$  protala přímka  $HG$ , úhly střídavé  $MHG$ ,  $HGF$  jsou si rovny. Společným buď  $\sphericalangle HGL$ ; tedy  $\sphericalangle MHG + \sphericalangle HGL = \sphericalangle HGF + \sphericalangle HGL$ . Avšak  $\sphericalangle MHG + \sphericalangle HGL = 2R$ ; tedy též  $\sphericalangle HGF + \sphericalangle HGL = 2R$ . Tedy  $FG$ ,  $GL$  činí přímku. A ježto  $FK = HG$  a s ní jest rovnoběžná, avšak i  $GH = ML$  a s ní jest rovnoběžná, tedy též  $KF \parallel ML$ . A spojují je  $KM$ ,  $FL$ ; tedy též  $KM$ ,  $FL$  jsou stejné a rovnoběžné; tedy  $KFML$  jest rovnoběžník. A ježto  $\triangle ABC$  rovná se rovnoběžníku  $FH$  a  $\triangle DBC = \triangle GM$ , tedy celý útvar přímkový rovná se celému rovnoběžníku  $KFLM$ .



Tedy na daném  $\sphericalangle FKM$ , jenž se rovná danému  $\sphericalangle E$ , sestrojen jest rovnoběžník  $KFLM$  rovný danému útvaru přímkovému  $ABCD$ ; což právě bylo vykonati.

## XLVI.

Na dané přímce narýsuj čtverec.

Danou přímku buď  $AB$ ; má se tedy na přímce  $AB$  narýsovat čtverec.


Veďme ku přímce  $AB$  z bodu na ní  $A$  kolmici  $AC$ , a buď  $AD = AB$ ; a z bodu  $D$  veďme  $DE \parallel AB$ , z bodu pak  $B$  veďme  $BE \parallel AD$ . Tedy  $ADEB$  jest rovnoběžník; tedy  $AB = DE$ ,  $AD = BE$ ; ale  $AB = AD$ ; tedy všechny čtyři,  $BA$ ,  $AD$ ,  $DE$ ,  $EB$ , jsou si rovny; pročež rovnoběžník  $ADEB$  je stejnostranný. Pravím ovšem, že též pravouhlý. Neboť ježto rovnoběžky  $AB$ ,  $DE$  protala přímka  $AD$ , tedy  $\sphericalangle BAD + \sphericalangle ADE = 2R$ . Avšak  $\sphericalangle BAD$  jest pravý, tedy jest pravý též  $\sphericalangle ADE$ . V rovnoběžnících pak protější strany i úhly jsou si navzájem rovny; tedy též oba protější úhly  $\sphericalangle ABE$ ,  $\sphericalangle BED$  jsou pravé. Tedy  $ADEB$  jest obrazec pravouhlý. Dokázáno však bylo, že též stejnostranný.

Jest to tedy čtverec a jest narýsován na přímce  $AB$ ; co právě bylo vykonati.

## XLVII.

V pravouhlých trojúhelnících čtverec na straně proti úhlu pravému ležící rovná se čtvercům na stranách pravý úhel svírajících (\*věta Pythagorova\*).

Trojúhelníkem pravouhlým buď  $ABC$ , maje pravý úhel  $BAC$ ; pravím, že čtverec na  $BC$  rovná se (součtem) čtvercům na  $BA$  a na  $AC$ .



Nuže buď narývován na  $BC$  čtverec  $BDEC$ , na  $BA$ ,  $AC$  pak  $GB$ ,  $HC$ , a z bodu  $A$  vedena buď  $AL \parallel BD$  nebo  $CE$  a spojnice  $AD$ ,  $FC$ . A ježto  $\sphericalangle BAC$  i  $\sphericalangle BAG$  jsou pravé, tož na jakési přímce  $BA$  a při bodě na ní  $A$  dvě přímky  $AC$ ,  $AG$  na rozličných stranách tvoří stýkavé úhly rovné dvěma pravým, tedy  $CA$ ,  $AG$  činí přímku; z téže příčiny ovšem též  $BA$ ,  $AH$  činí přímku (I. xiv.). A ježto  $\sphericalangle DBC = \sphericalangle FBA$ , oba totiž jsou pravé; společný přičtemež  $\sphericalangle ABC$ ; tedy celý  $\sphericalangle DBA = \sphericalangle FBC$ . A ježto  $DB = BC$  a  $FB = BA$ , jsou ovšem  $DB$ ,  $BA$  oběma  $FB$ ,  $BC$  jednotlivě rovny, a  $\sphericalangle DBA = \sphericalangle FBC$ ; tedy základna  $AD = FC$  a  $\triangle ABD = \triangle FBC$ ; a dvakrát větší než  $\triangle ABD$  jest rovnoběžník

$BL$ ; neboť mají touž základnu a jsou mezi týmiž rovnoběžkami  $BD$ ,  $AL$  (I. xli.); a dvakrát větší než  $\triangle FBC$  je čtverec  $GB$ , neboť mají touž základnu a jsou mezi týmiž rovnoběžkami  $FB$ ,  $GC$ . [Dvojnásobky pak týchž veličin jsou si rovny.] Tedy též rovnoběžník  $BL$  rovná se čtverci  $GB$ .

Podobně ovšem vedením spojnic  $AE$ ,  $BK$  dokáže se, že též rovnoběžník  $CL$  rovná se čtverci  $HC$ . Celý tedy čtverec  $BDEC$  rovná se součtu obou čtverců  $GB$ ,  $HC$ . I jest čtverec  $BDEC$  narýsován na  $BC$ , a  $GB$ ,  $HC$  na  $BA$ ,  $AC$ . Tedy  $BC^2 = BA^2 + AC^2$ .


Tedy v pravouhlých trojúhelnících — —

## XLVIII.

Když v trojúhelníku čtverec na jedné ze stran rovná se čtvercům na dvou ostatních stranách trojúhelníku, úhel ostatními dvěma stranami trojúhelníku sevřený jest pravý.

Nuže v  $\triangle ABC$  čtverec na jedné straně  $BC$  buď roven součtu čtverců na  $BA$ ,  $AC$ ; pravím, že  $\sphericalangle BAC$  jest pravý.

Nuže veďme z bodu  $A$  ku přímce  $AC$  kolmici  $AD$ , a buď  $BA = AD$ , a veďme spojnici  $DC$ . Ježto  $DA = AB$ , také čtverec na  $DA$  roven čtverci na  $AB$ . Společným přičtemež čtverec na  $AC$ ; tedy  $DA^2 + AC^2 = BA^2 + AC^2$ . Avšak  $DA^2 + AC^2 = DC^2$ , neboť  $\sphericalangle DAC$  jest pravý; čtverce však  $BA^2 + AC^2 = BC^2$ ; to je totiž podmínkou; tedy  $DC^2 = BC^2$ , takže též strana  $DC = BC$ . A ježto  $DA = AB$ , společnou pak jest  $AC$ , patrně obě  $DA$ ,  $AC$  jsou oběma  $BA$ ,  $AC$  jednotlivě rovny a základna  $DC = BC$ ; tedy  $\sphericalangle DAC = \sphericalangle BAC$ . Úhel však  $\sphericalangle DAC$  jest pravý; pravý tedy též  $\sphericalangle BAC$ .



Když tedy v trojúhelníku čtverec — —

## Kniha druhá.

## Vměry.


1. O každém pravouhlém rovnoběžníku pravíme, že jej svírají dvě přímky, svírající pravý úhel.
2. V každém útvaru rovnoběžkovém kterýkoli z rovnoběžníkův objímajících jeho úhlopříčku se dvěma doplňky nazýván buď soudelníkem (gnómón).



## I.

Když jsou dvě přímky a jedna z nich se rozdělí na několik dílů, pravoúhelník sevřený těmi dvěma přímkami rovná se pravoúhelníkům sevřeným přímkou nerozdělenou a každou z úseček.

Buďte dvě přímky  $A$ ,  $BC$ , a  $BC$  buď rozdělena jakkoli v bodech  $D$ ,  $E$ ; pravím, že pravoúhelník sevřený přímkami  $A$ ,  $BC$  rovná se pravoúhelníkům sevřeným přímkami  $A$ ,  $BD$  a  $A$ ,  $DE$  a ještě  $A$ ,  $EC$




Nuže vedme z  $B$  k  $BC$  kolmici  $BF$ , a budiž  $BG = A$  a z  $G$  vedme  $GH \parallel BC$  a z  $D$ ,  $E$ ,  $C$  vedme  $DK$ ,  $EL$ ,  $CH$  rovnoběžně s  $BG$ .

Patrně  $BH = BK + DL + EH$ . A  $BH$  jest z  $A$ ,  $BC$ , neboť je sevřen přímkami  $GB$ ,  $BC$ ;  $BG$  pak  $= A$ ;  $BK$  jest z  $A$ ,  $BD$ , neboť sevřen jest přímkami  $GB$ ,  $BD$ ;  $BG$  pak  $= A$ .  $DL$  je z  $A$ ,  $DE$ , neboť  $DK$ , t. j.  $BG = A$ . A podobně ještě  $EH$  je z  $A$ ,  $EC$ ; tedy pravoúhelník z  $A$ ,  $BC$  rovná se pravoúhelníkům z  $A$ ,  $BD$  a z  $A$ ,  $DE$  a ještě z  $A$ ,  $EC$ .

Když jsou tedy dvě přímky — —

## II.

Když se přímka libovolně rozdělí, pravoúhelníky sevřené celou a oběma úsečkami rovnají se čtverci z celé.



Nuže přímka  $AB$  buď libovolně rozdělena v bodě  $C$ ; pravím, že pravoúhelník sevřený přímkami  $AB$ ,  $BC$  i s pravoúhelníkem z  $BA$ ,  $AC$  rovná se čtverci z  $AB$ .<sup>1)</sup>

Nuže narýsujeme z  $AB$  čtverec  $ADEB$  a z  $C$  vedme  $CF$  rovnoběžně s  $AD$  nebo  $BE$ .

$AE$  patrně se rovná  $AF + CE$ . I jest  $AE$  čtverec z  $AB$ ;  $AF$  pak pravoúhelník z  $BA$ ,  $AC$ , neboť je sevřen přímkami  $DA$ ,  $AC$ , a  $AD = AB$ ;  $CE$  pak je z  $AB$ ,  $BC$ , neboť  $BE = AB$ . Tedy rovnoběžník z  $BA$ ,  $AC$

spolu s rovnoběžníkem z  $AB$ ,  $BC$  rovná se čtverci z  $AB$ .

Když se tedy přímka libovolně rozdělí, — —

<sup>1)</sup> Algebraicky: buď  $a = b + c$ , bude  $ab + ac = a^2$ .


## III.

Když se přímka libovolně rozdělí, pravoúhelník celou přímkou a jednou úsečkou sevřený rovná se pravoúhelníku úsečkami sevřenému a čtverci z řečené úsečky.

Nuže přímka  $AB$  buď libovolně rozdělena v  $C$ ; pravím, že pravoúhelník sevřený přímkami  $AB$ ,  $BC$  rovná se pravoúhelníku sevřenému úsečkami  $AC$ ,  $CB$  se čtvercem z  $BC$ .<sup>2)</sup>

Nuže narýsujeme z  $CB$  čtverec, prodlužme  $ED$  do  $F$  a z  $A$  vedme  $AF \parallel CD$  nebo  $BE$ . Patrně  $AE = AD + CE$  a jest  $AE$  pravoúhelník z  $AB$ ,  $BC$ ; neboť sevřen je přímkami  $AB$ ,  $BE$  a  $BE = BC$ .  $AD$  pak je z  $AC$ ,  $CB$ , neboť  $DC = CB$ .  $DB$  pak je čtverec z  $CB$ . Tedy pravoúhelník z  $AB$ ,  $BC$  rovná se pravoúhelníku z  $AC$ ,  $CB$  se čtvercem z  $BC$ .

Když se tedy přímka libovolně rozdělí — —




## IV.

Když se přímka libovolně rozdělí, čtverec z celé rovná se čtvercům z úseček a dvojnásobnému pravoúhelníku úsečkami sevřenému.

Nuže přímka  $AB$  buď libovolně rozdělena v  $C$ ; pravím, že čtverec z  $AB$  rovná se čtvercům z  $AC$  a z  $CB$  a dvojnásobnému pravoúhelníku úsečkami  $AC$ ,  $CB$  sevřenému.<sup>3)</sup>

Nuže narýsujeme z  $AB$  čtverec  $ADEB$ , vedme spojnicí  $BD$ , z bodu  $C$  vedme  $CF \parallel AD$  nebo  $BE$  a bodem  $G$  vedme  $HK \parallel AB$  nebo  $DE$ . A ježto  $CF \parallel AD$  a protíná je  $BD$ , vnější  $\sphericalangle CGB$  rovná se vnitřnímu protějšímu (souhlasnému)  $ADB$ . Avšak  $\sphericalangle ADB = ABD$ , ježto též strana  $BA = AD$ , tedy též  $\sphericalangle CGB = GBC$ , a tak i strana  $BC = CG$ . Avšak  $CB = GK$  a  $CG = BK$ , tedy též  $GK = KB$ ; tedy je  $CGKB$  rovnostranný. Pravím ovšem, že také pravoúhlý. Neboť ježto  $CG \parallel BK$  [a protíná je přímka  $CB$ ], tedy  $\sphericalangle KBC + GCB = 2R$ . Avšak  $\sphericalangle KBC$  je pravý, pravým tedy též  $\sphericalangle BCG$ ; a tak i protější  $CGK$  a  $GKB$  jsou pravé. Tedy  $CGKB$  jest pravoúhelník; dokázáno však, že i stejnostranný, jest to tedy čtverec, a je z  $CB$ . Z téže příčiny ovšem



<sup>2)</sup> Buď  $a = b + c$ , bude  $ac = bc + c^2$ .

<sup>3)</sup> Buď  $a = b + c$ , bude  $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc$ .

i  $HF$  je čtverec, a jest z  $HG$ , t. j.  $AC$ . Tedy  $HF$ ,  $KC$  jsou čtverce z  $AC$ ,  $CB$ . A ježto  $AG = GE$  (I. XLIII.) a jest  $AG$  z  $AC$ ,  $CB$ , neboť  $GC = CB$ ; tedy též  $GE = AC \times CB$ ; tedy  $AG + GE = 2 AC \times CB$ . Jsou pak  $HF$ ,  $CK$  čtverce z  $AC$ ,  $CB$ ; tedy ty čtyři  $HF + CK + AG + GE = AC^2 + CB^2 + 2 AC \times CB$ . Avšak  $HF$ ,  $CK$ ,  $AG$ ,  $GE$  je celý  $ADEB$ , což je čtverec z  $AB$ ; tedy  $AB^2 = AC^2 + CB^2 + 2 AC \times CB$ .

Když se tedy přímka libovolně rozdělí, — —.


[Důsledek.]

Z toho zajisté patrné, že ve čtvercích rovnoběžníky objímající úhlopříčku jsou čtverce.]

V.

Když se přímka rozdělí v úsečky stejné a nestejně, pravouhelník nestejnými úsečkami celé se vřeny se čtvercem úsečky mezi průsečíky rovná se čtverci půlky.

Nuže rozdělme jakousi přímku  $AB$  na úsečky stejné v  $C$  a nestejně v  $D$ ; pravím, že  $AD \times DB + CD^2 = CB^2$  4).



Nuže narýsujeme z  $CB$  čtverec  $CEFB$  a spojnicí  $BE$  a z  $D$  vedme  $DG \parallel CE$  nebo  $BF$ , z  $H$  pak  $KM \parallel AB$  nebo  $EF$  a dále z  $A$  vedme  $AK \parallel CL$  nebo  $BM$ . A ježto doplněk  $CH$  rovná se doplňku  $HF$ , společným přičteme  $DM$ ; tedy celý  $CM = DF$ . Avšak  $CM = AL$ , ježto též  $AC = CB$ ; tedy též  $AL = DF$ . Společným

přičteme  $CH$ ; celý tedy  $AH$  rovná se soudelníku  $MNO$ . Avšak  $AH$  je z  $AD$ ,  $DB$ ; neboť  $DH = DB$ ; tedy též soudelník  $MNO + LG = AD \times DB + CD^2$ . Avšak soudelník  $MNO + LG$  je celý čtverec  $CEFB$ , jenž je z  $CB$ ; tedy  $AD \times DB + CD^2 = CB^2$ .

Když se tedy přímka rozdělí v úsečky stejné a — —.

VI.


Když se rozpůlí přímka a připojí se k ní v přímém směru jiná, pravouhelník z celé s připojenou a z připojené spolu se čtvercem z půlky rovná se čtverci z půlky a připojené.

Nuže buď nějaká přímka  $AB$  rozpůlena v bodě  $C$ , k ní buď při-

4) Nestejnými úsečkami buďtež  $a$ ,  $b$ ; bude  $ab + \left(\frac{a+b}{2} - b\right)^2 = \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$ .

pojena v přímém směru přímka  $BD$ ; pravím, že  $AD \times DB + CB^2 = BD^2$  5).

Nuže buď narýsován z  $CD$  čtverec  $CEFD$  a spojnicí  $DE$ , a z bodu  $B$  vedme  $BG \parallel EC$  nebo  $DF$  a z bodu  $H$  vedme  $KM \parallel AB$  nebo  $EF$  a rovněž z  $A$  vedme  $AK \parallel CL$  nebo  $DM$ .



Ježto tedy  $AC = CB$ , též  $AL = CH$ ; avšak  $CH = HF$  (I. XLIII.); tedy též  $AL = HF$ . Společným přičteme  $CM$ ; celý tedy  $AM$  je z  $AD$ ,  $DB$ , neboť  $DM = DB$ ; tedy též soudelník  $NOP = AD \times DB$ . Společným přičtemež  $LG = BC^2$ ; tedy  $AD \times DB + CB^2 = NOP + LG$ . Avšak  $NOP + LG$  je čtverec  $CEFD$  celý, jenž je z  $CD$ ; tedy  $AD \times DB + CB^2 = CD^2$ .

Když se tedy rozpůlí přímka a připojí se — —.


VII.

Když se přímka libovolně rozdělí, čtverec celé a čtverec jedné úsečky součtem rovnají se dvojnásobnému pravouhelníku z celé a řečené úsečky a čtverci úsečky zbývající.

Nuže rozdělme nějakou přímku  $AB$  v bodě  $C$ ; pravím, že  $AB^2 + BC^2 = 2 AB \times BC + CA^2$  6).

Nuže narýsujeme z  $AB$  čtverec  $ADEB$ , a útvar buď linkami vyznačen. 7)

Ježto zajisté  $AG = GE$ , společným přičteme  $CF$ ; tedy celý  $AF = CE$ ; tedy  $AF + CE = 2 AF$ . Avšak  $AF + CE$  jest soudelník  $KLM$  a  $CF$  čtverec; tedy soudelník  $KLM + CF = 2 AF$ . Jest pak  $2 AB \times BC = 2 AF$ , neboť  $BF = BC$ ; tedy soudelník  $KLM + CF = 2 AB \times BC$ . Společným přičteme  $DG$ , což je čtverec z  $AC$ ; tedy soudelník  $KLM + BG + GD = 2 AB \times BC + AC^2$ . Avšak  $KLM + BG + GD = ADEB + CF$ , což jsou čtverce z  $AB$  a  $BC$ ; tedy  $AB^2 + BC^2 = 2 AB \times BC + AC^2$ .



Když se tedy přímka libovolně rozdělí, čtverec — —.

5) Půlkou přímky buď  $a$ , připojenou  $b$ ; bude  $(2a + b)b + a^2 = (a + b)^2$ .

6) Úsečkami buďtež  $a$ ,  $b$ ; bude  $(a + b)^2 + b^2 = 2(a + b)b + a^2$ , n.  $(a + b)^2 + a^2 = 2(a + b)a + b^2$ .


7) Linkami  $CN$ ,  $HF$  a  $DB$ , příslušným směrem vedenými.

## VIII.

Když se přímka libovolně rozdělí, čtyřnásobný pravoúhelník z celé a jedné úsečky spolu se čtvercem úsečky zbývající rovná se čtverci celé a řečené úsečky v jedno vzatých.

Nuže rozdělme libovolně nějakou přímkou  $AB$  v bodě  $C$ ; pravím, že čtyřnásobný pravoúhelník z  $AB$ ,  $BC$  spolu se čtvercem z  $AC$  rovná se čtverci z  $AB$ ,  $BC$  v jedno vzatých.<sup>8)</sup>

Nuže vedme dále přímým směrem  $BD$  a buď  $BD = CB$ , a narýsujeme z  $AD$  čtverec  $Aefd$ , a útvar vyznačíme dvojími linkami.<sup>9)</sup>



Ježto tedy  $CB = BD$ , avšak  $CB = GK$ ,  $BC = KN$ , tedy  $GK = KN$ . Z téže příčiny patrně  $QR = RP$ . A ježto  $BC = BD$  a  $GK = KN$ , tedy též  $CK = KD$  a  $GR = RN$ . Avšak  $CK = RN$ , neboť jsou to doplňky rovnoběžníku; tedy též  $KD = GR$ ; tedy všechny čtyři  $DK$ ,  $CK$ ,  $GR$ ,  $RN$  jsou si rovny. Ty čtyři tedy jsou čtyřikrát větší než  $CK$ . Ježto dále  $CB = BD$ , avšak  $BD = BK$ , t. j.  $CG$ , a  $CB = GK$ , t. j.  $GQ$ , tedy též  $CG = GQ$ . A ježto  $CG = GQ$  a  $QR = RP$ , též  $AG = MQ$  a  $QL = RF$ . Avšak  $MQ = QL$ , neboť to doplňky rovnoběžníku

$ML$ ; tedy též  $AG = RF$ ; tedy ty čtyři  $AG$ ,  $MQ$ ,  $QL$ ,  $RF$  jsou si rovny; tedy ty čtyři jsou čtyřikrát větší než  $AG$ . Bylo pak dokázáno, že též čtyři  $CK$ ,  $KD$ ,  $GR$ ,  $RN$  čtyřikrát větší než  $CK$ ; tedy všech osm obsahujících soudělník  $STU$  je čtyřikrát větší než  $AK$ . A ježto  $AK$  je z  $AB$ ,  $BC$ , neboť  $BK = BD$ , tedy  $4 AB \times BD = 4 AK$ . Dokázáno však bylo, že též soudělník  $STU = 4 AK$ ; tedy  $3 AB \times BD = STU$ . Společným buď  $OH$ , což rovno čtverci z  $AC$ ; tedy  $4 AB \times BD + AC^2 = STU + OH$ . Avšak  $STU + OH$  jest celý čtverec  $Aefd$ , jenž je z  $AD$ ; tedy  $4 AB \times BD + AC^2 = AD^2$ ;  $BD$  však  $= BC$ . Tedy  $4 AB \times BC + AC^2 = AD^2$ , t. j. čtverci z  $AB$  a  $BC$  v jedno vzatých.

Když se tedy přímka libovolně rozdělí, čtyřnásobný — —

## IX.

Když se rozdělí přímka na úsečky stejné a nestejně, čtverce nestejných úseček přímky celé jsou dvakrát větší nežli čtverce z půlky a z úsečky mezi průsečíky.

Nuže rozdělme nějakou přímkou  $AB$  na úsečky stejné v  $C$  a nestejně v  $D$ ; pravím, že čtverce z  $AD$  a z  $DB$  dvakrát větší jsou nežli čtverce z  $AC$  a z  $CD$ .<sup>10)</sup>

<sup>8)</sup> Úsečkami buďtež  $a$ ,  $b$ ;

bude  $4(a+b)b + a^2 = [(a+b) + b]^2$  n.  $4(a+b)a + b^2 = [(a+b) + a]^2$ .

<sup>9)</sup> Jednak  $MN$ ,  $CH$ , jednak  $OP$ ,  $BL$  (a úhlopříčkou  $DE$ ).

<sup>10)</sup> Nestejnými úsečkami buďtež  $a$ ,  $b$ ; bude  $a^2 + b^2 = 2\left[\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 + \left(\frac{a+b}{2} - b\right)^2\right]$ .

Nuže z  $C$  vedena buď  $CE$  kolmo k  $AB$  a buď  $CE = AC$  nebo  $CB$ , a spojnice  $AE$ ,  $EB$ , a z  $D$  vedme  $DF \parallel EC$  a z  $F$   $FG \parallel AB$  a spojnici  $AF$ . A ježto  $AC = CE$ , též  $\sphericalangle EAC = AEC$ , a ježto při  $C$  jest pravý, tedy ostatní  $EAC + AEC = R$  a jsou stejné; tedy  $\sphericalangle CEA = CAE = \frac{R}{2}$ . Z téže příčiny ovšem  $\sphericalangle CEB$  i  $EBC$  jsou každý  $\frac{R}{2}$ ;

tedy  $AEB = R$ . A ježto  $GEF = \frac{R}{2}$  a  $EGF = R$ , neboť se rovná vnitřnímu protějšímu (souhlasnému)  $ECB$ ; tedy zbývající  $EFG = \frac{R}{2}$ , a tak

též strana  $EG = GF$ . Ježto dále  $\sphericalangle B$  jest  $\frac{R}{2}$  a  $FDB = R$ , neboť se rovná opět vnitřnímu protějšímu (souhlasnému)  $ECB$ ; tedy zbývající  $BFD = \frac{R}{2}$  tedy  $\sphericalangle B = DFB$ ; a tak též strana  $FD = DB$ . A ježto

$AC = CE$ , také  $AC^2 = CE^2$ ; tedy  $AC^2 + CE^2 = 2AC^2$ . Avšak  $AC^2 + CE^2 = EA^2$ , neboť  $\sphericalangle ACE = R$ ; tedy  $EA^2 = 2AC^2$ . Dále, ježto  $EG = GF$ , také  $EG^2 + GF^2 = 2GF^2$ . Avšak  $EG^2 + GF^2 = EF^2$ ; tedy  $EF^2 = 2GF^2$ .  $GF$  však se rovná  $CD$ ; tedy  $EF^2 = 2CD^2$ . Jest pak i  $EA^2 = 2AC^2$ ; tedy  $AE^2 + EF^2 = 2(AC^2 + CD^2)$ . Avšak  $AE^2 + EF^2 = AF^2$ , neboť  $\sphericalangle AEF = R$ ; tedy  $AF^2 = 2(AC^2 + CD^2)$ . Též  $AF^2 = AD^2 + DF^2$ , neboť  $\sphericalangle D = R$ . Tedy  $AD^2 + DF^2 = 2(AC^2 + CD^2)$ .  $DF$  však rovná se  $DB$ ; tedy  $AD^2 + DB^2 = 2(AC^2 + CD^2)$ .


Když se tedy rozdělí přímka na úsečky stejné a nestejně — —

## X.

Když se přímka rozpůlí a připojí se k ní v přímém směru jiná, čtverce z celé s připojenou a z připojené jsou celkem dvakrát větší nežli čtverec z půlky se čtvercem z půlky a připojené v jedno vzatých.

Nuže buď nějaká přímka  $AB$  rozpůlena v  $C$  a k ní ve směru přímém připojena jiná  $BD$ ; pravím, že  $AD^2 + DB^2 = 2(AC^2 + CD^2)$ .<sup>11)</sup>

Nuže z bodu  $C$  vedme  $CE \perp AB$  a buď  $CE = AC$  nebo  $CB$ , a spojíme  $EA$ ,  $EB$  a z  $E$  vedme  $EF \parallel AD$  a z  $D$  vedme  $FD \parallel CE$ . A ježto rovnoběžky  $EC$ ,  $FD$  protíná nějaká přímka  $EF$ , tedy  $\sphericalangle CEF + EFD = 2R$ ; tedy  $(CEB + EFD) < 2R$ ; přímky však při menších úhlech než jsou dva pravé, prodlouženy



<sup>11)</sup> Půlkou přímky buď  $a$ , připojenou  $b$ ; bude  $(2a+b)^2 + b^2 = 2[a^2 + (a+b)^2]$ .


jsou, se stýkají; tedy  $EB, FD$ , prodlouženy jsou směrem k  $B, D$ , se setkají. Buďte prodlouženy a stýkejte se v  $G$ , a spojme  $AG$ . A ježto  $AC = CE$ , též  $\sphericalangle EAC = \sphericalangle AEC$ . Z téže příčiny ovšem  $\sphericalangle CEB = \sphericalangle EBC = \frac{R}{2}$ , tedy  $\sphericalangle AEB = R$ . A ježto  $\sphericalangle EBC = \frac{R}{2}$ , tedy též  $\sphericalangle DBG = \frac{R}{2}$ . Jest pak i  $\sphericalangle BDG = R$ , neboť je stejný s  $DCE$ , totiž střídavý; tedy zbývající  $\sphericalangle DGB = \frac{R}{2}$ , pročež  $\sphericalangle DGB = \sphericalangle DBG$ ; a tak i strana  $BD = GD$ . Dále, ježto  $\sphericalangle EGF = \frac{R}{2}$  a úhel při  $F = R$ , neboť se rovná protějšímu při  $C$ ; tedy zbývající  $\sphericalangle FEG = \frac{R}{2}$ ; tedy  $\sphericalangle EGF = \sphericalangle FEG$ ; a tak i strana  $GF = EF$ . A ježto  $EC^2 = CA^2$ , tedy  $EC^2 + CA^2 = 2CA^2$ . Avšak  $EC^2 + CA^2 = EA^2$ ; tedy  $EA^2 = 2CA^2$ . Ježto dále  $FG = EF$ , také  $FG^2 = FE^2$ ; tedy  $GF^2 + FE^2 = 2EF^2$ . Avšak  $GF^2 + FE^2 = EG^2$ ; tedy  $EG^2 = 2EF^2$ . Avšak  $EF = CD$ ; tedy  $EG^2 = 2CD^2$ . Bylo pak dokázáno, že též  $EA^2 = 2AC^2$ ; tedy  $AE^2 + EG^2 = 2(AC^2 + CD^2)$ . Avšak  $AE^2 + EG^2 = AG^2$ ;  $AG^2 = 2(AC^2 + CD^2)$ . Čtverec pak  $AG^2 = AD^2 + DG^2$ ; tedy  $AD^2 + DG^2 = 2(AC^2 + CD^2)$ ;  $DG$  pak  $= DB$ ; tedy  $AD^2 + DB^2 = 2(AC^2 + CD^2)$ .

Když se tedy přímka rozpůlí a připojí se — —.

## XI.

Rozděl danou přímku tak, aby pravoúhelník z celé a z jedné úsečky rovnal se čtverci úsečky zbývající.

Danou přímku buď  $AB$ ; má se tedy  $AB$  rozdělit, aby pravoúhelník z celé a z jedné úsečky rovnal se čtverci úsečky zbývající.



Nuže narýsujeme z  $AB$  čtverec  $ABDC$  a rozpolme  $AC$  v bodě  $E$  i spojme  $BE$  a prodlužme  $CA$  do  $F$ , a buď  $EF = BE$ , a narýsujeme z  $AF$  čtverec  $FH$  a prodlužme  $GH$  do  $K$ ; pravím, že  $AB$  jest rozdělena v  $H$ , takže činí pravoúhelník z  $AB, BH$  rovným čtverci z  $AH$ .

Neboť  $AC$  rozpůlena jest v  $E$  a připojena k ní  $FA$ , tedy pravoúhelník  $CF \times FA + AE^2 = EF^2$  (II. VI.). Avšak  $EF = EB$ ; tedy  $CF \times FA + AE^2 = EB^2$ . Ale  $EB^2 = BA^2 + AE^2$ , neboť  $\sphericalangle A$  je pravý; tedy  $CF \times FA + AE^2 = BA^2 + AE^2$ ; odečteme společný  $AE^2$ , tedy zbývající  $CF \times FA = AB^2$ . I jest  $FK = CF \times FA$ , neboť  $AF = FG$ ;  $AD$  pak  $= AB^2$ ; tedy  $FK = AD$ . Odečten buď společný  $AK$ , zbývající tedy  $FH = HD$ . I jest  $HD = AB \times BH$ , neboť  $AB = BD$ ; a  $FH = AH^2$ ; tedy pravoúhelník  $AB \times BH = HA^2$ .

Tedy daná přímka  $AB$  rozdělena je v  $H$ , takže pravoúhelník  $AB \times BH$  činí rovným čtverci  $HA^2$ ; což právě bylo vykonati.


## XII.

V trojúhelnících tupoúhlých čtverec strany proti úhlu tupému větší jest nežli čtverce stran tupý úhel svírajících odvojnásobný pravoúhelník sevřený jedním ramenem úhlu tupého, na něž dopadá kolmice, a vnější úsečkou při úhlu tupém, již kolmice omezuje.

Tupoúhlým trojúhelníkem buď  $ABC$  a měj tupý  $\sphericalangle BAC$ , a vedena buď z bodu  $B$  na prodlouženou  $CA$  kolmice  $BD$ ; pravím, že  $BC^2 = BA^2 + AC^2 + 2CA \times AD$ .

Neboť ježto přímka  $CD$  nahodile rozdělena v bodě  $A$ , tedy  $DC^2 = CA^2 + AD^2 + 2CA \times AD$  (II. IV.). Společným přičteme  $DB^2$ ; tedy  $CD^2 + DB^2 = CA^2 + AD^2 + DB^2 + 2CA \times AD$ . Avšak  $CD^2 + DB^2 = CB^2$ , neboť  $\sphericalangle D = R$ ; avšak  $AD^2 + DB^2 = AB^2$ ; tedy  $CB^2 = CA^2 + AB^2 + 2CA \times AD$ .

Tedy v trojúhelnících tupoúhlých — —.




## XIII.

V trojúhelnících ostroúhlých čtverec strany proti úhlu ostrému jest menší nežli čtverec stran úhel ostrý svírajících o dvojnásobný pravoúhelník sevřený jedním ramenem úhlu ostrého, na něž dopadá kolmice, a vnitřní úsečkou jeho při úhlu ostrém, již kolmice omezuje.

Ostroúhlým trojúhelníkem buď  $ABC$  a měj ostrý  $\sphericalangle B$ , a vedena buď z bodu  $A$  na  $BC$  kolmice  $AD$ ; pravím, že  $AC^2 + 2CB \times BD = CB^2 + BA^2$ .

Neboť ježto přímka  $CB$  jest nahodile rozdělena v  $D$ , tedy  $CB^2 + BD^2 = 2CB \times BD + DC^2$  (I. VII.). Společným přičteme  $DA^2$ ; tedy  $CB^2 + BD^2 + DA^2 = 2CB \times BD + AD^2 + DC^2$ . Avšak  $BD^2 + DA^2 = AB^2$ , neboť  $\sphericalangle D = R$ ; čtvercům pak  $AD^2 + DC^2 = AC^2$ ; tedy  $CB^2 + BA^2 = AC^2 + 2CB \times BD$ ; a tak pouhý  $AC^2 < (CB^2 + BA^2)$  o dvojnásobný pravoúhelník  $CB \times BD$ .

Tedy v trojúhelnících ostroúhlých — —.




## XIV.

Sestroj čtverec rovný danému útvaru přímkovému.

Daným útvarem přímkovým (čtyřúhelníkem) buď  $A$ ; má se tedy sestrojiti čtverec útvaru přímkovému  $A$  rovný.

Nuže buď sestrojen útvaru přímkovému  $A$  rovný obdélník  $BD$ . Jest-li ovšem  $BE = ED$ , byl by úkol vykonán; neboť sestrojen jest

čtverec  $BD$  rovný útvaru přímkovému  $A$ ; pakli ne, jest  $BE$  nebo  $ED$  větší. Buď větší  $BE$  a prodloužena buď do  $F$ , a buď  $ED = EF$ , a rozpolme  $BF$  v  $G$  a ze středu  $G$  narýsujme póloměrem  $GB$  nebo  $GF$  polokruh  $BHF$  a prodlužme  $DE$  do  $H$  i vedme spojnici  $GH$ .



Ježto tedy přímka  $BF$  rozdělena v  $G$  na díly stejné, na nestejně pak v  $E$ , tedy  $BE \times EF + EG^2 = GF^2$  (I. v.).  $GF$  však  $= GH$ ; tedy  $BE \times EF + GE^2 = GH^2$ . Tomu však se rovnají čtverce  $HE^2 + EG^2$ . Tedy pravoúhelník  $BE \times EF + GE^2 = HE^2 + EG^2$ . Odečteme společný  $GE^2$ ; tedy zbývající pravoúhelník  $BE \times EF = EH^2$ . Avšak  $BE \times EF = BD$ , neboť  $EF = ED$ ; tedy  $BD = HE^2$ .  $BD$  však je rovno útvaru přímkovému  $A$ . Tedy též útvar přímkový  $A$  rovná se čtverci, jenž bude narýsován z  $EH$ .

Tedy danému útvaru přímkovému  $A$  rovný čtverec je sestrojen, jenž bude narýsován z  $EH$ ; což právě bylo vykonati.

## Kniha třetí.

### Výměry.

- Stejně jsou kruhy, jejichž průměry jsou stejné neboli jejichž poloměry jsou stejné.
- Říká se, že přímka kruhu se dotýká, která kruh zasahuje a prodloužena jsouc kruhu neprotíná.
- Říká se, že kruhy navzájem se dotýkají, které zasahující se ve spolek se neprotínají.
- Říká se, že v kruhu přímky jsou stejně od středu vzdáleny, když kolmice ze středu k nim vedené jsou stejné.
- Říká se však, že vzdálenější je ta, na kterou dopadá kolmice delší.
- Úsečí kruhu jest útvar omezený přímkou (tětivou) a obloukem kruhu.
- Úhlem úseče jest ten, jež svírá tětiva a oblouk kruhu.
- Když se na oblouku úseče vezme nějaký bod a z něho k mezním bodům přímky, která je základnou úseče (tětivou), vedou spojnice, jest ten úhel, jež svírají ty spojnice, úhlem v úseči (obvodovým).
- Když pak přímky úhel svírající zabírají nějaký oblouk, říká se, že úhel na něm stojí.
- Výsečí kruhu, když se ve středu kruhu sestrojí úhel, jest útvar omezený přímkami úhel svírajícími a obloukem jimi zabíraným.


- Podobnými jsou úseče kruhů ty, jež obsahují stejné úhly neboli v nichž úhly navzájem jsou si rovny (úhly v úseči, obvodové; v. vým. 8.).

I.

Najdi střed kruhu daného.

Budiž daným kruhem  $ABC$ ; má se tedy najíti kruhu  $ABC$  střed.

Vedme v něm libovolně nějakou přímku  $AB$  a rozpolme ji v bodě  $D$  a z  $D$  vedme  $DC \perp AB$  a prodlužme do  $E$  a rozpolme  $CE$  v  $F$ ; pravím, že  $F$  je střed kruhu  $ABC$ .



Nuže, nebuď jím, nýbrž, možno-li, buď jím  $G$ , a vedme spojnice  $GA$ ,  $GD$ ,  $GB$ . A ježto  $AD = DB$ , společnou pak  $DG$ , obě patrně  $AD$ ,  $DG$  jednotlivě stejné jsou s  $GD$ ,  $DB$ , a základna  $GA = GB$ , neboť jdou ze středu; tedy  $\sphericalangle ADG = GDB$ . Když pak přímka na přímce postavena jsouc tvoří stýkávé úhly navzájem sobě rovné, jest každý ten úhel pravý; tedy  $\sphericalangle GDB = R$ . Jest pak i  $FDB = R$ ; tedy  $\sphericalangle FDB = GDB$ , větší menšímu, což právě jest nemožno. Tedy bod  $G$  není středem kruhu  $ABC$ . Podobně ovšem dokážeme, že ani žádný jiný kromě  $F$ .

Tedy bod  $F$  je středem kruhu  $ABC$ .

Důsledek.

Z toho zajisté patrné, že když v kruhu nějaká přímka přímku nějakou v polovici a kolmo protíná, střed kruhu jest na přímce protínající. — Což právě bylo vykonati.


II.

Když se vezmou na obvodě kruhu kterékoli dva body, přímka ty body spojující spadne dovnitř kruhu.

Kruhem budiž  $ABC$ , a na obvodě jeho vezmeme dva kterékoli body  $A$ ,  $B$ ; pravím, že přímka spojující  $A$  s  $B$  padne dovnitř kruhu.

Nuže nebuď tak, nýbrž, možno-li, padni vně jako  $AEB$ , a za střed kruhu vezmeme  $D$  a vedme spojnice  $DA$ ,  $DB$  a prodlužme  $DF$  do  $E$ .

Ježto tedy  $DA = DB$ , tedy  $\sphericalangle DAE = DBE$ ; a ježto v  $\triangle DAE$  jedna strana, totiž  $AEB$ , jest prodloužena, tedy  $\sphericalangle DEB$  (vnější)  $> DAE$  (vnitřní protější, I. xvi.). Avšak  $\sphericalangle DAE = DBE$ , tedy  $\sphericalangle DEB > DBE$ . Proti většímu však úhlu leží delší strana; tedy  $DB > DE$ .  $DB$  však  $= DF$ , tedy  $DF > DE$ ,



kratší nad delší; což právě nemožno. Tedy přímka spojující  $A$  s  $B$  nepadne vně kruhu. Podobně ovšem dokážeme, že ani na obvod; tedy dovnitř.

Když se tedy vezmou na obvodě kruhu — —.

## III

Když nějaká přímka v kruhu středem jdouc jinou přímkou mimostřednou pŕlí, též kolmo ji protíná; když pak ji prtíná kolmo, též ji pŕlí.

Kruhem buď  $ABC$  a v něm nějaká přímka  $CD$  středem jdouc rozpoluj nějakou přímkou mimostřednou  $AB$  v bodě  $F$ ; pravím, že též kolmo ji protíná.

Nuže vezměme střed kruhu  $ABC$ , a tím buď  $E$ , a vedme spojnice  $EA$ ,  $EB$ .

A ježto  $AF=FB$ , společnou pak  $FE$ , dvě jsou rovny dvěma, a základna  $EA=EB$ , tedy  $\sphericalangle AFE=BFE$  (I. VIII.). Když pak přímka na přímce postavena jsouc tvoří stýkavé úhly navzájem rovné, každý z těch stejných, úhlů jest pravý. Tedy  $CD$  středem jdouc a rozpolujc mimostřednou  $AB$  též kolmo ji protíná.

Nuže nyní  $CD$  protínej přímku  $AB$  kolmo; pravím, že ji též pŕlí, t. j. že  $AF=FB$ .

Neboť když touž úpravu vykonáme<sup>1)</sup>, ježto  $EA=EB$ , též  $\sphericalangle EAF=EBF$ ; jest pak pravý  $\sphericalangle AFE=BFE$ ; tedy oba trojúhelníky  $EAF$  i  $EFB$  mají dva a dva úhly stejné a jednu společnou stranu  $EF$  proti jednomu ze stejných úhlů ležící stejnou; tedy též zbývající strany zbývajícím stranám budou

míti rovné; tedy  $AF=FB$ .

Když tedy nějaká přímka v kruhu — —.


## IV.

Když dvě mimostředné přímky v kruhu navzájem se protínají, nerozpolují se navzájem.

Kruhem buď  $ABCD$  a v něm dvě mimostředné přímky  $AC$ ,  $BD$  navzájem se protínejte v  $E$ ; pravím, že se navzájem nerozpolují.

Nuže, možno-li, rozpolujte se navzájem, tak aby bylo  $AE=EC$ ,  $BE=ED$ , a vezměme střed kruhu  $ABCD$ , a buď jím  $F$ , a vedme spojnici  $FE$ .

<sup>1)</sup> t. j. vedeme přímky pomocné.



Ježto tedy přímka nějaká středem jdouc  $FE$  nějakou přímkou  $AC$  mimostřednou rozpoluje, též kolmo ji protíná (III. III.); tedy  $\sphericalangle FEA=R$ ; dále, ježto přímka nějaká  $FE$  přímkou nějakou  $BD$  pŕlí, též kolmo ji protíná; tedy  $\sphericalangle FEB=R$ . Dokázáno však bylo, že též  $\sphericalangle FEA=R$ ; tedy  $\sphericalangle FEA=FEB$ , menší většímu; což právě nemožno. Tedy  $AC$ ,  $BD$  se navzájem nerozpolují.

Když se tedy dvě mimostředné přímky — —.


## V.

Když se dva kruhy navzájem budou protínati, nebude střed jejich týž.

Nuže, dva kruhy  $ABC$ ,  $CDG$  protínejte se v bodech  $B$ ,  $C$ ; pravím, že nebude jejich střed týž.

Neboť, možno-li, buď jím  $E$  a vedena buď spojnice  $CE$  a prodloužena buď  $EFG$  jakko-li. A ježto bod  $E$  je středem kruhu  $ABC$ , jest  $EC=EF$ . Dále, ježto  $E$  je středem kruhu  $CDG$ , jest  $EC=EG$ ; dokázáno však, že též  $EC=EF$ ; tedy také  $EF=EG$ , kratší stejná s delší; což právě nemožno. Tedy bod  $E$  není středem kruhů  $ABC$ ,  $CDG$ ).

Když se tedy dva kruhy navzájem — —.



## VI.


Když se dva kruhy budou navzájem dotýkati, nebude střed jejich týž.

Nuže dva kruhy  $ABC$ ,  $CDE$  dotýkejte se navzájem v bodě  $C$ ; pravím, že nebude střed jejich týž.

Neboť, možno-li, buď jím  $F$  a vedena buď spojnice  $FC$  a prodloužena libovolně  $FEB$ .

Ježto tedy bod  $F$  je středem kruhu  $ABC$ , jest  $FC=FB$ . Dále, ježto bod  $F$  je středem kruhu  $CDE$  jest  $FC=FE$ . Dokázáno však, že  $FC=FB$ , tedy též  $FE=FB$ , kratší stejná s delší; což právě nemožno. Tedy bod  $F$  není středem kruhů  $ABC$ ,  $CDE$ ).

Když se tedy dva kruhy budou — —.



<sup>2)</sup> Totéž možno dokázati o každém jiném bodě.

<sup>3)</sup> Podobně o každém jiném bodě dokážeme, že není středem obou kruhů.

## VII.

Když se na průměru kruhu vezme nějaký bod, jenž není středem kruhu, z toho pak bodu na kružnici budou dopadati nějaké přímky, nejdelší bude ta, naniž střed, nejkratší pak úsečka zbývající, z ostatních však, kterákoli je blíže přímky středové, delší jest než která dále, a pouze dvě (a dvě) stejné z toho bodu padnou na kružnici s obou stran úsečky nejkratší.

Kruhem buď  $ABCD$ , průměrem jeho buď  $AD$ , a na  $AD$  vezměme nějaký bod  $F$ , jenž není středem kruhu, středem pak kruhu buď  $E$ , a z bodu  $F$  na kružnici  $ABCD$  dopadejte přímky nějaké  $BF$ ,  $FC$ ,  $FG$ ; pravím, že nejdelší jest  $FA$ , nejkratší pak  $FD$ , z ostatních pak  $FB > FC$ ,  $FC > FG$ .

Nuže vedme spojnice  $BE$ ,  $CE$ ,  $GE$ ; a ježto v každém trojúhelníku dvě strany delší jsou než třetí, tedy  $(EB + EF) > BF$ . Avšak  $BE = AE$ , tedy  $AF > BF$ . Dále, ježto  $BE = CE$  a společnou  $FE$ , tož  $BE + EF = CE + EF$ . Ale též  $\sphericalangle BEF > CEF$ , tedy základna  $BF > CF$ . Z téže ovšem příčiny také  $CF > FG$ .


Dále, ježto  $(GF + FE) > EG$ ,  $EG$  pak  $= ED$ , tedy  $(GF + FE) > ED$ . Odečteme společnou  $EF$ ; tedy zbývající  $GF > FD$ ; nejkratší pak jest  $FD$ ,  $FB$  však  $> FC$ , a  $FC > FG$ .

Pravím také, že z bodu  $F$  pouze dvě (a dvě) stejné dopadnou na kružnici  $ABCD$  na obou stranách úsečky nejkratší  $FD$ . Nuže sestrojeno buď na přímce  $EF$  a z bodu na ní  $E$   $\sphericalangle FEH$  rovný úhlu  $GEF$  a spojnice  $FH$ . Ježto tedy  $GE = EH$ , společnou pak  $EF$ , tož  $GE + EF = HE + EF$ ; též  $\sphericalangle GEF = HEF$ ; tedy základna  $FG = FH$ . Pravím ovšem, že jiná stejná s  $FG$  nedopadne na kružnici z bodu  $F$ . Neboť, možno-li, dopadej  $FK$ . A ježto  $FK = FG$ , avšak  $FG = FH$ , tedy též  $FK = FH$ , bližší úsečky středové je stejná se vzdálenější, což právě nemožno. Tedy z bodu  $F$  žádná jiná nedopadne na kružnici stejná s  $GF$  (kromě  $FH$ ); tedy jedna jediná.

Když se tedy na průměr kruhu — —.

## VIII.

Když se vezme nějaký bod vně kruhu a z toho bodu ke kruhu se vedou nějaké přímky, z nichž jedna středem, ostatní pak jakkoli, z přímek dopadajících na dutou část kružnice nejdelší jest, která jde středem, z ostatních pak vždy, která je středové bližší, je delší než která je vzdálenější, z přímek pak dopadajících na



vypuklou část kružnice nejkratší jest mezi bodem a průměrem, z ostatních pak vždy, která je bližší úsečky nejkratší, jest kratší než která je vzdálenější, a pouze dvě (a dvě) stejné dopadnou z bodu na kružnici s obou stran úsečky nejkratší.

Kruhem buď  $ABC$ , a vezměme vně kruhu  $ABC$  nějaký bod  $D$  a z něho vedme nějaké přímky  $DA$ ,  $DE$ ,  $DF$ ,  $DC$ , středem pak jdi  $DA$ ; pravím, že z přímek na dutou část kružnice  $AEFC$  dopadajících nejdelší je středová  $DA$  a  $DE > DF$ ,  $DF > DC$ , z přímek pak na vypuklou část kružnice  $HLKG$  dopadajících nejkratší jest  $DG$  mezi bodem a průměrem  $AG$ , a která jest úsečky  $DG$  bližší, je kratší než která je vzdálenější,  $DK < DL$ ,  $DL < DH$ .

Nuže vezměme střed kruhu  $ABC$ , a buď jím  $M$ , a vedme spojnice  $ME$ ,  $MF$ ,  $MC$ ,  $MK$ ,  $ML$ ,  $MH$ .

A ježto  $MA = EM$ , společnou přičteme  $MD$ , tedy  $AD = EM + MD$ , avšak  $(EM + MD) > ED$ ; tedy  $AD > ED$ . Dále, ježto  $ME = MF$ , společná pak  $MD$ , tedy  $EM + MD = FM + MD$ , a  $\sphericalangle EMD > FMD$ . Tedy základna  $ED > FD$ . Podobně ovšem dokážeme, že  $FD > CD$ ; tedy nejdelší je  $DA$ ,  $DE$  pak  $> DF$ ,  $DF > DC$ .


A ježto  $(MK + KD) > MD$ ,  $MG = MK$ , tedy zbývající  $KD > GD$ , a tak  $GD < KD$ ; a ježto v  $\triangle MLD$  na jedné straně  $MD$  uvnitř byly sestrojeny dvě přímky, totiž  $MK$ ,  $KD$ , tedy  $(MK + KD) < (ML + LD)$  (I. XXI.);  $MK = ML$ ; zbývající tedy  $DK < DL$ . Podobně ovšem dokážeme, že též  $DL < DH$ ; tedy nejkratší jest  $DG$ ,  $DK$  pak  $< DL$ ,  $DL < DH$ .

Pravím, že též pouze dvě (a dvě) stejné z bodu  $D$  dopadnou na kružnici s obou stran nejkratší úsečky  $DG$ . Sestrojeno buď na přímce  $MD$  a v bodě jejím  $M$   $\sphericalangle DMB = KMD$  a spojnice  $DB$ . A ježto  $MK = MB$ , společnou pak  $MD$ , zajisté  $KM + MD = BM + MD$  a  $\sphericalangle KMD = BMD$ ; tedy základna  $DK = DB$ . Pravím, že žádná jiná přímce  $DK$  rovná nedopadne na kružnici z bodu  $D$ . Neboť, možno-li, dopadej a budiž jí  $DN$ . Ježto tedy  $DK = DN$ , avšak  $DK = DB$ , tedy též  $DB = ND$ , přímka bližší úsečky nejkratší přímce vzdálenější; což právě dokázáno nemožným. Tedy nedopadne více úseček než dvě stejné na kružnici  $ABC$  z bodu  $D$  s obou stran úsečky nejkratší  $DG$ .


Když se tedy vezme nějaký bod vně kruhu — —.

## IX.

Když se vezme nějaký bod uvnitř kruhu a z toho bodu na kružnici dopadají více než dvě přímek stejných, vzatý bod je středem kruhu.



Kruhem buď  $ABC$ , bodem pak uvnitř něho  $D$ , a z  $D$  ke kruhu  $ABC$  dopadejte více než dvě přímky stejné  $DA, DB, DC$ ; pravím, že bod  $D$  je středem kruhu  $ABC$ .



Nuže veďme spojnice  $AB, BC$  a buďte rozpůleny v bodech  $E, F$  a spojnice  $ED, FD$  prodlouženy buďte do bodů  $D, K$  a  $H, L$ .


Ježto tedy  $AE = EB$ , společnou pak  $ED$ , ovšem  $AE + ED = BE + ED$ , a základna  $DA = DB$ ; tedy  $\sphericalangle AED = \sphericalangle BED$ ; tedy  $AED = R = BED$ ; tedy  $GK$  rozpoluje  $AB$  a jest na ní kolmo. A ježto v kruhu, když nějaká přímka přímku nějakou pólí a jest na ní kolmo, na rozpolovací je středem kruhu, tedy na  $GK$

je střed kruhu (III. I. důsl.). Z téže příčiny ovšem též na  $HL$  je střed kruhu  $ABC$ . A žádného jiného bodu společného přímky  $GK, HL$  nemají než  $D$ ; tedy bod  $D$  je středem kruhu  $ABC$ .

Když se tedy vezme nějaký bod uvnitř kruhu — —.

X.

Kruh kruhu neprotíná ve více bodech než ve dvou. Nuže, možno-li, kruh  $ABC$  protínej kruh  $DEF$  ve více bodech než ve dvou, totiž v  $B, G, F, H$  a spojnice  $BG, BH$  buďte rozpůleny v bodech  $K, L$ , a z  $K, L$  na  $BH, BG$  vedené kolmice  $KC, LM$  buďte prodlouženy do bodů  $A, E$ .



Ježto tedy v kruhu  $ABC$  nějaká přímka  $AC$  přímku nějakou  $BH$  pólí a jest na ní kolmo, na  $AC$  tedy je střed kruhu  $ABC$ . Dále, ježto v témž kruhu  $ABC$  nějaká přímka  $NP$  přímku nějakou  $BG$  pólí a jest na ní kolmo, tedy na  $NP$  je střed kruhu  $ABC$ . Dokázáno pak bylo, že i na  $AC$ , a přímky  $AC, NP$

nikde se neprotínají než v  $O$ ; tedy bod  $O$  je středem kruhu  $ABC$ . Podobně ovšem dokážeme, že také kruhu  $DEF$  středem jest  $O$ , tedy dva kruhy  $ABC, DEF$  navzájem se protínající mají též střed  $O$ ; což právě není možno.

Tedy kruh kruhu neprotíná ve více bodech než ve dvou; což právě bylo dokázati.

XI.


Když se dva kruhy navzájem uvnitř dotýkají [a vezmeme jejich středy], přímka spojující středy jejich prodloužena jsouc padne do bodu dotyčného těch kruhů.

Nuže dva kruhy  $ABC, ADE$  dotýkejte se navzájem uvnitř v bodě  $A$ , a za střed kruhu  $ABC$  vzato buď  $F$ , kruhu pak  $ADE$   $G$ ; pravím, že přímka spojující  $G$  s  $F$  prodloužena jsouc padne do  $A$ .

Nuže nebuď tak, nýbrž, možno-li, dopadej jako  $FGH$  a vedeny buďte spojnice  $AF, AG$ .

Ježto tedy  $(AG + GF) > FA$ , t. j.  $FH$ , odečteme společnou  $FG$ ; zbývající tedy  $AG > GH$ .  $AG$  však  $= GD$ , tedy  $GD > GH$ , kratší nad delší, což právě nemožno. Tedy přímka spojující  $F$  s  $G$  nepadne mimo, tedy padne do  $A$ , do bodu dotyčného.

Když se tedy dva kruhy navzájem uvnitř dotýkají — —.



XII.


Když se dva kruhy budou navzájem dotýkati vně, spojnice jejich středů půjde bodem dotyčným.

Nuže dva kruhy  $ABC, ADE$  dotýkejte se navzájem vně v bodě  $A$ , a za střed v  $ABC$  vzato buď  $F$ , v  $ADE$  pak  $G$ ; pravím, že přímka spojující  $F, G$  půjde bodem dotyčným  $A$ .

Nuže, není-li tak, nýbrž, možno-li, jdi jako  $FCDG$ , a veďme spojnice  $AF, AG$ .

Ježto tedy bod  $F$  je středem kruhu  $ABC$ ,  $FA = FC$ . Dále, ježto bod  $G$  je středem kruhu  $ADE$ ,  $GA = GD$ . Dokázáno pak, že též  $FA = FC$ ; tedy  $FA + AG = FC + DG$ ; a tak celá  $FG$  (t. j.  $FC + DG$  a ještě  $CD$ ) je větší než  $FA + AG$ , ale též menší (I. xx.); což právě nemožno. Tedy přímka spojující  $F$  s  $G$  nebude procházeti mimo bod dotyčný  $A$ ; tedy jím.

Když se tedy dva kruhy budou navzájem — —.



XIII.


Kruh kruhu se nedotýká ve více bodech než v jednom, ať se dotýká vnitř ať vně.

Nuže, možno-li, kruh  $ABCD$  dotýkej se kruhu  $EBFD$  ve více bodech než v jednom, totiž v  $D$  a  $B$ . A za střed kruhu  $ABCD$  vezměme  $G$ , kruhu  $EBFD$   $H$ .

Tedy spojnice  $GH$  padne do  $B$  a  $D$  (III. xi.).

Padni jako  $BGHD$ . A ježto bod  $G$  je středem kruhu  $ABCD$ ,  $BG = GD$ , tedy  $BG > HD$ , tedy  $BH$  o mnoho delší než  $HD$ . Dále,





avšak v  $ABCD$  padla dovnitř, v  $ACK$  pak vně<sup>4)</sup>; což právě nesrovnalost; tedy kruh kruhu se nedotýká vně ve více bodech než v jednom; dokázáno pak, že ani vnitř.


Tedy kruh kruhu se nedotýká ve více bodech — —.

## XIV.

V kruhu stejné přímky (tětivy) jsou stejně vzdáleny od středu, a stejně vzdálené od středu jsou navzájem stejné.

Kruhem buď  $ABCD$  a v něm stejnými tětivami buďtež  $AB$ ,  $CD$ ; pravím, že  $AB$ ,  $CD$  jsou stejně vzdáleny od středu.

Nuže vezměme střed kruhu, a buď jím  $E$ , z bodu  $E$  k  $AB$ ,  $CD$  vedme kolmice  $EF$ ,  $EG$  a spojnice  $AE$ ,  $EC$ .



Ježto tedy nějaká přímka středem vedená  $EF$  nějakou přímkou mimostřednou  $AB$  protíná kolmo, též ji půlí (III. III.). Tedy  $AF = FB$ ; tedy  $AB = 2AF$ . Z téže příčiny ovšem též  $CD = 2CG$ . A ježto  $AE = EC$ , také  $AE^2 = EC^2$ . Ale  $AE^2 = AF^2 + EF^2$ , neboť  $\sphericalangle F = R$ ; a  $EC^2 = EG^2 + GC^2$ , neboť  $\sphericalangle G = R$ ; tedy  $AF^2 + FE^2 = CG^2 + GE^2$ , z nichž  $AF^2 = CG^2$ , neboť  $AF = CG$ ; zbývající tedy  $FE^2 = EG^2$ ; tedy  $EF = EG$ . Pravíme však, že přímky od středu stejně jsou vzdáleny, když kolmice ze středu k nim vedené

sou stejné; tedy  $AB$ ,  $CD$  jsou od středu stejně vzdáleny.

Ale buďte již přímky  $AB$ ,  $CD$  od středu stejně vzdáleny, t. j. buď  $EF = EG$ ; pravím, že též  $AB = CD$ .

Neboť po téže úpravě podobně dokážeme, že  $AB = 2AF$  a  $CD = 2CG$ , a ježto  $AE = CE$ ,  $AE^2 = CE^2$ ; avšak  $AE^2 = AF^2 + FA^2$  a  $CE^2 = EG^2 + GC^2$ . Tedy  $EF^2 + FA^2 = EG^2 + GC^2$ , z nichž  $EF^2 =$

<sup>4)</sup> Nejasno. III. vým. 3. praví, že „kruhy navzájem se dotýkají, které zasahující se vespolek se neprotínají“, ale ovšem bez důkazu.

$EG^2$ , neboť  $EF = EG$ ; zbývající tedy  $AF^2 = CG^2$ ; tedy  $AF = CG$ ; a  $AB = 2AF$ ,  $CD$  pak  $= 2CG$ ; tedy  $AB = CD$ .

Tedy v kruhu stejné přímky (tětivy) jsou — —.

## XV.


V kruhu nejdelší jest průměr, z ostatních pak přímek vždy středu bližší je delší než ta, která je vzdálenější.

Kruhem buď  $ABCD$ , průměrem jeho pak buď  $AD$  a středem  $E$ , a blíže průměru  $AD$  buď  $BC$ , dále od něho  $FG$ ; pravím, že nejdelší jest  $AD$ ,  $BC$  pak  $> FG$ .

Nuže vedme ze středu  $E$  k  $BC$ ,  $FG$  kolmice  $EH$ ,  $EK$ . A ježto  $BC$  je středu blíže,  $FG$  pak od něho dále, tedy  $EK > EH$ . Buď  $EL = EH$  a na bod  $L$  k  $EK$  spuštěná kolmice  $LM$  prodloužena buď do  $N$  a vedeny spojnice  $ME$ ,  $EN$ ,  $FE$ ,  $EG$ .

A ježto  $EH = EL$ , též  $BC = MN$  (III. xiv.). Dále, ježto  $AE = EM$ ,  $ED = EN$ , tedy  $AD = ME + EN$ . Avšak  $(ME + EN) > MN$  [a  $AD > MN$ ],  $MN$  pak  $= BC$ , tedy  $AD > BC$ . A ježto dvě  $ME$ ,  $EN$  rovnají se se jednotlivě dvěma  $FE$ ,  $EG$ , také  $\sphericalangle MEN > FEG$ ; tedy základna  $MN > FG$  (I. xxiv.). Avšak dokázáno, že  $MN = BC$  [a  $BC > FG$ ]. Tedy průměr  $AD$  nejdelší,  $BC$  pak  $> FG$ .

Tedy v kruhu nejdelší je průměr, z ostatních — —.




## XVI.

Kolmice na konci průměru kruhového zřízená padne vně kruhu, a v prostor mezi přímkou (kolmicí) a obvodem nevejde se přímka jiná, a úhel polokružní<sup>5)</sup> větší jest nad jakýkoliv ostrý úhel přímkový, zbývající však jest menší.

Kruhem buď  $ABC$  kolem středu  $D$  a průměru  $AB$ ; pravím, že kolmice v  $A$  na konci  $AB$  vedená padne vně kruhu.

Nuže nebuď tak, nýbrž, možno-li, dopadej dovnitř jako  $CA$ , a vedena buď spojnice  $DC$ .

Ježto  $DA = DC$ , též  $\sphericalangle DAC = ACD$ .  $DAC$  však je pravý, tedy též  $ACD = R$ . V  $\triangle ACD$  tedy  $\sphericalangle DAC + ACD = 2R$ , což právě nemožno. Tedy kolmice vedená z bodu  $A$  k  $BA$  nepadne dovnitř kruhu. Podobně ovšem dokážeme, že ani na obvod; tedy vně.



<sup>5)</sup> Míni se úhel, jež tvoří polokružnice s průměrem.

Dopadej jako  $AE$ ; pravím již, že v prostor mezi přímkou  $AE$  a obloukem  $CHA$  nevejde se přímka jiná.

Nuže, možno-li, vložena buď jako  $FA$ , a vedme z bodu  $D$  k  $FA$  kolmici  $DG$ . A ježto  $\sphericalangle AGD = R$ ,  $\sphericalangle DAG$  však jest menší, tedy  $AD > DG$  (I. XIX.). Avšak  $DA = DH$ , tedy  $DH > DG$ , kratší nad delší, což právě nemožno. Tedy v prostor mezi kolmicí (tečnou) a obloukem nevejde se přímka jiná.

Pravím, že též úhel polokružní sevřený přímkou  $BA$  a obloukem  $CHA$  jest větší než jakýkoliv úhel ostrý přímkový, zbývající však sevřený obloukem  $CHA$  a přímkou  $AE$  jest menší než jakýkoliv úhel ostrý přímkový.

Neboť jest-li nějaký úhel přímkový větší než sevřený přímkou  $BA$  a obloukem  $CHA$ , menší však než sevřený obloukem  $CHA$  a přímkou  $AE$ , vejde se v prostor mezi obloukem  $CHA$  a přímkou  $AE$  přímka, jež utvoří úhel větší než sevřený přímkou  $BA$  a obloukem  $CHA$ , sevřený totiž přímkami, menší však než sevřený obloukem  $CHA$  a přímkou  $AE$ . Nevejde se však; tedy nebude nad úhel sevřený přímkou  $AB$  a obloukem  $CHA$  většího úhlu přímkami sevřeného, ani a jisté menšího nad sevřený obloukem  $CHA$  a přímkou  $AE$ .


#### Důsledek.

Z toho jest ovšem patrno, že kolmice k průměru kruhového na konci vedená dotýká se kruhu [a že přímka kruhu se dotýká pouze v jednom bodě, ježto právě dokázáno, že přímka ve dvou bodech s ním se stýkající dopadá dovnitř]; což právě bylo dokázati.

#### XVII.

Z daného bodu veď přímkou daného kruhu se dotýkající (tečnou).

Daným bodem buď  $A$ , daným kruhem  $BCD$ ; má se tedy z bodu  $A$  vésti přímka kruhu  $BCD$  se dotýkající.



Nuže vzato buď za střed kruhu  $E$ , vedme spojnicí  $AE$  a ze středu  $E$  poloměrem  $EA$  narýsujeme kruh  $AFG$  a z  $D$  k  $EA$  vedme kolmici  $DF$  a spojnicí  $EF$ ,  $AB$ ; pravím, že z bodu  $A$  jest vedena tečná  $AB$  kruhu  $BCD$ .

Neboť ježto  $E$  je střed kruhů  $BCD$ ,  $AFG$ , tedy  $EA = EF$ ,  $ED = EB$ ; obě ovšem  $AE$ ,  $EB$  stejně jsou s  $FE$ ,  $ED$ , též úhel společný při  $E$  svírají; tedy základna  $DF = AB$  a  $\triangle DEF = EBA$  a zbývající úhly rovny úhlům zbývajícím; tedy  $\sphericalangle EDF = EBA$ . Avšak  $EDF = R$ ,

tedy též  $EBA = R$ . A jest  $EB$  středová; kolmice však vedená na konec průměru <sup>6)</sup> kruhového dotýká se kruhu; tedy  $AB$  je tečná kruhu  $BCD$ .

<sup>6)</sup> Má býti zde »poloměru«, pro nějž Eukl. nemá názvu. Věc se tím nemění.

Tedy z daného bodu  $A$  vedena jest ke kruhu danému  $BCD$  tečná; což právě bylo vykonati.

#### XVIII.


Když se nějaká přímka kruhu dotýká a ze středu k bodu dotýčnému povede se spojnice, spojnice bude kolmicí k tečné.

Nuže kruhu  $ABC$  dotýkej se nějaká přímka  $DE$  v bodě  $C$  a za střed kruhu  $ABC$  vezměme  $F$  a vedme z  $F$  do  $C$  spojnicí  $FC$ ; pravím, že  $FC$  jest kolmicí k  $DE$ .

Nuže není-li tak, vedme z  $F$  k  $DE$  kolmici  $FG$ .

Ježto tedy  $\sphericalangle FGC$  je pravý, tedy  $\sphericalangle FCG$  jest ostrý; proti většímu pak úhlu leží delší strana, tedy  $FC > FG$ ,  $FC$  však  $= FB$ , tedy  $FB > FG$ , kratší nad delší; což právě nemožno. Tedy  $FG$  není kolmicí k  $DE$ . Podobně ovšem dokážeme, že ani žádná jiná kromě  $FC$ ; tedy  $FC$  jest kolmicí k  $DE$ .

Když se tedy nějaká přímka kruhu dotýká — —



#### XIX.


Když se kruhu nějaká přímka dotýká a sestrojí se v bodě dotýčném k tečné kolmice, na kolmici bude střed kruhu.

Nuže kruhu  $ABC$  dotýkej se nějaká přímka  $DE$  v bodě  $C$ , a v bodě  $C$  k  $DE$  buď vtýčena kolmice  $CA$ ; pravím, že na  $AC$  je střed kruhu.

Nuže nebuď tak, nýbrž, možno-li, buď jím  $F$  a buď vedena spojnice  $CF$ .

Ježto kruhu  $ABC$  dotýká se nějaká přímka  $DE$  a ze středu k bodu dotýčnému jest vedena  $FC$ , tedy  $FC$  je kolmicí k  $DE$  (III. XVIII.), tedy  $\sphericalangle FCE = R$ . Jest pak též  $\sphericalangle ACE = R$ ; tedy  $\sphericalangle FCE = ACE$ , menší většímu, což právě nemožno. Tedy není bod  $F$  středem kruhu  $ABC$ . Podobně ovšem dokážeme, že ani žádný jiný lež na  $AC$ .

Když se tedy kruhu nějaká přímka dotýká — —



## XX.

V kruhu jest úhel středový dvakrát větší než úhel obvodový, když ty úhly za základnu mají týž oblouk.

Kruhem buď  $ABC$  a úhlem jeho středovým  $BEC$ , obvodovým pak  $BAC$ , a mějte za základnu týž oblouk  $BC$ ; pravím, že  $\sphericalangle BEC = 2 \sphericalangle BAC$ .


Nuže spojnice  $AE$  buď prodloužena do  $F$ .

Ježto tedy  $EA = EB$  a  $\sphericalangle EAB = \sphericalangle EBA$ , tedy  $\sphericalangle EAB + \sphericalangle EBA = 2 \sphericalangle EAB$ . Úhel pak  $\sphericalangle BEF = \sphericalangle EAB + \sphericalangle EBA$ , tedy též  $\sphericalangle BEF = 2 \sphericalangle EAB$ . Z téže příčiny ovšem též  $\sphericalangle FEC = 2 \sphericalangle EAC$ . Tedy celý  $\sphericalangle BEC = 2 \sphericalangle BAC$ .

Tož dále budiž úhel odehnut<sup>7)</sup> a druhým úhlem buď  $BDC$  a spojnice  $DE$  buď prodloužena do  $G$ . Podobně ovšem

dokážeme, že  $\sphericalangle GEC = 2 \sphericalangle EDC$ , z nichž  $\sphericalangle GEB = 2 \sphericalangle EDB$ ; tedy zbývající  $\sphericalangle BEC = 2 \sphericalangle BDC$ .

V kruhu tedy jest úhel středový — —.



## XXI.


Úhly v kruhu na téže úseči jsou si navzájem rovny<sup>8)</sup>.

Kruhem buď  $ABCD$ , a na téže úseči  $BAED$  buďtež  $\sphericalangle BAD$ ,  $\sphericalangle BED$ ; pravím, že  $\sphericalangle BAD = \sphericalangle BED$ .

Nuže vezměme střed kruhu  $ABCD$ , a buď jím  $F$ , a veďme spojnice  $BF$ ,  $FD$ .

A ježto  $\sphericalangle BFD$  je středový a  $\sphericalangle BAD$  obvodový a mají za základnu týž oblouk  $BD$ , tedy  $\sphericalangle BFD = 2 \sphericalangle BAD$ . Z téže příčiny ovšem  $\sphericalangle BFD = 2 \sphericalangle BED$  (III. xx.); tedy  $\sphericalangle BAD = \sphericalangle BED$ .

Tedy úhly v kruhu na téže úseči — —.



## XXII.

Protější úhly čtyřúhelníků v kruzích rovnají se dvěma pravým.

Kruhem buď  $ABCD$  a v něm čtyřúhelníkem buď  $ABCD$ ; pravím, že protější úhly (součtem) rovnají se dvěma pravým.

<sup>7)</sup> T. j. úhel obvodový buď posunut z polohy  $BAC$  do polohy  $BDC$ .


<sup>8)</sup> Míjí se úhly obvodové na témž oblouku.

Veďme spojnice  $AC$ ,  $BD$ .

Ježto tedy v každém trojúhelníku tři úhly (vnitřní) rovnají se dvěma pravým (I. xxxii.), tedy v  $\triangle ABC$  tři úhly  $CAB$ ,  $ABC$ ,  $BCA$  rovnají se dvěma pravým. Avšak  $\sphericalangle CAB = \sphericalangle BDC$ , neboť jsou na téže úseči  $BADC$ ;  $\sphericalangle ACB$  však  $= \sphericalangle ADB$ , neboť jsou na téže úseči  $ADCB$ ; tedy celý  $\sphericalangle ADC = \sphericalangle BAC + \sphericalangle ACB$ . Společným přičteme  $\sphericalangle ABC$ ; tedy  $\sphericalangle ABC + \sphericalangle BAC + \sphericalangle ACB = \sphericalangle ABC + \sphericalangle ADC$ . Avšak  $\sphericalangle ABC + \sphericalangle BAC + \sphericalangle ACB = 2 \text{ R}$ . Tedy též  $\sphericalangle ABC + \sphericalangle ADC = 2 \text{ R}$ .

Podobně ovšem dokážeme, že též  $\sphericalangle BAD + \sphericalangle DCB = 2 \text{ R}$ .

Tedy protější úhly čtyřúhelníků — —.



## XXIII.

Na téže straně téže přímky nesestrojíš dvou úsečí kruhových podobných a nestejných.

Nuže, možno-li, buďte na téže straně téže přímky  $AB$  sestrojeny dvě podobné a nestejně úseče  $ACB$ ,  $ADB$  a vedena buď  $ACD$  i spojnice  $CB$ ,  $DB$ .

Ježto tedy úseč  $ACB$  podobná jest úseči  $ADB$ ; podobné však úseče kruhů jsou ty, které objímají stejné úhly; tedy  $\sphericalangle ACB = \sphericalangle ADB$ , vnější vnitřnímu, což právě nemožno.

Tedy na téže straně téže přímky — —.




## XXIV.

Na stejných přímkách podobné úseče kruhové jsou si navzájem rovny.

Nuže buďte na stejných přímkách  $AB$ ,  $CD$  podobné úseče kruhové  $AEB$ ,  $CFD$ ; pravím, že úseč  $AEB = CFD$ .

Neboť položíme-li úseč  $AEB$  na  $CFD$  a případně-li bod  $A$  na  $C$  a přímka  $AB$  na  $CD$ , bude se krýti též bod  $B$  s bodem  $D$ , ježto  $AB = CD$ ; když pak  $AB$  pokrýje  $CD$ , také úseč  $AEB$  bude krýti  $CFD$ . Neboť bude-li přímka  $AB$  krýti  $CD$ , úseč pak  $AEB$  nebude krýti  $CFD$ , buď padne dovnitř nebo ven nebo se uchýlí jako  $CGD$  a kruh bude protínati ve více bodech než ve dvou; což právě ne-



možno (III. x.)<sup>9)</sup>. Tedy položíme-li přímku  $AB$  na  $CD$ , nebude možno, by se též úseč  $AEB$  nekyla s  $CFD$ ; tedy se bude krýti a bude jí rovna.

Tedy na stejných přímkách podobné úseče — —.

## XXV.

K dané úseči kruhové přirýsuj kruh, jehož jest úsečí.

Danou úseči kruhovou buď  $ABC$ ; tož má se k úseči  $ABC$  přirýsovat kruh, jehož jest úsečí.

Nuže rozpolme  $AC$  v  $D$  a vedme z bodu  $D$  kolmici k  $AC$ , totiž  $DB$ , a spojnicí  $AB$ ; tedy  $\sphericalangle ABD \cong \sphericalangle BAD$ .

a) Buď nejprve větší, a sestrojen buď ku přímce  $BA$  a z bodu na ní  $A$   $\sphericalangle BAE = \sphericalangle ABD$  a prodloužena buď  $DB$  do  $E$  a vedena spojnice  $EC$ , Ježto tedy  $\sphericalangle ABE = \sphericalangle BAE$ , tedy též přímka  $EB = EA$  (I. vi.). A ježto  $AD = DC$ , společná pak  $DE$ , patrně  $AD, DE$  stejné jsou jednotlivě s  $CD, DE$  a  $\sphericalangle ADE = \sphericalangle CDE$ , neboť jsou oba pravé; základna tedy  $EA = CE$ . Avšak dokázáno bylo, že  $AE = BE$ , tedy též  $BE = CE$ ; tedy tři:  $AE, EB, EC$  jsou si navzájem rovny; tedy kruh ze středu  $E$  poloměrem  $AE$  neb  $EB$  neb  $EC$  rýsovaný půjde též body zbývajícími a bude přirýsován. Tedy k dané úseči kruhové přirýsován kruh. A patrně, že úseč  $ABC$  jest menší než polokruh, ježto střed  $E$  připadá mimo ni.

b) Podobně též, bude-li  $\sphericalangle ABD = \sphericalangle BAD$ , stane-li se  $AD$  stejnou s  $BD$  nebo  $DC$ , tři:  $DA, DB, DC$  budou si navzájem rovny, a bude  $D$  středem kruhu doplněného a bude  $ABC$  patrně polokruhem.

c) Pakli  $\sphericalangle ABD < \sphericalangle BAD$  a sestrojíme-li na přímce  $BA$  a v bodu na ní  $A$  úhel rovný úhlu  $ABD$ , případně střed dovnitř úseče  $ABC$  na  $DB$  a bude patrně úseč  $ABC$  polokruhu větší.

Tedy k dané úseči kruhové přirýsován jest kruh; což právě bylo vykonati.

## XXVI.


Ve stejných kruzích stejné úhly stojí na stejných obloucích, ať jsou to středové ať obvodové.

<sup>9)</sup> K prvním dvěma případům nehledí; ostatně viz III. xxiii.

Buďte stejnými kruhy  $ABC, DEF$ , a v nich buďte stejnými úhly středovými  $BGC, EHF$ , obvodovými pak  $BAC, EDF$ ; pravím, že oblouk  $BKC = ELF$ . Nuže vedme spojnice  $BC, EF$ .

A ježto kruhy  $ABC, DEF$  jsou stejné, jsou též poloměry stejné; tedy  $BG, GC$  stejné s  $EH, HF$  a  $\sphericalangle G = \sphericalangle H$ , tedy třetí přímka  $BC = EF$ . A ježto  $\sphericalangle A = \sphericalangle D$ , tedy úseč  $BAC \sim EDF$ , a jsou na stejných přímkách; podobné však úseče kruhové na stejných přímkách jsou si navzájem rovny (III. xxiv.); tedy úseč  $BAC = DEF$ . Jest pak i celý kruh  $ABC = DEF$ ; tedy zbývající oblouk  $BKC = ELF$ .

Tedy ve stejných kruzích stejné úhly — —.



## XXVII.

Úhly ve stejných kruzích stojící na stejných obloucích jsou si navzájem rovny, ať jsou to středové ať obvodové.

Nuže ve stejných kruzích  $ABC, DEF$  na stejných obloucích  $BC, EF$  stůjte při středech  $G, H$  středové úhly  $BGC, EHF$ ; pravím, že  $\sphericalangle BGC = \sphericalangle EHF$  a  $\sphericalangle BAC = \sphericalangle EDF$ .

Neboť není-li  $\sphericalangle BGC = \sphericalangle EHF$ , jeden z nich je větší. Buď větším  $BGC$ , a sestrojen buď na přímku  $BG$  a z bodu na ní  $G$   $\sphericalangle BGK = \sphericalangle EHF$ ; stejné však úhly stojí na stejných obloucích, když jsou středové; tedy oblouk  $BK = EF$ . Avšak  $EF = BC$ , tedy též  $BK = BC$ , menší většímu; což právě nemůžeme.


Tedy  $\sphericalangle BGC$  není neroven úhlu  $EHF$ ; tedy roven. A  $\sphericalangle \frac{BGC}{2} = \sphericalangle A$ ,  $\sphericalangle \frac{EHF}{2} = \sphericalangle D$ , tedy též  $\sphericalangle A = \sphericalangle D$ .

Tedy úhly ve stejných kruzích — —.

## XXVIII.

Ve stejných kruzích stejné tětivy odtínají oblouky stejné, větší s větším stejný, menší pak s menším.

Stejnými kruhy buďtež  $ABC, DEF$ , a v těch kruzích stejnými tětivy buďtež  $AB, DE$  a odtínejtež oblouky větší  $ABC, DEF$



a menší  $AGB, DHE$ ; pravím, že větší oblouk  $ACB = DEF$  a menší  $AGB = DHE$ .


Nuže vezměme za středy kruhů  $K, L$  a vedme spojnice  $AK, KB, DL, LE$ . A ježto jsou kruhy stejné, stejné jsou též poloměry; obě tedy  $AK, KB =$  oběma  $DL, LE$  a třetí  $AB = DE$ ; tedy  $\sphericalangle AKB = DLE$ . Stejně pak úhly stojí

na stejných obloucích, když jsou středové; tedy oblouk  $AGB = DHE$ . Jest pak též celý kruh  $ABC$  roven kruhu  $DEF$ , tedy též oblouk zbývající  $ACB =$  oblouku zbývajícímu  $DFE$ .

Tedy ve stejných kruzích stejné tětivy — —.

## XXIX.

Ve stejných kruzích proti stejným obloukům leží stejné tětivy.



Stejnými kruhy buďtež  $ABC, DEF$  a v nich odřaty buďte stejné oblouky  $BGC, EHF$ , a vedme spojnice  $BC, EF$ ; pravím, že  $BC = EF$ .

Nuže vezměme středy kruhů, a buďte jimi  $K, L$ , a vedme spojnice  $BK, KC, EL, LF$ . A poněvadž oblouk  $BGC = EHF$ , též  $\sphericalangle BKC = ELF$ . A ježto kruhy  $ABC, DEF$  jsou stejné, stejné jsou též poloměry. Obě tedy  $BK, KC = EL, LF$ , též úhly svírají stejné. Tedy třetí strana  $BC = EF$ .

Tedy ve stejných kruzích proti stejným obloukům — —.


## XXX.

Rozpol daný oblouk.

Daným obloukem buď  $ADB$ ; tož má se oblouk  $ADB$  rozpoliti.

Vedme spojnici  $AB$  a rozpolme ji v  $C$  a z bodu  $C$  vedme ku přímce  $AB$  kolmici  $CD$  a spojnice  $AD, DB$ .

A ježto  $AC = CB$ , společnou pak  $CD$ , obě patrně  $AC, CD = BC, CD$ , též  $\sphericalangle ACD = BCD$ , neboť oba jsou pravé; tedy třetí  $AD = DB$ . Stejně však tětivy odtínají oblouky stejné, větší s větším,



menší s menším; i jsou oba z oblouků menší než polokružnice; tedy oblouk  $AD = DB$ .

## XXXI.

Úhel v kruhu na polokruží (obvodový) jest pravý, v větší úseči menší než pravý, v menší pak úseči větší než pravý; a mimo to úhel úseče<sup>10)</sup> větší jest pravého větší, úhel úseče menší jest pravého menší.

Kruhem bud  $ABCD$ , průměrem jeho  $BC$  a středem  $E$ , a vedme spojnice  $BA, AC, AD, DC$ ; pravím, že  $\sphericalangle BAC$  na polokruží jest pravý, v úseči pak  $ABC$ , polokruhu větší, jest  $\sphericalangle ABC < R$ , v úseči  $ADC$ , polokruhu menší, jest  $\sphericalangle ADC > R$ .

Vedme spojnici  $AE$  a prodlužme  $BA$  do  $F$ .

A ježto  $BE = EA$ , též  $\sphericalangle ABE = BAE$ . Dále, ježto  $CE = EA$ , též  $\sphericalangle ACE = CAE$ . Tedy celý  $\sphericalangle BAC = ABC + ACB$ . Také však  $\sphericalangle FAC$ , vně trojúhelníku  $ABC$ , rovná se  $\sphericalangle ABC + ACB$ ; tedy  $BAC = FAC$ , tedy jsou oba pravé; tedy (obvodový)  $\sphericalangle BAC$  v polokruhu  $BAC$  je pravý.

A ježto v  $\triangle ABC$  dva úhly  $(ABC + BAC) < 2R$ , úhel však  $BAC = R$ , tedy  $\sphericalangle ABC < R$  a jest v úseči  $ABC$ , ve větší než polokruh.

A ježto v kruhu je čtyřúhelník  $ABCD$  a protější úhly čtyřúhelníků v kruzích rovnají se dvěma pravým (III. xxii.) [tedy  $\sphericalangle ABC + ADC = 2R$ ] a  $\sphericalangle ABC < R$ ; tedy zbývající  $\sphericalangle ADC > R$  a jest v úseči  $ADC$ , v menší než polokruh.

Pravím, že též úhel úseče větší, sevřený obloukem  $ABC$  a přímkou  $AC$  je větší než pravý, úhel pak menší úseče, sevřený obloukem  $ADC$  a přímkou  $AC$ , jest menší než pravý. Také je to hned patrné. Ježto totiž úhel přímek  $BA, AC$  je pravý, tedy úhel sevřený obloukem  $ABC$  a přímkou  $AC$  jest větší než pravý. Dále, ježto úhel přímek  $AC, AF$  jest pravý, tedy úhel sevřený přímkou  $CA$  a obloukem  $ADC$  jest menší než pravý.


Tedy úhel v kruhu na polokruží — —.

## XXXII.

Když se bude kruhu dotýkat nějaká přímka (tečná) a sestrojí se z bodu dotyčného do kruhu nějaká přímka kruh sekoucí (tětiva n. sečna), úhly, které činí stečnou, budou střídavě rovny úhlům (obvodovým) v úsečích kruhu.

Nuže kruhu  $ABCD$  dotýkej se nějaká přímka  $EF$  v bodě  $B$ , a z bodu  $B$  vedme nějakou přímku  $BD$  do kruhu  $ABCD$  jej sekoucí; pravím, že úhly, jež tvoří  $BD$  s tečnou, budou střídavě rovny úhlům v úsečích kruhu, t. j. že  $\sphericalangle FBD$  rovná se úhlu sestrojenému v úseči  $BAD$ , úhel pak  $EBD$  rovná se úhlu sestrojenému v úseči  $DCB$ .

<sup>10)</sup> Úhel úseče jest sevřen tětivou a obloukem úseče (III. vým. 7.).



Nuže z  $B$  vedme k  $EF$  kolmici  $BA$  a vezměme na oblouku  $BD$  kterýkoli bod  $C$  a vedme spojnice  $AD$ ,  $DC$ ,  $CB$ .

A ježto kruhu  $ABCD$  dotýká se nějaká přímka  $EF$  v  $B$  a z bodu dotyčného vedena jest kolmice  $BA$ , tedy na  $BA$  je střed kruhu  $ABCD$ . Tedy  $BA$  je průměr kruhu  $ABCD$ , tedy  $\sphericalangle ADB$  jsou v polokruží je pravý. Tedy ostatní  $BAD + ABD = R$ . Je však též  $\sphericalangle ABF = R$ ; tedy  $\sphericalangle ABF = BAD + ABD$ . Odečteme společný  $ABD$ , tedy zbývající  $\sphericalangle DBF = BAD$ , střídavě v úseči kruhu.

A ježto  $ABCD$  je čtyřúhelník v kruhu, protější úhly jeho rovnají se dvěma pravým (III. xxii). Jsou pak též  $\sphericalangle DBF + DBE = 2R$ ; tedy úhly  $DBF + DBE = BAD + BCD$ , z nichž  $\sphericalangle BAD$ , jak bylo dokázáno, roven úhlu  $DBF$ ; tedy zbývající  $\sphericalangle DBE = DCB$ , střídavě v kruhové úseči  $DCB$ .

Když se tedy bude kruhu dotýkati — —

## XXXIII.

Narýsuj na dané přímce úseč kruhovou obsahující úhel (obvodový) rovný úhlu danému přímkovému.

Danou přímku buď  $AB$ , daným pak úhlem přímkovým  $\sphericalangle C$ ; tož má se narýsovati na dané přímce  $AB$  úseč kruhová obsahující úhel stejný s  $\sphericalangle C$ .


Úhel  $C$  jest ovšem buď ostrý buď pravý buď tupý.

a) Buď nejprve ostrý a buď jako v prvním vyobrazení sestrojen na přímce  $AB$  a z bodu  $A$   $\sphericalangle BAD = C$ , tedy též  $BAD$  jest ostrý. Vedena buď k  $DA$  kolmice  $AE$  a buď  $AB$  v  $F$  rozpuřena a z bodu  $F$  k  $AB$  sestrojena kolmice  $FG$  a spojnice  $GB$ .

A ježto  $AF = FB$ , společnou pak  $FG$ , obě patrně  $AF$ ,  $FG$  rovnají se oběma  $BF$ ,  $FG$ , a  $\sphericalangle AFG = BFG$ , tedy třetí  $AG = BG$ . Tedy kruh sestrojený ze středu

$G$  poloměrem  $GA$  půjde též bodem  $B$ . Buď sestrojen a budiž to  $ABE$  a vedena spojnice  $EB$ . Ježto tedy na konci průměru  $AE$  v bodě  $A$  vedena kolmice k  $AE$ , tedy  $AD$  se kruhu dotýká; ježto tedy kruhu  $ABE$  dotýká se nějaká přímka  $AD$  a z bodu dotyčného  $A$  do kruhu  $ABE$  vedena nějaká přímka  $AB$ , tedy  $\sphericalangle DAB = AEB$ , střídavě v úseči kruhové. Avšak  $\sphericalangle DAB = C$ , tedy též  $\sphericalangle C = AEB$ . Tedy k dané přímce  $AB$  narýsována úseč kruhová  $AEB$ , obsahující  $\sphericalangle AEB$  rovný danému  $\sphericalangle C$ .

b) Nuže buď již  $\sphericalangle C$  pravým, a buď opět úkolem na  $AB$  narý-



sovati úseč kruhovou obsahující úhel rovný pravému  $\sphericalangle C$ .



Sestrojen buď  $\sphericalangle BAD = C$ , jak ukazuje vyobrazení druhé, a buď  $AB$  v  $F$  rozpuřena a ze středu  $F$  poloměrem  $FA$  nebo  $FB$  narýsován kruh  $AEB$ . Tedy přímka  $AD$  je tečná kruhu  $ABE$ , protože  $\sphericalangle A$  jest pravý, a  $\sphericalangle BAD$  rovná se úhlu v úseči  $AEB$ , neboť též on je pravý, jsou na polokruží. Ale též  $\sphericalangle BAD = C$ , tedy rovněž  $\sphericalangle AEB = C$ .

Tedy sestrojena jest opět úseč kruhová na  $AB$  obsahující  $\sphericalangle AEB$  rovný úhlu  $C$ .

c) Nuže buď již  $\sphericalangle C$  tupým, a sestrojen buď jemu rovný na přímce  $AB$  z bodu  $A$ , totiž  $BAD$ , jak ukazuje vyobrazení třetí, a k  $AD$  vedme kolmici  $AE$  a rozpolme opět  $AB$  v  $F$  a k  $AB$  vedme kolmici  $FG$  a spojnicí  $GB$ .

A ježto opět  $AF = FB$  a společnou  $FG$ , patrně  $AF$ ,  $FG = BF$ ,  $FG$  a  $\sphericalangle AFG = BFG$ ; tedy třetí  $AG = BG$ ; tedy kruh narýsováný ze středu  $G$  poloměrem  $GA$  půjde i bodem  $B$ . Jdiž jako  $AEB$ . A ježto na konci průměru  $AE$  jest kolmice  $AD$ , jest tedy  $AD$  tečnou kruhu  $AEB$ . A z bodu dotyčného  $A$  vedena jest  $AB$ ; tedy  $\sphericalangle BAD$  rovná se úhlu sestrojenému střídavě v úseči kruhové  $AHB$ . Avšak  $\sphericalangle BAD = C$ , tedy též úhel v úseči  $AHB = C$ .

Tedy na dané přímce  $AB$  narýsována jest úseč kruhová  $AHB$  obsahující úhel rovný úhlu  $C$ ; což právě bylo vykonati.




## XXXIV.

Odetniž od kruhu daného úseč obsahující úhel danému přímkovému rovný.

Daným kruhem buď  $ABC$ , daným úhlem přímkovým  $\sphericalangle D$ ; tož má se od kruhu  $ABC$  odtíti úseč obsahující úhel danému přímkovému  $D$  rovný.

Vedme bodem  $B$  k  $ABC$  tečnou  $EF$  a sestrojme na přímce  $FB$  v bodě na ní  $B$   $\sphericalangle FBC = D$ .

Ježto tedy kruhu  $ABC$  dotýká se nějaká přímka  $EF$  a z bodu dotyčného  $B$  vedena  $BC$ , tedy  $\sphericalangle FBC$  rovná se úhlu sestrojenému střídavě v úseči  $BAC$ , t. j.



✗ A. Avšak  $\sphericalangle FBC = D$ ; tedy též úhel v úseči  $BAC$  rovná se úhlu  $D$ .

Tedy od kruhu daného  $ABC$  odřata jest úseč  $BAC$  obsahující — —.

## XXXV.

Když se v kruhu dvě přímky navzájem protínají, pravouhelník sevřený úsečkami jedné rovná se pravouhelníku sevřenému úsečkami druhé.

Nuže v kruhu  $ABCD$  protínají se dvě přímky  $AC, BD$  navzájem v bodě  $E$ ; pravím, že pravouhelník sevřený úsečkami  $AE, EC$  rovná se pravouhelníku sevřenému úsečkami  $DE, EB$ .

Jdou-li ovšem  $AC, BD$  středem, tak aby  $E$  bylo středem kruhu  $ABCD$ ; patrně, ježto  $AE = EC = DE = EB$ , že též pravouhelník  $AD \times EC = DE \times EB$  (a).

Nejdětež tedy  $AC, DB$  středem, a vezměme střed kruhu  $ABCD$ , a buď jím  $F$  (b), a z  $F$  ku přímčkám  $AC, DB$  vedme kolmice  $FG, FH$  a spojnice  $FB, FC, FE$ .

A ježto nějaká přímka  $GF$  středem jdoucí na nějaké přímce mimostředné  $AC$  stojí kolmo, též ji půlí; tedy  $AG = GC$ . Ježto tedy přímka  $AC$  rozdělena jest na díly stejné v  $G$ , na nestejně pak v  $E$ , tedy pravouhelník  $AE \times EC + EG^2 = GC^2$  (II. v.); přičtíme společný  $GF^2$ ; tedy  $AE \times EC + GE^2 + GF^2 = CG^2 + GF^2$ . Avšak  $EG^2 + GF^2 = FE^2$  a  $CG^2 + GF^2 = FC^2$ ; tedy  $AE \times EC + FE^2 = FC^2$ ,  $FC$  však  $= FB$ ; tedy  $AE \times EC + FE^2 = FB^2$ . Z téže příčiny ovšem  $DE \times EB + FE^2 = FB^2$ . Bylo však dokázáno, že také  $AE \times EC + FE^2 = FB^2$ ; tedy  $AE \times EC + FE^2 = DE \times EB + FE^2$ . Odečteno buď společné  $FE^2$ ; tedy zbývající  $AE \times EC = DE \times EB$ .

Když se tedy v kruhu dvě přímky navzájem protínají, — —.

## XXXVI.

Když se vezme nějaký bod vně kruhu a budou z něho na kruh dopadati dvě přímky a jedna z nich bude kruh protínati, druhá pak se ho dotýkati, pravouhelník sevřený celou sečnou a úsečkou vnější mezi bodem a obloukem vypuklým bude se rovnati čtverci z tečné.

Nuže vezměme nějaký bod  $D$  vně kruhu  $ABC$ , a z  $D$  na kruh  $ABC$  dopadejte dvě přímky  $DCA, DB$  a  $DCA$  protínaj kruh  $ABC$ ,  $DB$  pak se ho dotýkej; pravím, že  $AD \times DC = DB^2$ .

$DAC$  zajisté jde buď středem buď mimo. Jdiž nejprve středem, a buď  $F$  středem kruhu  $ABC$ , a vedme spojnici  $FB$ ; tedy  $\sphericalangle FBD = R$ . A ježto přímka  $AC$  v  $F$  jest rozpůlena a druží se k ní  $CD$ , tedy  $AD \times DC + FC^2 = FD^2$  (I. vi.).  $FC$  pak  $= FB$ ; tedy  $AD \times DC + FB^2 = FD^2$ . Avšak  $FD^2 = FB^2 + BD^2$ ; tedy  $AC \times DC + FB^2 = FB^2 + BD^2$ . Společný  $FB^2$  odečtíme; zbývající tedy  $AD \times DC$  rovná se čtverci z tečné  $DB$ .

Avšak již nejdí  $DCA$  středem kruhu  $ABC$ , a vezměme za střed  $E$  a vedme z  $E$  k  $AC$  kolmici  $EF$  a spojnice  $EB, EC, ED$ ; tedy  $\sphericalangle EBD$  jest pravý. A ježto přímka nějaká středová  $EF$  ku přímce nějaké mimostředné  $AC$  stojí kolmo, též ji půlí; tedy  $AF = FC$ . A ježto přímka  $AC$  jest rozpůlena v bodě  $F$  a druží se k ní  $CD$ , tedy  $AD \times DC + FC^2 = FD^2$ . Společným buď  $FE^2$ ; tedy  $AD \times DC + FC^2 + FE^2 = FD^2 + FE^2$ . Avšak  $CF^2 + FE^2 = EC^2$ , neboť  $\sphericalangle EFC = R$ ;  $DF^2 + FE^2$  však  $= ED^2$ ; tedy  $AD \times DC + EC^2 = ED^2$ . Avšak  $EC = EB$ ; tedy  $AD \times DC + EB^2 = ED^2$ .  $ED^2$  však  $= EB^2 + BD^2$ , neboť  $\sphericalangle EBD = R$ ; tedy  $AD \times DC + EB^2 = EB^2 + BD^2$ . Odečtíme společný  $EB^2$ ; zbývající tedy  $AD \times DC = BD^2$ .




Když se tedy vezme nějaký bod vně kruhu — —.

## XXXVII.

Když se vezme nějaký bod vně kruhu a budou z něho na kruh dopadati dvě přímky a jedna z nich bude kruh protínati, druhá pak ho dosahovati a pravouhelník sevřený celou sečnou a úsečkou vnější mezi bodem a obloukem vypuklým bude se rovnati čtverci přímky dosahující, přímka dosahující bude se kruhu dotýkati.

Nuže vezměme nějaký bod  $D$  vně kruhu  $ABC$  a z  $D$  na kruh  $ABC$  dopadejte dvě přímky  $DCA, DB$  a  $DCA$  protínaj kruh,  $DB$  pak ho dosahuj a buď pravouhelník  $AD \times DC = DB^2$ ; pravím, že  $DB$  dotýká se kruhu  $ABC$ .

Nuže vedme k  $ABC$  tečnu  $DE$  a vezměme střed kruhu  $ABC$ , a buď jím  $F$ , a vedme spojnice  $FE, FB, FD$ . Tedy  $\sphericalangle FED = R$ . A ježto  $DE$  je tečna kruhu  $ABC$ ,  $DCA$  pak sečná, tedy  $AD \times DC = DE^2$  (III. xxxvi.). A byl také  $AD \times DC = DB^2$ , tedy  $DE^2 = DB^2$ , tedy  $DE = DB$ ; také však  $FE = FB$ ; tož  $DE, EF = DB, BF$ ; a základna jejich společná  $FD$ ; tedy  $\sphericalangle DEF = DBF$ . Avšak



$DEF = R$ ; tedy též  $\sphericalangle DBF = R$ . I jest  $FB$ , prodloužena jsouc, průměrem; přímka však na konci průměru kruhového kolmo vedená dotýká se kruhu; tedy  $DB$  je tečná kruhu  $ABC$ .

Podobný ovšem bude důkaz, když bude střed náhodou na  $AC$ . Když se tedy vezme nějaký bod vně kruhu — —.


## Kniha čtvrtá.

### Výměry.

1. Pravíme, že obrazec přímkový do obrazce přímkového vписujeme, když každý z úhlův obrazce vписovaného dotýká se každé strany obrazce, do něhož jej vписujeme.
2. Podobně pravíme, že obrazec kol obrazce opisujeme, když každá strana opisovaného dotýká se každého úhlu obrazce, kol něhož jej opisujeme.
3. Pravíme, že obrazec přímkový do kruhu vписujeme, když každý úhel vписovaného dotýká se obvodu kruhu.
4. Pravíme pak, že obrazec přímkový kol kruhu opisujeme, když každá strana opisovaného dotýká se obvodu kruhu.
5. Podobně pak kruh, jak pravíme, do obrazce vписujeme, když obvod kruhu dotýká se každé strany obrazce, do něhož jej vписujeme.
6. O kruhu pak pravíme, že jej kol obrazce opisujeme, když obvod kruhu dotýká se každého úhlu obrazce, kol něhož jej opisujeme.
7. O přímce pravíme, že ji do kruhu zapouštíme, když mezní body její jsou na obvodě kruhu.

I.

Zapusť do kruhu daného přímku danou ne větší průměru kruhu.



Ježto tedy bod  $C$  je středem kruhu  $EAF$ , jest  $CA = CE$ . Avšak  $CE = D$ ; tedy též  $D = CA$ .

Tedy do kruhu daného  $ABC$  — —.

II.

Vpiš do kruhu daného trojúhelník s daným trojúhelníkem stejnoúhlý.


Daným kruhem buď  $ABC$ , daným pak trojúhelníkem  $DEF$ ; má se tedy do kruhu  $ABC$  vepsati trojúhelník s daným trojúhelníkem stejnoúhlý.

Veďme ke kruhu  $ABC$  tečnou  $GH$  v  $A$  a sestrojme na přímce  $AH$  a v bodě na ní  $A$   $\sphericalangle HAC = DEF$ , na  $AG$  v bodě na ní  $A$   $\sphericalangle GAB = DFE$  a spojnicí  $BC$ .

Ježto tedy kruhu  $ABC$  dotýká se nějaká přímka  $AH$  a z bodu dotyčného  $A$  do kruhu vedena přímka  $AC$ , tedy  $\sphericalangle HAC = ABC$  střídavě v úseči kruhu (III. xxxii.). Avšak  $\sphericalangle HAC = DEF$ , tedy též  $\sphericalangle ABC = DEF$ .

Z téže příčiny ovšem též  $\sphericalangle ACB = DFE$ ; tedy také zbývající  $\sphericalangle BAC = EDF$  [tedy  $\triangle ABC$  je stejnoúhlý s trojúhelníkem daným a jest vepsán do kruhu  $ABC$ ].

Tedy do kruhu daného jest vepsán — —.



III.


Opiš kolem daného kruhu trojúhelník s trojúhelníkem daným stejnoúhlý.

Daným kruhem buď  $ABC$ , daným trojúhelníkem  $DEF$ ; má se tedy kolem kruhu  $ABC$  opsati trojúhelník s trojúhelníkem  $DEF$  stejnoúhlý.

Prodlužme  $EF$  na obě strany do bodu  $G, H$  a za střed kruhu  $ABC$  vezměme  $K$  a veďme libovolně přímku  $KB$  a sestrojme na přímce  $KB$  v bodě na ní  $K$   $\sphericalangle BKA = DEG$  a  $\sphericalangle BKC = DFH$  a v bodech  $A, B, C$  veďme ke kruhu  $ABC$  tečné  $LAM, MBN, NCL$ .

A ježto  $LM, MN, NL$  kruhu  $ABC$  se dotýkají v bodech  $A, B, C$  a ze středu  $K$  k bodům  $A, B, C$  vedeny jsou  $KA, KB, KC$ , tedy úhly při bodech  $A, B, C$  jsou pravé. A ježto ve čtyřúhelníku  $AMBK$  čtyři úhly rovnají se čtyřem pravým a úhly  $KAM, KBM$  jsou pravé, tedy zbývající  $\sphericalangle AKB + \sphericalangle AMB = 2R$ . Jsou pak též  $\sphericalangle DEG + \sphericalangle DEF = 2R$ ; tedy  $\sphericalangle AKB + \sphericalangle AMB = \sphericalangle DEG + \sphericalangle DEF$ , z nichž  $\sphericalangle AKB = \sphericalangle DEG$ ; tedy zbývající  $\sphericalangle AMB = \sphericalangle DEF$ . Podobně ovšem se dokáže, že též  $\sphericalangle LNB = \sphericalangle DFE$ ; tedy zbývající  $\sphericalangle MLN = \sphericalangle EDF$ . Tedy  $\triangle LMN$  je stejnoúhlý s  $\triangle DEF$  a jest opsán kolem kruhu  $ABC$ .

Kolem daného tedy kruhu jest opsán — —.





## IV.

Do trojúhelníku daného vpiš kruh.

Daným trojúhelníkem buď  $ABC$ ; má se tedy do trojúhelníku  $ABC$  vepsati kruh.

Úhly  $ABC, ACB$  buďte rozděleny přímkami  $BD, CD$  a ty stýkejte se v bodě  $D$ , a vedeny buďte z  $D$  k  $AB, BC, CA$  kolmice  $DE, DF, DG$ .

A ježto  $\sphericalangle ABD = CBD$ , jest pak i  $\sphericalangle BED = BFD = R$ ; oba tedy trojúhelníky  $EBD, FBD$  mají po dvou úhlech stejných a jednu stranu rovnou jedné straně, t.  $BD$ , která ležíc proti jednomu ze stejných úhlů jest jim společná; tedy též ostatní strany budou míti stejné se stranami ostatními; tedy  $DE = DF$ . Z téže příčiny ovšem též  $DG = DF$ . Tedy tři přímky  $DE, DF, DG$  jsou navzájem stejné; pročež kruh rýsovaný ze středu  $D$  rozpětím  $E$  (t.  $DE$ ),  $F$  nebo  $G$  půjde též ostatními body a dotkne se přímk  $AB, BC, CA$ , ježto úhly při  $E, F, G$  jsou pravé. Neboť bude-li je protínati, dopadne kolmice na konci průměru kruhu sestrojená dovnitř kruhu; což, jak dokázáno (III. xvi.), jest nemožno; tedy kruh rýsovaný ze středu  $D$  rozpětím  $E$  neb  $F$  nebo  $G$  nebude protínati přímk  $AB, BC, CA$ ; tedy se jich bude dotýkati a bude to kruh vepsaný do  $ABC$ . Vepsán buď jako  $FGE$ .

Tedy do daného trojúhelníku  $ABC$  jest vepsán — —.


## V.

Kolem daného trojúhelníku opiš kruh.

Daným trojúhelníkem buď  $ABC$ ; má se tedy kolem daného  $\triangle ABC$  opsati kruh.

Přímky  $AB, AC$  buďte rozděleny v bodech  $D, E$  a z bodů  $D, E$  k  $AB, AC$  vedeny kolmice  $DF, EF$ ; tož se setkají buď uvnitř trojúhelníku nebo na přímce  $BC$  nebo vně  $BC$ .

a) Setkejte se nejprve vnitř v  $F$ , a vedme spojnice  $FB, FC, FA$ . A ježto  $AD = DB$ , společnou pak kolmice  $DF$ , tedy třetí  $AF = FB$ . Podobně ovšem dokážeme, že  $CF = AF$ , a tak též  $FB = FC$ , tedy všechny tři  $FA, FB, FC$  jsou si rovny. Tedy kruh rýsovaný ze středu  $F$  rozpětím  $A$  (t.  $FA$ ) nebo  $B$  neb  $C$  půjde též ostatními body a opsán kruh kolem  $\triangle ABC$ . Buď opsán jako  $ABC$ .



b) Avšak již stýkejte se  $DF, EF$  na přímce  $BC$  v  $F$ , jak naznačuje vyobr. druhé, a vedme spojnici  $AF$ . Podobně zajisté dokážeme, že bod  $F$  je středem kruhu rýsovaného kolem  $\triangle ABC$ .

c) Avšak již stýkejte se  $DF, EF$  vně trojúhelníku  $ABC$  opět v  $F$ , jak naznačuje vyobr. třetí, a vedme spojnice  $AF, BF, CF$ . A ježto opět  $AD = DB$ , společnou pak kolmice  $DF$ , tedy třetí  $AF = BF$ . Podobně ovšem dokážeme, že též  $CF = AF$ , a tak též  $BF = FC$ ; tedy kruh ze středu  $F$  rozpětím  $FA$  neb  $FB$  neb  $FC$  rýsovaný půjde též ostatními body i bude opsán kolem trojúhelníku  $ABC$ .

Tedy kolem daného trojúhelníku jest opsán kruh; což právě bylo vykonati.

## Důsledek.

I jest patrné, že, když dopadá střed kruhu dovnitř trojúhelníku,  $\sphericalangle BAC$ , jsa právě v úseči nad polokruh větší, jest menší než pravý; když pak dopadá střed na přímku  $BC$ ,  $\sphericalangle BAC$  jsa právě v polokruží je pravý; když pak střed kruhu dopadá vně trojúhelníku,  $\sphericalangle BAC$ , jsa právě v úseči nad polokruh menší, jest větší než pravý.

## VI.


Vpiš do kruhu daného čtverec.

Daným kruhem buď  $ABCD$ ; má se tedy do kruhu daného vepsati čtverec.

Vedme v kruhu  $ABCD$  dva průměry navzájem kolmé  $AC, BD$  a spojnice  $AB, BC, CD, DA$ .

A ježto  $BE = ED$ , neboť  $E$  je střed, a společnou kolmice  $EA$ , tedy třetí  $AB = AD$ . Z téže příčiny ovšem též  $BC, CD$  jednotlivě stejné jsou s  $AB, AD$ ; tedy čtyřúhelník  $ABCD$  je stejnostranný. Pravím ovšem, že též pravouhlý. Neboť ježto přímka  $BD$  je průměrem kruhu  $ABCD$ , tedy  $BAD$  jest polokruhem, pročež  $\sphericalangle BAD = R$ . Z též ovšem příčiny také každý z úhlův  $ABC, BCD, CDA$  jest pravý; tedy čtyřúhelník  $ABCD$  je pravouhlý, dokázáno pak bylo, že též stejnostranný; je to tedy čtverec. Též je vepsán do kruhu  $ABCD$ .

Tedy do kruhu daného — —.




## VII.

Opiš kolem kruhu daného čtverec.

Daným kruhem buď  $ABCD$ ; má se tedy kolem kruhu  $ABCD$  opsati čtverec.

Vedme v kruhu  $ABCD$  dva průměry navzájem kolmé  $AC, BD$  a v bodech  $A, B, C, D$  vedme ke kruhu  $ABCD$  tečné  $FG, GH, HK, KF$ .

Ježto tedy  $FG$  se dotýká kruhu  $ABCD$  a ze středu  $E$  k bodu dotýčnému  $A$  vedena spojnice  $EA$ , tedy úhly při  $A$  jsou pravé. Z téže



příčiny ovšem též úhly při bodech  $B, C, D$  jsou pravé. A ježto  $\sphericalangle AEB = R$  a též  $\sphericalangle EBG = R$ , tedy  $GH \parallel AC$ . Z téže příčiny ovšem též  $AC \parallel FK$ . Pročež také  $GH \parallel FK$ . Podobně ovšem dokážeme, že též  $GF, HK$  jsou s  $BED$  rovnoběžné. Tedy  $GK, GC, AK, FB, BK^1)$  jsou rovnoběžníky; tedy  $GF = HK, GH = FK$ . A ježto  $AC = BD$ , avšak též  $AC = GH = FK$  a  $BD = GF = HK$ , tedy čtyřúhelník  $FGHK$  je stejnostranný. Pravím ovšem, že též pravouhlý. Neboť ježto  $GBEA$  jest rovnoběžník a  $\sphericalangle AEB = R$ , tedy též  $\sphericalangle AGB = R$ . Podobně ovšem dokážeme, že též úhly při  $H, K, F$  jsou pravé. Tedy  $FGHK$  je pravouhelník. Dokázáno však bylo, že také stejnostranný, tedy jest to čtverec. A opsán jest kolem kruhu  $ABCD$ .

Tedy kolem daného kruhu jest opsán čtverec; což právě bylo vykonati.

## VIII.

Vpiš do čtverce daného kruh.

Daným čtvercem buď  $ABCD$ ; má se tedy do čtverce  $ABCD$  vepsati kruh.

Buďtež  $AD, AB$  rozpůleny v bodech  $E, F$ , a z bodu  $E$  vedme  $EH \parallel AB$  nebo  $CD$ , z bodu  $F$  pak vedme  $FK \parallel AD$  nebo  $BC$ ; tedy  $AK, KB, AH, HD, AG, GC, BG, GD$  jsou samé rovnoběžníky a jejich protější strany patrně stejné. A ježto  $AD = AB$  a polovinou  $AD$  jest  $AE$ , polovinou pak  $AB$  jest  $AF$ , tedy  $AE = AF$ , a tak i protější; tedy  $FG = GE$ . Podobně ovšem dokážeme, že  $GH, GK$  jsou jednotlivě stejné s  $FG, GE$ ; tedy  $GE = GF = GH = GK$ . Kruh tedy ze středu  $G$  rozpětím  $E$  n.  $F$  n.  $H$  n.  $K$  rýsovaný půjde též ostatními body a přímek  $AB, BC, CD, DA$  bude se dotýkati, ježto úhly při  $E, F, H, K$  jsou pravé; neboť bude-li kruh  $AB, BC, CD, DA$  protínati, přímka na

konci průměru kruhu kolmo vedená dopadne dovnitř kruhu, což právě, jak bylo dokázáno, nemožno (III. xvi.). Tedy kruh ze středu  $G$

<sup>1)</sup> Stačilo uvést, že  $GK$  jest rovnoběžník (k tomu viz I. xxxiii.).

rozpětím  $E, F, H$  n.  $K$  rýsovaný nebude protínati přímek  $AB, BC, CD, DA$ . Bude se jich tedy dotýkati a bude vepsán do čtverce  $ABCD$ . Tedy do čtverce daného jest vepsán — —.

## IX.


Opiš kolem daného čtverce kruh.

Daným čtvercem buď  $ABCD$ ; má se tedy kolem čtverce  $ABCD$  opsati kruh.

Nuže protínají se spojnice  $AC, BD$ , v  $E$ . A ježto  $DA = AB$ , společnou pak  $AC$ , obě tedy  $DA, AC = BA, AC$  a základna  $DC = BC$ ; tedy  $\sphericalangle DAC = \sphericalangle BAC$ ; tedy  $\sphericalangle DAB$  přímku  $AC$  je rozpůlen. Podobně ovšem dokážeme, že též každý z úhlův  $ABC, BCD, CDA$  je rozpůlen přímkami  $AC, DB$ . A ježto  $\sphericalangle DAB = \sphericalangle ABC$  a  $\sphericalangle EAB = \frac{DAB}{2}$  a  $\sphericalangle EBA = \frac{ABC}{2}$

tedy též  $\sphericalangle EAB = \sphericalangle EBA$ ; a tak též strana  $EA = EB$ . Podobně ovšem dokážeme, že též  $EA = EC = ED, EB = EC = ED$ . Tedy  $EA = EB = EC = ED$ . Tedy kruh rýsovaný jsa ze středu  $E$  rozpětím  $A, B, C$  n.  $D$  půjde též ostatními body a bude opsán kolem čtverce  $ABCD$ . Buď opsán jako  $ABCD$ .

Tedy kolem daného čtverce opsán — —.




## X.

Sestroj rovnoramenný trojúhelník mající úhly na základně jednotlivě dvakrát větší úhlu třetího.

Stranou buď nějaká přímka  $AB$  a buď rozdělena v bodě  $C$  tak, aby pravouhelník  $AB \times BC = CA^2$  (dle II. xi.); a ze středu  $A$  rozpětím  $AB$  buď narysován kruh  $BDE$  a zapuštěna buď do kruhu  $BDE$  přímka  $BD$  rovná přímce  $AC$ , ne větší než průměr kruhu  $BDE$ ; i vedme spojnice  $AD, DC$  a opišme kolem  $\triangle ACD$  kruh  $ACD$ .

A ježto  $AB \times BC = CA^2$  a  $AC = BD$ , tedy  $AB \times BC = BD^2$ . A ježto vzat jest nějaký bod  $B$  mimo kruh  $ACD$  a z  $B$  na kruh  $ACD$  dopadají dvě přímky  $BA, BD$ , a jedna z nich jej seče, druhá ho dosahuje a  $AB \times BC = BD^2$ , tedy  $BD$  je tečna kruhu  $ACD$  (III. xxviii.). A ježto tedy  $BD$  je tečna a z bodu dotýčného  $D$  vedena jest  $DC$ , tedy  $\sphericalangle BDC = \sphericalangle DAC$



střídavě v úseči kruhu (III. xxxii.). Ježto tedy  $\sphericalangle BDC = DAC$ , společným přičteme  $\sphericalangle CDA$ ; tedy celý  $\sphericalangle BDA = CDA + DAC$ . Avšak  $\sphericalangle CDA + DAC = BCD$  vnějšímu; tedy též  $\sphericalangle BDA = BCD$ . Avšak  $\sphericalangle BDA = CBD$ , ježto také strana  $AD = AB$ ; a tak též  $\sphericalangle DBA = BCD$ . Tedy  $BDA = DBA = BCD$ . A ježto  $\sphericalangle DBC = BCD$ , též strana  $BD = DC$ . Avšak  $BD$  vzata za stejnou s  $CA$ ; tedy též  $CA = CD$ ; a tak také  $\sphericalangle CDA = DAC$ , tedy  $\sphericalangle CDA + DAC = 2 DAC$ . Úhel však  $BCD = CDA + DAC$ ; tedy též  $\sphericalangle BCD = 2 CAD$ . Úhel však  $BCD = BDA = DBA$ . Tedy  $\sphericalangle BDA = 2 DAB = DBA$ .


Tedy je sestrojen rovnoramenný  $\triangle ABD$  mající — —.

## XI.

Vpiš do kruhu daného pětiúhelník stejnostranný a stejnoúhlý.

Daným kruhem buď  $ABCDE$ ; má se tedy do kruhu  $ABCDE$  vepsati pětiúhelník stejnostranný a stejnoúhlý.

Vedle buď trojúhelník rovnoramenný  $FGH$  mající úhly při  $G, H$  jednotlivě dvakrát větší úhlu při  $F$ , a vpišme do kruhu  $ABCDE$   $\triangle ACD$  s  $\triangle FGH$  stejnoúhlý, tak aby  $\sphericalangle F = CAD$  a  $\sphericalangle G, H$  byly stejné s  $\sphericalangle ACD, CDA$ ; tedy též  $\sphericalangle ACD, CDA$  jsou jednotlivě dvakrát větší než  $\sphericalangle CAD$ .



Tož úhly  $ACD, CDA$  rozpolme přímkami  $CE, DB$  a vedme spojnice  $AB, BC, DE, EA$ .

Ježto tedy  $\sphericalangle ACD, CDA$  jsou jednotlivě dvakrát větší než  $CAD$  a jsou přímkami  $CE, DB$  rozpuřeny, jest tedy pět úhlů  $DAC, ACE, ECD, CDB, BDA$  navzájem sobě rovných. Stejně však úhly (zde všechny obvodové) stojí na stejných obloucích (III. xxvi.); tedy oblouky  $AB, BC, CD, DE, EA$  jsou si rovny. Stejným však obloukům náleží stejné tětivy; tedy tětivy  $AB, BC, CD, DE, EA$  jsou si rovny; pročež pětiúhelník  $ABCDE$  je stejnostranný. Pravím ovšem, že též stejnoúhlý. Neboť ježto obl.  $AB = DE$ , společným buď obl.  $BCD$ ; tedy celý oblouk  $ABCD = EDCB$  a na oblouku  $ABCD$  stojí  $\sphericalangle AED$ , na obl.  $EDCB$   $\sphericalangle BAE$ ; tedy též  $\sphericalangle BAE = AED$ . Z téže příčiny ovšem též každý z  $\sphericalangle ABC, BCD, CDE$  rovná se kterémukoli z úhlů  $BAE, AED$ ; tedy pětiúhelník  $ABCDE$  je stejnoúhlý. Dokázáno pak bylo, že též stejnostranný.

Tedy do kruhu daného vepsán jest — —.


## XII.

Opiš kolem kruhu daného pětiúhelník stejnostranný a stejnoúhlý.

Daným kruhem buď  $ABCDE$ ; má se tedy kolem kruhu  $ABCDE$  opsati pětiúhelník stejnostranný a stejnoúhlý.

Dejme tomu, že v pětiúhelníku vepsaném jsou body úhlů (vrcholy)  $A, B, C, D, E$ , tak aby oblouky  $AB, BC, CD, DE, EA$  byly stejné; a body  $A, B, C, D, E$  vedme tečné kruhu  $GH, HK, KL, LM, MG$  a za střed kruhu  $ABCDE$  vezměme  $F$  a vedme spojnice  $FB, FK, FC, FL, FD$ .

A ježto přímka  $KL$  dotýká se kruhu  $ABCDE$  v  $C$  a ze středu  $F$  k bodu dotyčnému  $C$  vedena spojnice  $FC$ , tedy  $FC \perp KL$ ; pročež oba úhly při  $C$  jsou pravé. Z téže příčiny ovšem též úhly při bodech  $B, D$  jsou pravé. A ježto  $\sphericalangle FCK = R$ , tedy  $FK^2 = FC^2 + CK^2$ . Z téže příčiny ovšem též  $FK^2 = FB^2 + BK^2$ , takže  $FC^2 + CK^2 = FB^2 + BK^2$ , z nichž  $FC^2 = FB^2$ ; zbývající tedy  $CK^2 = BK^2$ . Tedy  $BK = CK$ . A ježto  $FB = FC$  a společná  $FK$ , tedy  $BF, FK = CF, FK$  a základna  $BK = CK$ , tedy  $\sphericalangle BFK = KFC$  a  $\sphericalangle BKF = FKC$ , tedy  $\sphericalangle BFC = 2 KFC$  a  $\sphericalangle BKC = 2 FKC$ . Z téže příčiny ovšem též  $\sphericalangle CFD = 2 CFL$  a  $\sphericalangle DLC = 2 FLC$ . A ježto obl.  $BC = CD$ , též  $\sphericalangle BFC = CFD$ . I jest  $\sphericalangle BFC = 2 KFC$  a  $\sphericalangle DFC = 2 LFC$ ; tedy  $\sphericalangle KFC = LFC$ ; avšak též  $\sphericalangle FCK = FCL$ . Oba zajisté  $\triangle FKC$  a  $FLC$  mají po dvou úhlech stejných a jednu stranu stejnou společnou  $FC$ ; tedy též ostatní strany jejich budou rovny ostatním stranám a zbývající úhel úhlu zbývajícímu. Tedy  $KC = CL$  a  $\sphericalangle FKC = FLC$ . A ježto  $KC = CL$ , tedy  $KL = 2 KC$ . Týmž způsobem zajisté se dokáže, že též  $HG = 2 BK$ . I jest  $BK = KC$ , tedy též  $HK = KL$ . Podobně ovšem dokážeme, že i každá ze stran  $HG, GM, ML$  každé ze stran  $GH, KL$  se rovná; tedy pětiúhelník  $GHKLM$  je stejnostranný. Pravím ovšem, že též stejnoúhlý. Neboť ježto  $\sphericalangle FKC = FLC$  a dokázáno, že  $HKL = 2 FKC$  a  $KLM = 2 FLC$ ; tedy též  $\sphericalangle HKL = KLM$ . Podobně ovšem dokážeme, že každý z úhlů  $KHG, HGM, GML$  roven každému z úhlů  $HKL, KLM$ ; tedy  $GHK = HKL = KLM = LMG = MGH$ . Tedy pětiúhelník  $GHKLM$  je stejnoúhlý. Dokázáno však, že i stejnostranný, a opsán je kolem kruhu  $ABCDE$ .




Tedy kolem daného kruhu opsán jest — —.

## XIII.

Do daného pětiúhelníku stejnostranného a stejnoúhlého vpiš kruh.

Daným pětiúhelníkem stejnostranným a stejnoúhlým buď  $ABCDE$ ; má se tedy do pětiúhelníku  $ABCDE$  vepsatí kruh.

Nuže rozpolme  $\sphericalangle BCD$  a  $CDE$  dvěma přímkami  $CF$ ,  $DF$  a z bodu  $F$ , v němž přímky  $CF$ ,  $DF$  se stýkají, vedme spojnice  $FB$ ,  $FA$ ,  $FE$ . A ježto  $BC=DC$ , společnou pak  $CF$ , tedy  $BC, CF=DC, CF$  i  $\sphericalangle BCF=DCF$ , tedy základna  $BF=DF$  a  $\sphericalangle BCF=DCF$ , i ostatní úhly budou rovny ostatním úhlům, proti nimž leží stejné strany; tedy  $\sphericalangle CBF=CDF$ . A ježto  $\sphericalangle CDE=2 CDF$  a  $\sphericalangle CDE=ABC$  i  $\sphericalangle CDF=CBF$ , tedy též  $\sphericalangle CBA=2 CBF$ ; tedy  $\sphericalangle ABF=FBC$ ; pročež  $\sphericalangle ABC$  přímkou  $BF$  je rozpučen. Podobně ovšem dokážeme, že též úhly  $BAE$ ,  $AED$  přímkami  $FA$ ,  $FE$  jsou rozpučeny. Vedme již z bodu  $F$  ku přímkám  $AB$ ,  $BC$ ,  $CD$ ,  $DE$ ,  $EA$  kolmice  $FG$ ;  $FH$ ,  $FK$ ,  $FL$ ,  $FM$ .



A ježto  $\sphericalangle HCF=KCF$  a pravý  $\sphericalangle FHC=FKC$ , tedy oba trojúhelníky  $FHC$ ,  $FKC$  mají po dvou úhlech stejných a stejnou jednu společnou stranu  $FC$  proti jednomu ze stejných úhlů ležící; tedy též ostatní strany budou míti rovné ostatním stranám; tedy kolmice  $FH=FK$ . Podobně ovšem dokážeme, že též každá z kolmic  $FL$ ,  $FM$ ,  $FG$  každé z kolmic  $FH$ ,  $FK$  se rovná; tedy  $FG=FH=FK=FL=FM$ . Tedy kruh z bodu  $F$  rozpětím  $G$ ,  $H$ ,  $K$ ,  $L$  neb  $M$  rýsovaný půjde též ostatními body a bude se dotýkati přímek  $AB$ ,  $BC$ ,  $CD$ ,  $DE$ ,  $EA$ , ježto úhly při  $G$ ,  $H$ ,  $K$ ,  $L$ ,  $M$  jsou pravé. Neboť nebude-li se jich dotýkati, nýbrž bude je protínati, stane se, že kolmice vedená na konci průměru kruhu padne dovnitř kruhu; což dokázáno nemožným. Tedy kruh rýsovaný ze středu  $F$  a rozpětím  $G$ ,  $H$ ,  $K$ ,  $L$  neb  $M$  nebude protínati přímek  $AB$ ,  $BC$ ,  $CD$ ,  $DE$ ,  $EA$ ; tedy se jich bude dotýkati. Buď narýsován jako  $GHKLM$ .

Tedy do daného pětiúhelníku stejnostranného — —


## XIV.

Kolem daného pětiúhelníku stejnostranného a stejnoúhlého opiš kruh.

Daným pětiúhelníkem stejnostranným a stejnoúhlým buď  $ABCDE$ ; má se tedy kolem pětiúhelníku  $ABCDE$  opsatí kruh.

Rozpolme tedy úhly  $BCD$ ,  $CDE$  přímkami  $CF$ ,  $DF$  a z bodu  $F$ , v němž

se přímky stýkají, k bodům  $B$ ,  $A$ ,  $E$  vedme spojnice  $FB$ ,  $FA$ ,  $FE$ . Podobně ovšem jako předešle (XIII.) dokážeme, že též úhly  $CBA$ ,  $BAE$ ,  $AED$  rozpolují přímky  $FB$ ,  $FA$ ,  $FE$ . A ježto  $\sphericalangle BCD=CDE$  a  $\sphericalangle FCD=\frac{BCD}{2}$  a  $\sphericalangle CDF=\frac{CDE}{2}$ , tedy



$FCD=FDC$ ; a tak též strana  $FC=FD$ . Podobně ovšem dokážeme, že též  $FB, FA, FE$  každá je stejná s  $FC$  i  $FD$ ; tedy  $FA=FB=FC=FD=FE$ . Tedy kruh rýsovaný z bodu  $F$  a rozpětím  $FA, FB, FC, FD$  neb  $FE$  půjde též ostatními body a bude opsán. Buď opsán a budiž to  $ABCDE$ .


Tedy kolem daného pětiúhelníku stejnostranného — —

## XV.

Do daného kruhu vpiš šestiúhelník stejnostranný i stejnoúhlý.

Daným kruhem buď  $ABCDEF$ ; má se tedy do kruhu  $ABCDEF$  vepsatí šestiúhelník stejnostranný i stejnoúhlý.

Vedme v kruhu  $ABCDEF$  průměr  $AD$  a vezměme za střed kruhu  $G$  a ze středu  $D$  rozpětím  $DG$  narýsujme kruh  $EGCH$  a spojnice  $EG$ ,  $CG$  prodlužme do bodů  $B$ ,  $F$  a vedme spojnice  $AB$ ,  $BC$ ,  $CD$ ,  $DE$ ,  $EF$ ,  $FA$ ; pravím, že  $ABCDEF$  je šestiúhelník stejnostranný i stejnoúhlý.



Neboť ježto bod  $G$  je středem kruhu  $ABCDEF$ ,  $GE=GD$ . Dále, ježto bod  $D$  je středem kruhu  $GCH$ ,  $DE=DG$ . Avšak dokázáno, že  $GE=GD$ ; tedy též  $GE=ED$ ; tedy  $\triangle EGD$  je stejnostranný; pročež také tři úhly jeho  $EGD$ ,  $GDE$ ,  $DEG$  jsou navzájem rovny, poněvadž v trojúhelnících rovnoarmenných (i. v.) úhly při základně jsou stejné<sup>2)</sup>;

a tři úhly v trojúhelníku rovnají se dvěma pravým; tedy  $\sphericalangle EGD=\frac{2R}{3}$

Podobně ovšem dokážeme, že též  $\sphericalangle DGC=\frac{2R}{3}$ . A ježto  $CG$  na  $EB$  postavena jsouc, činí úhly stýkavé  $EGC+CGB=2R$ , tedy též zbývající  $\sphericalangle CGB=\frac{2R}{3}$ ; tedy úhly  $EGD$ ,  $DGC$ ,  $CGB$  jsou si rovny; pročež také příslušné vrcholové úhly  $BGA$ ,  $AGF$ ,  $FGE$  jsou stejné. Tedy  $EGD=DGC=CGB=BGA=AGF=FGE$ . Stejně však úhly (středové) stojí na stejných obloucích; tedy oblouky  $AB$ ,  $BC$ ,  $CD$ ,  $DE$ ,

<sup>2)</sup>  $\triangle EGD$  je rovnoarmenný, ať základnou strana kterákoli. Rovnosti úhlů v  $\triangle$  stejnostranném Eukl. dotud nedokázal. Mohla by se ovšem vyvoditi z I. XVIII.

$EF, FA$  jsou stejné. Na stejných však obloucích jsou stejné tětivy; tedy šestiúhelník  $ABCDEF$  je stejnostranný.

Pravím ovšem, že též stejnoúhlý. Neboť ježto obl.  $FA = ED$ , společným přičtemež obl.  $ABCD$ ; tedy celý  $FABCD = EDCBA$ ; a na obl.  $FABCD$  stojí  $\sphericalangle FED$  (obvodový) a na obl.  $EDCBA$   $\sphericalangle AFE$ ; tedy  $\sphericalangle AFE = DEF$ . Podobně ovšem dokážeme, že též ostatní úhly šestiúhelníku  $ABCDEF$  jednotlivě stejné jsou s  $AFE$  i s  $FED$ ; tedy šestiúhelník  $ABCDEF$  je stejnoúhlý. Dokázáno však bylo, že také stejnostranný; i jest vepsán do kruhu  $ABCDEF$ .

Tedy do daného kruhu vepsán šestiúhelník — —.

#### Důsledek.

Z toho zajisté patrné, že strana šestiúhelníku (pravidelného) rovná se poloměru kruhu.

Podobně pak, jako při pětiúhelníku, když vedeme v bodech kružnici rozdělujících ke kruhu tečně, opišeme kolem kruhu šestiúhelník stejnostranný i stejnoúhlý tak, jak pověděno jest při pětiúhelníku (IV. XII.). A také způsobem podobným tomu, co řečeno při pětiúhelníku (IV. XIII. XIV.), do daného šestiúhelníku vpišeme i kolem něho opišeme kruh; což právě bylo vykonati.

#### XVI.

Do daného kruhu vpiš patnáctiúhelník stejnostranný i stejnoúhlý.

Daným kruhem buď  $ABCD$ ; má se tedy do kruhu  $ABCD$  vepsati patnáctiúhelník stejnostranný i stejnoúhlý.


Vpišme do kruhu  $ABCD$  stranu  $AC$  trojúhelníku stejnostranného do kruhu vpišovaného (srv. IV. II.), stranu pak  $AB$  pětiúhelníku stejnostranného; jakých tedy úsečí má kruh  $ABCD$  patnáct, takových obl.  $ABC$ , jsa třetinou kruhu, bude míti pět a obl.  $AB$ , jsa pětinou kruhu, bude míti tři, tedy zbývající  $BC$  stejných dvě. Rozpolme  $BC$  v  $E$ ; tedy obl.  $BE$  i  $CE$  jest patnáctinou kruhu  $ABCD$ .

Když tedy spojíme  $B, E$  a  $E, C$  zapustíme nepřetržitě přímky jim rovné do kruhu  $ABCD$ . bude do něho vepsán patnáctiúhelník

stejnostranný i stejnoúhlý<sup>3)</sup>; což právě bylo vykonati.

Podobně pak jako při pětiúhelníku, když vedeme v bodech kružnici rozdělujících ke kruhu tečně, opišeme kolem kruhu patnáctiúhelník stejnostranný i stejnoúhlý. Mimo to způsobem podobným tomu, jak ukázáno při pětiúhelníci, též do daného patnáctiúhelníku vpišeme a kolem něho opišeme kruh; což právě bylo vykonati.

<sup>3)</sup> Že je též stejnoúhlý, zde nedokázáno; způsob důkazu však snadno nalezneme v oddělech předešlých.



#### Jiné důkazy.

Kn. II. IV.

#### Jinak.

Pravím, že  $AB^2 = AC^2 + BC^2 + 2AC \times CB$ .

Neboť v témže vyobrazení (str. 27. t. d.), ježto  $BA = AD$ , též úhel  $\sphericalangle ABD = \sphericalangle ADB$ , a ježto v každém trojúhelníku tři úhly rovnají se dvěma pravým, tedy v  $\triangle ADB$  tři úhly  $\sphericalangle ADB + \sphericalangle BAD + \sphericalangle DBA = 2R$ . Avšak  $\sphericalangle BAD = R$ , tedy ostatní  $\sphericalangle ABD + \sphericalangle ADB = 2R$  a jsou stejné, tedy  $\sphericalangle ABD = \frac{R}{2} = \sphericalangle ADB$ . Úhel však  $\sphericalangle BCG = R$ , neboť se rovná protějšímu

(souhlasnému)  $\sphericalangle A$ ; tedy zbývající  $\sphericalangle CGB = \frac{R}{2}$ , tedy  $\sphericalangle CBG = \sphericalangle CGB$  pročež i strana  $BC = CG$ . Avšak  $CB = GK$  a  $CG = BK$ , tedy  $CK$  je stejnostranný. Má však též  $\sphericalangle CBK$  pravý; tedy  $CK$  je čtverec a je z  $CB$ . (Ostatek téměř slovo od slova stejný.)

Kn. III. VII.

Nebo též takto:

Vedme spojnici  $EK$ . A ježto  $GE = EK$ , společnou pak  $FE$ , i základna  $FG = FK$ , tedy  $\sphericalangle GEF = \sphericalangle KEF$ , Avšak  $\sphericalangle GEF = \sphericalangle HEF$ , menší většímu; což právě není možno. (Týká se části poslední.)

Kn. III. VIII.

Nebo též jinak.


Vedme spojnici  $MN$ . Ježto  $KM = MN$ , společnou pak  $MD$ , i základna  $DK = DN$ , tedy  $\sphericalangle KMD = \sphericalangle DMN$ . Avšak  $\sphericalangle KMD = \sphericalangle BMD$ , tedy též  $\sphericalangle BMD = \sphericalangle NMD$ , menší většímu; což právě nemožno. (K poslední č.)

Kn. III. IX.

#### Jinak.

Nuže v kruhu  $ABC$  vezmeme nějaký bod uvnitř  $D$  a z  $D$  na kruh  $ABC$  dopadej více než dvě stejných přímkou  $AD, DB, DC$ ; pravím, že vzaty bod  $D$  je středem kruhu  $ABC$ .


Nuže nebud, nýbrž, možno-li, buď jím  $E$  a spojnice  $DE$  buď prodloužena do bodů  $F, G$ ; tedy  $FG$  je průměrem kruhu  $ABC$ . Ježto tedy v kruhu  $ABC$  na průměru  $FG$  vzat jest nějaký bod, jenž není středem kruhu, t.  $D$ , největší bude  $DG, DC$  pak  $> DB, DB > DA$  (III. VII.). Avšak jsou si též rovny; což právě jest nemožno; tedy  $E$  není středem kruhu  $ABC$ . Podobně ovšem dokážeme, že ani jiný bod kromě  $D$ . Tedy bod  $D$  je středem kruhu  $ABC$ ; což právě bylo dokázati.



## Kn. III. x.

Zinak.


Nuže opět kruh  $ABC$  protínej kruh  $DEF$  ve více než dvou bodech  $B, G, H, F$  a za střed kruhu  $ABC$  vezměme  $K$  a veďme spojnice  $KB, KG, KF$ .



Ježto tedy v kruhu  $DEF$  vzat nějaký bod uvnitř  $K$  a z  $K$  na kruh  $DEF$  dopadá více než dvě stejných přímek  $KB, KF, KG$ , tedy bod  $K$  je středem kruhu  $DEF$ . Jest pak  $K$  také středem kruhu  $ABC$ ; tedy dva kruhy navzájem se protínající mají týž střed  $K$ ; což právě jest nemožno (III. v.). Tedy kruh protíná kruh ve více bodech než dvou; což právě bylo dokázati.

## Kn. III. xi.

Nuže již dopadej jako  $GFC$ , i prodlužme přímým směrem  $CFG$  do bodu  $H$  a veďme spojnice  $AG, AF$ .



Ježto tedy  $(AG + GF) > AF$ , avšak  $FA = FC = FH$ , společnou odečtemež  $FG$ , tedy zbývající  $AG > GH$ , t. j.  $GD > GH$ , menší nad větší; což právě jest nemožno.

Podobně dokážeme nemožnost toho, i když střed kruhu většího je vně malého.

## Kn. III. xxxi.

Ziný důkaz,

že  $\sphericalangle BAC$  je pravý (vyobr. str. 51.).

Ježto  $\sphericalangle AEC = 2BAE$  (je zajisté roven dvěma vnitřním protějším), jest pak též  $\sphericalangle AEB = 2EAC$ ; tedy  $\sphericalangle AEB + AEC = 2BAC$ . Avšak  $\sphericalangle AEB + AEC = 2R$ ; pročež  $\sphericalangle BAC$  jest pravý, což právě bylo dokázati.

## Kniha patá.

## Výměry.

1. Dílem veličiny větší jest veličina menší, když veličinu větší doměřuje.<sup>1)</sup>
2. Násobkem pak veličiny menší jest větší, když ji menší doměřuje.

<sup>1)</sup> Míni se beze zbytku.

3. Poměrem jest nějaký vztah dvou stejnorodých veličin dle jejich kolikosti.
4. Pravíme, že k sobě mají poměr veličiny, které násobeny jsouce mohou býti jedna druhé větší.
5. Pravíme, že jsou veličiny v témž poměru k sobě, první ke druhé, a třetí ke čtvrté, když stejné násobky veličiny první a třetí nad stejné násobky druhé a čtvrté jsou dle jakékoli násobnosti buď jeden nad druhý zároveň větší buď zároveň stejné buď zároveň menší, jsouce vzaty ve vzájemném pořádku.<sup>2)</sup>
6. Veličiny mající týž poměr nazýváme úměrou (úměrnými).
7. Když ze stejných násobků násobek veličiny první jest větší než násobek druhé, násobek třetí však není větší než násobek čtvrté, tehdy pravíme, že první ke druhé jest v poměru větším než třetí ke čtvrté.
8. Úměra o trojím členství jest nejmenší.<sup>3)</sup>
9. Když jsou tři veličiny úměrou, pravíme, že se má první ke třetí jako dvojmoc první ke dvojmoci druhé.<sup>4)</sup>
10. Když pak jsou čtyři veličiny (spojitě) úměrou, první má se ke čtvrté jako trojmoc první k trojmoci druhé, a tak stále po řadě týmž způsobem, jakoukoli máme úměrou.<sup>5)</sup>
11. Pravíme, že souhlasnými veličinami (členy jsou přední s předními a zadní se zadními).
12. Střídavým poměrem je sdružení členu předního s předním a zadního se zadním.<sup>6)</sup>
13. Zpětným poměrem je sdružení zadního na místě předním s předním na místě zadním.<sup>7)</sup>
14. Součetným poměrem je sdružení předního a spolu zadního se zadním samým.<sup>8)</sup>
15. Rozdílovým poměrem jest sdružení rozdílu, oč přední člen je větší zadního, se zadním samým.<sup>9)</sup>

<sup>2)</sup> Stejný poměr tedy jest, když  $ma \leq nb$  a zároveň  $mc \leq nd$ ,  $a:b = c:d$ .

<sup>3)</sup> Z  $a, b, c$  bude  $a:b = b:c$ .

<sup>4)</sup>  $a:b = d:c$ , z toho  $a:c = a^2:b^2$ , neboť  $c = \frac{b^2}{a}$ ,  $\frac{a}{c} = \frac{a^2}{b^2}$ .

<sup>5)</sup>  $a:b = b:c = c:d$ , z toho  $a:d = a^3:b^3$ , neboť  $d = \frac{c^2}{b}$ ,  $c = \frac{b^2}{a}$ ,  $c^2 = \frac{b^4}{a^2}$ , z toho  $\frac{c^2}{b} = \frac{b^3}{a^2}$ , tedy  $\frac{a}{d} = \frac{a^3}{b^3}$ . Týmž způsobem z úměry  $a:b = b:c = c:d = d:e$  bude  $a:e = a^4:b^4$ , neboť  $e = \frac{d^2}{c}$ ,  $c = \frac{b^2}{a}$  a dle předešlého zde (5.) výsledku  $d^2 = \frac{b^5}{a^4}$ , z toho  $\frac{a}{e} = \frac{a^4}{b^4}$ ; atd.

<sup>6)</sup> Z  $a, b, c, d$  budiž  $a:c = b:d$ .

<sup>7)</sup>  $b:a = d:c$ .

<sup>8)</sup>  $(a+b) : (c+d) : d$ .

<sup>9)</sup>  $(a-b) : b = (c-d) : d$ .

16. Zvratným poměrem je sdružení členu prvního s rozdílem, oč přední člen je větší zadního.<sup>10)</sup>
17. Stejnořadným poměrem jest, jest-li více členův a jiné jim počtem rovné a berou-li se po dvou v témž poměru, když se má jako v prvních členech první k poslednímu, tak ve druhých členech první k poslednímu; nebo jinak: sdružení krajních s vypuštěním středních.<sup>11)</sup>
18. Nestejnořadným poměrem jest, když jsou členy a jiné jim počtem rovné a jako v prvních členech má se přední k zadnímu, tak ve druhých členech přední k zadnímu a jako v prvních členech zadní k jinému, tak ve druhých členech jiný ku přednímu.<sup>12)</sup>

## I.

Když několik veličin několika veličin počtem stejných jest každá každé stejným násobkem, jakým násobkem jest jedna jedné, takým bude i součet součtu.

Buď několik veličin  $AB, CD$  (dvě) několika veličin počtem stejných  $E, F$  každá každé stejným násobkem; pravím, že, jakým násobkem jest  $AB$  veličiny  $E$ , takovým bude  $AB + CD$  součtu  $E + F$ .

Neboť ježto  $AB$  je stejným násobkem veličiny  $E$  jako  $CD$  veličiny  $F$ ; tedy kolik v  $AB$  jest veličin stejných s  $E$ , tolik i v  $CD$  stejných v  $F$ . Rozdělme  $AB$  na veličiny stejné s  $E$ , totiž  $AG, GB$ ;  $CD$  pak na veličiny stejné s  $F$ , totiž  $CH, HD$ ; bude zajisté počet veličin  $AG, GB$  počtu  $CH, HD$  roven. A ježto  $AG = E$  a  $CH = F$ , tedy  $AG + CH = E + F$ . Z téže příčiny  $GB = E$  a  $GB + HD = E + F$ . Tedy kolik veličin jest v  $AB$  stejných s  $E$ , tolikéž i v  $AB + CD$  stejných s  $E + F$ . Tedy jakým násobkem jest  $AB$  veličiny  $E$ , takovým bude též  $AB + CD$  veličiny  $E + F$ .

Tedy když několik veličin několika veličin — —.

## II.

Když první veličina je stejným násobkem druhé jako třetí čtvrté a pátá stejným násobkem druhé jako šestá čtvrté, též součet prvé s pátou bude stejným násobkem druhé jako součet třetí se šestou čtvrté.<sup>13)</sup>

Nuže buď první  $AB$  stejným násobkem druhé  $C$  jako třetí  $DE$

<sup>10)</sup>  $a : (a - b) = c : (c - d)$ .

<sup>11)</sup> Z  $a : b : c = \alpha : \beta : \gamma$  bude  $a : c = \alpha : \gamma$  (srv. V. XXII).

<sup>12)</sup> Z  $a, b, c; \alpha, \beta, \gamma$  bude  $a : b = \beta : \gamma$  i  $b : c = \alpha : \beta$  atd. (srv. V. XXIII).

<sup>13)</sup>  $a : b = c : d, e : b = f : d$ ; bude  $(a + e) : b = (c + f) : d$ ; neboť  $bc = ad, bf = de$ , sečtením  $bc + bf = ad + de$ , z toho  $b(c + f) = d(a + e)$ , z toho  $(a + e) : b = (c + f) : d$ .

čtvrté veličiny  $F$  a buď také pátá  $BG$  stejným násobkem druhé veličiny  $C$  jako šestá  $EH$  čtvrté  $F$ ; pravím, že též součet první a páté  $AG$  bude stejným násobkem veličiny druhé  $C$  jako součet třetí a šesté  $DH$  veličiny čtvrté  $F$ .

Neboť ježto  $AB$  je stejným násobkem veličiny  $C$  jako  $DE$  veličiny  $F$ , tedy kolik dílů má  $AB$  stejných s  $C$ , tolik též  $DE$  stejných s  $F$ . Z téže příčiny ovšem kolik má jich  $BG$  stejných s  $C$ , tolik též  $EH$  stejných s  $F$ ; tedy kolik je v celku  $AG$  stejných s  $C$ , tolik též v celku  $DH$  stejných s  $F$ ; jakým tedy násobkem jest  $AG$  veličiny  $C$ , takovým bude též  $DH$  veličiny  $F$ . Tedy též součet první a páté  $AG$  bude stejným násobkem veličiny  $C$  jako třetí a šesté  $DH$  veličiny  $F$ .

Když tedy první veličina je stejným násobkem — —,

## III.

Když první veličina je stejným násobkem druhé jako třetí čtvrté a vezmeme stejný násobek první a třetí, bude též z obdržených po řadě násobků první a stejného násobkem druhé jako druhý čtvrté.<sup>14)</sup>

Nuže buď první  $A$  stejným násobkem druhé  $B$  jako třetí  $C$  čtvrté  $D$  a za stejné násobky veličin  $A, C$  vezměme  $EF, GH$ ; pravím, že  $EF$  je stejným násobkem veličiny  $B$  jako  $GH$  veličiny  $D$ .

Neboť ježto  $EF$  je stejným násobkem veličiny  $A$  jako  $GH$  veličiny  $C$ , tedy kolik dílů má  $EF$  stejných s  $A$ , tolik též  $GH$  stejných s  $C$ . Rozdělme  $EF$  na  $EK, KF$  stejné s  $A$ ,  $GH$  pak na  $GL, LH$  stejné s  $C$ ; bude zajisté počet  $EK, KF$  s počtem  $GL, NH$  stejný. A ježto  $A$  je stejným násobkem veličiny  $B$  jako  $C$  veličiny  $D$ , avšak  $EK = A$  a  $GL = C$ , tedy  $EK$  je stejným násobkem veličiny  $B$  jako  $GL$  veličiny  $D$ . Z téže příčiny ovšem  $KF$  je stejným násobkem veličiny  $B$  jako  $LH$  veličiny  $D$ . Ježto tedy první  $EK$  je stejným násobkem veličiny druhé  $B$  jako třetí  $GL$  čtvrté  $D$ , jest pak i pátá  $KF$  stejným násobkem druhé  $B$  jako šestá  $LH$  čtvrté  $D$ , tedy též součet první a páté  $EF$  je stejným násobkem druhé  $B$  jako součet třetí a šesté  $GH$  čtvrté  $D$  (V. II.)

Když tedy první veličina je stejným násobkem — —.


## IV.

Když se má první veličina ke druhé jako třetí ke čtvrté, též stejné násobky první a třetí ke stejným

<sup>14)</sup>  $a : b = c : d$ , bude též  $na : b = nc : d$ .

násobkům druhé a čtvrté dle jakékoli násobnosti budou, po řadě vzaty jsouce, míti též poměr.<sup>15)</sup>

Nuže buď  $A:B=C:D$  a vezměme veličin  $A, C$  stejné násobky  $E, F$  a veličin  $B, D$  jiné jakékoli stejné násobky  $G, H$ ; pravím, že  $E:G=F:H$ .



Nuže vezměme veličin  $E, F$  stejné násobky  $K, L$  a veličin  $G, H$  jiné jakékoli stejné násobky  $M, N$ .

A ježto  $E$  je stejným násobkem veličiny  $A$  jako  $F$  veličiny  $C$  a za stejné násobky veličin  $E, F$  jsme vzali  $K, L$ , tedy stejnými násobky jsou  $K$  veličiny  $A$  a  $L$  veličiny  $C$ . Z téže příčiny ovšem je stejným násobkem  $M$  veličiny  $B$  jako  $N$  veličiny  $D$ . A ježto  $A:B=C:D$  a  $K, L$  vzaty jsou za stejné násobky veličin  $A, C$  a za jiné jakékoli stejné násobky


veličin  $B, D$  vzaty  $M, N$ , jest-li ovšem  $K > M$ , je též  $L > N$ , pakli stejné ono, stejné toto, pakli menší ono, menší toto. I jsou  $K, L$  veličin  $E, F$  stejnými násobky, jako  $M, N$  jinými nahodilými stejnými násobky veličin  $G, H$ ; tedy  $E:G=F:H$  (srv. V. III.).

Když se má tedy první veličina ke druhé — —

#### V.

Když jest veličina veličiny stejným násobkem jako část odečtená odečtené, též zbytek zbytku bude stejným násobkem jakým celá celá.<sup>16)</sup>

Nuže buď  $AB$  veličiny  $CD$  stejným násobkem jako část odečtená  $AE$  odečtené  $CF$ ; pravím, že též zbytek  $EB$  bude stejným násobkem zbytku  $FD$  jako celek  $AB$  celku  $CD$ .



Nuže jakým násobkem jest  $AE$  veličiny  $CF$ , takovým násobkem buď též  $EB$  veličiny  $CG$ .

A ježto  $AE$  je stejným násobkem veličiny  $CF$  jako  $EB$  veličiny  $GC$ , tedy  $AE$  je stejným násobkem veličiny  $CF$  jako  $AB$  veličiny  $GF$  (V. I.) Jest pak  $AE$  vzato za stejný násobek veličiny  $CF$  jako  $AB$  veličiny  $CD$ . Tedy  $AB$  je stejným násobkem veličiny  $GF$  i  $CD$ ; tedy  $GF=CD$ . Odečtíme společné  $CF$ ; tedy zbývající  $GC=FD$ . A ježto  $AE$  je stejným násobkem veličiny  $CF$  jako  $EB$  veličiny  $GC$  a  $GC=FD$ , tedy  $AE$  bude stejným násobkem veličiny  $CF$  jako  $EB$  veličiny  $FD$ .  $AE$  však vzato za stejný násobek veličiny  $CF$  jako  $AB$  veličiny  $CD$ ; tedy  $EB$  je stejným násobkem veličiny  $FD$  jako  $AB$  veličiny  $CD$ . Tedy také zbytek  $EB$  bude stejným násobkem veličiny  $FD$  jako celek  $AB$  celku  $CD$ .

Když je tedy veličina veličiny stejným násobkem — —

<sup>15)</sup> Z  $a:b=c:d$  bude  $am:bn=cm:dn$ .

<sup>16)</sup>  $a:b=u:v$ ; též bude  $(a-u):(b-v)=a:b$ .

#### VI.

Když jsou dvě veličiny dvou veličin stejnými násobky a nějaké části od nich odečtené jsou týchž veličin (druhých) stejnými násobky, též zbytky týmž (druhým) veličinám buď jsou rovný nebo jsou stejnými jejich násobky.<sup>17)</sup>

Nuže buďte dvě veličiny  $AB, CD$  dvou veličin  $E, F$  stejnými násobky a části odečtené  $AG, CH$  buďte stejnými násobky týchž veličin  $E, F$ ; pravím, že též zbytky  $GB, HD$  veličinám  $E, F$  buď jsou rovný buď jsou stejnými jejich násobky.

Nuže buď dříve  $GB=E$ ; pravím, že též  $HD=F$ .

Nuže buď  $CK=F$ . Ježto  $AG$  je stejným násobkem veličiny  $E$  jako  $CH$  veličiny  $F$  a  $GB$  veličiny  $E$  jako  $KC$  veličiny  $F$ ; tedy  $AB$  je stejným násobkem veličiny  $E$  jako  $KH$  veličiny  $F$ . Vzali jsme však  $AB$  za stejný násobek veličiny  $E$  jako  $CD$  veličiny  $F$ ; tedy  $KH$  je stejným násobkem veličiny  $F$  jako  $CD$  veličiny  $F$ . Ježto tedy  $KH$  i  $CD$  jsou stejnými násobky veličiny  $F$ , tedy  $KH=CD$ . Společným odečteno buď  $CH$ , tedy zbývající  $KC=HD$ . Avšak  $F=KC$ , tedy též  $HD=F$ . Pročež jest-li  $GB=E$ , bude též  $HD=F$ .

Podobně ovšem dokážeme, i když  $GB$  je násobkem veličiny  $E$ , že též  $HD$  je týmž násobkem veličiny  $F$ .

Když jsou tedy dvě veličiny dvou veličin — —

#### VII.

Stejně veličiny k těmž mají stejný poměr i totéž stejný k veličinám stejným.<sup>18)</sup>

Stejnými veličinami buďtež  $A, B$ , jinou pak jakoukoli veličinou  $C$ ; pravím, že  $A$  i  $B$  má k  $C$  též poměr i  $C$  k  $A$  jako k  $B$ .

Nuže vezměme  $D, E$  za stejné násobky veličin  $A, B$  a za jiný jakýkoli násobek veličiny  $C$  vezměme  $F$ .

Ježto tedy  $D$  je stejným násobkem veličiny  $A$  jako  $E$  veličiny  $B$  a  $A=B$ , tedy též  $D=E$ . A jinou veličinou jakoukoli jest  $F$ . Jest-li tedy  $D > F$ , též  $E > F$ , pak-li  $D=F$ , též  $E=F$ , pak-li  $D < F$ , též  $E < F$ . I jsou  $D, E$  stejné násobky veličin  $A, B$ ;  $F$  pak jiným jakýmkoli násobkem veličiny  $C$ ; tedy  $A:C=B:C$ .

Pravím, že též  $C$ <sup>19)</sup> k  $A$  i  $B$  má též poměr.

<sup>17)</sup>  $a:b=c:d, u:v=d:e$  bude buď  $(a-u)=b, (c-v)=d$  nebo  $(a-u):b=(c-v):d$ .

<sup>18)</sup> Budiž  $a=a_1$ , bude  $a:x=a_1:x$  a též  $x:a=x:a_1$ .

<sup>19)</sup> V orig. jest  $\bar{E}$ ; má býti patrně  $\Gamma$ , neboť tu se počíná druhý důkaz.



Neboť vykonajícе touž úpravu podobně dokážeme, že  $D = E$ .  
A jinou veličinou jest  $F$ ; jest-li tedy  $F \geq D$ , též  $F \geq E$ . I jest  $F$  násobkem veličiny  $C$ , a  $D, E$  jinými jakýmikoli stejnými násobky veličin  $A, B$ ; tedy  $C:A = C:B$ .


Stejně tedy veličiny k těmž mají — —.

#### Důsledek.

Z toho zajisté patrnо, že veličiny, když mají nějaký poměr k sobě, též opačně budou úměrny; což právě bylo dokázati.

#### VIII.

Z nestejných veličin větší k těmž má poměr větší než veličina menší; a totéž k menší má větší poměr nežli k větší.<sup>20)</sup>




Nestejnými veličinami buďtež  $AB, C$  a buď  $AB > C$ , jinou pak jakoukoli buď  $D$ ; pravím, že  $AB:D > C:D$  a  $D:C > D:AB$ .

Neboť ježto  $AB > C$ , budiž  $BE = C$ . Menší zajisté veličina než  $AE, EB$  násobena jsouc bude někdy větší než  $D$ . Buď dříve  $AE < EB$ , i buď  $AE$  znásobena, a násobkem jejím buď  $FG$ , větším než  $D$ , a učiněmež, aby  $FG:AE = GH:EB = K:C$ , a buď  $L = 2D, M = 3D$  a dále vždy o  $D$  více, až veličina bude násobkem veličiny  $D$ , a to prvním větším než  $K$ .

I budiž to  $N$  a buď čtyřnásobkem veličiny  $D$ , a to prvním větším než  $K$ .

Ježto tedy  $K$  jest menší než první  $N$ , tedy není  $K < M$ . A ježto



$FG:AE = GH:EB$ , tedy  $FG:AE = FH:AB$ , avšak  $FG:AE = K:C$ , tedy  $FH:AB = K:L$ . Tedy  $FH, K$  jsou stejné násobky veličin  $AB, C$ . Dále, ježto  $GH:EB = K:C$  a  $EB = C$ , tedy  $GH = K$ . Avšak není  $K < M$ , tedy není ani  $GH < M$ . Avšak  $FG > D$ , tedy celá  $FH > (D + M)$ . Ale  $D + M = N$ , ježto právě  $M = 3D$  a  $M + D = 4D$ , jest pak i  $N = 4D$ ; tedy  $M + D = N$ . Avšak  $FH > (M + D)$ , tedy  $FH > N$ .  $K$  však není větší než  $N$ . Jsou pak  $FH, K$  stejnými násobky veličin  $AB, C$  a  $N$  jiným jakýmikoli násobkem veličiny  $D$ ; tedy  $AB:D > C:D$ .

Pravím ovšem, že též  $D:C > D:AB$ .

<sup>20)</sup> Buď  $v > m$ , mimo to  $s$ ; bude  $v:s > m:s$ , ale  $s:m > s:v$ .


Neboť stejnou úpravu vykonajícе<sup>21)</sup> podobně dokážeme, že  $N > K$ , nikoli však  $N > FH$ . I jest  $N$  násobkem veličiny  $D$  a  $FH, K$  jinými jakýmikoli stejnými násobky veličin  $AB, C$ ; tedy  $D:C > D:AB$ . Ale již buď  $AE > EB$ . Menší zajisté  $EB$  znásobena jsouc bude někdy větší než  $D$ . Buď znásobena, a buď  $GH$  násobkem veličiny  $EB$ , větším však než  $D$ ; a buď  $GH:EB = FG:AE = K:C$ . Podobně ovšem dokážeme, že  $FH, K$  jsou stejnými násobky veličin  $AB, C$ ; a vezměme podobně  $N$  za násobek veličiny  $D$ , první větší než  $FG$ ; pročež opět není  $FG < M$ . Avšak  $GH > D$ . Tedy celá  $FH > (D + M)$ , t. j.  $FH > N$ .  $K$  však není větší než  $N$ , ježto právě též  $FG$ , větší jsouc než  $GH$ , t. j.  $K$ , není větší než  $N$ . A rovněž jako svrchu postupujícе dokončíme důkaz.

Tedy z nestejných veličin větší k těmž — —.

#### IX.

Veličiny mající k těmž též poměr jsou si rovny a ke kterým totéž má též poměr, ty jsou si rovny.

Nuže měj každá z veličin  $A, B$  k  $C$  též poměr; pravím, že  $A = B$ .



Neboť nebyti tak, neměla by každá z veličin  $A, B$  k  $C$  poměru téhož; má však; tedy  $A = B$ .

Měj již opět  $C$  k  $A$  i k  $B$  též poměr; pravím, že  $A = B$ .


Neboť nebyti tak, nebyla by  $C$  k  $A$  i  $B$  v poměru témž; jest však, tedy  $A = B$ .

Tedy veličiny mající k těmž též poměr — —.

#### X.

Z veličin k těmž poměr majících ta, jež má větší poměr, jest větší; ke které však totéž má větší poměr; ta jest menší.<sup>22)</sup>

Nuže buď  $A:C > B:C$ ; pravím, že  $A > B$ .



Neboť není-li tak, jest buď  $A = B$  buď  $A < B$ . Není ovšem  $A = B$ , neboť  $A$  i  $B$  by měla k  $C$  též poměr (V. VII.); nemá však; tedy není  $A = B$ . Ani zajisté není  $A < B$ , neboť  $A$  by měla k  $C$  menší poměr než  $B$  k  $C$  (V. VIII.); nemá však; tedy není  $A < B$ . Dokázano však, že nejsou ani stejné; tedy  $A > B$ .

Buď již opět  $C:B > C:A$ ; pravím, že  $B < A$ .

Neboť není-li tak, buď  $B = A$  buď  $B > A$ . Není ovšem  $B = A$ , neboť  $C$  by měla k  $A$  i  $B$  též poměr; nemá však; tedy není  $B = A$ . Ani zajisté není  $B > A$ , neboť by bylo  $C:B < C:A$  (V. VIII.); avšak

<sup>21)</sup> T. j. aby opět bylo  $AE > EB$ .

<sup>22)</sup>  $a:n > b:n$ , tedy  $a > b$ ;  $n:b > n:a$ , tedy  $b < a$ .


není tak. Tedy není  $B > A$ . Dokázáno však, že ani stejné nejsou; tedy  $B < A$ .

Tedy z veličin k těmž poměr majících — —.

## XI.

Poměry těmž poměru rovné jsou si též navzájem rovné.

Nuže buď  $A:B=C:D$  a  $C:D=E:F$ ; pravím, že  $A:B=E:F$



Nuže vezměme veličin  $A, C, E$  stejné násobky  $G, H, K$ , veličin pak  $B, D, F$  jiné jakékoli stejné násobky  $L, M, N$ .

A ježto  $A:B=C:D$  a za stejné násobky veličin  $A, C$  vzali jsme  $G, H$ , veličin pak  $B, D$  jiné jakékoli stejné násobky  $L, M$ , jest-li tedy  $G > L$ , je též  $H > M$ , a jest-li  $G = L$ , je  $H = M$ , a jest-li  $G < L$ , je  $H < M$ . Ježto dále  $C:D=E:F$


a za stejné násobky veličin  $C, E$  vzali jsme  $H, K$ , veličin pak  $D, F$  jiné jakékoli stejné násobky  $M, N$ , jest-li tedy  $H > M$ , je též  $K > N$ , a jest-li  $H = M$ , je  $K = N$ , a jest-li  $H < M$ , je  $K < N$ . Avšak byla-li veličina  $H > M$ , byla též  $G > L$ , a byla-li  $H = M$ , tu též  $G = L$ , pakli  $H < M$ , též  $G < L$ ; pročež také jest-li  $G > L$ , je též  $K > N$ , pakli  $G = L$ , též  $K = N$ , pakli  $G < L$ , též  $K < N$ . A  $G, K$  jsou stejnými násobky veličin  $A, E$  a  $L, N$  jinými jakýmikoli stejnými násobky veličin  $B, F$ ; tedy  $A:B=E:F$ .

Tedy poměry těmž poměru rovné — —.

## XII.

Když jest několik veličin úměrou, jako se má jeden člen přední ke svému zadnímu, tak se bude míti součet předních k součtu zadních.

Buď úměrou několik veličin  $A, B, C, D, E, F$ , aby bylo  $A:B=C:D=E:F$ ; pravím, že  $A:B=(A+C+E):(B+D+F)$ .



Nuže za stejné násobky veličin  $A, C, E$  vezměme  $G, H, K$  a veličin  $B, D, F$  jiné jakékoli stejné násobky  $L, M, N$ .

A ježto  $A:B=C:D=E:F$  a za stejné násobky veličin  $A, C, E$  vzali jsme  $G, H, K$  a veličin  $B, D, F$  jiné jakékoli stejné násobky  $L, M, N$ , tedy jest-li  $G > L$ , je též  $H > M$  a  $K > N$ , pakli  $G = L$ , je též  $H = M$  a  $K = N$ , pakli  $G < L$ , též  $H < M$ ,  $K < N$ . Pročež také jest-li  $G > L$ , je též  $(G+H+K) > (L+M+N)$ , pakli  $G = L$ , jsou součty stejné,

pakli  $G < L$ , je první součet menší. I jsou  $G$  jakož i  $G+H+K$

stejnými násobky veličin  $A$  i  $A+C+E$ , ježto právě, když je několik veličin několika veličin počtem stejných každá každé stejným násobkem, jakým násobkem jest jedna veličiny jedné, takovým bude též součet součtu (V. I.). Z téže příčiny ovšem též  $L$  a  $L+M+N$  jsou stejnými násobky veličin  $B$  a  $B+D+F$ ; tedy  $A:B=(A+C+E):(B+D+F)$ .

Když jest tedy několik veličin úměrou, — —.

## XIII.

Když bude míti veličina první ke druhé týž poměr jako třetí ke čtvrté, třetí pak ke čtvrté bude míti poměr větší než pátá k šesté, též první ke druhé bude míti poměr větší než pátá k šesté.

Budíž  $A:B=C:D$ , avšak  $C:D > E:F$ ; pravím, že též  $A:B > E:F$ .

Neboť ježto  $C, E$  mají nějaké stejné násobky a  $D, F$  jiné jakékoli stejné násobky a násobek veličiny  $C$  jest větší než veličiny  $D$ , násobek však veličiny  $E$  není větší než veličiny  $F$ , vezměme stejné násobky veličin  $C, E$  a buďte jimi  $G, H$ , veličin pak  $D, F$  jinými jakýmikoli stejnými násobky  $K, L$ , tak aby byla  $G > K$  a nikoli  $H > L$ , a jakým násobkem jest  $G$  veličiny  $C$ , takovým buď též  $M$  veličiny  $A$ , a jakým  $K$  veličiny  $D$ , takovým buď též  $N$  veličiny  $B$ .

A ježto  $A:B=C:D$  a za stejné násobky veličin  $A, C$  vzaty  $M, G$  a veličin  $B, D$  za jiné jakékoli stejné násobky  $N, K$  tedy jest-li  $M > N$  je též  $G > K$ , pakli  $M = N$ , též  $G = K$ , pakli  $M < N$ , též  $G < K$ . Avšak  $G > K$ , tedy též  $M > N$ . Není však  $H > L$ ; a  $M, H$  jsou stejné násobky veličin  $A, E$  a  $N, L$  jiné jakékoli stejné násobky veličin  $B, F$ . Tedy  $A:B > E:F$ .

Když tedy bude míti veličina první ke druhé — —.

## XIV.

Když bude míti veličina první ke druhé týž poměr jako třetí ke čtvrté, první však bude větší než třetí, též druhá bude větší čtvrté; a když stejná, bude stejná, a když menší, bude menší.

Nuže buď  $A:B=C:D$  a buď  $A > C$ ; pravím, že též  $B > D$ .

Neboť ježto  $A > C$  a jinou jakoukoli veličinou jest  $B$ , tedy  $A:B > C:B$  (V. VIII.). Avšak  $A:B=C:D$ , tedy též  $C:D > C:B$ . K čemu však totéž má větší poměr, to jest menší; tedy  $D < B$ ; pročež  $B > D$ .

Podobně ovšem dokážeme, když  $A = C$ , že též  $B = D$ , a když  $A < C$ , že též  $B < D$ .



Když tedy bude míti veličina první ke druhé, — —.

## XV.

Části mají po řadě vzaty jsouce též poměr jako stejné násobky.

Nuže buď  $AB$  stejným násobkem veličiny  $C$  jako  $DE$  veličiny  $F$ ; pravím, že  $C:F=AB:DE$ .

Neboť ježto  $AB$  je stejným násobkem veličiny  $C$  a  $DE$  veličiny  $F$ , tedy kolik veličin jest v  $AB$  stejných s  $C$ , tolikéž v  $DE$  stejných s  $F$ . Rozdělme  $AB$  v části  $AG, GH, HB$  stejné s  $C$  a  $DE$  v části  $DK, KL, LE$  stejné s  $F$ . Bude zajisté počet veličin  $AG, GH, HB$  stejný s počtem veličin  $DK, KL, LE$ . A ježto  $AG=GH=HB$ , je též  $DK=KL=LE$ ; tedy  $AG:DK=GH:KL=HB:LE$ . Tedy jako se má jedna veličina přední ke své zadní, tak též součet předních k součtu zadních (V.XII.) tedy  $AG:DK=AB:DE$ . Avšak  $AG=C$  a  $DK=F$ . Tedy  $C:F=AB:DE$ . Tedy části mají po řadě vzaty jsouce — —.



## XVI.

Když jsou čtyři veličiny úměrou, také střídavě budou úměrou (srv. vým. 12)<sup>23)</sup>

Buďtež úměrou čtyři veličiny  $A, B, C, D$ , totiž  $A:B=C:D$ ; pravím, že též střídavě bude  $A:C=B:D$ .

Nuže za stejné násobky veličin  $A, B$ , vezměme  $E, F$ , veličin pak  $C, D$  za jiné jakékoli stejné násobky  $G, H$ ,

A ježto  $E$  je stejným násobkem veličiny  $A$  jako  $F$  veličiny  $B$  a části mají též poměr jako stejné násobky (V. xv.), tedy  $A:B=E:F$ .

Avšak  $A:B=C:D$ , tedy též  $C:D=E:F$ . Dále, ježto  $G, H$  jsou stejné násobky veličin  $C, D$ , tedy  $C:D=G:H$ . Také však  $C:D=E:F$ , tedy též  $E:F=G:H$ . Když pak čtyři veličiny jsou úměrou, první však je větší než třetí, též druhá bude větší nežli čtvrtá; pakli stejná, stejná; pakli menší, menší. Jest-li tedy  $E>G$ , též  $F>H$ ; pakli stejná, stejná; pakli menší, menší. I jsou  $E, F$  stejnými násobky veličin  $A, B$  a  $G, H$  jinými jakýmikoli stejnými násobky veličin  $C, D$ ; tedy  $A:C=B:D$ .

Když jsou tedy čtyři veličiny úměrou — —.

## XVII.

Když jsou veličiny součtetně úměrou, budou též rozdílově úměrou.<sup>24)</sup>

<sup>23)</sup> Když  $a:b=c:d$  bude též  $a:c=b:d$ .

<sup>24)</sup> K tomu viz vým. 14. a 15. Míni se takto: buď  $S=a+b, T=c+d$ ; jest-li  $(a+b):b=(c+d):d$ , t. j.  $S:b=T:d$ ; bude též  $a:b=c:d$ , t. j.  $(S-b):b=(T-d):d$ .

Buďte součtetně úměrnými veličinami  $AB, BE, CD, DF$ , totiž  $AB:BE=CD:DF$ ; pravím, že též rozdílově bude  $AE:EB=CF:DF$ .

Nuže za stejné násobky veličin  $AE, EB, CF, FD$  vezměme  $GH, HK, LM, MN$ , veličin pak  $EB, FD$  za jiné jakékoli stejné násobky  $KO, NP$ .

A ježto  $GH$  je stejným násobkem veličiny  $AE$  jako  $HK$  veličiny  $EB$ , tedy  $GH$  je stejným násobkem veličiny  $AE$  jako  $GK$  veličiny  $AB$ , a  $GH$  je stejným násobkem veličiny  $AE$  jako  $LM$  veličiny  $CF$ , tedy  $GK$  je stejným násobkem veličiny  $AB$  jako  $LM$  veličiny  $CF$ . Dále, ježto  $LM$  je stejným násobkem veličiny  $CF$  jako  $MN$  veličiny  $FD$ , tedy  $LM$  je stejným násobkem veličiny  $CF$  jako  $LN$  veličiny  $CD$ .  $LM$  však bylo stejným násobkem veličiny  $CF$  jako  $GK$  veličiny  $AB$ ; tedy  $GK$  je stejným násobkem veličiny  $AB$  jako  $LN$  veličiny  $CD$ . Tedy  $GK, LN$  jsou stejné násobky veličin  $AB, CD$ .

Dále, ježto  $HK$  je stejným násobkem veličiny  $EB$  jako  $MN$  veličiny  $FD$  a též  $KO$  stejným veličiny  $EB$  jako  $NP$  veličiny  $FD$ , též  $HO$  je stejným násobkem veličiny  $EB$  jako  $MP$  veličiny  $FD$ . A ježto  $AB:BE=CD:DF$  a za stejné násobky veličin  $AB, CD$  vzali jsme  $GK, LN$  a  $HO, MP$  za stejné násobky veličin  $EB, FD$ , tedy jest-li  $GK>HO$ , též  $LN>MP$ ; pakli stejná, stejná; pakli menší, menší. Nuže budiž  $GK>HO$ , a odečteme-li společnou  $HK$ , tedy též  $GH>KO$ . Ale bylo-li  $GK>HO$ , byla též  $LN>MP$ ; a odečteme-li společnou  $MN$ , tedy též  $LM>NP$ . Podobně ovšem dokážeme, když  $GH=KO$ , že bude též  $LM=NP$ , pakli menší, bude menší. A  $GH, LM$  jsou stejné násobky veličin  $AE, CF$  a  $KO, NP$  veličin  $EB, FD$  jiné jakékoli stejné násobky. Tedy  $AE:EB=CF:FD$ .

Když tedy jsou veličiny součtetně úměrou — —.





## XVIII.

Když jsou veličiny rozdílově úměrou, budou též součtetně úměrou.

Rozdílově úměrou buďte veličiny  $AE, EB, CF, FD$ , totiž  $AE:EB=CF:FD$ ; pravím, že budou též součtetně úměrou, totiž  $AB:BE=CD:FD$ .

Neboť není-li  $AB:BE=CD:FD$ , bude se míti  $AB$  k  $BE$  jako  $CD$  buď k něčemu menšímu než  $DF$  nebo většímu.

Měj se prve k menšímu  $DG$ . A ježto  $AB:BE=CD:DG$ , veličiny součtetně jsou úměrou, pročež i rozdílově budou úměrou. Tedy  $AE:EB=CG:GD$ . Je však podmínkou, že též  $AE:EB=CF:FD$ ; tedy též  $CG:GD=CF:FD$ . Avšak první člen  $CG$  je větší než třetí  $CF$ ; tedy též druhý  $GD$  větší než čtvrtý  $FD$ . Ale též menší,



<sup>25)</sup> Tohoto vyobr. ve vyd. Heibergově není; doplnil jsem tedy sám.

což právě jest nemožno. Tedy  $AB$  k  $BE$  nemá se jako  $CD$  k menšímu než  $FD$ . Podobně ovšem dokážeme, že ani k většímu; tedy právě k  $FD$ .

Když jsou tedy veličiny rozdílově úměrou, — —.

## XIX.

Když se má část k části jako celek k celku, též zbytek bude se míti ke zbytku jako celek k celku<sup>26)</sup>

Nuže buď  $AE:CF=AB:CD$ ; pravím, že bude též  $EB:FD=AB:CD$ .

Neboť ježto  $AE:CF=AB:CD$ , také střídavě  $BA:AE=DC:CF$ . A ježto součetně veličiny jsou uměrné, též rozdílově budou uměrné, totiž  $DF:CF=BE:EA$ , a střídavě  $EA:FC=BE:DF$ . Avšak podmínkou jest, že  $AB:CD=AE:CF$ , tedy též zbytek  $EB$  bude se míti ke zbytku  $FD$  jako celek  $AB$  k celku  $CD$ .

Když se tedy má část k části jako celek k celku, — —.

## Důsledek.

Z toho zajisté patrně, když jsou veličiny součetně úměrou, že též obráceně budou úměrou. [Což právě bylo dokázati].

## XX.

Když jsou tři veličiny a jiné jim počtem rovné a jsou po dvou brány jsouce také v témž poměru, první však po řadě větší jest než třetí, také čtvrtá bude větší než šestá, a když stejná bude stejná a když menší bude menší.<sup>27)</sup>

Třemi veličinami buďtež  $A, B, C$  a jinými jim počtem rovnými  $D, E, F$  a buďte po dvou brány jsouce v témž poměru, totiž  $A:B=D:E$  a  $B:C=E:F$  a buď po řadě  $A>C$ ; pravím, že bude též  $D>F$ , a když  $A=C$ , též  $D=F$ , a když  $A<C$ , též  $D<F$ .

Neboť ježto  $A>C$  a jinou nějakou veličinou jest  $B$ , větší k témuž má větší poměr než veličina menší, tedy  $A:B>C:B$ . Avšak  $A:B=D:E$  a obráceně  $C:B=F:E$ , tedy též  $D:E>F:E$ . Z veličin však k témuž poměr majících která má větší poměr, jest větší; tedy  $D>F$ . Podobně ovšem dokážeme, když  $A=C$ , že bude též  $D=F$ , a když  $A<C$ , též  $D<F$ .

Když tedy jsou tři veličiny a jiné jim počtem rovné — —.

<sup>26)</sup> Buď  $M=a+b$ ,  $N=c+d$ ; když  $a:c=M:N$ , bude též  $b:d=M:N$ .

<sup>27)</sup> Buďtež  $a, b, c; d, e, f$ ; buď  $a:b=d:e$ ,  $b:c=e:f$ ; jest-li  $a \leq c$ , bude též  $d \leq f$ .

## XXI.

Když jsou tři veličiny a jiné jim počtem rovné po dvou brány jsouce také v témž poměru a jest úměra jejich nestejnořadná, po řadě však jest první větší než třetí, také čtvrtá bude větší než šestá a když stejná, bude stejná, a když menší, bude menší.<sup>28)</sup>

Třemi veličinami buďtež  $A, B, C$ , a jinými jim počtem rovnými  $D, E, F$  a po dvou brány jsouce také v témž poměru, buď však úměra jejich nestejnořadná, totiž  $A:B=E:F$  a  $B:C=D:E$  a po řadě buď  $A>C$ ; pravím, že bude též  $D>F$ , a když stejná, bude stejná, a když menší, bude menší.

Neboť ježto  $A>C$ , jinou pak nějakou veličinou  $B$ , tedy  $A:B>C:B$ . Avšak  $A:B=E:F$  a obráceně  $C:B=E:D$ . Tedy též  $E:F>E:D$ . K čemu však totéž má větší poměr, to jest menší; tedy  $F<D$ , pročť  $D>F$ . Podobně ovšem dokážeme, když  $A=C$ , že též  $D=F$ , a když  $A<C$ , že též  $D<F$ .

Když jsou tedy tři veličiny a jiné jim počtem rovné — —.

## XXII.

Když jest několik veličin a jiné jim počtem rovné po dvou brány jsouce také v témž poměru, též stejnořadně budou v témž poměru.<sup>29)</sup>

Buď několik veličin  $A, B, C$  a jiné jim počtem rovné  $D, E, F$  po dvou brány jsouce v témž poměru, totiž  $A:B=D:E$  a  $B:C=E:F$ ; pravím, že též stejnořadně budou v témž poměru.

Nuže za stejné násobky veličin  $A, D$  vezměme  $G, H$ , veličin  $B, E$  za jiné jakékoli stejné násobky  $K, L$  a ještě  $M, N$  za jiné jakékoli násobky veličin  $C, F$

A ježto  $A:B=D:E$  a  $G, H$  vzaty za stejné násobky veličin  $A, D$  a  $K, L$  za jiné jakékoli stejné násobky veličin  $B, E$ , tedy  $G:K=H:L$ . Z téže příčiny ovšem též  $K:M=L:N$ . Ježto tedy jsou tři veličiny  $G, K, M$  a jiné jim počtem rovné  $H, L, N$  po dvou brány jsouce také v témž poměru, tedy po řadě, jest-li  $G>M$ , též  $H>N$ , pakli stejná, bude stejná, pakli menší, bude menší. I jsou  $G, H$ , veličin  $A; D$  stejnými násobky a  $M, N$  jinými jakýmikoli stejnými násobky veličin  $C, F$ , tedy  $A:C=D:F$ .

Když jest tedy několik veličin a jiné jim počtem rovné — —.


<sup>28)</sup> Buďtež  $a, b, c; d, e, f$ ; buď  $a:b=e:f$ ,  $b:c=d:e$ ; bude-li  $a \leq c$ , bude též  $d \leq f$ .

<sup>29)</sup> Buďtež  $a, b, c; d, e, f$ ; jest-li  $a:b=d:e$ ,  $b:c=e:f$ , bude též  $a:c=d:f$ .

## XXIII.

Když jsou tři veličiny a jiné jim počtem rovné po dvou brány jsou v témž poměru a mají úměru nestejnořadnou, také stejnořadně v témž poměru budou.<sup>30)</sup>

Buďte tři veličiny  $A, B, C$  a jiné jim počtem rovné po dvou brány jsou v témž poměru  $D, E, F$  a mějtež úměru nestejnořadnou, totiž  $A : B = E : F$  a  $B : C = D : E$ ; pravím, že  $A : C = D : F$ .



Vezměme  $G, H, K$  za stejné násobky veličin  $A, B, D$  a  $L, M, N$  za jiné jakékoli stejné násobky veličin  $C, E, F$ .

A ježto  $G, H$  jsou stejné násobky veličin  $A, B$  a části mají se stejnými násobky též poměr (V. xv.), tedy  $A : B = G : H$ . Z téže příčiny

ovšem též  $E : F = M : N$ ; i jest  $A : B = E : F$ ; tedy též  $G : H = M : N$ . A ježto  $B : C = D : E$ , též střídavě  $B : D = C : E$ . A ježto  $H, K$  jsou stejné násobky veličin  $B, D$  a části se stejnými násobky mají stejný poměr, tedy  $B : D = H : K$ . Avšak  $B : D = C : E$ , tedy též  $H : K = C : E$ . Dále, ježto  $L, M$  jsou stejné násobky veličin  $C, E$ , tedy  $C : E = L : M$ . Avšak  $C : E = H : K$ , tedy též  $H : K = L : M$  a střídavě  $H : L = K : M$ . Bylo pak dokázáno, že  $G : H = M : N$ . Ježto tedy jsou tři veličiny  $G, H, L$  a jiné jim počtem rovné  $K, M, N$  po dvou brány jsou v témž poměru a mají úměru nestejnořadnou, stejnořadně tedy, jest-li  $G > L$ , je též  $K > N$ , pakli stejná, stejná, pakli menší, menší. I jsou  $G, K$  stejnými násobky veličin  $A, D$  a  $L, N$  veličin  $C, F$ . Tedy  $A : C = D : F$ .

Když tedy jsou tři veličiny a jiné jim počtem rovné — —

## XXIV.

Když první veličina má ke druhé též poměr jako třetí ke čtvrté a též pátá ke druhé má též poměr jako šestá ke čtvrté, také součet první s pátou bude mít ke druhé též poměr jako součet třetí se šestou ke čtvrté.<sup>31)</sup>

Nuže buď  $AB : C = DE : F$  a též  $BG : C = EH : F$ ; pravím, že též  $AG : C = DH : F$ .

<sup>30)</sup> Buďtež  $a, b, c; d, e, f$ ; jest-li  $a : b = e : f, b : c = d : e$ ; bude též  $a : c = d : f$ .


<sup>31)</sup> Buďtež  $a, b, c; d, e, f$ ; jest-li  $a : b = c : d, e : b = f : d$ , bude též  $(a + e) : b = (c + f) : d$ ; neboť  $ad = bc, ed = bf$ , sečtením  $d(a + e) = b(c + f)$ .

Neboť ježto  $BG : C = EH : F$ , tedy obráceně  $C : BG = F : EH$ .

Ježto tedy  $AB : C = DE : F$  a  $C : BG = F : EH$ , tedy po řadě  $AB : BG = DE : EH$ .

A ježto veličiny jsou úměrné rozdílově, též součetně budou úměrné (V. xviii.); tedy  $AG : GB = DH : HE$ . I jest také  $BG : C = EH : F$ ; tedy po řadě  $AG : C = DH : F$  (V. xxii.).

Když tedy první veličina má ke druhé též poměr — —



## XXV.

Když jsou čtyři veličiny úměrou, největší s nejmenší jest větší než dvě ostatní.

Čtyřmi veličinami úměrnými buďtež  $AB, CD, E, F$ , totiž buď  $AB : CD = E : F$ , a největší z nich buď  $AB$ , nejmenší pak  $F$ ; pravím, že  $(AB + F) > (CD + E)$ .

Nuže dejme tomu, že  $E = AG$  a  $F = CH^*$ .

Ježto  $AB : CD = E : F$  a  $E = AG$  a  $F = CH$ , tedy  $AB : CD = AG : CH$ . A ježto celek  $AB$  má se k celku  $CD$  jako část  $AG$  k části  $CH$ , tedy zbytek  $GB$  bude se míti ke zbytku  $HD$  jako celek  $AB$  k celku  $CD$  (V. xix.). Avšak  $AB > CD$ , tedy  $GB > HD$  (V. xiv.). A ježto  $AG = E$  a  $CH = F$ , tedy  $AG + F = E + CH$ . A když  $GB, HD$  jsou nestejně a  $GB > HD$  a ku  $GB$  přičteme  $AG + F$ , k  $HD$  pak přičteme  $CH + E$ , vychází z toho  $(AB + F) > (CD + E)$ .

Když jsou tedy čtyři veličiny úměrou — —

## Kniha šestá.

## Výměry.

1. Útvary přímkové jsou si podobny, které mají úhly jednotlivě stejné a strany při stejných úhlech úměrné.
2. [Zvratné (reciproké) jsou útvary, když v jednom i druhém z nich přední i zadní poměry jsou]†).
3. Pravíme, že přímka jest rozdělena poměrem krajním a středním, když větší úsečka má se k menší jako celá k větší††).
4. Výškou každého útvaru jest kolmice vedená od temene k základně.
5. [Pravíme, že poměr z poměrů se skládá, když hodnoty poměrů samy sobě násobky jsouce činí nějaký poměr]††).

\*) Že  $AB$  jest největší, tedy též  $AB > E$ , to podmínkou; že  $CD > F$ , jde z úměry (srv. V. xiv.).

†) Vým. 2. nepochází od Eukl., také nejasný (srv. úkol xiv.) Výměr 5. podvržený.


††) Rozdělení >zlatým řezem<, kdež úsečka větší je střední úměrnou.

I.

Trojúhelníky a rovnoběžníky mající stejnou výšku mají se k sobě jako základny.

Budtež trojúhelníky  $ABC$ ,  $ACD$  a rovnoběžníky  $EC$ ,  $CF$  o téže výšce  $AC$ ; pravím, že základna  $BC$  má se k  $CD$  jako  $\triangle ABC$  k  $\triangle ACD$  a rovnoběžník  $EC$  k rovnoběžníku  $CF$ .

Nuže prodlužme  $BD$  na obě strany do bodů  $H$ ,  $L$  a mějme  $BG$ ,  $GH$  za rovné základně  $BC$  a několik základně  $CD$  za rovné, t.  $DK$ ,  $KL$ , a vedme spojnice  $AG$ ,  $AH$ ,  $AK$ ,  $AL$ .



A ježto  $CB = BG = GH$ , také  $\triangle AHG = AGB = ABC$  (I. xxxviii.). Tedy jakým násobkem základny  $BC$  je základna  $HC$ , takovým násobkem trojúhelníku  $ABC$  je též  $\triangle AHC$ . Z téže příčiny ovšem, jakým násobkem základny  $CD$  jest  $AC$ , takovým násobkem trojúhelníku  $ACD$  je též  $\triangle ALC$ ; a jest-li  $HC = CL$ , též  $\triangle AHC = ACL$ , a jest-li  $HC > CL$ , též  $\triangle AHC > ACL$ , a jest-li  $HC < CL$ , též  $\triangle AHC < ACL$ . Když tedy jsou čtyři veličiny, dvě základny  $BC$ ,  $CD$  a dva trojúhelníky  $ABC$ ,  $ACD$ , za stejné násobky základny  $BC$  a trojúhelníku  $ABC$  vzaty jsou základna  $HC$  a  $\triangle AHC$ , základny pak  $CD$  a trojúhelníku  $ADC$  za jiné jakékoli násobky základny  $LC$  a  $\triangle ALC$ ; a dokázáno, že, jest-li  $HC > CL$ , též  $\triangle AHC > ALC$ , a jest-li stejná, stejný, a jest-li menší, menší; tedy  $BC:CD = ABC:ACD$ .

A ježto  $EC = 2 ABC$  a  $FC = 2 ACD$  (I. xxxiv.) a části mají se k sobě jako stejné násobky, tedy  $\triangle ABC:ACD = EC:FC$ . Ježto ovšem bylo dokázáno, že  $BC:CD = ABC:ACD$  a  $ABC:ACD = EC:FC$ , tedy též  $BC:CD = EC:FC$ .

Tedy trojúhelníky a rovnoběžníky mající stejnou výšku — —.

II.

Když se v trojúhelníku zřídí k jedné straně rovnoběžka, protne strany (druhé) trojúhelníku úměrně; a když se strany trojúhelníku protnou úměrně, spojnice průsečíků bude rovnoběžkou (třetí) strany trojúhelníku.<sup>1)</sup>

Nuže vedme v  $\triangle ABC$  k jedné straně  $BC$  rovnoběžku  $DE$ ; pravím, že  $BD:DA = CE:EA$ .

Nuže vedme spojnice  $BE$ ,  $CD$ .

Tedy  $\triangle BDE = CDE$ , neboť jsou na téže základně  $DE$  a mezi týmiž rovnoběžkami  $DE$ ,  $BC$ . Jiná pak jakási veličina jest  $\triangle ADE$ . Stejně však veličiny mají k témuž též poměr; tedy  $\triangle BDE:ADE = CDE:ADE$ . Avšak  $BDE:ADE = BD:DA$ ; neboť majíce touž výškou


<sup>1)</sup> Druhá část je pravdivá, jen když úměrné úsečky jsou stejnohlé.

kolmici vedenou z  $E$  k  $AB$  mají se k sobě jako základny. Z téže příčiny ovšem  $CDE:ADE = CE:EA$ ; tedy též  $BD:DA = CE:EA$ .

Ale budte již strany  $AB$ ,  $AC$  trojúhelníku  $ABC$  protaty úměrně,  $BD:DA = CE:EA$ , a vedena spojnice  $DE$ ; pravím, že jest  $DE \parallel BC$ .

Neboť vykonáme-li touž úpravu, ježto  $BD:DA = CE:EA$ , avšak  $BD:DA = \triangle BDE:ADE$  a  $CE:EA = \triangle CDE:ADE$ , tedy též  $BDE:ADE = CDE:ADE$ . Tedy  $\triangle BDE$  i  $CDE$  mají k  $ADE$  též poměr. Tedy  $\triangle BDE = CDE$ ; a jsou na téže základně  $DE$ . Stejně však trojúhelníky a na téže základně jsou též mezi týmiž rovnoběžkami. Tedy  $DE \parallel BC$ .

Když se tedy v trojúhelníku zřídí k jedné straně — —.



III.

Když se úhel trojúhelníku (na temeni) rozpůlí a přímka úhel rozpolující seče též základnu, úsečky základny budou míti též poměr jako zbývající strany trojúhelníku; a mají-li úsečky základny též poměr jako zbývající strany trojúhelníku, přímka vedená od vrcholu k průsečíku bude úhel trojúhelníku rozpolovati.


Trojúhelníkem buď  $ABC$  a  $\sphericalangle BAC$  buď přímku  $AD$  rozpůlen; pravím, že  $BD:CD = BA:AC$ .

Nuže vedme z bodu  $C$  k  $DA$  rovnoběžku  $CE$  a prodlužmen  $BA$  do  $E$ . A ježto rovnoběžky  $AD$ ,  $EC$  protala přímka  $AC$ , tedy  $\sphericalangle ACE = CAD$ . Avšak  $\sphericalangle CAD$  vzat za stejný s  $BAD$ , tedy též  $BAD = ACE$ . Dále, ježto rovnoběžky  $AD$ ,  $EC$  protala přímka  $BAE$ , vnější  $\sphericalangle BAD = AEC$  vnitřnímu. Dokázáno pak, že též  $\sphericalangle AEC = BAD$ , tedy též  $\sphericalangle ACE = AEC$ ; pročež i strana  $AE = AC$ . A ježto v  $\triangle BCE$  k jedné straně  $EC$  vedena rovnoběžka  $AD$ , tedy  $BD:DC = BA:AE$  (VI. II.). Avšak  $AE = AC$ ; tedy  $BD:DC = BA:AC$ .

Ale buď již  $BD:DC = BA:AC$  a vedme spojnicí  $AD$ ; pravím, že přímka  $AD$   $\sphericalangle BAC$  půlí.

Neboť vykonáme-li touž úpravu, ježto  $BD:DC = BA:AC$ , ale též  $BD:DC = BA:AE$ , neboť v  $\triangle BCE$  jest  $EC \parallel AD$ ; tedy  $BA:AC = BA:AE$ . Tedy  $AC = AE$ ; pročež i  $\sphericalangle AEC = ACE$ . Avšak  $\sphericalangle AEC = BAD$  vnějšímu. Úhel však  $ACE = CAD$  střídavému; tedy též  $\sphericalangle BAD = CAD$ . Tedy přímku  $AD$   $\sphericalangle BAC$  rozpůlen.

Když se tedy (na temeni) úhel v trojúhelníku rozpůlí — —.




## IV.

V stejnoúhlých trojúhelnících úměrné jsou strany při stejných úhlech i stejnolehle, které leží proti stejným úhlům.

Stejnoúhlými trojúhelníky buďtež  $ABC$ ,  $DCE$  a buď  $\sphericalangle ABC = \sphericalangle DCE$ ,  $\sphericalangle BAC = \sphericalangle CDE$ ,  $\sphericalangle ACB = \sphericalangle CED$ ; pravím, že v trojúhelnících  $ABC$ ,  $DCE$  úměrné jsou strany při stejných úhlech i stejnolehle, které leží proti stejným úhlům.

Nuže  $BC$  buď s  $CE$  v přímce. A ježto  $(\sphericalangle ABC + \sphericalangle ACB) < 2R$  a  $\sphericalangle ACB = \sphericalangle DEC$ , tedy  $(\sphericalangle ABC + \sphericalangle DEC) < 2R$ , pročež  $BA$ ,  $ED$  prodloužením se setkají. Buďte prodlouženy a stýkejte se v  $F$ .




A ježto  $\sphericalangle DCE = \sphericalangle ABC$ , jest  $BF \parallel CD$ . Dále, ježto  $\sphericalangle ACB = \sphericalangle DEC$ , jest  $AC \parallel FE$ . Tedy  $FACD$  jest rovnoběžník; pročež  $FA = DC$ ,  $AC = FD$ . A ježto v  $\triangle FBE$  vedena k  $FE$  rovnoběžka  $AC$ , tedy  $BA : AF = BC : CE$ . Avšak  $AF = CD$ ; tedy  $BA : CD = BC : CE$  a střídavě  $AB : BC = DC : CE$ . Dále, ježto  $CD \parallel BF$ , tedy  $BC : CE = FD : DE$ . Avšak  $FD = AC$ , tedy  $BC : CE = AC : DE$  a střídavě  $BC : CA = CE : ED$ . Ježto tedy dokázáno, že  $AB : BC = DC : CE$  a  $BC : CA = CE : ED$ , stejnořadně tedy  $BA : AC = CD : DE$  (V. xxii.).

Tedy v stejnoúhlých trojúhelnících úměrné jsou strany — —.

## V.

Když mají dva trojúhelníky strany úměrné, budou tyto trojúhelníky stejnoúhlé a budou mít ty úhly stejné, proti nimž leží stejnolehle strany.



Buďtež  $ABC$ ,  $DEF$  trojúhelníky majícími úměrné strany, totiž  $AB : BC = DE : EF$  a  $BC : CA = EF : FD$  a též  $BA : AC = ED : DF$ ; pravím, že  $\triangle ABC$  je stejnoúhlý s  $\triangle DEF$  a že úhly, proti nimž leží stejnolehle strany, budou mít stejné, t.  $\sphericalangle ABC = \sphericalangle DEF$ ,  $\sphericalangle BCA = \sphericalangle EFD$ ,  $\sphericalangle BAC = \sphericalangle EDF$ .

Nuže sestrojme na přímce  $EF$  v bodech na ní  $E$ ,  $F$   $\sphericalangle FEG = \sphericalangle ABC$  a  $\sphericalangle EFG = \sphericalangle ACB$ , tedy zbývající  $\sphericalangle A = \sphericalangle G$ .

Tedy  $\triangle ABC$  je stejnoúhlý s  $\triangle EFG$ . Pročež v trojúhelnících  $ABC$ ,  $EGF$  strany při stejných úhlech i stejnolehle proti stejným úhlům ležící jsou úměrné; tedy  $AB : BC = GE : EF$ . Avšak dáno jest, že  $AB : BC = DE : EF$ ; tedy  $DE : EF = GE : EF$ . Tedy  $DE$ ,  $GE$  mají k  $EF$  též poměr; pročež  $DE = GE$ . Z téže příčiny ovšem

i  $DF = GF$ . Ježto tedy  $DE = EG$  a společnou  $EF$ , dvě tedy  $DE$ ,  $EF$  dvěma  $GE$ ,  $EF$  jednotlivě rovny jsou, i základna  $DF = FG$ ; tedy  $\sphericalangle DEF = \sphericalangle GEF$  a  $\triangle DEF = \triangle GEF$  i ostatní úhly rovny ostatním úhlům, proti nimž leží stejné strany. Tedy též  $\sphericalangle DFE = \sphericalangle GFE$  a  $\sphericalangle EDF = \sphericalangle EGF$ . A ježto  $\sphericalangle FED = \sphericalangle GEF$ , avšak  $\sphericalangle GEF = \sphericalangle ABC$ , tedy též  $\sphericalangle ABC = \sphericalangle DEF$ . Z téže příčiny ovšem též  $\sphericalangle ACB = \sphericalangle DFE$  a též  $\sphericalangle A = \sphericalangle D$ . Tedy  $\triangle ABC$  je stejnoúhlý s  $\triangle DEF$ .

Když tedy mají dva trojúhelníky strany úměrné — —.


## VI.

Když mají dva trojúhelníky po jednu úhlu stejném a strany při stejných úhlech úměrné, ty trojúhelníky budou stejnoúhlé a budou mít ty úhly stejné, proti nimž leží stejnolehle strany.

Buďtež  $ABC$ ,  $DEF$  trojúhelníky majícími jeden úhel  $BAC$  jednomu úhlu  $EDF$  rovný a při stejných úhlech úměrné strany, tak že  $BA : AC = ED : DF$ ; pravím, že  $\triangle ABC$  je s  $\triangle DEF$  stejnoúhlý a bude mít  $\sphericalangle ABC$  stejný s  $\sphericalangle DEF$  a  $\sphericalangle ACB$  s  $\sphericalangle DFE$ .

Nuže buď sestrojen na přímce  $DF$  a v bodech na ní  $D$ ,  $F$   $\sphericalangle FDG$  kterémukoli z úhlů  $BAC$ ,  $EDF$  rovný a  $\sphericalangle DFG$  rovný úhlu  $ACB$ , tedy zbývající  $\sphericalangle B = \sphericalangle G$ . Tedy  $\triangle ABC$  je s  $\triangle DGF$  stejnoúhlý. Tedy  $BA : AC = GD : DF$ . Dáno však, že  $BA : AC = ED : DF$ ; tedy též  $ED : DF = GD : DF$ . Pročež  $ED = DG$  a společnou  $DF$ ; obě tedy  $ED$ ,  $DF$  rovny oběma  $GD$ ,  $DF$  i  $\sphericalangle EDF = \sphericalangle GDF$ , tedy základna  $EF = GF$  a  $\triangle DEF = \triangle GDF$ , i ostatní úhly budou rovny ostatním, proti nimž leží stejné strany. Tedy  $\sphericalangle DFG = \sphericalangle DFE$ ,  $\sphericalangle DGF = \sphericalangle DEF$ . Avšak  $\sphericalangle DFG = \sphericalangle ACB$ , tedy též  $\sphericalangle ACB = \sphericalangle DFE$ . Dáno však, že též  $\sphericalangle BAC = \sphericalangle EDF$ ; tedy též zbývající  $\sphericalangle B = \sphericalangle E$ ; tedy  $\triangle ABC$  je s trojúhelníkem  $DEF$  stejnoúhlý.

Když tedy mají dva trojúhelníky po jednom úhlu — —.




## VII.


Když mají dva trojúhelníky po jednom úhlu stejném strany pak při jiných úhlech úměrné, z ostatních pak úhlů jeden i druhý zároveň buď menší nebo nemenší pravého, stejnoúhlé budou ty trojúhelníky a stejné budou mít ty úhly, při nichž úměrné jsou strany.

Buďtež  $ABC$ ,  $DEF$  trojúhelníky majícími po jednom úhlu stejném, t.  $\sphericalangle BAC = \sphericalangle EDF$ , a při jiných úhlech  $ABC$ ,  $DEF$  úměrné strany,  $AB : BC = DE : EF$ , z ostatních pak úhlů  $C$ ,  $F$  dříve oba zároveň menší

pravého; pravím, že  $\triangle ABC$  s  $DEF$  je stejnoúhlý i bude  $\sphericalangle ABC = DEF$  i patrně úhel zbývající  $C = F$ .



že jest pravého menší; což právě nesrovnalost. Tedy není  $\sphericalangle ABC$  nestejný s  $DEF$ , tedy je stejný.



že jest pravého menší; což právě nesrovnalost. Tedy není  $\sphericalangle ABC$  nestejný s  $DEF$ , tedy je stejný. Jest pak i  $\sphericalangle A = D$ , tedy též zbývající  $\sphericalangle C = F$ . Tedy  $\triangle ABC$  s  $DEF$  je stejnoúhlý.

VIII.

Nuže již dejme tomu, že zase i  $\sphericalangle C$  i  $\sphericalangle F$  není pravého menší; pravím opět, že též takto  $\triangle ABC$  je s  $\triangle DEF$  stejnoúhlý.

Neboť vykonáme-li touž úpravu, podobně dokážeme, že  $BC = BG$ ; pročež i  $\sphericalangle C = BGC$ . Avšak  $\sphericalangle C$  není menší než pravý, tedy ani  $\sphericalangle BGC$  není pravého menší. Tedy v  $\triangle BGC$  dva úhly nejsou menší dvou pravých; což právě nemožno. Tedy opět  $\sphericalangle ABC$  není nestejný s  $\sphericalangle DEF$ ; tedy je stejný. Jest pak i  $\sphericalangle A = D$ ; tedy zbývající  $\sphericalangle C = F$ . Pročež  $\triangle ABC$  a  $DEF$  jsou stejnoúhlé.


Když tedy mají dva trojúhelníky po jednom úhlu stejném — —.

Když se v pravoúhlém trojúhelníku vede od pravého úhlu na základnu kolmice, trojúhelníky při kolmici jsou podobny celému i navzájem. Pravoúhlým trojúhelníkem buď  $ABC$  a jeho pravým úhlem  $BAC$  a vedme z  $A$  k  $BC$  kolmici  $AD$ ; pravím, že  $\triangle ABD$  i  $\triangle ADC$  jsou podobny trojúhelníku  $ABC$  i také navzájem. Neboť ježto  $\sphericalangle BAC = ADB$ , neboť oba pravé, a společným obou trojúhelníkův  $ABC$  i  $ABD$  jest  $\sphericalangle B$ , tedy zbývající  $\sphericalangle ACB = BAD$ ; tedy  $\triangle ABC$  s  $\triangle ABD$  je stejnoúhlý; tedy  $BC$  proti pravému úhlu v  $\triangle ABC$  má se k  $BA$  proti pravému úhlu v  $\triangle ABD$  jako sama  $AB$  proti  $\sphericalangle C$  v  $\triangle ABC$  k  $BD$  proti stejnému  $\sphericalangle BAD$  v  $\triangle ABD$  a rovněž jako  $AC:AD$  proti  $\sphericalangle B$ , oběma trojúhelníkům společnému. Tedy  $\triangle ABC$  s  $ABD$  je stejnoúhlý a má strany při stejných úhlech úměrné.

Tedy  $\triangle ABC \sim \triangle ABD$ . Podobně ovšem dokážeme, že též  $\triangle ADC \sim \triangle ABC$ ; a tak  $ABD$  i  $ADC$  podobny je celému  $ABC$ .

Pravím ovšem, že  $\triangle ABD$  a  $\triangle ADC$  jsou si také navzájem podobny.

Neboť ježto  $\sphericalangle BDA = R = \sphericalangle ADC$ , avšak zajisté dokázáno, že též  $\sphericalangle BAD = C$ , tedy také zbývající  $\sphericalangle B = DAC$ ; pročež  $\triangle ABD$  s  $\triangle ADC$  je stejnoúhlý. Tedy jako se má  $BD$  proti  $\sphericalangle BAD$  v  $\triangle ABC$  k  $DA$  proti  $\sphericalangle C$  ( $= \sphericalangle BAD$ ) v  $\triangle ADC$ , tak sama  $AD$  proti  $\sphericalangle B$  v  $\triangle ABD$  k  $DC$  proti  $\sphericalangle DAC$  v  $\triangle ADC$ , stejnému s  $\sphericalangle B$ , a rovněž jako  $BA:AC$  proti úhlům pravým; tedy  $\triangle ABD \sim \triangle ADC$ .



Když se tedy v pravoúhlém trojúhelníku — —.

Důsledek.

Z toho zajisté patrné, že, když se v pravoúhlém trojúhelníku od úhlu pravého vede k základně kolmice, kolmice ta je střední úměrnou úseček základny; což se právě mělo dokázati.


IX.

Od přímky dané odřízni určenou několikátou část

Danou přímkou buď  $AB$ ; má se tedy od přímky  $AB$  určená několikátá část odříznouti.

Určena tedy buď třetina. Vedme z  $A$  nějakou přímkou  $AC$ , aby s  $AB$  svírala jakýkoliv úhel, a vezměme na  $AC$  jakýkoli bod  $D$  a buď  $AD = DE = EC$ , i vedme spojnicí  $BC$  a z  $D$  rovnoběžku k ní  $DF$ .

Ježto tedy v  $\triangle ABC$  k jedné straně  $BC$  vedena rovnoběžka  $FD$ , tedy  $CD:DA = BF:FA$ , avšak  $CD = 2 DA$ , tedy též  $BF = 2 FA$ ; pročež  $BA = 3 AF$ .




Tedy od přímky dané  $AB$  odříznuta — —.

X.

Danou přímkou nerozdělenou rozděl podobně dané rozděléné.

Danou přímkou nerozdělenou buď  $AB$ ,  $AC$  pak rozděléné a bodech  $D$ ,  $E$ , a postaveny buďte tak, aby svíraly jakýkoliv úhel,






a vedena buď spojnice  $CB$  a z  $D, E$ , vedeny buďte rovnoběžky s  $BC$ , totiž  $DF, EG$ , a z  $D$  rovnoběžná s  $AB$ , t.  $DHK$ .

Tedy  $FH$  i  $HB$  jsou rovnoběžníky; pročež  $DH=FG, HK=GB$ . A ježto v  $\triangle DKC$  k jedné straně  $KC$  vedena rovnoběžka  $HE$ , tedy  $CE:ED=KH:HD$ . Avšak  $KH=BG$  a  $HD=GF$ . Tedy  $CE:ED=BG:GF$ . Dále ježto v  $\triangle AGE$  k jedné straně  $GE$  vedena rovnoběžka  $FD$ , tedy  $ED:DA=GF:FA$ . Dokázáno pak, že  $CE:ED=BG:GF$ ; tedy  $CE:ED=BG:GF$  a  $ED:DA=GF:FA$ .

Tedy daná přímka nerozdělená  $AB$  rozdělena jest — —.

XI.

Dány-li dvě přímky, najdi třetí s nimi úměrnou.



Danými dvěma přímkami buďte  $BA, AC$  a buďte sestaveny, aby svíraly jakýkoliv úhel. Má se tedy ku přímkám  $BA, AC$  naléztí třetí úměrná.


Nuže prodlužme je do bodů  $D, E$  a buď  $AC=BD$  a vedme spojnic  $BC$  a z  $D$  k ní rovnoběžku  $DE$ .

Ježto tedy v  $\triangle ADE$  k jedné straně  $DE$  vedena rovnoběžka  $BC$ ,  $AB:BD=AC:CE$ . A  $BD=AC$ , Tedy  $AB:AC=AC:CE$ .

Dány-li tedy dvě přímky  $AB, AC$  nalezena — —.

XII.

Ke třem daným přímkám najdi úměrnou čtvrtou.



Danými třemi přímkami buďtež  $A, B, C$ ; má se tedy k  $A, B, C$  naléztí čtvrtá úměrná.

Stranou buďte dvě přímky  $DE, DF$  a svírejte úhel  $EDF$ , a buď  $A=DG, B=GE, C=DH$ ; a ke spojnic  $GH$  buď vedena z  $E$  rovnoběžka  $EF$ .

Ježto tedy v  $\triangle DEF$  k jedné straně  $EF$  vedena rovnoběžka  $GH$ , tedy  $DG:GE=DH:HF$ . Avšak  $DG=A, GE=B$  a  $DH=C$ ; tedy  $A:B=C:HF$ .

Ke třem tedy daným přímkám  $A, B, C$  nalezena — —.

<sup>3)</sup> Ve vyd. Heibergově přímky  $A, B, C$  při XI., náleží však patrně ke XII.


XIII.

Ke dvěma daným přímkám najdi střední úměrnou. Danými dvěma přímkami buďtež  $AB, BC$ ; má se tedy k  $AB, BC$  naléztí střední úměrná.

Buďte v přímce, a na  $AC$  narýsujme polokruh  $ADC$  a vedme z bodu  $B$  na přímce  $AC$  kolmici  $BD$  a spojnic  $AD, DC$ .

Ježto  $\sphericalangle ADC$  je v polokruží, jest pravý. A ježto v pravouhlém  $\triangle ADC$  od pravého úhlu na základnu vedena kolmice, tedy  $DB$  je střední úměrnou úseček základny  $AB, BC$  (VI. VIII. důsl.).

Ke dvěma tedy daným přímkám  $AB, BC$  nalezena — —.



XIV.

Ve stejných a stejnoúhlých rovnoběžnicích strany při stejných úhlech jsou k sobě v poměru obráceném; a rovnoběžníky stejnoúhlé, jichž strany při stejných úhlech jsou k sobě v poměru obráceném, jsou si rovny.


Stejnými a stejnoúhlými rovnoběžnicemi buďtež  $AB, BC$  a mějte stejné úhly při  $B$ , a  $DB, BE$  buďte v přímce, tedy v přímce jsou též  $FB, BG$ . Pravím, že v  $AB, BC$  strany při stejných úhlech jsou k sobě v obráceném poměru, t. j. že  $DB:BE=GB:BF$ .

Nuže doplníme rovnoběžnic  $EF$ . Ježto tedy  $AB=BC$  a jest mimo to  $FE$ , tedy  $AB:FE=BC:FE$ . Avšak  $AB:FE=DB:BE$  a  $BC:FE=GB:BF$  (VI. I.). Pročež také  $DB:BE=GB:BF$ . Tedy v rovnoběžnicích  $AB, BC$  jsou strany při stejných úhlech v obráceném poměru.

Avšak buď již  $DB:BE=GB:BF$ ; pravím, že  $AB=BC$ .

Neboť ježto  $DB:BE=GB:BF$ , avšak  $DB:BE=AB:FE$  a  $GB:BF=BC:FE$ , tedy též  $AB:FE=BC:FE$ ; pročež  $AB=BC$ .

Tedy ve stejných a stejnoúhlých rovnoběžnicích — —.



XV.

Ve stejných trojúhelnících, jež mají po jednom úhlu stejném, strany při stejných úhlech mají poměr obrácený; a trojúhelníky, jež mají po jednom úhlu stejném a jichž strany při stejných úhlech mají poměr obrácený, jsou si rovny.

Stejnými trojúhelníky buďtež  $ABC, ADE$  a buď  $\sphericalangle BAC=DAE$ ;

pravím, že v trojúhelnících  $ABC$ ,  $ADE$  strany při stejných úhlech jsou k sobě v poměru obráceném, t. j. že  $CA:AD=EA:AB$ .

Nuže buďte položeny tak, aby  $CA$  s  $AD$  byla v přímce; v přímce je tedy též  $EA$  s  $AB$ . I vedme spojnicí  $BD$ .

Ježto  $\triangle ABC = \triangle ADE$  a jiný jest  $BAD$ , tedy  $CAB:BAD = EAD:BAD$ . Avšak  $CAB:BAD = CA:AD$  a  $EAD:BAD = EA:AB$ . Tedy  $CA:AD = EA:AB$ . Tedy v trojúhelnících  $ABC$ ,  $ADE$  strany při stejných úhlech jsou k sobě v obráceném poměru

Nuže již buďte v  $\triangle ABC$ ,  $ADE$  strany v obráceném poměru, a to  $CA:AD = EA:AB$ ; pravím, že  $\triangle ABC = \triangle ADE$ .


Neboť vedeme-li opět spojnicí  $BD$ , ježto  $CA:AD = EA:AB$ , avšak  $CA:AD = BAC:BAD$ , a  $EA:AB = EAD:BAD$ ; tedy  $ABC:BAD = EAD:BAD$ . Tedy oba  $\triangle ABC$ ,  $EAD$  k  $BAD$  mají též poměr. Tedy  $ABC = EAD$ .

Tedy ve stejných trojúhelnících, jež mají — —.

## XVI.

Když jsou čtyři přímky úměrou, pravoúhelník objímáný krajními rovná se pravoúhelníku objímanému středními; a když pravoúhelník objímáný krajními rovná se pravoúhelníku objímanému středními, ty čtyři přímky budou úměrou.

Budtež úměrou čtyři přímky  $AB$ ,  $CD$ ,  $E$ ,  $F$ , totiž  $AB:CD = E:F$ ; pravím, že pravoúhelník z  $AB$ ,  $F$  rovná se pravoúhelníku z  $CD$ ,  $E$ .



Vedme z bodů  $A$ ,  $C$  ku přímce  $AB$ ,  $CD$  kolmice  $AG$ ,  $CH$  a buď  $AG = F$  a  $CH = E$ , i doplňme rovnoběžníky  $BG$ ,  $DH$ .

A ježto  $AB:CD = E:F$  a  $E = CH$ ,  $F = AG$ , tedy  $AB:CD = CH:AG$ . Tedy v rovnoběžnicích  $BG$ ,  $DH$  strany při stejných úhlech<sup>3)</sup> jsou k sobě v poměru obráceném. Ve kterých

však stejnoúhlých rovnoběžnicích strany při stejných úhlech mají k sobě poměr obrácený, ty jsou si rovny (VI. xiv.); tedy  $BG = DH$ . I jest  $BG$  z  $AB$ ,  $F$ , neboť  $AG = F$ , a  $DH$  z  $CD$ ,  $E$ , neboť  $E = CH$ . Tedy pravoúhelník z  $AB$ ,  $F$  rovná se pravoúhelníku z  $CD$ ,  $E$ .

Avšak již buď pravoúhelník z  $AB$ ,  $F$  roven pravoúhelníku z  $CD$ ,  $E$ ; pravím, že ty čtyři přímky budou úměrou, t.  $AB:CD = E:F$ .

<sup>3)</sup> Všecky rovnoběžníky lze zajisté proměnit v stejnoúhlé.

Neboť vykonáme-li touž úpravu, ježto  $AB \times F = CD \times E$  a  $AB \times F$  jest  $BG$ , neboť  $AG = F$ , a  $CD \times E$  jest  $DH$ , neboť  $CH = E$ ; tedy  $BG = DH$ , a jsou stejnoúhlé. V rovnoběžnicích však stejných a stejnoúhlých strany při stejných úhlech mají se k sobě v obráceném poměru. Tedy  $AB:CD = CH:AG$ . Avšak  $CH = E$ ,  $AG = F$ ; tedy  $AB:CD = E:F$ .  
Když jsou tedy čtyři přímky úměrou, pravoúhelník — —.

## XVII.

Když jsou tři přímky úměrou, pravoúhelník objímáný krajními rovná se čtverci ze střední; a když pravoúhelník objímáný krajními rovná se čtverci ze střední, ty tři přímky budou úměrou.

Budtež úměrou tři přímky  $A$ ,  $B$ ,  $C$ , t.  $A:B = B:C$ ; pravím, že pravoúhelník z  $A$ ,  $C$  rovná se čtverci z  $B$ .

Buď  $D = B$ . A ježto  $A:B = B:C$  a  $B = D$ , tedy  $A:B = D:C$ . Když pak jsou čtyři přímky úměrou, pravoúhelník z krajních rovná se pravoúhelníku ze středních; tedy  $A \times C = B \times D$ . Avšak  $B \times D = B^2$ , neboť  $B = D$ ; tedy  $A \times C = B^2$ .

Avšak již buď  $A \times C = B^2$ ; pravím, že  $A:B = B:C$ .

Neboť vykonáme-li touž úpravu, ježto  $A \times C = B^2$ , avšak  $B^2 = B \times D$ , neboť  $B = D$ , tedy  $A \times C = B \times D$ . Když pak pravoúhelník z krajních roven pravoúhelníku ze středních, ty čtyři přímky jsou úměrou. Tedy  $A:B = D:C$ . Avšak  $B = D$ ; tedy  $A:B = B:C$ .


Když jsou tedy tři přímky úměrou, pravoúhelník — —.

## XVIII.

Na dané přímce narýsuj útvar přímkový danému útvaru přímkovému podobný a podobně položený (stejnolehlý).

Danou přímku buď  $AB$  a daným útvarem přímkovým  $CE$ ; má se tedy na přímce  $AB$  narýsovat útvar přímkový, útvaru  $CE$  podobný a podobně položený.

Vedme spojnicí  $DF$  a zřídme na přímce  $AB$  a v bodech na ní  $A$ ,  $B$  úhel  $GAB = C$  a  $\sphericalangle ABG = CDF$ . Tedy zbývající  $\sphericalangle CFD = AGB$ ; pročež  $\triangle FCD$  je s  $\triangle GAB$  stejnoúhlý. Tedy  $FD:GB = FC:GA = CD:AB$ . Opět zřídme na přímce  $BG$  a v bodech na ní  $B$ ,  $G$   $\sphericalangle BGH = DFE$  a  $\sphericalangle GBH = FDE$ . Tedy zbývající  $\sphericalangle E = H$ ; pročež  $\triangle FDE$  s  $\triangle GBH$  je stejnoúhlý; tedy  $FD:GB = FE:GH = ED:HB$ . Dokázáno pak, že též  $FD:GB = FC:GA = CD:AB$ ; tedy též  $FC:AG = CD:AB = FE:GH = ED:HB$ . A ježto  $\sphericalangle CFD = AGB$  a  $\sphericalangle DFE = BGH$ , tedy celý  $CFE = AGH$ .



Z téže příčiny ovšem též  $\sphericalangle CDE = ABH$ ; jest pak též  $\sphericalangle C = A$  a  $\sphericalangle E = H$ . Tedy  $AH$  s  $CE$  je stejnoúhlý, a mají strany při stejných úhlech úměrné. Tedy útvar přímkový  $AH$  jest podoben útvaru přímkovému  $CE$ .


Tedy na dané přímce  $AB$  narýsován útvar přímkový — —.

## XIX.

Podobné trojúhelníky mají se k sobě jako dvojmoci stejnoúhlých stran.<sup>4)</sup>

Podobnými trojúhelníky buďtež  $ABC$ ,  $DEF$  a buď  $\sphericalangle B = E$  a  $AB : BC = DE : EF$ , takže  $BC$  je stejnoúhlá s  $EF$ ; pravím, že  $\triangle ABC : DEF = BC^2 : EF^2$ .

Nuže vezměme k  $BC$ ,  $EF$  za třetí úměrnou  $BG$ , tak aby byla  $BC : EF = EF : BG$ , a vedme spojnicí  $AG$ .



Ježto tedy  $AB : BC = DE : EF$ , tedy střídavě  $AB : DE = BC : EF$ . — Avšak  $BC : EF = EF : BG$ . Tedy též  $AB : DE = EF : BG$ ; tedy v trojúhelnících  $ABG$ ,  $DEF$  strany při stejných úhlech jsou k sobě v obráceném poměru. Trojúhelníky pak mají po jednom úhlu stejném, když strany jejich při stejných úhlech mají k sobě poměr obrácený, jsou stejné. Tedy  $\triangle ABG = DEF$  (VI. xv.). A ježto  $BC : EF = EF : BG$  a když jsou tři přímky úměrou, první má se ke třetí jako čtverec první ke čtverci druhé (V. vým. 9.), tedy  $BC : BG = BC^2 : EF^2$ . Avšak  $CB : BG = \triangle ABC : ABG$ ; tedy též  $\triangle ABC : ABG = BC^2 : EF^2$ . A  $\triangle ABG = DEF$ ; tedy též  $\triangle ABC : DEF = BC^2 : EF^2$ .

Tedy podobné trojúhelníky mají se k sobě — —.

## Důsledek.

Z toho zajisté patrné, když tři přímky jsou úměrou, že se má první ke třetí jako útvar z první k útvaru z druhé podobnému a podobně sestrojenému.<sup>5)</sup>

## XX.

Podobné mnohoúhelníky rozdělují se v trojúhelníky podobné a počtem rovné i s celky stejnoúhlé; a mnohoúhelník má se k mnohoúhelníku (podobnému) jako dvojmoci stejnoúhlých stran.

<sup>4)</sup> Eukl. dí: ἐν διπλαστον λόγῳ ἔστι, t. j.  $M : N = a \times a : b \times b$ .


<sup>5)</sup> Slovem útvar (εἶδος) dle výkladu předcházejícího míní se čtverec; důsledek však nevysvětluje z výkladu, nýbrž zakládá se na vým. 9. knihy V., pravdivém, ale nedokázaném.

Podobnými mnohoúhelníky buďtež  $ABCDE$ ,  $FGHKL$  a buď  $AB$  stejnoúhlou s  $FG$ ; pravím, že mnohoúhelníky  $ABCDE$ ,  $FGHKL$  rozdělují se v trojúhelníky podobné a počtem rovné a s celky stejnoúhlé, a že  $ABCDE : FGHKL = AB^2 : FG^2$ .

Vedme  $BE$ ,  $EC$ ,  $GL$ ,  $LH$ .

A ježto  $ABCDE \sim FGHKL$ ,  $\sphericalangle BAE = GFL$ , a  $BA : AE = GF : FL$ .

Ježto tedy dva trojúhelníky  $ABE$ ,  $FGL$  mají po jednom úhlu stejném a strany při stejných úhlech úměrné, tedy  $\triangle ABE$  je s  $\triangle FGL$  stejnoúhlý, pročež i podobný; tedy  $\triangle ABE = FGL$ . Jest pak i celý  $\sphericalangle EBC = FGH$  pro podobnost mnohoúhelníků, tedy zbývající  $\sphericalangle EBC = LGH$ . A ježto  $\triangle ABE \sim FGL$  a proto  $EB : BA = LG : GF$ , avšak zajisté též pro podobnost mnohoúhelníků  $AB : BC = FG : GH$ , tedy



po řadě  $EB : BC = LG : GH$  i strany při stejných úhlech  $EBC$ ,  $LGH$  jsou úměrné; tedy  $\triangle EBC$  s  $LGH$  je stejnoúhlý, pročež i  $\triangle EBC \sim LGH$ . Z téže příčiny ovšem též  $\triangle ECD \sim LHK$ . Tedy podobné mnohoúhelníky  $ABCDE$ ,  $FGHKL$  rozdělují se v trojúhelníky podobné a počtem rovné.

Pravím, že také s celky stejnoúhlé, t. j. tak, že úměrné jsou trojúhelníky a předními členy jsou  $ABE$ ,  $EBC$ ,  $ECD$  a jejich zadními  $FGL$ ,  $LGH$ ,  $LHK$ , a že  $ABCDE$  má se k  $FGHKL$  jako dvojmoci stejnoúhlých stran t. j.  $AB^2$  ku  $FG^2$ .

Nuže vedme spojnicí  $AC$ ,  $FH$ . A ježto pro podobnost mnohoúhelníků  $\sphericalangle ABC = FGH$  a  $AB : BC = FG : GH$ ,  $\triangle ABC$  s  $FGH$  je stejnoúhlý; tedy  $\sphericalangle BAC = GFH$  a  $\sphericalangle BCA = GHF$ . A ježto  $\sphericalangle BAM = GFN$  a též  $\sphericalangle ABM = FGN$ , tedy též zbývající  $\sphericalangle AMB = FNG$ . Tedy  $\triangle AMB$  je s  $\triangle FGN$  stejnoúhlý. Podobně ovšem dokážeme, že též  $\triangle BMC$  s  $\triangle GNH$  je stejnoúhlý. Úměrou tedy jest  $AM : MB = FN : NG$  a  $BM : MC = GN : NH$ ; protož také po řadě  $AM : MC = FN : NH$ . Avšak  $AM : MC = ABM : BMC = AME : EMC$ , neboť mají se k sobě jako základny. Tedy též jako se má jeden z předních členů k jednomu zadnímu, tak součet předních k součtu zadních; tedy  $\triangle AMB : BMC = ABE : CBE$ . Avšak  $AMB : BMC = AM : MC$ ; tedy též  $AM : MC = \triangle ABE : \triangle CBE$ . Z téže příčiny ovšem též  $FN : NH = FGL : GLH$ . I jest  $AM : MC = FN : NH$ ; tedy též  $\triangle ABE : BEC = FGL : GLH$  a střídavě  $\triangle ABE : FGL = BEC : GLH$ . Podobně ovšem dokážeme zřídíce spojnicí  $BD$ ,  $GK$ , že též  $BEC : LGH = ECD : LHK$ . A ježto  $\triangle ABE : FGL = EBC : LGH$  a rovněž  $ECD : LHK$ , tedy též jak se má jeden přední k jednomu zadnímu členu, tak součet předních k součtu zadních; tedy  $\triangle ABE : FGL = ABCDE : FGHKL$ . Avšak  $\triangle ABC : FGL = AB^2 : FG^2$  — strany stejnoúhlé čtverec ke čtverci strany stejnoúhlé —, neboť podobné trojúhelníky mají se k sobě jako čtverce stejnoúhlých stran (VI. xix.). Tedy také  $ABCDE : FGHKL = AB^2 : FG^2$ .

Tedy podobné mnohoúhelníky rozdělují se — —.


## Důsledek.

A rovněž tak i o čtyřúhelnících dokážeme, že se mají k sobě jako čtverce stejnoúhlých stran. Dokázáno pak to také o trojúhelní-

nících; pročež i vůbec podobné útvary přímkové mají se k sobě jako čtverce stejnoúhlých stran; což právě bylo dokázati.<sup>6)</sup>

## XXI.

Útvary témuž útvaru přímkovému podobné jsou též navzájem podobné.




Nuže buďtež oba útvary přímkové  $A$ ,  $B$  útvaru  $C$  podobny; pravím, že též  $A \sim B$ .

Ježto totiž  $A \sim C$ , jsou stejnoúhlé a mají strany při stejných úhlech úměrné. Dále, ježto  $B \sim C$ , jsou stejnoúhlé a mají strany při stejných úhlech úměrné. Tedy  $A$  i  $B$  jsou s  $C$  stejnoúhlé a mají s ním strany při stejných úhlech úměrné (pročež i  $A$  s  $B$  je stejnoúhlý a mají při stejných úhlech úměrné strany). Tedy  $A \sim B$ , což právě bylo dokázati.

## XXII.

Když jsou čtyři přímky úměrou, též přímkové útvary na nich podobné a podobně sestrojené budou úměrou; a když přímkové útvary na nich podobné a podobně sestrojené budou úměrou, též přímky samy budou úměrou.

Čtyřmi přímkami úměrnými buďtež  $AB$ ,  $CD$ ,  $EF$ ,  $GH$ , totiž  $AB:CD = EF:GH$ , a narýsujeme na  $AB$ ,  $CD$  útvary přímkové podobné a podobně položené  $KAB$ ,  $LCD$  a na  $EF$ ,  $GH$  podobné a podobně položené  $MF$ ,  $NH$ ; pravím, že  $KAB:LCD = MF:NH$ .



Nuže za třetí úměrnou přímek  $AB$ ,  $CD$  vezměmež  $O$  a přímek  $EF$ ,  $GH$  za třetí úměrnou  $P$ . A ježto  $AB:CD = EF:GH$  a  $CD:O = GH:P$ <sup>7)</sup>, tedy po řadě  $AB:O = EF:P$  (V. xxii.). Avšak  $AB:O = KAB:LCD$  a  $EF:P = MF:NH$ <sup>8)</sup>; tedy  $KAB:LCD = MF:NH$ .

Avšak buď již  $KAB:LCD = MF:NH$ ; pravím, že též  $AB:CD = EF:GH$ . Neboť není-li  $AB:CD = EF:GH$ , buď  $AB:CD = EF:QR$ , a narýsujeme na  $QR$  útvar přím-

kový  $SR$  útvaru  $MF$  i  $NH$  podobný a podobně položený.

<sup>6)</sup> Následuje ještě druhý důsledek, avšak nepochybně není Eukleidův.

<sup>7)</sup>  $AB:CD = CD:O$ ,  $EF:GH = GH:P$ , a ježto  $AB:CD = EF:GH$ . z toho  $CD:O = GH:P$ .

<sup>8)</sup> To jde z úměr  $AB:CD = CD:O$ ,  $EF:GH = GH:P$  (VI. XIX. důsl.).

Ježto tedy  $AB:CD = EF:QR$  a narýsovány na  $AB$ ,  $CD$  útvary podobné a podobně položené  $KAB$ ,  $LCD$  a na  $EF$ ,  $QR$  podobné a podobně položené  $MF$ ,  $SR$ , tedy  $KAB:LCD = MF:SR$ . Podmínkou však, že též  $KAB:LCD = MF:NH$ ; tedy též  $MF:SR = MF:NH$ . Tedy  $MF$  i k  $NH$  i k  $SR$  má týž poměr; tedy  $NH = SR$ . Jest pak mu i podoben i podobně položen; tedy  $GH = QR$ . A ježto  $AB:CD = EF:QR$  a  $QR = GH$ , tedy  $AB:CD = EF:GH$ .

Když jsou tedy čtyři přímky úměrou, též přímkové — —.<sup>9)</sup>


## XXIII.

Stejnoúhlé rovnoběžníky mají se k sobě jako poměry jejich stran.<sup>10)</sup>

Stejnoúhlými rovnoběžníky buďtež  $AC$ ,  $CF$ , tak že  $\sphericalangle BCD = \sphericalangle ECG$ ; pravím, že  $AC$  má se k  $CF$  jako poměry jejich stran.

Nuže buď  $BC$  s  $CG$  v přímce; tedy v přímce je též  $DC$  s  $CE$ . I doplníme rovnoběžník  $DG$  a buď vedle nějaká přímka  $K$  a buď  $BC:CG = K:L$  a  $DC:CE = L:M$ .

Tedy poměry  $K:L$  a  $L:M$  jsou stejné s poměry stran  $BC:CG$  a  $DC:CE$ . Avšak poměr  $K:M$  je složen z poměrů  $K:L$  a  $L:M$ , proto též  $K$  k  $M$  má poměr složený z poměrů stran.<sup>11)</sup> A ježto  $BC:CG = AC:CH$ , avšak  $BC:CG = K:L$ , tedy též  $K:L = AC:CH$ . Dále, ježto  $DC:CE = CH:CF$ , avšak  $DC:CE = L:M$ , tedy též  $L:M = CH:CF$ . Ježto tedy dokázáno, že  $K:L = AC:CH$  a  $L:M = CH:CF$ , tedy po řadě  $K:M = AC:CF$ . Avšak  $K$  k  $M$  má poměr složený z poměrů stran, tedy též  $AC$  k  $CF$  má poměr složený z poměrů stran.<sup>12)</sup>



Tedy stejnoúhlé rovnoběžníky mají se k sobě jako poměry jejich stran

## XXIV.

V každém rovnoběžníku jsou rovnoběžníky, jimiž prochází úhlopříčka, podobny celému i sobě navzájem.

<sup>9)</sup> Následuje »výběžek« (λημμα), avšak nejspíše nikoliv Eukleidův.

<sup>10)</sup> Míní se strany při stejných úhlech, aby krajními i vnitřními členy byly strany téhož rovnoběžníku.


<sup>11)</sup> Eukl. ἐκ τῶν πλευρῶν μ. ἐκ τῶν τῶν πλευρῶν (sc. λόγων).  $\frac{BC}{CG} = \frac{K}{L}$ ,  $\frac{CE}{CD} = \frac{M}{L}$ , tedy  $K:M = \frac{BC}{CG} : \frac{CE}{CD}$ .

<sup>12)</sup>  $AC:CF = \frac{BC}{CG} : \frac{CE}{CD}$ . Určitěji bylo by (též v záhlaví)  $AC:CF$  jako součiny vlastních stran při stejných úhlech, t.  $AC:CF = BC \times CD : CE \times CG$ .

Buď rovnoběžníkem  $ABCD$ , úhlopříčkou jeho  $AC$  a rovnoběžníky, jimiž  $AC$  prochází, buďtež  $EG$ ,  $HK$ ; pravím, že  $EG$  i  $HK$  jsou podobny celému  $ABCD$  i sobě navzájem.

Neboť ježto v  $\triangle ABC$  k jedné straně  $BC$  vedena rovnoběžka  $EF$ , úměrou  $BE:EA=CF:FA$ . Dále ježto v  $\triangle ACD$  k jedné straně  $CD$  vedena rovnoběžka  $FG$ , úměrou  $CF:FA=DG:GA$ .

Avšak dokázáno, že  $CF:FA=BE:EA$ ; tedy též  $BE:EA=DG:GA$ , tedy též součtetně  $BA:AE=DA:AG$  (V. XVIII.) i střídavě  $BA:AD=EA:AG$ .



Tedy v rovnoběžnicích  $ABCD$ ,  $EG$  strany při společném úhlu  $BAD$  jsou úměrné. A ježto  $GF \parallel DC$ ,  $\sphericalangle AFG = DCA$ , a  $\sphericalangle DAC$  oběma  $\triangle ADC$ ,  $\triangle AGF$  společný; tedy  $\triangle ADC$  je s  $\triangle AGF$  stejnoúhlý. Z téže příčiny ovšem též  $\triangle ACB$  je stejnoúhlý s  $\triangle AFE$ , i celý rovnoběžník  $ABCD$  je s  $EG$  stejnoúhlý. Tedy úměrou  $AD:DC=AG:GF$  a  $DC:CA=GF:FA$  a  $AC:CB=AF:FE$  a rovněž  $CB:BA=FE:EA$ .


A ježto že dokázáno,  $DC:CA=GF:FA$  a  $AC:CB=AF:FE$ , tedy po řadě  $DC:CB=GF:FE$ . Tedy v rovnoběžnicích  $ABCD$ ,  $EG$  strany při stejných úhlech jsou úměrné, tedy  $ABCD \sim EG$ . Z téže příčiny ovšem též  $ABCD \sim KH$ . Tedy  $EG$  i  $KH$  jsou podobny rovnoběžníku  $ABCD$ . Útvary však téměř útvaru přímkovému podobné jsou i navzájem podobny (VI. XXI.), tedy též  $EG \sim HK$ .

V každém tedy rovnoběžníku jsou — —.

XXV.

Sestav útvar přímkový danému podobný a jinému danému spolu rovný.

Daným útvarem přímkovým, jemuž má se podobný sestaviti, buď  $ABC$ , a kterému rovný, buď  $D$ ; má se tedy sestaviti útvaru  $ABC$  podobný a zároveň útvaru  $D$  rovný.



Nuže přistavme si k  $BC$  rovnoběžník  $BE$  stejný s  $\triangle ABC$  a k  $CE$  rovnoběžník  $CM$  stejný s  $D$  v  $\sphericalangle FCE$ , jenž roven úhlu  $CBL$ . Tedy jest  $BC$  s  $CF$  v přímce,  $LE$  pak s  $EM$ <sup>13)</sup>. A k  $BC$ ,  $CF$  buď střední úměrnou  $GH$ , a na  $GH$  narýsujme  $\triangle KGH$  trojúhelníku  $ABC$  podobný a podobně položený.

A ježto  $BC:GH=GH:CF$  a když jsou tři přímky úměrou, první má se ke třetí jako útvar z první k útvaru z druhé podobnému a podobně sestrojenému (VI. XIX. důsl.), tedy  $BC:CF=\triangle ABC:KGH$ . Avšak též  $BC:CF=BE:EF$ . Tedy také  $\triangle ABC:KGH=$


<sup>13)</sup> Třeba totiž  $BE$  i  $EF$  tak sestrojiti (I. XLIV. n.).

$BE:EF$ ; pročež střídavě  $ABC:BE=KGH:EF$ . Avšak  $ABC=BE$ , tedy též  $KGH=EF$ . Avšak  $EF=D$ , tedy též  $KGH=D$ . A jest i  $KGH \sim ABC$ . Tedy sestaven jest útvar přímkový danému podobný — —.

XXVI.

Když se od rovnoběžníku oddělí rovnoběžník celému podobný a podobně položený, mající s ním společný úhel, má s celým touž úhlopříčku.

Nuže od rovnoběžníku  $ABCD$  oddělme rovnoběžník  $AEF$  celému  $ABCD$  podobný a podobně položený, mající  $\sphericalangle DAB$  s ním společný pravím, že  $ABCD$  má s  $AF$  touž úhlopříčku.



Nuže nebuď tak, nýbrž, možno-li, buď úhlopříčkou  $AHC$ , a prodloužíce  $GF$  vedme do  $H$  a bodem  $H$  vedme  $HK \parallel AD$  n.  $BC$ .

Ježto tedy  $ABCD$  má s  $KG$  touž úhlopříčku, tedy  $DA:AB=GA:AK$ . Avšak  $ABCD \sim EG$  a proto  $DA:AB=GA:AE$ ; tedy též  $GA:AK=GA:AE$ . A tak  $GA$  i k  $AK$  i k  $AE$  má tž poměr. Tedy  $AE=AK$ , menší stejná s větší, což právě nemožno. Nenl tedy možno, by  $ABCD$  a  $AEF$  neměly téže úhlopříčky; tedy rovnoběžník  $ABCD$  má s rovnoběžníkem  $AEF$  touž úhlopříčku.

Když se tedy od rovnoběžníku oddělí — —.


XXVII.

Ze všech rovnoběžníků k téže přímce přistavených, jimž scházejí<sup>14)</sup> doplňovací rovnoběžníky podobné a stejnohlé s tím, jenž sestrojen jest na polovině, největší jest rovnoběžník přistavený k polovině, podobný doplňku.

Přímku buď  $AB$  a buď rozpůlena v  $C$ , a ku přímce  $AB$  buď přistaven rovnoběžník  $AD$ , tak aby mu scházel doplňovací rovnoběžník  $DB$ , sestrojený na polovině přímky  $AB$ , t. j. na  $CB$ ; pravím, že ze všech rovnoběžníků přistavených k  $AB$ , jimž scházejí doplňovací útvary podobné a stejnohlé s  $DB$ , největší jest  $AD$ .

Nuže přistavme ku přímce  $AB$  rovnoběžník  $AF$ , jemuž schází doplněk  $FB$  podobný a stejnohlý s  $DB$ ; pravím, že  $AD > AF$ .

Neboť ježto  $DB \sim FB$ , mají touž úhlopříčku. Vedme jejich úhlopříčku  $DB$  a útvar linkami vyznačme. Ježto tedy  $CF=FE$  (I, XLIII.), společným pak  $FB$ , tedy celý  $CH=$



<sup>14)</sup> Totiž do zabrání celé přímky.


*KE*. Avšak  $CH = CG$ , ježto též  $AC = CB$ . Tedy též  $CG = KE$ . Společným buď  $CF$ ; tedy  $AF$  roven je soudelníku  $LMN$ ; pročež  $DB$ , t. j.  $AD > AF^{15)}$ .  
Ze všech tedy rovnoběžníků k téže přímce — —.

XXVIII.

Přistav k dané přímce rovnoběžník útvaru danému přímkovému rovný, aby mu scházel doplňovací rovnoběžník danému podobný; daný však útvar přímkový nesmí býti větší než útvar (rovnoběžník) sestrojený na polovině, doplňku podobný.

Danou přímkou buď  $AB$ , daným pak útvarem přímkovým, jemuž rovný má se k  $AB$  přistaviti, buď  $C$ , ne větším než sestrojený na polovině přímky  $AB$ , doplňku podobný, útvarem pak, jemuž podoben má býti doplněk, buď  $D$ ; má se tedy k dané přímce  $AB$  přistaviti rovnoběžník danému útvaru přímkovému  $C$  rovný, aby mu scházel doplňovací rovnoběžník danému  $D$  podobný.

Nuže rozpolme  $AB$  v bodě  $E$  a narýsujme na  $EB$   $EBFG$  útvaru  $D$  podobný a podobně položený a doplňme rovnoběžník  $AG$ .



Jest-li ovšem  $AG = C$ , úkol byl by vykonán; neboť k dané přímce  $AB$  jest přistaven rovnoběžník  $AG$  rovný danému útvaru přímkovému  $C$ , jemuž schází doplňovací rovnoběžník  $GB$ , podobný útvaru  $D$ . Pakli tomu jinak, buď  $HE > C$ .  $HE$  však  $= GB$ ; tedy též  $GB > C$ . Oč tedy  $GB$  je větší než  $C$ ; tomu roz-

dílu rovný a útvaru  $D$  rovněž podobný sestavme  $KLMN$ . Avšak  $D \sim GB$ , tedy též  $KM \sim GB$ . Stejnolehloú tedy buď  $KL$  s  $GE$  a  $LM$  s  $GF$ . A ježto  $GB = C + KM$ , tedy  $GB > KM$ , pročež také  $GE > KL$  a  $GF > LM$ . Buď  $GO = KL$  a  $GP = LM$ , i doplňme rovnoběžník  $OGPQ$ ; tedy  $GQ \cong KM$ . Tedy též  $GQ \sim GB$ ; pročež  $GQ$  a  $GB$  mají touž úhlopříčku. Úhlopříčkou jejich buď  $GQB$ , i vyznačme útvar linkami.

Ježto tedy  $GB = C + KM$ , z čehož  $GQ = KM$ , tedy zbývající soudelník  $UXV = C$ . A ježto  $PR = OS$  (I. XLIII.), společným buď  $QB$ ; tedy celý  $PB = OB$ . Avšak  $OB = TE$ , ježto také strana  $AE = EB$ ; tedy též  $TE = PB$ . Společným buď  $OS$ ; tedy celý  $TS$  rovná se celému soudelníku  $UXV$ . Avšak dokázáno, že  $UXV = C$ ; tedy též  $TS = C$ .

Tedy k dané přímce  $AB$  přistaven rovnoběžník — —.


XXIX.

Přistav k dané přímce rovnoběžník obrazci danému přímkovému rovný, přesahující o útvar rovnoběžníku danému podobný.

<sup>15)</sup> Totéž podobně dokázati lze o každém jiném, že jest menší než  $AD$ .

Danou přímkou buď  $AB$ , daným pak útvarem přímkovým, jemuž rovný se má k  $AB$  přistaviti, buď  $C$ , ten pak, jemuž podobný má přesahovati,  $D$ ; má se tedy k přímce  $AB$  přistaviti rovnoběžník obrazci přímkovému  $C$  rovný, přesahující o útvar podobný rovnoběžníku  $D$ .

Rozpolme  $AB$  v  $E$  a narýsujme na  $EB$  rovnoběžník  $BF$  útvaru  $D$  podobný a podobně položený a zřídme  $GH$ , rovný součtu  $BF + C$  a zároveň útvaru  $D$  podobný a podobně položený. Stejnolehloú pak buď  $KH$  s  $FL$  a  $KG$  s  $FE$ . A ježto  $GH > FB$ , tedy též  $KH > FL$  a  $KG > FE$ . Prodlužme  $FL$ ,  $FE$  a buď  $FLM = KH$  a  $FEN = KG$  a doplňme  $MN$ ; tedy  $MN \cong GH$  a  $GH \sim EL$ , tedy též  $MN \sim EL$ , tedy  $EL, MN$  mají touž úhlopříčku. Vedme jejich úhlopříčku  $FO$  a obrazec vyznačme.



Ježto  $GH = EL + C$ , avšak  $GH = MN$ , tedy též  $MN = EL + C$ . Společný  $EL$  odečteme, tedy zbývající soudelník  $UXV = C$ . A ježto  $AE = EB$ , též  $AN = NB = LP$ . Společným přičtíme  $EO$ ; tedy celý  $AO$  rovná se soudelníku  $UXV$ . Avšak soudelník  $UXV = C$ ; tedy též  $AO = C$ .

Tedy k dané přímce  $AB$  přistaven rovnoběžník — —.


XXX.

Rozděl danou přímku omezenou poměrem krajním a středním (VI. vým. 3.)

Danou přímku omezenou buď  $AB$ ; má se tedy přímka  $AB$  rozdělití poměrem krajním a středním.

Narýsujme na  $AB$  čtverec  $BC$  a přistavme k  $AC$  rovnoběžník  $CD$  čtverci  $BC$  rovný, přesahující útvarem  $AD$  čtverci  $BC$  podobným (VI. XXIX.).

Jest pak  $BC$  čtverec, tedy též  $AD$  je čtverec. A ježto  $BC = CD$ , společným odečteme  $CE$ ; tedy zbývající  $BF = AD$ . Jest pak s ním i stejnoúhlý; tedy v  $BF$ ,  $AD$  jsou strany při stejných úhlech k sobě v poměru obráceném (VI. XIV.); tedy  $FE : ED = AE : EB$ . Avšak  $FE = AB$  a  $ED = AE$ . Tedy  $BA : AE = AE : EB$ . I jest  $AB > AE$ , tedy též  $AE > EB$ .



Tedy přímka  $AB$  rozdělena jest v  $E$  poměrem krajním a středním a větší její úsečkou jest  $AE$ ; což právě bylo vykonati.

XXXI.

V trojúhelnících pravoúhlých útvar sestrojený na přeponě rovná se součtu útvarů podobných a stejnohlehlých, sestrojených na odvěsnách.

Trojúhelníkem pravouhlým buď  $ABC$  a měj pravý úhel  $BAC$ ; pravím, že útvar na  $BC$  rovná se součtu útvarů podobných a stejno-  
lehlých, sestrojených na  $BA$ ,  $AC$ .

Vedme kolmici  $AD$ . Ježto tedy v pravouhlém  $\triangle ABC$  od pravého  
úhlu při  $A$  na základnu  $BC$  vedena kolmice  $AD$ , trojúhelníky  $ABD$ ,  
 $ADC$  jsou podobny celému  $ABC$  i navzá-  
jem. A ježto  $ABC \sim ABD$ , tedy  $CB:BA =$   
 $AB:BD$ . A ježto jsou tři přímky úměrou,  
první má se ke třetí, jako útvar na první  
k útvaru na druhé podobnému a stejno-  
lehlému (VI. XIX. důsl.). Tedy  $CB:BD$   
jako útvar na  $CB$  k útvaru na  $BA$  po-  
dobnému a stejnolehlému. Z téže příčiny  
ovšem též  $BC:CD$  jako útvar na  $BC$  k útva-  
ru na  $CA$ <sup>16)</sup>. Pročež také  $BC:(BD+DC)$   
jako útvar na  $BC$  k útvarům na  $BA$ ,  $AC$   
podobným a stejnolehlým. Avšak  $BC =$   
 $BD+DC$ ; tedy též útvar na  $BC$  rovná se útvarům na  $BA$ ,  $AC$  po-  
dobným a stejnolehlým<sup>17)</sup>.

Tedy v trojúhelnících pravouhlých útvar na přeponě — —.

XXXII.

Když se dva trojúhelníky mající dvě a dvě strany  
úměrné sestaví úhlem kúhlu tak, aby souhlasné strany  
byly též rovnoběžné, zbývající strany těch trojúhel-  
níků budou v přímce.

Dvěma trojúhelníky buďtež  $ABC$ ,  $DCE$   
a mějte dvě strany  $BA$ ,  $AC$  úměrné se dvěma  
stranami  $DC$ ,  $DE$  tak, že  $AB:AC = DC:DE$ ,  
a  $AB \parallel DC$ ,  $AC \parallel DE$ ; pravím, že  $BC$  je s  $CE$   
v přímce.

Neboť ježto  $AB \parallel DC$  a protíná je přímka  
 $AC$ , střídavé úhly  $BAC$ ,  $ACD$  jsou si rovny.  
Z téže příčiny ovšem též  $CDE = ACD$ ;  
pročež také  $BAC = CDE$ . A ježto dva trojúhel-  
níky  $ABC$ ,  $DCE$  mají po jednom úhlu  $A$ ,  $D$   
stejném a strany při stejných úhlech úměrné,  
t.  $BA:AC = CD:DE$ , tedy  $\triangle ABC$  je s  $\triangle DCE$   
stejnoúhlý; tedy  $\sphericalangle ABC = DCE$ . Dokázáno  
pak, že též  $\sphericalangle ACD = BAC$ ; celý tedy  $\sphericalangle ACE = ABC + BAC$ . Společným

<sup>16)</sup> Neboť  $ABC \sim ACD$ ;  $BC:CA = CA:CD$ .

<sup>17)</sup> Útvary na  $BC$ ,  $AC$ ,  $AB$  buďtež  $a$ ,  $b$ ,  $c$ . Dokázáno, že  $BC:CD = a:b$ ,  $BC:BD = a:c$ ;  
tedy  $CD:BD = b:c$ , součtetně  $\frac{BC}{BD} = \frac{b+c}{c}$ ; avšak  $BD = \frac{BC \cdot c}{a}$ , dosazením za  $BD$  bude  
 $\frac{BC \cdot a}{BC \cdot c} = \frac{b+c}{c}$ , z toho  $a = b + c$ .

buď  $\sphericalangle ACB$ ; tedy  $\sphericalangle ACE + ACB = ABC + BAC + ACB$ . Avšak  
 $ABC + BAC + ACB = 2R$ ; tedy též  $ACE + ACB = 2R$ . Na nějaké tedy  
přímce  $AC$  a v bodě na ní  $C$  dvě přímky  $BC$ ,  $CE$  na protívých  
stranách ležící činí úhly styčné  $ACE + ACB$  rovnými dvěma pravým;  
tedy  $BC$  s  $CE$  jsou v přímce (I. XIV.).

Když se tedy dva trojúhelníky mající dvě a dvě — —.

XXXIII.

Ve stejných kruzích úhly mají se k sobě jak oblouky,  
na nichž stojí, ať jsou středové, ať obvodové.

Stejnými kruhy buďtež  $ABC$ ,  $DEF$  a úhly středovými při  $G$ ,  $H$   
buďte  $BGC$ ,  $EHF$ , obvodovými pak  $BAC$ ,  $EDF$ ; pravím, že  
 $\sphericalangle BGC:EHF = \text{obl. } BC:\text{obl. } EF = \sphericalangle BAC:EDF$ .

Nuže budiž oblouku  $BC$  rovných po řadě několik  $CK$ ,  $KL$ ,  
oblouku pak  $EF$  rovných několik  $FM$ ,  $MN$ , a vedme spojnice  $GK$ ,  
 $GL$ ,  $HM$ ,  $HN$ .

Ježto tedy obl.  $BC = CK = KL$ , též  $\sphericalangle BGC = CGK = KGL$ ; tedy  
jakým násobkem oblouku  $BC$  jest  $BL$ , takým násobkem úhlu  $BGC$   
jest  $\sphericalangle BGL$ . Z téže příčiny ovšem též, jakým násobkem oblouku  $EF$   
jest  $NE$ , takým násobkem úhlu  $EHF$  jest  $NHE$ . Jest-li  
tedy obl.  $BL = EN$ , je též

$\sphericalangle BGL = EHN$ , pakli  $BL >$   
 $EN$ , též  $\sphericalangle BGL > EHL$ ,  
pakli menší, menší. Když  
tedy jsou čtyři veličiny, dva  
oblouky  $BC$ ,  $EF$  a dva úhly  
 $BGC$ ,  $EHF$ , za stejné ná-  
sobky oblouku  $BC$  a úhlu  
 $BGC$  vzaty jsou obl.  $BL$  a  
 $\sphericalangle BGL$ , oblouku pak  $EF$  a úhlu  $EHF$  oblouk  $EN$  a  $\sphericalangle EHN$ . I do-  
kázáno, když obl.  $BL > EN$ , že též  $\sphericalangle BGL > EHN$ , pakli roven,  
roven, pakli menší, menší. Tedy obl.  $BC:EF = \sphericalangle BGC:EHF$ . Avšak  
 $\sphericalangle BGC:EHF = \sphericalangle BAC:EDF$  (V. xv.), neboť ony jsou dvojnásobky  
těchto (III. xx.). Tedy též obl.  $BC:EF = \sphericalangle BGC:EHF = \sphericalangle BAC:EDF$ .

Tedy ve stejných kruzích úhly mají se k sobě, jak oblouky, na  
nichž stojí, ať jsou středové, ať obvodové; což právě bylo dokázati.

## Kniha sedmá.

### Výměry.

1. Jednotka jest, dle níž každé věci říká se jedna.
2. Číslo pak je množství složené z jednotek.<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Dle toho jednotka není číslo.

3. Díl čísla většího jest číslo menší, když se jím větší doměruje.
4. Díly pak, když se nedoměruje.<sup>2)</sup>
5. Násobek čísla menšího je číslo větší, když se menším doměruje.
6. Sudé jest číslo, když se půlí.
7. Liché pak, které se nepůlí neboli které jednotkou se liší od sudého.
8. Sudosudé jest číslo, které se měří číslem sudým dle čísla sudého.
9. Sudoliché pak, které se měří číslem sudým dle čísla lichého. [Lichosudé jest, které se měří číslem lichým dle čísla sudého.]
10. Licholiché pak, které se měří číslem lichým dle čísla lichého.
11. Kmenné jest číslo (prvočíslo), které měří jednotka jediná.
12. Kmenná navzájem jsou čísla, jež měří jednotka jediná jakožto míra společná.
13. Složené jest číslo, které se nějakým číslem doměruje.
14. Složená pak navzájem jsou čísla, jež se doměrují nějakým číslem jakožto měrou společnou.
15. Pravíme, že číslo číslem se násobí, když násobené (násobenec) tolikrát se složí, kolik v druhém jest jednotek, a nějaké vznikne.
16. Když se dvě čísla vespolek znásobí a dají číslo, vzniklé zove se rovinným (rovinou), stranami pak jeho (jejími) čísla vespolek znásobená.
17. Když pak se tři čísla vespolek znásobí a dají číslo, vzniklé jest tělesové, stranami pak jeho jsou čísla vespolek znásobená.
18. Čtvercové jest číslo tolikéžkrát stejné neboli které je násobkem dvou stejných čísel.
19. Křychlové jest číslo tolikéžkrát stejné tolikéžkrát neboli které je násobkem tří stejných čísel.
20. Čísla jsou úměrná, když první je stejným násobkem druhého jako třetí čtvrtého nebo týměž dílem nebo týměž díly.
21. Podobná jsou čísla rovinná a tělesová, která mají strany úměrné.
22. Plné jest číslo, jež se rovná součtu svých dílů.

## I.

Jsou-li dána dvě čísla nestatejná a odčítá-li se střídavě vždy menší od většího, když zbývající předcházejícího nikdy nedoměruje, dokud nezbude jednotka, počáteční čísla budou navzájem kmenná.

Nuže ze dvou čísel  $AB$ ,  $CD$ , odčítá-li se střídavě vždy menší od většího, zbývající nikdy nedoměrují předcházejícího, dokud nezbude jednotka; pravím, že  $AB$ ,  $CD$  jsou navzájem čísla kmenná, t. j. že  $AB$ ,  $CD$  doměruje jednotka jediná.


Neboť nejsou-li  $AB$ ,  $CD$  čísla navzájem kmenná, bude je měřiti<sup>3)</sup>

<sup>2)</sup> Čtvrtí, třetinou, pětinou atd. číslo se doměruje; tedy čtvrt je díl čísla většího, rovněž  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{5}$  atd. Avšak  $\frac{3}{4}$  jsou díly čísla většího, rovněž  $\frac{4}{5}$ ,  $\frac{5}{6}$  atd.

<sup>3)</sup> Měří, doměruje, jest něčemu měrou — jsou výrazy souznačné.

nějaké číslo. Měř je a buď to  $E$ ; a  $CD$  měřic  $BF$  ostavuj menší sebe  $FA$ ,  $AF$  pak měřic  $DG$  ostavuj menší sebe  $GC$  a  $GC$  měřic  $FH$  ostavuj jednotku  $HA$ .

Ježto tedy  $E$  měří  $CD$ ,  $CD$  pak měří  $BF$ , tedy též  $E$  měří  $BF$ ; měří však též celou veličinu  $BA$ ; tedy též zbytek  $AF$  bude měřiti.  $AF$  pak měří  $DG$ ; tedy též  $E$  měří veličinu  $DG$ ; jest však měrou i celému  $DC$ ; tedy též zbytku  $CG$  bude měrou.  $CG$  však měří  $FH$ ; tedy též  $E$  bude měřiti veličinu  $FH$ ; jest však měrou též celému  $FA$ , tedy též zbývající jednotce  $AH$  bude měrou, ač je číslem; což právě nemožno. Tedy čísel  $AB$ ,  $CD$  nebude měřiti žádné číslo; pročež  $AB$ ,  $CD$  jsou čísla navzájem kmenná; což právě bylo dokázati.



## II.


Jsou-li dána dvě čísla navzájem nekmenná, najdi největší jejich společnou míru.

Danými dvěma čísly navzájem nekmennými buďtež  $AB$ ,  $CD$ ; má se tedy nalézt čísel  $AB$ ,  $CD$  největší společná míra.

Jestliže ovšem  $CD$  měří veličinu  $AB$  a je též samo sobě měrou, tedy  $CD$  je společnou měrou čísel  $CD$ ,  $AB$ , i zřejmo, že též největší, neboť žádné nad  $CD$  větší nebude čísla  $CD$  měřiti.

Pakli  $CD$  neměří čísla  $AB$ , budeme-li z čísel  $AB$ ,  $CD$  střídavě vždy menší od většího odčítati, zbude nějaké číslo, jež bude měrou předcházejícího. Jednotka zajisté nezbude, sice budou  $AB$ ,  $CD$  navzájem kmennými, což však proti podmínce. Tedy zbude nějaké číslo, jež bude měrou předcházejícího. I ostavuj  $CD$  měřic  $BE$  menší sebe  $EA$ ,  $EA$  pak měřic  $DF$  ostavuj menší sebe  $FC$ ,  $CF$  pak  $AE$  doměruj. Ježto tedy  $CF$  měří  $AE$ ,  $AE$  pak měří  $DF$ , tedy  $CF$  bude měřiti  $DF$ ; měří však i sebe, tedy též celému  $CD$  bude měrou.  $CD$  však měří  $BE$ , tedy též  $CF$  měří veličinu  $BE$ ; měří však též  $EA$ , protož i celému  $BA$  bude měrou; měří však též  $CD$ ;  $CF$  tedy měří čísla  $AB$ ,  $CD$ . Pročež  $CF$  je společnou měrou čísel  $AB$ ,  $CD$ .

Pravím ovšem, že též největší. Neboť není-li  $CF$  největší společnou měrou čísel  $AB$ ,  $CD$ , bude čísla  $AB$ ,  $CD$  měřiti číslo větší než  $CF$ . Měř je a buď jím  $G$ . A ježto  $G$  měří  $CD$ ,  $CD$  pak měří  $BE$ , tedy též  $G$  měří  $BE$ ; jest však i celému  $BA$  měrou, tedy též zbytku  $AE$  bude měrou.  $AE$  však měří  $DF$ , pročež i  $G$  bude měřiti  $DF$ ; jest však i celému  $DC$  měrou, tedy též zbytku  $CF$  bude měrou, větší menšímu; což právě nemožno. Tedy číslům  $AB$ ,  $CD$  nebude měrou žádné číslo větší než  $CF$ ; pročež  $CF$  je největší společnou měrou čísel  $AB$ ,  $CD$ .





## Důsledek.

Z toho zajisté patrné, že když číslo dvě čísla doměřuje, též největší společnou míru jejich bude doměřovati<sup>4)</sup>; což právě bylo dokázati.

## III.

Jsou-li dána tři čísla navzájem nekmenná, najdi největší jejich společnou míru.

Danými třemi čísly navzájem nekmennými buďtež  $A, B, C$ ; má se tedy číslům  $A, B, C$  naléztí největší společná míra.

Nuže za největší společnou míru čísel  $A, B$  vezměme  $D$ ;  $D$  zajisté buď měří  $C$  buď ho neměří. Měří je dříve<sup>5)</sup>; i měří též  $A, B$ .  $D$  tedy měří  $A, B, C$ , tedy  $D$  je společnou měrou čísel  $A, B, C$ . Pravím ovšem, že též největší. Neboť nemají-li  $A, B, C$  za největší společnou míru  $D$ , bude čísla  $A, B, C$  měřiti číslo větší než  $D$ . Měří je a buď jím  $E$ . Ježto tedy  $E$  měří  $A, B, C$ , tedy bude měřiti též  $A, B$ , pročez bude měřiti i největší společnou míru čísel  $A, B$  (VII. II. důsl.). Největší však společnou měrou čísel  $A, B$  jest  $D$ , tedy  $E$  jest měrou číslu  $D$ , větší menšímu; což právě nemožno. Tedy čísel  $A, B, C$  nebude doměřovati žádné číslo větší než  $D$ ; pročez  $D$  jest největší společnou měrou čísel  $A, B, C$ .

Neměří již  $D$  čísla  $C$ ; pravím nejprve, že  $C, D$  nejsou navzájem kmennými. Neboť ježto  $A, B, C$  nejsou navzájem kmennými, bude je měřiti nějaké číslo. Číslo měřící  $A, B, C$  bude zajisté též  $A, B$  měřiti, a největší míra čísel  $A, B$  bude měrou čísla  $D$ ; jest pak měrou též čísla  $C$ ; tedy čísla  $D, C$  bude měřiti nějaké číslo; pročez  $D, C$  nejsou navzájem kmennými. Vezměme tedy za největší jejich společnou míru  $F$ .<sup>6)</sup> A ježto  $F$  měří  $D, C$  pak měří  $A, B$ , tedy též  $F$  měří  $A, B$ ; jest pak měrou též čísla  $C$ ; tedy  $F$  měří  $A, B, C$ ; pročez  $F$  je společnou měrou čísel  $A, B, C$ . Pravím ovšem, že též největší. Neboť není-li  $F$  největší společnou měrou čísel  $A, B, C$ , bude čísla  $A, B, C$  měřiti číslo větší než  $F$ . Měří je a buď jím  $G$ . A ježto  $G$  měří  $A, B, C$ , měří též  $A, B$ , tedy měřiti bude též největší společnou míru čísel  $A, B$ . Největší však společná míra čísel  $A, B$  jest  $D$ ;  $G$  tedy měří  $D$ ; jest však měrou i čísla  $C$ ; pročez  $G$  měří  $D, C$ . Protož i největší společnou míru čísel  $D, C$  bude měřiti (VII II. důsl.). Největší však společná míra čísel  $D, C$  jest  $F$ ; tedy  $G$  je měrou číslu  $F$ , větší menšímu; což právě nemožno. Tedy čísel  $A, B, C$  nebude doměřovati žádné číslo větší než  $F$ ; pročez  $F$  je největší společnou měrou čísel  $A, B, C$ ; což právě bylo dokázati (naléztí).

<sup>4)</sup> To číslo bude ovšem buď stejné s největší spol. měrou buď menší.

<sup>5)</sup> Vyobrazení dbá jen případu druhého, kdež  $D$  není spolu měrou čísla  $C$ .

<sup>6)</sup> Svrchu vzato  $E$  za větší než  $D$ , což zde nemožno: označil jsem tedy společnou míru všech tří  $F$  a dále, že  $G > F$ .

## IV.

Každé číslo menší každého čísla většího jest buďto dílem buďto díly.

Dvěma čísly buďtež  $A, BC$ , a buď  $BC$  menší; pravím, že  $BC$  jest číslo  $A$  buďto dílem buďto díly.

Neboť  $A, BC$  jsou buď navzájem kmennými buď nejsou. Buďtež  $A, BC$  dříve navzájem kmennými. Rozdělíme-li tedy  $BC$  v jednotky jeho, každá zajisté jednotka z těch, kolik jich v  $BC$ , bude nějakým dílem čísla  $A$ ; pročez  $BC$  jsou díly čísla  $A$ .

Nebuďte již  $A, BC$  navzájem kmennými;  $BC$  zajisté číslu  $A$  buď jest měrou buď není. Jestliže tedy  $BC$  měří  $A$ , jest  $BC$  dílem čísla  $A$ . Pakli ne, vezměme  $D$  za největší společnou míru čísel  $A, BC$  i rozdělme  $BC$  v části  $BE, EF, FC$  stejné s  $D$ . A ježto  $D$  měří  $A$ , jest  $D$  dílem čísla  $A$ ;  $D$  však je rovno každé z částí  $BE, EF, FC$ ; tedy též každá z částí  $BE, EF, FC$  jest dílem čísla  $A$ ; pročez  $BC$  jsou díly čísla  $A$ .

Tedy každé číslo menší — —.

## V.

Když je číslo čísla dílem a jiné jiného je týmž dílem, též součet obou týmž dílem bude součtu, jakým jedno jednoho.


Nuže buď  $A$  dílem čísla  $BC$  a jiné  $D$  jiného  $EF$  týmž dílem, jakým  $A$  čísla  $BC$ ; pravím, že též  $A + D$  součtu  $BC + EF$  týmž dílem jest, jakým  $A$  čísla  $BC$ .

Neboť ježto takovým dílem, jakým jest  $A$  čísla  $BC$ , je též  $D$  čísla  $EF$ , tedy kolik jest čísel v  $BC$  stejných s  $A$ , tolik je též v  $EF$  stejných s  $D$ . Rozdělme  $BC$  v části  $BG, GC$  stejné s  $A$ ,  $EF$  pak v  $EH, HF$  stejné s  $D$ ; bude zajisté počet  $BG, GC$  stejných s počtem  $EH, HF$ . A ježto  $BG = A$  a  $EH = D$ , též  $BG + EH = A + D$ . Z téže příčiny ovšem též  $GC + HF = A + D$ . Kolik tedy v  $BC$  čísel stejných s  $A$ , tolik je též v  $(BC + EF)$  stejných s  $(A + D)$ . Jakým tedy násobkem jest  $BC$  čísla  $A$ , takovým jsou též  $BC + EF$  součtu  $A + D$ . Jakým tedy dílem čísla  $BC$  jest  $A$ , takovým jest i součet  $A + D$  součtu  $BC + EF$ ; což právě bylo dokázati.

## VI.

Když je číslo čísla díly a jiné jiného týmiž díly, též součet obou bude týmiž díly součtu, jakými jedno jednoho.

Nuže buď číslo  $AB$  díly čísla  $C$  a jiné  $DE$  jiného  $F$  týmiž díly, jakými  $AB$  čísla  $C$ ; pravím, že také součet  $AB + DE$  je týmiž díly součtu  $C + F$ , jakými  $AB$  čísla  $C$ .



Neboť ježto týmiž díly, jakými jest  $AB$  čísla  $C$ , je též  $DE$  čísla  $F$ , tedy kolik dílů čísla  $C$  jest v  $AB$ , tolik dílů čísla  $F$  je též v  $DE$ . Rozděleno buď  $AB$  v díly čísla  $C$ , totiž  $AG, GB$ , a  $DE$  v díly čísla  $F$ , totiž  $DH, HE$ ; bude zajisté počet dílů  $AG, GB$  roven počtu  $DH, HE$ . A ježto týmž dílem, jakým jest  $AG$  čísla  $C$ , je též  $DH$  čísla  $F$ , tedy jakým dílem čísla  $C$  jest  $AG$ , týmž dílem jest i součet  $AG + DH$  součtu  $C + F$  (VII. v.). Z téže příčiny ovšem, jakým dílem čísla  $C$  jest  $GB$ , i součet  $GB + HE$  je týmž dílem součtu  $C + F$ . Tedy jakými díly čísla  $C$  jest  $AB$ , týmiž díly součtu  $C + F$  jest i součet  $AB + DE$ ; což právě bylo dokázati.

## VII.

Když je číslo čísla dílem, jakým odečtené odečteného, také zbytek zbytku týmž dílem bude, jakým celek celku.

Nuže buď číslo  $AB$  dílem čísla  $CD$ , jakým odečtené  $AE$  odečteného  $CG$ ; pravím, že též zbytek  $EB$  zbytku  $FD$  týmž dílem jest, jakým celek  $AB$  celku  $CD$ .

Nuže buď číslo  $AB$  dílem čísla  $CD$ , jakým odečtené  $AE$  odečteného  $CG$ ; pravím, že též zbytek  $EB$  zbytku  $FD$  týmž dílem jest, jakým celek  $AB$  celku  $CD$ .




Společným odečteme  $CF$ , tedy zbývající  $GC = FD$ . A ježto, jakým dílem čísla  $CF$  jest  $AE$ , týmž dílem čísla  $GC$  je též  $EB$  a  $GC = FD$ , tedy jakým dílem čísla  $CF$  jest  $AE$ , týmž dílem čísla  $FD$  je též  $EB$ . Avšak jakým dílem čísla  $CF$  jest  $AE$ , týmž dílem čísla  $CD$  je též  $AB$ ; tedy též zbytek  $EB$  je týmž dílem zbytku  $FD$ , jakým celek  $AB$  celku  $CD$ ; což právě bylo dokázati.

## VIII.

Když je číslo čísla díly, jakými odečtené odečteného, také zbytek zbytku týmiž díly bude, jakými celek celku.

Nuže buď číslo  $AB$  čísla  $CD$  díly, jakými odečtené  $AE$  odečteného  $CF$ ; pravím, že i zbytek  $EB$  zbytku  $FD$  týmiž díly jest, jakými celek  $AB$  celku  $CD$ .

Nuže vezměme  $GH$  za stejné s  $AB$ . Jakými tedy díly čísla  $CD$  jest  $GH$ , týmiž díly je též  $AE$  čísla  $CF$ . Rozděleno buď  $GH$  v díly čísla  $CD$ , totiž  $GK, KH$ , a  $AE$  v díly čísla  $CF$ , totiž  $AL, LE$ ; bude zajisté počet  $GK, KH$  roven počtu  $AL, LE$ . A ježto, jakým dílem čísla  $CD$  jest  $GK$ , též  $AL$  je týmž dílem čísla  $CF$ , avšak  $CD > CF$ ; tedy též  $GK > AL$ . Budiž  $AL = GM$ . Jakým tedy dílem čísla  $CD$  jest  $GK$ , též  $GM$  je týmž dílem čísla  $CF$ ; tedy též zbytek  $MK$  je týmž dílem zbytku  $FD$ , jakým celek  $GK$  celku  $CD$  (VII. VII.).



Ježto dále, jakým dílem čísla  $CD$  jest  $KH$ , týmž dílem čísla  $CF$  je též  $EL$ , avšak  $CD > CF$ , tedy též  $HK > EL$ . Budiž  $EL = KN$ . Jakým tedy dílem čísla  $CD$  jest  $KH$ , týmž dílem čísla  $CF$  jest i  $KN$ ; pročež i zbytek  $NH$  zbytku  $FD$  týmž dílem jest, jakým celek  $KH$  celku  $CD$ . Bylo však dokázáno, že též zbytek  $MK$  je týmž dílem zbytku  $FD$ , jakým celek  $GK$  celku  $CD$ ; protož i součet  $MK + NH$  je týmiž díly čísla  $DF$ , jakými celek  $HG$  celku  $CD$ . Součet pak  $MK + NH = EB$  a  $HG = BA$ ; tedy též zbytek  $EB$  je týmiž díly zbytku  $FD$ , jakými celek  $AB$  celku  $CD$ ; což právě bylo dokázati.


## IX.

Když je číslo čísla dílem a jiné jiného je týmž dílem, také střídavě, jakým dílem nebo jakými díly jest první třetího, týmž dílem nebo týmiž díly bude též druhé čtvrtého.

Nuže buď číslo  $A$  dílem čísla  $BC$  a jiné  $D$  jiného  $EF$  týmž dílem, jakým  $A$  čísla  $BC$ ; pravím, že také střídavě, jakým dílem nebo díly čísla  $D$  jest  $A$ , týmž dílem nebo díly čísla  $EF$  je též  $BC$ .

Neboť ježto, jakým dílem čísla  $BC$  jest  $A$ , týmž dílem čísla  $EF$  je též  $D$ ; kolik tedy čísel stejných s  $A$  jest v  $BC$ , tolik stejných s  $D$  je též v  $EF$ . Rozděleno buď  $BC$  ve stejná s  $A$ , totiž  $BG, GC$ , a  $EF$  ve stejná s  $D$  totiž  $EH, HF$ ; bude zajisté počet  $BG, GC$  roven počtu  $EH, HF$ .

A ježto  $BG = GC$  a též  $EH = HF$  a počet  $BG, GC$  jest roven počtu  $EH, HF$ , tedy jakým dílem nebo díly čísla  $EH$  jest  $BG$ , týmž dílem nebo týmiž díly čísla  $HF$  jest i  $GC$ ; pročež také jakým dílem nebo díly čísla  $EH$  jest  $BG$ , týmž dílem nebo týmiž díly jest i součet  $BC$  součtu  $EF$ , (VII. v. VI.). Avšak  $BG = A$  a  $EH = D$ ; jakým tedy dílem nebo díly čísla  $D$  jest  $A$ , týmž dílem nebo týmiž díly čísla  $EF$  jest  $BC$ ; což právě bylo dokázati.




<sup>7)</sup> Neboť  $GM + MK + KN + NH = AL + LE + EB$  a  $GM = AL, KN = EL$ .

X.

Když je číslo čísla díly a jiné jiného je týmiž díly, také střídavě, jakými díly nebo dílem jest první třetího, týmiž díly nebo týmž dílem bude též druhé čtvrtého.


Nuže buď číslo  $AB$  díly čísla  $C$  a jiné  $DE$  týmiž díly čísla  $F$ ; pravím, že také střídavě, jakými díly nebo dílem čísla  $DE$  jest  $AB$ , též  $C$  je týmiž díly nebo týmž dílem čísla  $F$ .



Neboť jakými díly čísla  $C$  jest  $AB$ , ježto týmiž díly čísla  $F$  je též  $DE$ ; kolik tedy dílů čísla  $C$  jest v  $AB$ , tolik dílů čísla  $F$  je též v  $DE$ . Rozděleno buď  $AB$  v díly čísla  $C$ , totiž  $AG, GB$ , a  $DE$  v díly čísla  $F$ , totiž  $DH, HE$ ; bude zajisté počet  $AG, GB$  počtu  $DH, HE$  roven. A ježto, jakým dílem čísla  $C$  jest  $AG$ , také  $DH$  je týmž dílem čísla  $F$ , a střídavě, jakým dílem nebo díly čísla  $DH$  jest  $AG$ , týmž dílem nebo díly čísla  $F$  je též  $C$  (VII. IX.). Z téže příčiny

ovšem též, jakým dílem nebo díly čísla  $HE$  jest  $GB$ , týmž dílem nebo týmiž díly čísla  $F$  je též  $C$ ; pročez také jakými díly nebo dílem čísla  $DE$  jest  $AB$ , týmiž díly nebo týmž dílem čísla  $F$  je též  $C$ <sup>8)</sup>; což právě bylo dokázati.

XI.




Když se má odečtené k odečtenému, jako celek k celku, také zbytek bude se míti ke zbytku, jako celek k celku.

Budiž  $AB:CD = AE:CF$ ; pravím, že též  $EB:FD = AB:CD$ .

Ježto  $AB:CD = AE:CF$ , jakým tedy dílem nebo díly čísla  $CD$  jest  $AB$ , týmž dílem nebo týmiž díly čísla  $CF$  je též  $AE$ . Pročez i zbytek  $EB$  je týmž dílem nebo díly zbytku  $FD$ , jakými  $AB$  čísla  $CD$  (VII. VII. VIII.). Tedy  $EB:FD = AB:CD$ ; což právě bylo dokázati.

XII.



Když je několik čísel úměrných, bude se míti jedno z předních k jednomu ze zadních, jako součet předních k součtu zadních.

Budiž několik čísel úměrných  $A, B, C, D$ , t.  $A:B = C:D$ ; pravím, že  $A:B = (A+C):(B+D)$ .

Neboť ježto  $A:B = C:D$ , tedy jakým dílem nebo díly čísla  $B$  jest  $A$ , týmž dílem nebo díly čísla  $D$  je též  $C$ . Tedy též součet

<sup>8)</sup> Neboť též  $AG$  je týmž dílem nebo díly čísla  $DH$ , jakými  $GB$  čísla  $HE$ ; tedy (VII. v. VI.)  $AB$  je týmž dílem nebo díly čísla  $DE$ , jakými  $AG$  čísla  $DH$  nebo  $C$  čísla  $F$ .


$A+C$  je týmž dílem nebo díly součtu  $B+D$ , jakými  $A$  čísla  $B$  (VII. v. VI.). Proto  $A:B = (A+C):(B+D)$ ; což právě bylo dokázati.

XIII.

Když jsou čtyři čísla úměrná, také střídavě budou úměrná.

Budte čtyři čísla úměrná  $A, B, C, D$ , takže  $A:B = C:D$ ; pravím, že budou také střídavě úměrná, totiž  $A:C = B:D$ .


Neboť ježto  $A:B = C:D$ , tedy jakým dílem nebo díly čísla  $B$  jest  $A$ , týmž dílem nebo týmiž díly čísla  $D$  je též  $C$ . Pročez střídavě, jakým dílem nebo díly čísla  $C$  jest  $A$ , týmž dílem nebo týmiž díly čísla  $D$  jest i  $B$  (VII. x.). Tedy  $A:C = B:D$ ; což právě bylo dokázati.



XIV.

Když jest několik čísel a jiná jim počtem rovná jsouce po dvou brána také v témž poměru, též stejnořadně (V. vým. 17.) v témž poměru budou.

Budiž několik čísel  $A, B, C$  a jiná jim počtem rovná  $D, E, F$  po dvou brána jsouce buďte v témž poměru, takže  $A:B = D:E$  a  $B:C = E:F$ ; pravím, že také stejnořadně  $A:C = D:F$ .




Neboť ježto  $A:B = D:E$ , střídavě tedy  $A:D = B:E$  (VII. XIII.). Ježto dále  $B:C = E:F$ , střídavě tedy  $B:E = C:F$ . Avšak  $B:E = A:D$ ; tedy též  $A:D = C:F$  a střídavě  $A:C = D:F$ ; což právě bylo dokázati.

XV.

Když jednotka jest nějakého čísla měrou a jiné číslo je touž měrou nějakého čísla jiného, také střídavě bude jednotka touž měrou čísla třetího, jakou druhé čtvrtého.<sup>9)</sup>

Nuže buď jednotka  $A$  měrou nějakého čísla  $BC$  a jiné číslo  $D$  touž měrou nějakého čísla jiného  $EF$ ; pravím, že také střídavě jednotka  $A$  je touž měrou čísla  $D$ , jakou  $BC$  čísla  $EF$ .

Neboť ježto jednotka  $A$  je touž měrou čísla  $BC$  jakou  $D$  čísla  $EF$ , tedy kolik jednotek jest v  $BC$ , tolik čísel stejných s  $D$  je též v  $EF$ . Rozděleno buď  $BC$  ve




<sup>9)</sup> O číslech to dokázáno v VII. XIII. jednotka však dle VII. vým. 2. není číslo

své jednotky  $BG$ ,  $GH$ ,  $HC$  a  $EF$  v díly stejné s  $D$ , totiž  $EK$ ,  $KL$ ,  $LF$ . Bude zřejmé počet  $BG$ ,  $GH$ ,  $HC$  roven počtu  $EK$ ,  $KL$ ,  $LF$ . A ježto jednotky  $BG$ ,  $GH$ ,  $HC$  jsou si navzájem rovny, jsou si pak i čísla  $EK$ ,  $KL$ ,  $LF$  navzájem rovna i počet jednotek  $BG$ ,  $GH$ ,  $HC$  jest roven počtu čísel  $EK$ ,  $KL$ ,  $LF$ , bude tedy  $BG:EK=GH:KL=HC:LF$ . Bude se tedy míti též jedno z předních k jednomu ze zadních, jako součet předních k součtu zadních (VII. XII.). Pročež  $BG:EK=BC:EF$ . Avšak  $BG=A$  a  $EK=D$ ; tedy  $A:D=BC:EF$ . Jednotka  $A$  je tedy stejnou měrou čísla  $D$ , jakou  $BC$  čísla  $EF$ ; což právě bylo dokázati.

## XVI.

Když se dvě čísla navzájem znásobí a vzniknou jiná, vzniklá z nich budou si rovna.

Dvěma čísly buďtež  $A$ ,  $B$ , a buď  $A \times B = C$ ,  $B \times A = D$ ; pravím, že  $C = D$ .




Neboť ježto  $A \times B = C$ , tedy  $B$  jest měrou čísla  $C$  dle jednotek v  $A$ ; jest pak i jednotka  $E$  měrou čísla  $A$  dle jeho jednotek. Tedy jednotka  $E$  je touž měrou čísla  $A$ , jakou  $B$  čísla  $C$ . Pročež střídavě jednotka  $E$  je touž měrou čísla  $B$ , jakou  $A$  čísla  $C$ . Dále, ježto  $B \times A = D$ , tedy  $A$  jest měrou čísla  $D$  dle jednotek v  $B$ , avšak i jednotka  $E$  jest měrou čísla  $B$  dle jeho jednotek; pročež jednotka  $E$  je

stejnou měrou čísla  $B$ , jakou  $A$  čísla  $D$ . Avšak jednotka  $E$  byla stejnou měrou čísla  $B$ , jakou  $A$  čísla  $C$ ; tedy  $A$  je touž měrou čísel  $C$  i  $D$ . Pročež  $C = D$ , což právě bylo dokázati.

## XVII.

Když se číslem znásobí čísla dvě a vzniknou jiná, vzniklá z nich budou se míti k sobě jako znásobená.

Nuže znásobme číslem  $A$  dvě čísla  $B$ ,  $C$ , aby vznikla  $D$ ,  $E$ ; pravím, že  $D:E=B:C$ .



Neboť ježto znásobením čísla  $B$  číslem  $A$  vzniklo  $D$ , jest tedy  $B$  měrou čísla  $D$  dle jednotek v  $A$ . Také však jednotka  $F$  je měrou čísla  $A$  dle jeho jednotek; tedy jednotka  $F$  je touž měrou čísla  $A$ , jakou  $B$  čísla  $D$ . Pročež  $F:A=$


$B:D$ . Z téže příčiny zajisté také  $F:A=C:E$ , tedy též  $C:E=B:D$ , pročež střídavě  $D:E=B:C$ ; což právě bylo dokázati.

## XVIII.

Když se nějaké číslo znásobí dvěma čísly a vzniknou jiná, vzniklá z nich budou se míti k sobě jako ta, kterými násobeno.

Nuže násobme dvěma čísly  $A$ ,  $B$  nějaké číslo  $C$ , aby vznikla  $D$ ,  $E$ ; pravím, že  $A:B=D:E$ .


Neboť ježto znásobením čísla  $C$  číslem  $A$  vzniklo  $D$ , také tedy znásobením čísla  $A$  číslem  $C$  vznikne  $D$  (VII. XVI.). Z téže příčiny ovšem také znásobením čísla  $B$  číslem  $C$  vznikne  $E$ . Tedy znásobením čísel  $A$ ,  $B$  číslem  $C$  vznikla  $D$ ,  $E$ . Tedy  $A:B=D:E$  (VII. XVII.); což právě bylo dokázati.



## XIX.

Když jsou čtyři čísla úměrná, součin prvního a čtvrtého bude roven součinu druhého a třetího; akdyž součin prvního a čtvrtého jest roven součinu druhého a třetího, ta čtyři čísla budou úměrná.

Čtyřmi čísly úměrnými buďtež  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ,  $D$ , takže  $A:B=C:D$ , a budiž  $A \times D = E$ , a  $B \times C = F$ ; pravím, že  $E = F$ . Nuže budiž  $A \times C = G$ . Ježto tedy  $A \times C = G$  a  $A \times D = E$ , tedy znásobením čísel  $C$ ,  $D$  číslem  $A$  vznikla  $G$ ,  $E$ , pročež  $C:D=G:E$ . Avšak  $C:D=A:B$ , tedy též  $A:B=G:E$ . Dále, ježto  $A \times C = G$ , ale ovšem též  $B \times C = F$ , tedy znásobením nějakého čísla  $C$  dvěma čísly  $A$ ,  $B$  vznikla  $G$ ,  $F$ . Protož  $A:B=G:F$ . Ale ovšem též  $A:B=G:E$ , tedy též  $G:E=G:F$ . Pročež  $G$  má k oběma  $E$  i  $F$  též poměr; tedy  $E = F$ .



Buď již dále  $E = F$ ; pravím, že  $A:B=C:D$ .

Neboť po téže úpravě, ježto  $E = F$ , tedy  $G:E=G:F$ . Avšak  $G:E=C:D$  a  $G:F=A:B$ ; tedy též  $A:B=C:D$ ; což právě bylo dokázati.


## XX.

Čísla nejmenší z těch, která mají též poměr, jaký ona, jsou stejnou měrou čísel též poměr majících, větší většího jako menší menšího.

Nuže nejmenšími čísly z těch, jež mají též poměr jak  $A:B$ , buďte  $CD$ ,  $EF$ ; pravím, že  $CD$  je touž měrou čísla  $A$  jakou  $EF$  čísla  $B$ .

Neboť  $CD$  není díly čísla  $A$ . Nuže, možno-li, budiž díly; tedy též  $EF$  je týmiž díly čísla  $B$  jakými  $CD$  čísla  $A$ . Tedy kolik dílů

číslo  $A$  je v  $CD$ , tolikéž dílů čísla  $B$  jest v  $EF$ . Rozděleno buď  $CD$  v díly čísla  $A$ , totiž  $CG, GD$  a  $EF$  v díly čísla  $B$ , totiž  $EH, HF$ ; bude zajisté počet  $CG, GD$  roven počtu  $EH, HF$ . A ježto  $CG = GD$  a též  $EH = HF$  a počet  $CG, GD$  je roven počtu  $EH, HF$ , tedy  $CG : EH = GD : HF$ . Bude se tedy míti též jedno z předních k jednomu ze zadních jako součet předních k součtu zadních (VII. XII.). Pročež  $CG : EH = CD : EF$ ; tedy  $CG, EH$  mají týž poměr jako  $CD, EF$ , ač jsou jich menší; což právě není možno, neboť  $CD, EF$  jsme vzali za nejmenší z těch, jež mají týž poměr, jaký ona. Není tedy  $CD$  díly čísla  $A$ ; tedy dílem. A  $EF$  je týž dílem čísla  $B$ , jakým  $CD$  čísla  $A$ ; tedy  $CD$  je touž měrou čísla  $A$ , jakou  $EF$  čísla  $B$ ; což právě bylo dokázati.



XXI.

Číslo navzájem kmenná jsou nejmenší z těch, která mají týž poměr, jaký ona.

Čísly navzájem kmennými buďtež  $A, B$ ; pravím, že  $A, B$  jsou nejmenší z těch, která mají týž poměr, jaký ona.

Neboť nejsou-li, budou nějaká čísla, mající týž poměr jaký  $A, B$ , menší než  $A, B$ . Buďte jimi  $C, D$ .

Ježto tedy čísla nejmenší z těch, která mají týž poměr, jsou touž měrou těch, jež mají týž poměr, větší většího jako menší menšího, t. j. přední předního jako zadní zadního, tedy  $C$  jest měrou čísla  $A$  jako  $D$  čísla  $B$ . Jakou tedy měrou čísla  $A$  jest  $C$ , tolik jednotek buď v  $E$ . Proto též  $D$  jest měrou čísla  $B$  dle jednotek v  $E$ . A ježto  $C$  jest měrou čísla  $A$  dle jednotek v  $E$ , tedy též  $E$  jest měrou čísla  $A$  dle jednotek v  $C$ . Z téže příčiny ovšem  $E$  je také měrou čísla  $B$  dle jednotek v  $D$ . Tedy  $E$  jest měrou čísel  $A, B$ , ač jsou navzájem kmenná; což právě jest nemožno (VII. vým. 12.). Pročež nijaká čísla, mající týž poměr jaký  $A, B$ , nebudou menší než  $A, B$ . Tedy  $A, B$  jsou nejmenší z těch, která mají týž poměr, jaký ona; což právě bylo dokázati.

XXII.


Nejmenší čísla z těch, která mají týž poměr, jaký ona, jsou navzájem kmenná.

Nejmenšími čísly z těch, která mají týž poměr, jaký ona, buďtež  $A, B$ ; pravím, že  $A, B$  jsou navzájem kmenná.

Neboť nejsou-li navzájem kmenná, bude jim nějaké číslo měrou. Buď měrou a buď to  $C$ . A jakou měrou čísla  $A$  jest  $C$ , tolik jednotek buď v  $D$ , a jakou  $C$  čísla  $B$ , tolik jednotek buď v  $E$ .

Ježto  $C$  jest měrou čísla  $A$  dle jednotek v  $D$ , tedy bude  $C \times D = A$ . Z téže příčiny ovšem také  $C \times E = B$ .

Tedy znásobením dvou čísel  $D, E$  číslem  $C$  vzniknou  $A, B$ ; pročež  $D : E = A : B$ ; tedy  $D, E$  mají týž poměr, jaký  $A, B$ , ač jsou jich menší; což právě není možno. Pročež čísel  $A, B$  žádné číslo nebude měrou. Tedy  $A, B$  jsou navzájem kmenná; což právě bylo dokázati.




XXIII.

Když jsou dvě čísla navzájem kmenná, číslo, které jednomu z nich je měrou, druhému bude kmenným.

Dvěma čísly navzájem kmennými buďtež  $A, B$ , měrou pak čísla  $A$  buď nějaké číslo  $C$ ; pravím, že také,  $C, B$  jsou navzájem kmenná.

Neboť nejsou-li  $C, B$  navzájem kmenná, nějaké číslo bude číslům  $C, B$  měrou. Budiž měrou a buď to  $D$ . Ježto  $D$  jest měrou čísla  $C$  a  $C$  čísla  $A$ , tedy též  $D$  jest měrou čísla  $A$ . Je však měrou též čísla  $B$ ; tedy  $D$  jest měrou čísel  $A, B$ , ač jsou navzájem kmenná, což právě jest nemožno. Tedy číslům  $C, B$  žádné číslo nebude měrou. Pročež  $C, B$  jsou navzájem kmenná; což právě bylo dokázati.




XXIV.

Když jsou dvě čísla nějakému číslu kmenná, též součin jejich bude témuž číslu kmenným.


Nuže buďte dvě čísla  $A, B$  nějakému číslu  $C$  kmenná a buď  $A \times B = D$ ; pravím, že  $C, D$  jsou navzájem kmenná.

Neboť nejsou-li  $C, D$  navzájem kmenná, nějaké číslo bude číslům  $C, D$  měrou. Budiž měrou a buď to  $E$ . A ježto  $C, A$  jsou navzájem kmenná, číslu  $C$  pak jest nějaké číslo  $E$  měrou, tedy  $A, E$  jsou navzájem kmenná (VII. XXIII.). Jakou tedy měrou čísla  $D$  jest  $E$ , tolik jednotek buď v  $F$ ; tedy též  $F$  je měrou čísla  $D$  dle jednotek v  $E$ . Pročež  $E \times F = D$ . Avšak zajisté také  $A \times B = D$ ; tedy  $E \times F = A \times B$ . Když pak součin krajních čísel



roven součinu středních, ta čtyři čísla jsou úměrná (VII. XIX.), tedy  $E:A=B:F$ .  $A, E$  však jsou kmenná, kmenná pak i nejmenší; nejmenší pak čísla z těch, která mají týž poměr, jaký ona, jsou stejnou měrou čísel týž poměr majících, větší většího jako menší menšího, t. j. přední předního jako zadní zadního: tedy  $E$  jest měrou čísla  $B$ . Je však měrou i čísla  $C$ ; tedy  $E$  jest měrou čísel  $B, C$ , ač jsou navzájem kmenná, což právě nemožno. Pročež nebude číslům  $C, D$  žádné číslo měrou. Tedy  $C, D$  jsou navzájem kmenná; což právě bylo dokázati.

## XXV.



Když jsou dvě čísla navzájem kmenná, čtverec jednoho z nich bude druhému číslu kmenným.


Dvěma číslu navzájem kmennými buďtež  $A, B$  a budiž  $A^2=C$ ; pravím, že  $B, C$  jsou navzájem kmenná.

Nuže buď  $A=D$ . Ježto  $A, B$  jsou navzájem kmenná a  $A=D$ , tedy též  $D, B$  jsou navzájem kmenná. A tak  $A$  i  $D$  jsou číslu  $B$  kmenná; pročež i součin  $D \times A$  bude číslu  $B$  kmenný (VII. XXIV.). Avšak  $D \times A=C$ , tedy  $C, B$  jsou navzájem kmenná; což právě bylo dokázati.

## XXVI.

Když jsou dvě čísla jednotlivě dvěma číslům jednomu i druhému kmenná, též součiny jejich budou navzájem kmennými.

Nuže buďte čísla  $A, B$  jednotlivě dvěma číslům  $C, D$  jednomu i druhému kmenná a buď  $A \times B=E, C \times D=F$ ; pravím, že  $E, F$  jsou navzájem kmenná.



Neboť ježto  $A, B$  číslu  $C$  jsou kmenná, tedy též  $A \times B$  bude číslu  $C$  kmenným (VII. XXIV.). Avšak  $A \times B=E$ , tedy  $E, C$  jsou navzájem kmenná. Z téže příčiny ovšem též  $E, D$  jsou navzájem kmenná. Tedy jedno i druhé z čísel  $C, D$  jest číslu  $E$  kmenné. Pročež i součin  $C \times D$  bude číslu  $E$  kmenným. Avšak  $C \times D=F$ ; tedy  $E, F$  jsou čísla navzájem kmenná; což právě bylo dokázati.


## XXVII.

Když jsou dvě čísla navzájem kmenná a obě sama sebou znásobena jsouce dají čísla jiná, vzniklá z nich budou navzájem kmenná, a když počátečními znásobíme vzniklá a dají jiná, i ta budou navzájem kmenná [a tak děje se s konečnými pokaždé].<sup>10)</sup>

<sup>10)</sup> Poslední část nepochybně potvrzena.

Dvěma číslu navzájem kmennými buďtež  $A, B$  a buď  $A^2=C, A \times C=D$  a  $B^2=E, B \times E=F$ ; pravím, že jak  $C, E$  tak  $D, F$  jsou navzájem kmenná.

Neboť ježto  $A, B$  jsou navzájem kmenná a  $A^2=C$ , tedy  $C, B$  jsou navzájem kmenná (VII. XXV.). Ježto tedy  $C, B$  jsou navzájem kmenná a  $B^2=E$ , jsou tedy  $C, E$  navzájem kmenná. Dále, ježto  $A, B$  jsou navzájem kmenná a  $B^2=E$ , tedy  $A, E$  jsou navzájem kmenná. Ježto tedy dvě čísla  $A, C$  jsou dvěma číslům  $B, E$  jednotlivě jednomu i druhému kmenná, tož i součin  $A \times C$  součínu  $B \times E$  je kmenný (VII. XXVI.). I jest  $A \times C=D$  a  $B \times E=F$ . Pročež  $D, F$  jsou navzájem kmenná; což právě bylo dokázati.



## XXVIII.

Když jsou dvě čísla navzájem kmenná, též součet jejich jednomu i druhému z nich bude kmenný; a když součet jejich některému z obou je kmenný, také počáteční čísla budou navzájem kmenná.

Nuže sečtěme dvě čísla navzájem kmenná  $AB, BC$ ; pravím, že též součet  $AC$  číslům  $AB, BC$  je kmenný.

Neboť nejsou-li  $AC, AB$  navzájem kmenná, bude nějaké číslo číslům  $AC, AB$  měrou. Budiž měrou a buď to  $D$ . Ježto tedy  $D$  jest měrou čísel  $AC, AB$ , tedy bude též zbytku  $BC$  měrou. Jest pak měrou i čísla  $BA$ ; tedy  $D$  jest měrou čísel  $AB, BC$ , ač jsou navzájem kmenná, což právě nemožno. Pročež číslům  $CA, AB$  nebude měrou číslo žádné; tedy  $CA, AB$  jsou navzájem kmenná. Z téže příčiny ovšem též  $AC, CB$  jsou navzájem kmenná. Tedy  $CA$  jest oběma z čísel  $AB, BC$  kmenné.


Buďte již dále  $CA, AB$  navzájem kmenná; pravím, že též  $AB, BC$  jsou navzájem kmenná.

Neboť nejsou-li  $AB, BC$  navzájem kmenná, bude číslům  $AB, BC$  nějaké číslo měrou. Budiž měrou a buď to  $D$ . A ježto  $D$  jest měrou čísla  $AB$  i  $BC$ , tedy bude též měrou čísla  $CA$ . Jest pak měrou i čísla  $AB$ ; tedy  $D$  jest měrou čísel  $CA, AB$ , ač jsou navzájem kmenná; což právě nemožno. Pročež nebude číslům  $AB, BC$  žádné číslo měrou. Tedy  $AB, BC$  jsou navzájem kmenná; což právě bylo dokázati.

## XXIX.

Každé kmenné číslo každému číslu, jehož není měrou, jest kmenné.

Kmenným číslem buď  $A$  a nebuď měrou čísla  $B$ ; pravím, že  $B$ ,  $A$  jsou navzájem kmenná.




Neboť nejsou-li  $B$ ,  $A$  navzájem kmenná, bude jim nějaké číslo měrou. Budiž měrou  $C$ . Ježto  $C$  jest měrou čísla  $B$ , avšak  $A$  není měrou čísla  $B$ , není tedy  $C=A$ . A ježto  $C$  jest měrou čísel  $B$ ,  $A$ , tedy je též měrou čísla  $A$  jemu kmenného, ač není s ním stejné; což právě nemožno. Tedy  $A$ ,  $B$  jsou navzájem kmenná; což právě bylo dokázati.

## XXX.

Když se dvě čísla spolu znásobí a vznikne jiné a součinu z nich jest měrou nějaké číslo kmenné, také jednomu z počátečních čísel bude měrou.

Nuže buďte dvě čísla  $A$ ,  $B$  spolu znásobena a součinem buď  $C$ , číslu  $C$  pak buď měrou nějaké číslo kmenné  $D$ ; pravím, že  $D$  jest měrou jednoho z čísel  $A$ ,  $B$ .




Nuže nebuď měrou čísla  $A$ ; i jest  $D$  kmenné; tedy  $A$ ,  $D$  jsou navzájem kmenná (VII. xxix.). A jakou měrou jest  $D$  čísla  $C$ , tolik jednotek buď v  $E$ , jest  $D \times E = C$ . Avšak zajisté též  $A \times B = C$ ; tedy  $D \times E = A \times B$ . Pročež  $D : A = B : E$ .  $D$ ,  $A$  však jsou kmenná, kmenná však i nejmenší, nejmenší pak jsou touž měrou čísel též poměr majících, větší většího jako menší menšího, t. j. přední předního jako zadní zadního; tedy  $D$  jest měrou čísla  $B$ . Podobně ovšem dokážeme, když není měrou čísla  $B$ , také že bude měrou čísla  $A$ . Tedy  $D$  jest měrou jednoho z čísel  $A$ ,  $B$ ; což právě bylo dokázati

## XXXI.

Každému složenému číslu jest měrou nějaké číslo kmenné.

Číslem složeným<sup>11)</sup> buď  $A$ ; pravím, že číslu  $A$  jest měrou nějaké číslo kmenné.

Neboť ježto  $A$  je složené, bude mu nějaké číslo měrou. Budiž měrou a buď to  $B$ . A jest-li  $B$  kmenné, byl by úkol vykonán; pakli složené, bude mu nějaké číslo měrou. Budiž měrou a buď to  $C$ . A ježto  $C$  jest měrou čísla  $B$  a  $B$  čísla  $A$ , tedy  $C$  je též měrou čísla  $A$ . A jest-li  $C$  kmenné, byl by úkol vykonán; pakli složené, bude mu nějaké číslo měrou. Bude-li se ovšem dále takto uvažovati,



<sup>11)</sup> Tím rozumí se součin nejméně dvou čísel (větších než jednotka).

dojde se nějakého čísla kmenného, jež bude (předcházejícího) měrou.<sup>12)</sup> Neboť nedojde-li se ho, bude číslu  $A$  měrou nekonečný počet čísel, z nichž jedno druhého bude menší; což právě při číslech nemožno. Dojde se tedy nějakého čísla kmenného, jež bude měrou předcházejícího a též čísla  $A$ .

Tedy každému složenému číslu jest měrou nějaké číslo kmenné; což právě bylo dokázati.

## XXXII.

Každé číslo jest buď kmenné nebo má nějaké číslo kmenné měrou.

Číslem budiž  $A$ ; pravím, že  $A$  jest buď kmenné nebo má nějaké číslo kmenné měrou.

Jest-li ovšem  $A$  kmenné, byl by úkol vykonán; pakli složené, bude mu nějaké kmenné číslo měrou (xxxI.).


Tedy každé číslo jest buď kmenné nebo má nějaké číslo kmenné měrou; což právě bylo dokázati.

## XXXIII.

Dáno-li někokolik čísel, najdi nejmenší z těch, která mají též poměr, jaký ona.

Danými několika čísly buďtež  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ; mají se tedy najíti nejmenší z těch, která mají též poměr jako  $A$ ,  $B$ ,  $C$ .  $A$ ,  $B$ ,  $C$  zajisté buď jsou navzájem kmenná buď ne, Jsou-li tedy  $A$ ,  $B$ ,  $C$  navzájem kmenná, jsou to nejmenší z těch, která mají též poměr, jaký ona (VII. XXI.).

Pakli ne, vezměme  $D$  za největší společnou míru čísel  $A$ ,  $B$ ,  $C$  (VII. III.), a jakou měrou je  $D$  každému z čísel  $A$ ,  $B$ ,  $C$ , po toliká jednotkách mějtež  $E$ ,  $F$ ,  $G$ . Tedy též čísla  $E$ ,  $F$ ,  $G$  jsou jednotlivě měrami čísel  $A$ ,  $B$ ,  $C$  dle jednotek v  $D$ . Tedy  $E$ ,  $F$ ,  $G$  jsou stejnou měrou čísel  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ; pročež  $E$ ,  $F$ ,  $G$  jsou v téměř poměru jako  $A$ ,  $B$ ,  $C$ . Pravím ovšem, že jsou také nejmenší. Neboť nejsou-li  $E$ ,  $F$ ,  $G$  nejmenší z těch, která mají též poměr jako  $A$ ,  $B$ ,  $C$ , nějaká čísla menší než  $E$ ,  $F$ ,  $G$  budou mítí též poměr jako  $A$ ,  $B$ ,  $C$ . Buďte to  $H$ ,  $K$ ,  $L$ ; tedy  $H$  je stejnou měrou čísla  $A$ , jakou jednotlivě čísla  $K$ ,  $L$  číslům  $B$ ,  $C$ . A jakou měrou čísla  $A$  jest  $H$ , tolik jednotek měj  $M$ ; tedy také čísla  $K$ ,  $L$  jsou jednotlivě měrami čísel  $B$ ,  $C$  dle jednotek v  $M$ . A ježto  $H$  jest měrou čísla  $A$  dle jednotek v  $M$ , tedy  $M$  jest měrou čísla  $A$  dle jednotek v  $H$ . Z této příčiny ovšem jest  $M$  také měrou čísel  $B$ ,  $C$  jednotlivě



<sup>12)</sup> Číslo 2 patrně pokládá za kmenné, jinak byl by úkol nesprávný.

dle jednotek v  $K, L$ ; tedy  $M$  jest měrou čísel  $A, B, C$ . A ježto  $H$  jest měrou čísla  $A$  dle jednotek v  $M$ , tedy  $H \times M = A$ . Z téže příčiny ovšem též  $E \times D = A$ ; pročež  $E \times D = H \times M$ . Tedy  $E : H = M : D$ . Avšak  $E > H$ , tedy též  $M > D$  a jest měrou čísel  $A, B, C$ , což právě nemožno; neboť  $D$  vzato za největší společnou míru čísel  $A, B, C$ . Pročež nebude čísel menších než  $E, F, G$ , jež by měla týž poměr jako  $A, B, C$ . Tedy  $E, F, G$  jsou nejmenší z těch, která mají týž poměr, jaký  $A, B, C$ ; což právě bylo dokázati.

## XXXIV.

Dána-li dvě čísla, najdi číslo nejmenší, jehož jsou měrami.

Danými dvěma čísly buďtež  $A, B$ , má se tedy najíti nejmenší číslo, jehož jsou měrami.

$A, B$  jsou zajisté buď navzájem kmenná buď ne. Buďtež  $A, B$  dříve navzájem kmenná a buď  $A \times B = C$ , tedy též  $B \times A = C$ . Tedy

$A$  —————  $B$  —————

$C$  —————

—————  $D$

—————  $E$  —————  $F$

$A, B$  jsou měrami čísla  $C$ . Pravím ovšem, že  $C$  jest nejmenší. Neboť není-li tak, budou  $A, B$  měrami čísla menšího než  $C$ . Budiž to číslo  $D$ . A jakou měrou čísla  $D$  jest  $A$ , tolik jednotek buď v  $E$ , a jakou měrou čísla  $D$  jest  $B$ , tolik jednotek buď v  $F$ . Tedy  $A \times E = D$ ,  $B \times F = D$ ; pročež  $A \times E = B \times F$ . Tedy  $A : B = F : E$ .  $A, B$  však jsou kmenná, kmenná pak i nejmenší, nejmenší pak jsou stejnou měrou čísel týž poměr majících, větší většího, menší menšího; tedy  $B$  jest

měrou čísla  $E$  jakožto zadního. A ježto znásobením čísel  $B, E$  číslem  $A$  vzniknou  $C, D$ , tedy  $B : E = C : D$ . Avšak  $B$  jest měrou čísla  $E$ , jest tedy též  $C$  měrou čísla  $D$ , větší menšího, což právě nemožno. Tedy  $A, B$  nejsou měrami čísla menšího než  $C$ ; pročež  $A, B$  jsou měrami čísla  $C$ , které jest nejmenší.

Nebudte již  $A, B$  navzájem kmenná, a za nejmenší čísla z těch, která mají týž poměr jako  $A, B$ , vezměmež  $F, E$  (VII. xxxiii.); tu jest  $A \times E = B \times F$ . A budiž  $A \times E = C$ , tedy též  $B \times F = C$ ; pročež

$A$  —————  $B$  —————

—————  $F$  —————  $E$

—————  $C$

—————  $D$

—————  $G$  —————  $H$

$A, B$  jsou měrami čísla  $C$ . Pravím ovšem, že  $C$  jest nejmenší. Neboť není-li tak, budou  $A, B$  měrami nějakého čísla menšího než  $C$ ; budiž to  $D$ . A jakou měrou čísla  $D$  jest  $A$ , tolik jednotek měj  $G$ , a jakou měrou čísla  $D$  jest  $B$ , tolik jednotek měj  $H$ . Tedy  $A \times G = D$  a  $B \times H = D$ . Pročež  $A \times G = B \times H$ ; tedy  $A : B = H : G$ , avšak  $A : B = F : E$ , tedy též  $F : E = H : G$ ,  $F, E$  však jsou nejmenší, nejmenší pak jsou touž měrou těch, která mají týž poměr, větší většího a menší menšího. Pročež  $E$  je měrou čísla  $G$ .


A ježto znásobením čísel  $E, G$  číslem  $A$  vzniknou  $C, D$ , tedy  $E : G = C : D$ .  $E$  však je měrou čísla  $G$ , pročež také  $C$  je měrou čísla  $D$ , větší menšího, což právě nemožno. Tedy  $A, B$  nebudou měrami čísla menšího než  $C$ . Pročež  $A, B$  jsou měrami čísla  $C$ , které jest nejmenší; což právě bylo dokázati.

## XXXV.

Když jsou dvě čísla nějakému číslu měrami, také nejmenší číslo, jehož jsou měrou, bude rovněž onomu měrou.

Nuže buďte dvě čísla  $A, B$  měrami nějakého čísla  $CD$  i nejmenšího  $E$ ; pravím, že též  $E$  jest měrou čísla  $CD$ .

Neboť není-li  $E$  měrou čísla  $CD$ ,  $E$  doměřujíc  $DF$  ostavuj menší sebe číslo  $CF$ . A ježto  $A, B$  jsou měrami čísla  $E$ ,  $E$  pak čísla  $DF$ , tedy též  $A, B$  budou měrami čísla  $DF$ . Jsou pak měrami též celého  $CD$ , tedy budou též měrami zbývajícího čísla  $CF$ , ač jest menší než  $E$ ; což právě nemožno.<sup>13)</sup> Pročež není možno, by  $E$  nebylo měrou čísla  $CD$ ; tedy jest; což právě bylo dokázati.




## XXXVI.

Jsou-li dána tři čísla, najdi nejmenší číslo, jemuž jsou měrami.

Danými třemi čísly buďtež  $A, B, C$ ; má se tedy najíti nejmenší číslo, jemuž jsou měrami.

Nuže vezměme  $D$  za nejmenší číslo, jemuž dvě  $A, B$  jsou měrami (VII. xxxiv.).  $C$  ovšem buď jest nebo není měrou čísla  $D$ . Budiž dříve měrou; jsou pak též  $A, B$  měrami čísla  $D$ ; tedy  $A, B, C$  jsou měrami čísla  $D$ . Pravím ovšem, že je  $D$  také nejmenší. Neboť není-li tak, budou  $A, B, C$  měrami čísla menšího než  $D$ . Budiž to  $E$ . Ježto  $A, B, C$  jsou měrami čísla  $E$ , tedy též  $A, B$  jsou měrami čísla  $E$ . Pročež také nejmenší, jemuž  $A, B$  jsou měrami, bude měrou čísla  $E$ . Nejmenší pak, jemuž  $A, B$  jsou měrami, jest  $D$ ; tedy  $D$  bude měrou čísla  $E$ , větší menšího, což právě nemožno. Pročež  $A, B, C$  nebudou měrami nějakého čísla menšího než  $D$ ;  $D$  tedy jest nejmenší, jehož měrami jsou  $A, B, C$ .

Nebud' již dále  $C$  měrou čísla  $D$ , a za nejmenší číslo, jehož měrami jsou  $C, D$ , vezměme  $E$  (VII. xxxiv.). Ježto  $A, B$  jsou měrou



<sup>13)</sup> Neboť napřed položeno, že nejmenší jest  $E$ .



čísla  $D$ ,  $D$  pak čísla  $E$ , tedy též  $A$ ,  $B$  jsou měrami čísla  $E$ . Jest pak též  $C$  jeho měrou; pročez  $A$ ,  $B$ ,  $C$  jsou měrami čísla  $E$ . Pravím ovšem, že  $E$  je též nejmenší. Neboť není-li tak, budou  $A$ ,  $B$ ,  $C$  měrami nějakého čísla menšího než  $E$ . Budtež měrami čísla  $F$ . Ježto  $A$ ,  $B$ ,  $C$  jsou měrami čísla  $F$ , též  $A$ ,  $B$  jsou tedy měrami čísla  $F$ ; pročez také nejmenší, jehož  $A$ ,  $B$  jsou měrami, bude měrou čísla  $F$ . Nejmenší však, jehož měrami jsou  $A$ ,  $B$ , je  $D$ ; tedy  $D$  jest měrou čísla  $F$ . Jest pak též  $C$  měrou čísla  $F$ ; tedy  $D$ ,  $C$  jsou měrami čísla  $F$ ; pročez i nejmenší, jehož  $D$ ,  $C$  jsou měrami, bude měrou čísla  $F$ . Nejmenší však, jehož měrami jsou  $C$ ,  $D$ , jest  $E$ ; tedy  $E$  jest měrou čísla  $F$ , větší menšího, což právě nemožno. Pročez  $A$ ,  $B$ ,  $C$  nebudou měrami žádného čísla menšího než  $E$ . Tedy  $E$  jest nejmenší, jehož měrami jsou  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ; což právě bylo dokázati.

## XXXVII.

Když je číslu číslo nějaké měrou, měřené bude míti díl s měrou stejnojmenný.

Nuže buď číslu  $A$  měrou nějaké číslo  $B$ ; pravím, že má  $A$  díl s  $B$  stejnojmenný.<sup>14)</sup>

Nuže jakou měrou čísla  $A$  jest  $B$ , tolik jednotek měj  $C$ . Ježto  $B$  jest měrou čísla  $A$  dle jednotek v  $C$  a též jednotka  $D$  jest měrou čísla  $C$  dle jeho jednotek, tedy jednotka  $D$  je touž měrou čísla  $C$  jako  $B$  čísla  $A$ . Pročez střídavě jednotka  $D$  je touž měrou čísla  $B$  jako  $C$  čísla  $A$ ; jakým tedy dílem čísla  $B$  jest jednotka  $D$ , týmž dílem jest i  $C$  čísla  $A$ . Jednotka pak  $D$  jest díl čísla  $B$  s ním stejnojmenný. Tedy též  $C$  jest díl čísla  $A$  stejnojmenný s  $B$ ; pročez  $A$  má díl  $C$  stejnojmenný s  $B$ ; což právě bylo dokázati.

## XXXVIII.

Když má číslo nějaký díl, bude mu měrou číslo s dílem tím stejnojmenné.

Nuže měj číslo  $A$  nějaký díl  $B$ , a s dílem  $B$  budiž stejnojmenným  $C$ .

<sup>14)</sup> T. j. jakým dílem míry  $B$  jest jednotka, takovým dílem čísla  $A$  jest díl jeho  $C$ ;

pravím, že  $C$  jest měrou čísla  $A$ . Neboť ježto  $B$  jest díl čísla  $A$  stejnojmenný s  $C$  a též jednotka  $D$  jest díl čísla  $C$  s ním stejnojmenný, jaký tedy díl čísla  $C$  jest jednotka  $D$ , také  $B$  je týž díl čísla  $A$ ; tedy jednotka  $D$  je touž měrou čísla  $C$  jako  $B$  čísla  $A$ . Pročez střídavě jednotka  $D$  je touž měrou čísla  $B$  jako  $C$  čísla  $A$ . Tedy  $C$  jest měrou čísla  $A$ ; což právě bylo dokázati.

## XXXIX.

Najdi číslo, jež by mělo díly dané jsouc nejmenší.

Danými díly budtež  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ; má se tedy najíti číslo, jež by jsouc nejmenší mělo díly dané  $A$ ,  $B$ ,  $C$ .

Nuže mějme s díly  $A$ ,  $B$ ,  $C$  stejnojmenná čísla  $D$ ,  $E$ ,  $F$  a za číslo nejmenší, jehož měrami jsou  $D$ ,  $E$ ,  $F$ , vezměme  $G$ .

Tedy  $G$  má díly stejnojmenné s  $D$ ,  $E$ ,  $F$  (VII. xxxvii.); díly pak s  $D$ ,  $E$ ,  $F$  stejnojmenné jsou  $A$ ,  $B$ ,  $C$ . Pravím ovšem, že  $G$  je též nejmenší. Neboť není-li, bude nějaké číslo menší než  $G$ , jež bude míti díly  $A$ ,  $B$ ,  $C$ . Budiž to  $H$ . Ježto  $H$  má díly  $A$ ,  $B$ ,  $C$ , tedy číslu  $H$  budou měrami čísla stejnojmenná s díly  $A$ ,  $B$ ,  $C$  (VII. xxxviii.). S díly však  $A$ ,  $B$ ,  $C$  stejnojmenná čísla jsou  $D$ ,  $E$ ,  $F$ ; tedy číslu  $H$  jsou měrami  $D$ ,  $E$ ,  $F$ . I jest  $H$  menší než  $G$ , což právě nemožno. Nebude tedy žádného čísla menšího než  $G$ , jež by mělo za díly  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ; což právě bylo dokázati.


## Kniha osmá.

## I.

Když jest několik čísel spojitě úměrných a krajní z nich jsou navzájem kmenná, jsou nejmenší z těch, která mají týž poměr, jaký ona.

Budiž několik čísel spojitě<sup>1)</sup> úměrných  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ,  $D$  a krajní z nich  $A$ ,  $D$  buďte navzájem kmenná; pravím, že  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ,  $D$  jsou nejmenší z těch, která mají týž poměr, jaký ona.

<sup>1)</sup> Pravidlo řečené má platnost, jen když  $\epsilon\sigma\gamma\epsilon$   $\acute{\alpha}\nu\lambda\omicron\gamma\omicron\nu$  značí »spojitou« úměrnost; a tu čísla po řadě buď se zvětšují buď zmenšují. Vyobrazení vydání Heibergova tedy dle toho tuto jest opraveno.



Nuže není-li tak, menší než  $A, B, C, D$  buďtež  $E, F, G, H$ , majíce týž poměr, jaký ona. A ježto  $A, B, C, D$  mají týž poměr, jaký  $E, F, G, H$  a počet počtu jest roven, tedy stejnořadně  $A:D=E:H$ .  $A, D$  však jsou kmenná, kmenná pak i nejmenší, nejmenší však čísla jsou týmiž měrami těch, která mají týž poměr, větší většího jako menší menšího, t. j. přední předního jako zadní zadního. Jest tedy  $A$  měrou čísla  $E$ , větší menšího, což právě nemožno. Pročež  $E, F, G, H$  jsou menší než  $A, B, C, D$  nemají téhož poměru, jaký tato. Tedy  $A, B, C, D$  jsou nejmenší z těch, která mají týž poměr, jaký ona; což právě bylo dokázati.


## II.

Najdi nejmenších čísel spojitě úměrných, kolik kdo uloží, v poměru daném.

Daným poměrem v číslech nejmenších buď  $A:B^2$ ; má se tedy najíti nejmenších čísel spojitě úměrných, kolik kdo uloží, v poměru  $A:B$ .

Nuže buďtež uložena čtyři, a buď  $A \times A = C, A \times B = D$  a ještě  $B \times B = E$  a též  $A \times C = F, A \times D = G, A \times E = H$  a  $B \times E = K$ .

A ježto  $A \times A = C$  a  $A \times B = D$ , tedy  $A:B=C:D$ . Dále, ježto  $A \times B = D$  a  $B \times B = E$ , tedy násobením čísla  $B$  čísly  $A, B$  vzniknou



$D, E$ . Pročež  $A:B=D:E$ . Avšak  $A:B=C:D$ , tedy též  $C:D=D:E$ . A ježto znásobivše  $C, D$  číslem  $A$  dostali jsme  $F, G$ , tedy  $C:D=F:G$ . Bylo však  $C:D=A:B$ , tedy též  $A:B=F:G$ . Dále, ježto znásobivše  $D, E$  číslem  $A$  dostali jsme  $G, H$ , tedy  $D:E=G:H$ . Avšak  $D:E=A:B$ , tedy též  $A:B=G:H$ . A ježto znásobivše  $E$  čísly  $A, B$  dostali jsme  $H, K$ , tedy  $A:B=H:K$ . Avšak  $A:B=F:G=G:H$ , tedy též  $F:G=G:H=H:K$ . Pročež  $C, D, E$  a  $F, G, H, K$  jsou

úměrná poměrem  $A:B$ . Pravím ovšem, že jsou také nejmenší. Neboť ježto  $A, B$  jsou nejmenší z těch, která mají týž poměr, jaký ona, nejmenší pak z těch, která mají týž poměr, jsou navzájem kmenná (VII. XXII.), tedy  $A, B$  jsou navzájem kmenná. A samonásobky čísel  $A, B$  daly  $C, E$  a  $A \times C = F, B \times E = K$ , tedy  $C, E$  jsou navzájem kmenná a též  $F$  a  $K$ . A když jest několik čísel spojitě úměrných a krajní z nich jsou navzájem kmenná, jsou nejmenší z těch, která mají týž poměr, jaký ona. Tedy  $C, D, E^3$  a  $F, G, H, K$  jsou nejmenší z těch, která mají týž poměr, jaký  $A, B$ ; což právě bylo dokázati.

<sup>3)</sup> Nejsou-li nejmenší, najdeme nejmenší téhož poměru dle VII. XXXIII.

<sup>4)</sup> K číslům  $C, D, E$  přihlíží pro následující důsledek.

## Důsledek.

Z toho zajisté patrno, když tři čísla spojitě úměrná jsou nejmenší z těch, která mají týž poměr, jaký ona, že krajní z nich jsou čtvercová, pakli čtyři, krychlová<sup>4)</sup>.

## III.

Když jest několik čísel spojitě úměrných nejmenších z těch, která mají týž poměr, jaký ona, krajní z nich jsou navzájem kmenná.

Některá čísla spojitě úměrnými nejmenšími z těch, která mají týž poměr, jaký ona, buďtež  $A, B, C, D$ ; pravím, že krajní z nich  $A, D$  jsou navzájem kmenná.

Nuže vezměmež  $E, F$  za dvě nejmenší čísla poměru, jaký mají  $A, B, C, D$ , za tři pak  $G, H, K$  a po řadě o jedno více, až braný počet se vyrovná počtu  $A, B, C, D$ . Vezměmež a buďte to  $L, M, N, O$ .

A ježto  $E, F$  jsou nejmenší z těch, která mají týž poměr, jaký ona, jsou navzájem kmenná (VII. XXII.). A ježto  $E^2, F^2$  dají  $G^2, K^2$  (VIII. II.) a  $E \times G = L, F \times K = O$ , tedy též  $G, K$  a  $L, O$  jsou navzájem kmenná.



A ježto  $A, B, C, D$  jsou nejmenší z těch, která mají týž poměr, jaký ona, a též  $L, M, N, O$  jsou nejmenší téhož poměru jako  $A, B, C, D$ , a počet  $A, B, C, D$  jest roven počtu  $L, M, N, O$ , tedy čísla  $A, B, C, D$  jsou jednotlivě rovna číslům  $L, M, N, O$ ; a tak  $A=L, D=O$ . I jsou  $L, O$  navzájem kmenná; pročež také  $A, D$  jsou kmenná; což právě bylo dokázati.

## IV.

Dáno-li několik poměrů čísel nejmenšími, najdi čísla nejmenší spojitě poměrná<sup>5)</sup> dle poměrů daných.

Danými poměry v číslech nejmenších buďtež  $A:B, C:D$  a ještě  $E:F$ ; mají se tedy najíti nejmenší čísla spojitě poměrná dle poměrů  $A:B, C:D$  a ještě  $E:F$ .

Nuže za nejmenší číslo, jehož měrami jsou  $B, C$ , vezměme  $G$ . A jakou




<sup>4)</sup> Neboť v řadě  $C, D, E$  vznikla  $C, E$  z  $A^2, B^2$ , v řadě  $F, G, H, K$  vznikla  $F, K$  z  $A \times A^2$  a  $B \times B^2$ .

<sup>5)</sup> Mají se totiž najíti čísla nejmenší, která by se spojitě k sobě měla jako  $A:B:C:D, E:F$ , na př.  $v:x, x:y, y:z$ , kdež  $v:x=A:B, x:y=C:D, y:z=E:F$ . Zovu

měrou čísla  $G$  jest  $B$ , takovou buď  $A$  čísla  $H$ , a jakou  $C$  čísla  $G$ , takovou buď  $D$  čísla  $K$ .  $E$  však buď jest měrou čísla  $K$  buď není. Budiž nejprve.  $A$  jakou měrou čísla  $K$  jest  $E$ , takovou buď  $F$  čísla  $L$ .  $A$  ježto  $A$  je touž měrou čísla  $H$ , jakou  $B$  čísla  $G$ , tedy  $A : B = H : G$ .  $Z$  téže příčiny ovšem také  $C : D = G : K$  a rovněž  $E : F = K : L$ ; pročež  $H, G, K, L$  jsou spojitě poměrná dle poměrův  $A : B, C : D, E : F$ . Pravím ovšem, že také nejmenší. Nuže nejsou-li  $H, G, K, L$  spojitě poměrná nejmenší dle poměrův  $A : B, C : D, E : F$ , buďtež  $N, O, M, P$ .  $A$  ježto  $A : B = N : O$  a  $A, B$  jsou nejmenší, nejmenší pak jsou touž měrou těch, která mají týž poměr, větší většího jako menší menšího, t. j. přední předního jako zadní zadního, tedy  $B$  jest měrou čísla  $O$ ; z téže příčiny ovšem i  $C$  jest měrou čísla  $O$ ; tedy  $B, C$  jsou měrami čísla  $O$ . Proto i nejmenší, jehož měrami jsou  $B, C$ , bude měrou čísla  $O$ . Nejmenší však, jehož měrami jsou  $B, C$ , jest  $G$ ; tedy  $G$  jest měrou čísla  $O$ , větší menšího, což právě nemožno. Tedy nebude čísel nad  $H, G, K, L$  menších spojitě poměrných dle poměrův  $A : B, C : D, E : F$ .

Nebuď již  $E$  měrou čísla  $K$ , a za nejmenší číslo, jehož měrami jsou  $E, K$ , vezměmež  $M$  (vyobr. druhé).  $A$  jakou měrou čísla  $M$  jest  $K$ , takovou buď též  $H$  čísla  $N$  a  $G$  čísla  $O$ ; a jakou měrou čísla  $M$  jest  $E$ ,



takovou buď též  $F$  čísla  $P$ . Ježto  $H$  je touž měrou čísla  $N$ , jakou  $G$  čísla  $O$ , tedy  $H : G = N : O$ . Avšak  $H : G = A : B$ , proto též  $A : B = N : O$ . Z téže příčiny ovšem i  $C : D = O : M$ . Dále, ježto  $E$  je touž měrou čísla  $M$ , jakou  $F$  čísla  $P$ , tedy  $E : F = M : P$ . Pročež  $N, O, M, P$  jsou spojitě poměrná dle poměrův  $A : B, C : D, E : F$ . Pravím ovšem, že i nejmenší v poměrech  $A : B, C : D, E : F$ . Pakli ne, budou některá čísla spojitě poměrná dle poměrův  $A : B, C : D, E : F$  menší než  $N, O, M, P$ . Buďtež jimi  $Q,$

$R, S, T$ .  $A$  ježto  $Q : R = A : B$ , avšak  $A : B$  jsou nejmenší, nejmenší pak jsou týmiž měrami těch, která mají týž poměr, jaký ona, přední předního jako zadní zadního, tedy  $B$  jest měrou čísla  $R$ . Z téže příčiny ovšem i  $C$  jest měrou čísla  $R$ ; a tak  $B, C$  jsou měrami čísla  $R$ ; pročež i nejmenší, jemuž  $B, C$  jsou měrami, bude měrou čísla  $R$ . Nejmenší však, jemuž  $B, C$  jsou měrami, jest  $G$ ; tedy  $G$  jest měrou čísla  $R$ .  $A : G = R = K : S$ , pročež i  $K$  jest měrou čísla  $S$ . Jest pak též  $E$  měrou čísla  $S$ ; tedy  $E, K$  jsou měrami čísla  $S$ . Také nejmenší tedy, jemuž  $E, K$  jsou měrami, bude měrou čísla  $S$ . Nejmenší pak, jemuž  $E, K$  jsou měrami, jest  $M$ ; tedy  $M$  jest měrou čísla  $S$ , větší menšího, což právě nemožno. Pročež nebude čísel spojitě poměrných dle poměrův  $A : B, C : D, E : F$  menších než  $N, O, M, P$ ; tedy  $N, O, M, P$


řadu takových čísel »spojitě poměrnými« číslly (na rozdíl od čísel »spojitě úměrných«, což by bylo  $v : x = x : y = y : z$ ), ač je Eukl. rovněž jako spojitě úměrná jmenuje — nepřesně —  $\epsilon\sigma\eta\varsigma$  ἀνάλογον.

<sup>6)</sup> Zmenšeno na  $\frac{1}{10}$ .

jsou nejmenší spojitě poměrná dle poměrův  $A : B, C : D, E : F$ ; což právě bylo dokázati.

V.

Rovinná čísla mají k sobě poměr složený ze stran. Rovinnými čísly buďtež  $A, B$  a měj  $A$  za strany čísla  $C, D$  a  $B$  čísla  $E, F$ ; pravím, že  $A$  se má ku  $B$  poměrem složeným ze stran.<sup>7)</sup> Nuže dány-li poměry  $C : E$  a  $D : F$ , za čísla spojitě poměrná dle poměrů  $C : E, D : F$  vezměme  $G, H, K$ , takže  $C : E = G : H$  a  $D : F = H : K$ , a budiž  $D \times E = L$ .  $A$  ježto  $D \times C = A$  a  $D \times E = L$ , tedy  $C : E = A : L$ .  $A : C = E = G : H$ ; pročež i  $G : H = A : L$ . Dále, ježto  $E \times D = L$ , avšak bylo zajisté také  $E \times F = B$ , tedy  $D : F = L : B$ . Avšak  $D : F = H : K$ , pročež i  $H : K = L : B$ . Bylo pak dokázáno, že též  $G : H = A : L$ ; stejnořadně (VII. XIV.) tedy  $G : K = A : B$ .  $G$  však má se ke  $K$  poměrem složeným ze stran<sup>8)</sup>; tedy  $A$  se má ku  $B$  poměrem složeným ze stran; což právě bylo dokázati.




VI.

Když je několik čísel spojitě úměrných a první druhému není měrou, ani jiné žádné žádnému nebude měrou.

Několika čísla spojitě úměrnými buďtež  $A, B, C, D, E$  a nebuď  $A$  měrou číslu  $B$ ; pravím, že ani jiné žádné žádnému nebude měrou.


Že zajisté  $A, B, C, D, E$  po řadě navzájem se nedoměřují, patrné; neboť ani  $A$  číslu  $B$  není měrou. Pravím ovšem, že ani jiné žádné žádnému nebude měrou. Nuže, možno-li, budiž  $A$  měrou čísla  $C$ .  $A$  kolik čísel jest  $A, B, C$ , tolik za nejmenší z těch, která mají týž poměr, jaký  $A, B, C$ , vezměmež  $F, G, H$  (VII. XXXIII.).  $A$  ježto  $F, G, H$  mají týž poměr, jaký  $A, B, C$  a počet  $A, B, C$  roven počtu  $F, G, H$ , tedy stejnořadně  $A : C = F : H$ .  $A$  ježto  $A : B = F : G$  a není  $A$  měrou čísla  $B$ , tedy ani  $F$  není měrou čísla  $G$ ; pročež  $F$  není jednotka, neboť jednotka jest měrou každého čísla. I jsou  $F, H$  navzájem kmenná (VIII. III.).  $A : F = H : C$ ; není tedy ani  $A$  měrou čísla  $C$ . Podobně ovšem dokážeme, že ani jiné žádné žádnému nebude měrou; což právě bylo dokázati.



<sup>7)</sup> T. j.  $A : B = C \times D : E \times F$  neboli  $A : B = \frac{C}{E} : \frac{F}{D}$ .

<sup>8)</sup> To jde z úměr  $C : E = G : H$  a  $D : F = H : K$ .

## VI.



Když jest několik čísel spojitě úměrných a první jest měrou posledního, také druhého bude měrou.


Několika čísla spojitě úměrnými buďtež  $A, B, C, D$  a buď  $A$  měrou čísla  $D$ ; pravím, že jest  $A$  též měrou čísla  $B$ .

Neboť není-li  $A$  měrou čísla  $B$ , ani jiné žádné žádnému nebude měrou; je však  $A$  měrou čísla  $D$ . Tedy  $A$  jest měrou čísla  $B$ ; což právě bylo dokázati.

## VIII.

Když se mezi dvě čísla vejdu čísla dle spojitě úměry, kolik čísel mezi ně se vejde dle spojitě úměry, tolik se vejde dle spojitě úměry též mezi čísla (jiná) téhož poměru.

Nuže mezi dvě čísla  $A, B$  vejďtež se dle spojitě úměry čísla  $C, D$  a buď  $A:B=E:F$ ; pravím, že tolik čísel, kolik dle spojitě úměry vloženo mezi  $A$  a  $B$ , vejde se dle spojitě úměry též mezi  $E$  a  $F$ .



Nuže kolik je čísel  $A, B, C, D$ , za tolik čísel nejmenších téhož poměru, jaký mají  $A, C, D, B$ , vezměme  $G, H, K, L$ . Tedy krajní z nich  $G, L$  jsou navzájem kmenná (VIII. III.). A ježto  $A, C, D, B$  mají též poměr jako  $G, H, K, L$  a počet  $A, C, D, B$  je roven počtu  $G, H, K, L$ , tedy stejnořadně  $A:B=G:L$ ; avšak  $A:B=E:F$ ; pročez  $G:L=E:F$ .  $G, L$  však jsou kmenná, kmenná pak také nejmenší, nejmenší pak čísla jsou týmiž měrami těch, která mají též poměr, větší

větší většího jako menší menšího, t. j. přední předního jako zadní zadního. Tedy  $G$  je touž měrou čísla  $E$ , jakou  $L$  čísla  $F$ . Jakou tedy měrou čísla  $E$  jest  $G$ , takovou buď též  $H$  čísla  $M$  a  $K$  čísla  $N$ . Tedy  $G, H, K, L$  jsou týmiž měrami čísel  $E, M, N, F$ . Pročez  $G, H, K, L$  mají též poměr, jaký  $E, M, N, F$ . Avšak  $G, H, K, L$  mají též poměr, jaký  $A, C, D, B$ ; tedy též  $A, C, D, B$  mají též poměr, jaký  $E, M, N, F$ .  $A, C, D, B$  jsou však spojitě úměrná; pročez  $E, M, N, F$  jsou spojitě úměrná. Tedy kolik čísel jest vloženo mezi  $A, B$  dle spojitě úměry, tolik čísel je dle spojitě úměry vloženo mezi  $E$  a  $F$ ; což právě bylo dokázati.


## IX.

Když jsou dvě čísla navzájem kmenná a mezi ně se vejdu čísla dle spojitě úměry, kolik čísel mezi ně

se vejde dle spojitě úměry, tolik také se vejde dle spojitě úměry mezi kterékoli z obou a jednotku.

Dvěma čísly navzájem kmennými buďtež  $A, B$  a mezi ně dle spojitě úměry vložme  $C, D$  a za jednotku vezměme  $E$ ; pravím, že tolik čísel, kolik vloženo dle spojitě úměry mezi  $A$  a  $B$ , vejde se dle spojitě úměry též mezi  $A$  nebo  $B$  a jednotku.

Nuže za dvě nejmenší čísla poměru  $A, C, D, B$  vezměmež  $F, G$ , za tři pak  $H, K, L$  a vždy po řadě o jednu více, až se počet jejich vyrovná počtu  $A, C, D, B$  (dle VIII. II.). Vezměmež a buďtež to  $M, N, O, P$ . Patrně zajisté, že  $F \times F = H$ ,  $F \times H = M$  a  $G \times G = L$ ,  $G \times L = P$  (VIII. II.). A ježto  $M, N, O, P$  jsou nejmenší z těch,



která mají též poměr, jaký  $F, G$ , jsou pak též  $A, C, D, B$  nejmenší z těch, která mají též poměr, jaký  $F, G$  a počet  $M, N, O, P$  roven počtu  $A, C, D, B$ , tedy čísla  $M, N, O, P$  jsou jednotlivě číslům  $A, C, D, B$  rovna; tedy  $M=A$ ,  $P=B$ . A ježto  $F \times F = H$ , tedy  $F$  jest měrou čísla  $H$  dle jednotek v  $F$ . Jest pak jednotka  $E$  měrou čísla  $F$  dle jeho jednotek; pročez jednotka je touž měrou čísla  $F$ , jakou  $F$  čísla  $H$ , tedy  $E:F=F:H$ . Dále, ježto  $F \times H = M$ , tedy  $H$  jest měrou čísla  $M$  dle jednotek v  $F$ . Jest pak též jednotka  $E$  měrou čísla  $F$  dle jeho jednotek; pročez jednotka  $E$  je touž měrou čísla  $F$ , jakou  $H$  čísla  $M$ , tedy  $E:F=F:H=M$ . Dokázáno však bylo, že též  $E:F=F:H$ ; a tak též  $E:F=F:H=M$ . Avšak  $M=A$ ; pročez  $E:F=F:H=M$ . Z téže příčiny ovšem také  $E:G=G:L=L:B$ . Tedy kolik čísel je vloženo dle spojitě úměry mezi  $A$  a  $B$ , tolik čísel vloženo též jednotlivě mezi  $A, B$  a jednotku  $E$ ; což právě bylo dokázati.

## X.


Když se vejdu mezi některé ze dvou čísel a jednotku čísla dle spojitě úměry, kolik čísel se vejde mezi některé z nich a jednotku dle spojitě úměry, tolik se vejde dle spojitě úměry též mezi ona čísla.

Nuže mezi čísla  $A, B$  a jednotku  $C$  vejďtež se dle spojitě úměry čísla  $D, E$  a  $F, G$ ; pravím, že tolik čísel, kolik se vloží dle spojitě úměry mezi  $A$  nebo  $B$  a jednotku  $C$ , vloží se dle spojitě úměry též mezi  $A$  a  $B$ .

Nuže budiž  $D \times F = H$ ,  $D \times H = K$ ,  $F \times H = L$ .

A ježto  $C:D=D:E$ , tedy jednotka  $C$  je touž měrou čísla  $D$ , jakou  $D$  čísla  $E$ . Jednotka však  $C$  jest měrou čísla  $D$  dle jednotek v  $D$ , tedy též číslo  $D$  jest měrou čísla  $E$  dle jednotek v  $D$ ; pročez  $D \times D = E$ . Dále, ježto  $C:D=E:A$ , tedy jednotka  $C$  je touž měrou

čísla  $D$ , jakou  $E$  čísla  $A$ . Avšak jednotka  $C$  jest měrou čísla  $D$  dle jednotek v  $D$ , tedy též  $E$  jest měrou čísla  $A$  dle jednotek v  $D$ ; pročež




$D \times E = A$ . Z téže příčiny ovšem též  $F \times F = G$  a  $F \times G = B$ . A ježto  $D \times D = E$  a  $D \times F = H$ , tedy  $D : F = E : H$ . Z téže příčiny ovšem též  $D : F = H : G$ . Pročež také  $E : H = H : G$ . Dále, ježto  $D \times E = A$  a  $D \times H = K$ , tedy  $E : H = A : K$ . Avšak  $E : H = D : F$ , tedy též  $D : F = A : K$ . Dále, ježto  $D \times H = K$ ,  $F \times H = L$ , tedy  $D : F = K : L$ . Avšak  $D : F = A : K$ , pročež také  $A : K = K : L$ . Poněvadž mimo to  $F \times H = L$  a  $F \times G = B$ , tedy  $H : G = L : B$ . Avšak  $H : G = D : F$ , tedy též  $D : F = L : B$ . Bylo však dokázáno, že též  $D : F = A : K = K : L$ ; proto též  $A : K = K : L = L : B$ . Tedy  $A, K,$

$L, B$  mají se k sobě po řadě dle spojitě úměry. Kolik tedy čísel se vejde jednotlivě mezi  $A, B$  a jednotku  $C$  dle spojitě úměry, tolik se vejde dle spojitě úměry též mezi  $A$  a  $B$ ; což právě bylo dokázati.

## XI.

Dvě čísla čtvercová mají jedno zastřední úměrnou, a čtverec má se ke čtverci jako dvojmoci jejich stran.<sup>9)</sup>

Čísla čtvercovými buďtež  $A, B$ , a měj  $A$  za stranu  $C$ , a  $B$  měj  $D$ ; pravím, že  $A, B$  mají jedno číslo za střední úměrnou a že  $A : B = C^2 : D^2$ .



Nuže budiž  $C \times D = E$ . A ježto  $A$  jest číslo čtvercové a strana jeho  $C$ , tedy  $C \times C = A$ ; z téže příčiny ovšem též  $D \times D = B$ . Ježto tedy  $C \times C = A$  a  $C \times D = E$ , tedy  $C : D = A : E$ . Z téže příčiny ovšem také  $C : D = E : B$ ; proto též  $A : E = E : B$ . Tedy  $A, B$  mají jedno číslo za střední úměrnou.

Pravím již, že  $A : B = C^2 : D^2$ . Neboť ježto tři čísla  $A, E, B$  jsou (spojitou) úměrou, tedy  $A : B = A^2 : E^2$  (V. vým. 9.); avšak  $A : E = C : D$ , pročež  $A : B = C^2 : D^2$ ; což právě bylo dokázati.

## XII.


Dvě čísla krychlová mají dvě čísla za střední úměrné, a krychle má se ke krychli jako trojmoci jejich stran.

Čísla krychlovými buďtež  $A, B$ , a mějž  $A$  za stranu  $C$ , a  $B$  měj  $D$ ; pravím, že mají  $A, B$  dvě čísla střední úměrná a že  $A : B = C^3 : D^3$ .

<sup>9)</sup> Vlastně: mají k sobě poměr dvojmocně větší (διπλασιαστικὰ λόγον) než strana k straně.

Nuže buď  $C \times C = E$ ,  $C \times D = F$  a  $D \times D = G$ , jakož i  $C \times F = H$ ,  $D \times F = K$ .

A ježto  $A$  jest číslo krychlové a strana jeho  $C$  a  $C \times C = E$ , tedy  $C \times C = E$  a  $C \times E = A$ . Z téže příčiny ovšem též  $D \times D = G$  a  $D \times G = B$ . A ježto  $C \times C = E$  a  $C \times D = F$ , tedy  $C : D = E : F$ . Z téže příčiny ovšem také  $C : D = F : G$ . Dále, ježto  $C \times E = A$  a  $C \times F = H$ , tedy  $E : F = A : H$ . Avšak  $E : F = C : D$ , tedy též  $C : D = A : H$ . Dále, ježto  $C \times F = H$  a  $D \times F = K$ , tedy  $C : D = H : K$ . Dále, ježto  $D \times F = K$  a  $D \times G = B$ , tedy  $F : G = K : B$ . Avšak  $F : G = C : D$ , pročež také  $C : D = A : H = H : K = K : B$ . Tedy  $A, B$  mají dvě střední úměrné  $H, K$ .



Pravím již, že též  $A : B = C^3 : D^3$ . Neboť ježto čtyři čísla  $A, H, K, B$  jsou (spojitě) úměrná, tedy  $A : B = A^3 : H^3$  (V. vým. 10.). Avšak  $A : H = C : D$ , tedy též  $A : B = C^3 : D^3$ ; což právě bylo dokázati.


## XIII.

Když jest několik čísel spojitě úměrných a každé samo sebou znásobeno jsouc činí jiné, vzniklá z nich budou (spojitě) úměrná, a když se vzniklá znásobí počátečními a vzniknou jiná, i ta budou sama (spojitě) úměrná [a tak vždy skonečnými se stává.]

Budiž několik čísel spojitě úměrných  $A, B, C$ , takže  $A : B = B : C$ , a budiž  $A \times A = D^{10)}$ ,  $B \times B = E$ ,  $C \times C = F$ , jakož i  $A \times D = G$ ,  $B \times E = H$ ,  $C \times F = K$ ; pravím, že  $D, E, F$  i  $G, H, K$  jsou spojitě úměrná.

Nuže buď  $A \times B = L$ ,  $A \times L = M$ ,  $B \times L = N$ , a dále  $B \times C = O$ .  $B \times O = P$ ,  $C \times O = Q$ . Podobně ovšem jako svrchu (t. j. VIII. XII. dle VII. XVII. XVIII.), dokážeme,

že  $D, L, E$  a  $G, M, N, H$  jsou spojitě úměrná dle poměru  $A : B$  a rovněž  $E, O, F$  a  $H, P, Q, K$  jsou spojitě úměrná dle poměru  $B : C$ . I jest  $A : B = B : C$ ; pročež také  $D, L, E$  mají též poměr jako  $E, O, F$  a též  $G, M, N, H$  jako  $H, P, Q, K$ . A počet  $D, L, E$  je roven počtu  $E, O, F$ , počet pak  $G, M, N, H$  počtu  $H, P, Q, K$ ; stejnořadně tedy  $D : E = E : F$  a  $G : H = H : K$ ; což právě bylo dokázati.




<sup>10)</sup> Bylo nutno zmenšiti  $D, E, F, L, O$  na  $1/10$ ,  $G, H, K, M, N, P, Q$  na  $1/60$ .

## XIV.

Když je čtverec čtverci měrou, též strana straně bude měrou; a když je měrou strana straně, bude i čtverec měrou čtverci.

Čtvercovými čísly buďtež  $A, B$ , stranami pak jejich  $C, D$ , a buď  $A$  měrou čísla  $B$ ; pravím, že též  $C$  je měrou čísla  $D$ .

Nuže budiž  $C \times D = E$ , tedy  $A, E, B$  jsou spojitě úměrná (VIII. XI.) dle poměru  $C:D$ <sup>11)</sup>. A ježto  $A, E, B$  jsou spojitě úměrná a jest  $A$  měrou čísla  $B$ , tedy  $A$  je též měrou čísla  $E$  (VIII. VII.); a  $A:E = C:D$ , tedy je též  $C$  měrou čísla  $D$ .



Buď již naopak  $C$  měrou čísla  $D$ ; pravím, že též  $A$  jest měrou čísla  $B$ .

Neboť touž úpravu vykonajíce podobně dokážeme, že  $A, E, B$  jsou spojitě úměrná dle poměru  $C:D$ . A ježto

$C:D = A:E$  a  $C$  jest měrou čísla  $D$ , tedy též  $A$  jest měrou čísla  $E$ ; a  $A, E, B$  jsou spojitě úměrná; pročež také  $A$  jest měrou čísla  $B$ .


Když tedy je čtverec čtverci měrou, — — —

## XV.

Když jest měrou číslo krychlové číslu krychlovému, bude měrou i strana straně; a když strana straně jest měrou, i krychle krychli bude měrou.

Nuže budiž krychlové číslo  $A$  měrou čísla krychlového  $B$ <sup>12)</sup>, a měž  $A$  za stranu  $C, B$  pak  $D$ ; pravím, že  $C$  jest měrou strany  $D$ .

Nuže buď  $C \times C = E, D \times D = G$  a též  $C \times D = F, C \times F = H, D \times F = K$ <sup>13)</sup>. Patrně zajisté, že  $E, F, G$  a  $A, H, K, B$  jsou spojitě úměrná dle poměru  $C:D$ . A ježto  $A, H, K, B$  jsou spojitě úměrná a jest  $A$  měrou čísla  $B$ , tedy je též měrou čísla  $H$  (VIII. VII.). Též  $A:H = C:D$ ; tedy též  $C$  jest měrou čísla  $D$ .



Avšak buď již  $C$  měrou čísla  $D$ ; pravím, že bude též  $A$  měrou čísla  $B$ .

Neboť touž úpravu vykonajíce podobně zajisté dokážeme, že  $A, H, K, B$  jsou spojitě úměrná dle poměru  $C:D$ .

A ježto  $C$  jest měrou čísla  $D$  a  $C:D = A:H$ , tedy též  $A$  jest měrou čísla  $H$ ; pročež jest  $A$  též měrou čísla  $B$ ; což právě bylo dokázati.

<sup>11)</sup>  $A:E = C^2:C \times D = C:D$ ;  $E:B = C \times D:D^2 = C:D$ .

<sup>12)</sup>  $B$  v obr. myšleno buď dvojnásobným.

<sup>13)</sup> Ve vyd. Heiberg.  $K$  zaměněno písmenem jiným; opravil jsem.

## XVI.


Když není číslo čtvercové měrou číslu čtvercovému, ani strana straně nebude měrou; a když není strana straně měrou, ani čtverec čtverci měrou nebude.

Čtvercovými čísly buďtež  $A, B$ , stranami pak jejich  $C, D$ , a nebuď  $A$  měrou čísla  $B$ ; pravím, že ani  $C$  není měrou čísla  $D$ .

Neboť jest-li  $C$  měrou čísla  $D$ , bude též  $A$  měrou čísla  $B$  (VIII. XIV.); avšak  $A$  není měrou čísla  $B$ , tedy ani  $C$  nebude měrou čísla  $D$ .

Nuže nebudíž naopak  $C$  měrou čísla  $D$ ; pravím, že ani  $A$  nebude měrou čísla  $B$ .

Neboť jest-li  $A$  číslu  $B$  měrou, bude též  $C$  měrou číslu  $D$  (ib.);  $C$  však není měrou čísla  $D$ , tedy ani  $A$  nebude měrou čísla  $B$ ; což právě bylo dokázati.



## XVII.


Když není číslo krychlové měrou číslu krychlovému, ani strana straně nebude měrou; a když není strana straně měrou, ani krychle krychli měrou nebude.

Nuže nebuď krychlové číslo  $A$  měrou krychlového čísla  $B$ , a měž  $A$  za stranu  $C, B$  pak měž  $D$ ; pravím, že  $C$  nebude měrou strany  $D$ .

Neboť jest-li  $C$  měrou strany  $D$ , bude též  $A$  měrou čísla  $B$  (VIII. XV.); a však není měrou čísla  $B$ , tedy ani  $C$  není měrou strany  $D$ .

Avšak nebuď již  $C$  měrou strany  $D$ ; pravím, že ani  $A$  číslu  $B$  nebude měrou.

Neboť jest-li  $A$  číslu  $B$  měrou, také  $C$  bude měrou straně  $D$ ;  $C$  však není měrou straně  $D$ , pročež ani  $A$  nebude měrou čísla  $B$ ; což právě bylo dokázati.



## XIX.

Dvě podobná čísla rovinná<sup>14)</sup> mají jedno číslo za střední úměrnou; a roviny mají se k sobě jako dvojmoci stejnohlehlých stran.

Podobnými dvěma čísly rovinnými buďtež  $A, B$  a měž  $A$  za strany čísla  $C, D$  a  $B$  čísla  $E, F$ . A ježto podobny jsou ty roviny, jež mají úměrné strany (VII. vým. 21.), tož  $C:D = E:F$ . Pravím tedy, že  $A, B$  mají jedno číslo za střední úměrnou a že  $A:B = C^2:E^2$  nebo  $D^2:F^2$ , t. j. ve dvojmoci stejnohlehlá strana ke straně stejnohlehlé.

<sup>14)</sup> T. j. čísla plošného obsahu podobných rovin.

A ježto  $C:D=E:F$ , střídavě bude  $C:E=D:F$ . A ježto  $A$  jest rovina, strany pak její  $C, D$ , tedy  $D \times C = A$ ; z téže příčiny ovšem též  $E \times F = B$ . Tož budiž  $D \times E = G$ . A ježto  $D \times C = A$  a  $D \times E = G$ , tedy  $C:F=A:G$ . Avšak  $C:E=D:F$ ; pročez také  $D:F=A:G$ . Dále, ježto  $E \times D = G$  a  $E \times F = B$ , tedy  $D:F=G:B$ . Bylo pak dokázáno, že též  $D:F=A:G$ ; proto též  $A:G=G:B$ . Pročez  $A, G, B$  jsou spojitě úměrná. Tedy  $A, B$  mají jedno číslo za střední úměrnou.

Pravím ovšem, že též  $A:B=C^2:E^2$  nebo  $D^2:F^2$ . Neboť ježto  $A, C, B$  jsou spojitě úměrná,  $A:B=A^2:G^2$  (V. vým. 9.). Též  $A:G=C:E=D:F$ ; pročez také  $A:B=C^2:E^2=D^2:F^2$ ; což právě bylo dokázati.

## XIX.

Mezi dvě podobná čísla tělesová vejdou se dvě čísla za střední úměrné; a podobná tělesa mají se k sobě jako trojmocí stejnoolehých stran.

Podobnými dvěma tělesy buďtež  $A, B$  a měř  $A$  za strany  $C, D, E$  a  $B$  měj  $F, G, H$ . A ježto podobná tělesa jsou ta, která mají úměrné strany (VII. vým. 21.), tedy  $C:D=F:G, G:E=G:H$ ; pravím, že mezi  $A, B$  vejdou se dvě čísla za střední úměrné a že  $A:B=C^3:F^3=D^3:G^3=E^3:H^3$ .

Nuže budiž  $C \times D = K$  a  $F \times G = L$ . A ježto  $C, D$  a  $F, G$  mají stejný poměr a  $C \times D = K, F \times G = L$ , jsou  $K, L$  podobná čísla rovinná, pročez  $K, L$  mají jedno číslo za střední úměrnou (VIII. xviii.); budiž to  $M$ . Tedy  $M = D \times F$ , jak dokázáno v poučce předešlé. A ježto  $D \times C = K, D \times F = M$ , tedy  $C:F = K:M$ ; avšak  $K:M = M:L$ ; tedy  $K, M, L$  jsou spojitě

úměrná dle poměru  $C:F$ . A ježto  $C:D=F:G$ , střídavě tedy  $C:F=D:G$ . Z téže příčiny ovšem také  $D:G=E:H$ . Tedy  $K, M, L$  jsou spojitě úměrná dle poměrů  $C:F, D:G$  a  $E:H$ . Buď již  $E \times M = N, H \times M = O$ . A ježto  $A$  jest těleso a strany jeho jsou  $C, D, E$ , tedy  $E \times C \times D = A$ ; avšak  $C \times D = K$ , tedy  $E \times K = A$ . Z téže příčiny ovšem též  $H \times L = B$ . A ježto  $E \times K = A$ , ale zajisté také  $E \times M = N$ , tedy  $K:M=A:N$ . Avšak  $K:M=C:F=D:G=E:H$ ; tedy též  $C:F=D:G=E:H=A:N$ . Dále, ježto  $E \times M = N$  a  $H \times M = O$ , tedy  $E:H=N:O$ . Avšak  $E:H=C:F=D:G$ ; pročez i  $C:F=D:G=E:H=A:N=N:O$ . Dále, ježto  $H \times M = O$ , ale zajisté též  $H \times L = B$ ,

tedy  $M:L=O:B$ . Avšak  $M:L=C:F=D:G=E:H$ . Proto též  $C:F=D:G=E:H=O:B=A:N=N:O$ .

Tedy  $A, N, O, B$  jsou spojitě úměrná dle řečených poměrů stran. Pravím, že též  $A:B=C^3:F^3=D^3:G^3=E^3:H^3$ . Neboť ježto čtyři čísla  $A, N, O, B$  jsou spojitě úměrná, tedy  $A:B=A^3:N^3$  (V. vým. 10.). Avšak dokázáno, že  $A:N=C:F=D:G=E:H$ . Pročez také  $A:B=C^3:F^3=D^3:G^3=E^3:H^3$ ; což právě bylo dokázati.

## XX.

Když se mezi dvě čísla vejde jedno číslo za střední úměrnou, ta čísla budou podobné roviny.

Mezi dvě čísla  $A, B$  vejdiž se jedno číslo  $C$  za střední úměrnou; pravím, že  $A, B$  jsou podobná čísla rovinná.

Za nejmenší čísla z těch, která mají též poměr, jaký  $A:C$ , vezměme  $D, E$  (VII. xxxiii.); tedy  $D$  je touž měrou čísla  $A$ , jakou  $E$  čísla  $C$ . Jakou tedy měrou čísla  $A$  je  $D$ , tolik jednotek měj  $F$ ; pročez  $F \times D = A$ . Tedy  $A$  jest rovina a strany její  $D, F$ . Dále, ježto  $D, E$  jsou nejmenší z těch, která mají též poměr, jaký  $C:B$ , tedy  $D$  je touž měrou čísla  $C$ , jakou  $E$  čísla  $B$ . Jakou tedy měrou čísla  $B$  jest  $E$ , tolik jednotek měj  $G$ . Pročez  $E$  jest měrou čísla  $B$  dle jednotek v  $G$ ; tedy  $G \times E = B$ . Pročez  $B$  jest jest rovina a strany její jsou  $E, G$ . Tedy  $A, B$  jsou čísla rovinná.

Pravím ovšem, že také podobná. Neboť ježto  $F \times D = A$  a  $F \times E = C$ ,<sup>15)</sup> tedy  $D:E=A:C$ , t. j.  $C:B$ . Dále, ježto  $E \times F = C$  a  $E \times G = B$ , tedy  $F:G=C:B$ . Avšak  $C:B=D:E$ ; proto i  $D:E=F:G$ , a střídavě  $D:F=E:G$ . Tedy  $A, B$  jsou podobná čísla rovinná, neboť mají úměrné strany; což právě bylo dokázati.

## XXI.


Když se mezi dvě čísla vejdou čísla dvě za střední úměrné, ta čísla (počáteční) jsou podobná tělesa.

Nuže vložme mezi dvě čísla  $A, B$  čísla dvě  $C, D$  za střední úměrné; pravím, že  $A, B$  jsou podobná tělesa.

Nuže za nejmenší čísla z těch, která mají též poměr, jaký  $A, C, D$  vezměme tři  $E, F, G$ ; tedy krajní z nich  $E, G$  jsou navzájem kmenná (VIII. iii.). A ježto mezi  $E, G$  vloženo jedno za střední úměrnou  $F$ , tedy  $E, G$  jsou podobná čísla rovinná. Měj tedy  $E$  za strany  $H, K$  a  $G$  měj  $L, M$ . Tu je z předešlého patrné, že  $E, F, G$  jsou spojitě úměrná dle poměrů  $H:L$  a  $K:M$ . A ježto  $E, F, G$  jsou nejmenší z těch, která mají též poměr, jaký  $A, C, D$ , a počet  $E, F, G$

<sup>15)</sup>  $D:A=1:F=E:C$ , z toho  $F \times E = C$ .

roven počtu  $A, C, D$ , tedy stejnořadně  $E:G=A:D$ . Avšak  $E, G$  jsou kmenná, kmenná pak také nejmenší, nejmenší však jsou týmiž měrami těch, která mají týž poměr, jaký ona, větší většího jako menší menšího, t. j. přední předního jako zadní zadního; pročez  $E$  je touž měrou čísla  $A$ , jakou  $G$  čísla  $D$ . Jakou tedy měrou čísla  $A$  jest  $E$ , tolik jednotek měj  $N$ . Pročez  $N \times E = A$ . Avšak  $E = H \times K$ ; tedy  $N \times H \times K = A$ . Proto  $A$  jest těleso a strany jeho jsou  $H, K, N$ .



Dále, ježto  $E, F, G$  jsou nejmenší z těch, která mají týž poměr, jaký  $C, D, B$ , tedy  $E$  je touž měrou čísla  $C$ , jakou  $G$  čísla  $B$ . Jakou tedy měrou čísla  $C$  jest  $E$ , tolik jednotek měj  $O$ . Pročez  $G$  jest měrou čísla  $B$  dle jednotek v  $O$ ; tedy  $O \times G = B$ . Avšak

$G = L \times M$ ; a tak  $O \times L \times M = B$ ;  $B$  jest tedy těleso, a strany jeho jsou  $L, M, O$ ; pročez  $A, B$  jsou tělesa.

Pravím ovšem, že též podobná. Neboť ježto  $N \times E = A$  a  $O \times E = C$ , tedy  $N:O = A:C$ , t. j.  $E:F$ . Avšak  $E:F = H:L = K:M$ , pročez také  $H:L = K:M = N:O$ ; a  $H, K, N$  jsou strany tělesa  $A$ ;  $O, L, M$  strany tělesa  $B$ . Tedy čísla  $A, B$  jsou tělesa podobná; což právě bylo dokázati.

## XXII.

Když jsou tři čísla spojitě úměrná a první je čtverec, i třetí bude čtverec.

$A$  —————  
 $B$  —————  
 $C$  —————

Třemi čísly spojitě úměrnými buďtež  $A, B, C$ , a první  $A$  buď čtverec; pravím, že i třetí  $C$  je čtverec.

Neboť ježto mezi  $A, C$  jest jedno číslo  $B$  střední úměrnou, tedy  $A, C$  jsou podobné roviny (VIII. xx.);  $A$  však je čtverec, pročez i  $C$  je čtverec; což právě bylo dokázati.

## XXIII.

Když jsou čtyři čísla spojitě úměrná a první je krychle, i čtvrté bude krychle.

$A$  —————  
 $B$  —————  
 $C$  —————  
 $D$  —————

Čtyřmi čísly spojitě úměrnými buďtež  $A, B, C, D$ , a buď  $A$  krychlí; pravím, že též  $D$  jest krychle.

Neboť ježto mezi  $A, D$  jsou dvě čísla  $B, C$  středními úměrnými, tedy  $A, D$  jsou podobná čísla tělesová (VIII.

xxi.);  $A$  však je krychle, krychle tedy jest i  $D$ ; což právě bylo dokázati.


## XXIV.

Když se mají dvě čísla k sobě jako číslo čtvercové k číslu čtvercovému a první je čtverec, i druhé bude čtverec.

Nuže mějtež se čísla  $A, B$  k sobě jako číslo čtvercové  $C$  k číslu čtvercovému  $D$  a budiž  $A$  čtverec; pravím, že také  $B$  je čtverec.

Neboť ježto  $C, D$  jsou čtverce, tedy  $C, D$  jsou podobné roviny. Pročez se vloží mezi  $C, D$  jedno číslo za střední úměrnou (VIII. xviii.).

I jest  $C:D = A:B$ ; tedy též mezi  $A$  a  $B$  se vloží jedno číslo za střední úměrnou. I jest  $A$  čtverec; tedy též  $B$  je čtverec (VIII. xxii.); což právě bylo dokázati.




## XXV.

Když se mají dvě čísla k sobě jako číslo krychlové k číslu krychlovému a první je krychle, i druhé bude krychle.

Nuže mějtež se čísla  $A, B$  k sobě jako číslo krychlové  $C$  k číslu krychlovému  $D$  a budiž  $A$  krychlí; pravím, že i  $B$  jest krychle.

Neboť ježto  $C, D$  jsou krychle,  $C, D$  jsou podobná tělesa; tedy mezi  $C$  a  $D$  vejdou se dvě čísla za střední úměrné. A kolik se jich vejde mezi  $C$  a  $D$  dle spojitě úměry, tolik též mezi ta, která mají týž poměr, jaký ona (VIII. viii.); proto též mezi  $A$  a  $B$  vložíme dvě čísla za střední úměrné.

Vložíme  $E, F$ . Ježto tedy čtyři čísla  $A, E, F, B$  jsou spojitě úměrná,  $A$  pak jest krychle, krychle tedy též  $B$  (VIII. xxiii.); což právě bylo dokázati.




## XXVI.

Podobná čísla rovinná mají se k sobě jako číslo čtvercové k číslu čtvercovému.

Podobnými čísly rovinnými buďtež  $A, B$ ; pravím, že  $A$  se má k  $B$ , jako číslo čtvercové k číslu čtvercovému.

Neboť ježto  $A, B$  jsou podobné roviny, tedy mezi  $A, B$  vejde se jedno číslo za střední úměrnou. Vložíme a budiž to  $C$ , a za nejmenší čísla z těch, která mají týž poměr, jaký  $A, C, B$ , vezměme  $D, E, F$ ; tedy krajní z nich  $D, F$  jsou






čtvercová (VIII. II. důsl.). A ježto  $D:F=A:B$  a  $D, F$  jsou čtvercová, tedy  $A$  se má k  $B$  jako číslo čtvercové k číslu čtvercovému; což právě bylo dokázati.

## XXVII.

Podobná čísla tělesová mají se k sobě jako číslo krychlové k číslu krychlovému.



Podobnými čísly tělesovými buďtež  $A, B$ ; pravím, že  $A$  se má k  $B$  jako číslo krychlové k číslu krychlovému.

Neboť ježto  $A, B$  jsou podobná tělesa, tedy mezi  $A$  a  $B$  vejdu se dvě čísla za střední úměrné. Vložme  $C, D$  a za nejmenší čísla z těch, která mají týž poměr, jaký  $A, C, D, B$ , a jichž počet je týž, vezměme  $E, F, G, H$ ; tedy krajní z nich  $E, H$  jsou krychle (VIII. II. důsl.).  $A E:H=A:B$ . Pročež má se též  $A$  k  $B$  jako


číslo krychlové k číslu krychlovému; což právě bylo dokázati.

## Kniha devátá.

## I.

Když se dvě podobná čísla rovinná vespolek znásobí a dají nějaké číslo, vzniklé bude čtverec.

Dvěma podobnými čísly rovinnými buďtež  $A, B$ , a buď  $A \times B = C$ ; pravím, že  $C$  je čtverec.



Nuže budiž  $A \times A = D$ . Tu jest  $D$  čtverec. Ježto  $A \times A = D$  a  $A \times B = C$ , tedy  $A:B=D:C$ . A ježto  $A, B$  jsou podobná čísla rovinná, mezi  $A, B$  tedy vejde se jedno číslo za střední úměrnou (VIII. XVIII.). Když pak mezi dvě čísla se vloží čísla za střední úměrné, kolik se jich mezi ně vloží, tolik též mezi ta, jež mají týž poměr (VIII. VIII.); proto též mezi  $D, C$  vložíš jedno číslo za střední úměrnou. I jest  $D$  čtverec, pročež


i  $C$  jest čtverec (VIII. XXII.); což právě bylo dokázati.

## II.

Když se dvě čísla vespolek znásobí a dají čtverec, jsou to podobná čísla rovinná.

Dvěma čísly buďtež  $A, B$ , a buď  $A \times B = C$ ; pravím, že  $A, B$  jsou podobná čísla rovinná.

Nuže buď  $A \times A = D$ ;  $D$  jest tedy čtverec. A ježto  $A \times A = D$  a  $A \times B = C$ , tedy  $A:B=D:C$ . A ježto  $D$  je čtverec, avšak také  $C$ , tedy  $D, C$  jsou podobná čísla rovinná. Pročež mezi  $D, C$  vložíš jedno číslo za střední úměrnou.  $A D:C=A:B$ ; tedy též mezi  $A, B$  se vejde jedno číslo za střední úměrnou.



Když pak se vejde mezi dvě čísla jedno za střední úměrou, jsou to podobná čísla rovinná (VIII. xx.); tedy  $A, B$  jsou podobná čísla rovinná; což právě bylo dokázati.


## III.

Když se číslo krychlové samo sebou znásobí a dá jiné, vzniklé bude krychle.

Nuže budiž číslo krychlové  $A$  samo sebou znásobeno a dej  $B$ ; pravím, že  $B$  je krychle.

Nuže stranou čísla  $A$  buď  $C$  a  $C \times C = D$ . Tu jest patrné, že  $C \times D = A$ . A ježto  $C \times C = D$ , tedy  $C$  jest měrou čísla  $D$  dle svých jednotek. Než ovšem i jednotka jest měrou čísla  $C$  dle jeho jednotek;

pročež  $1:C=C:D$ . Dále ježto  $C \times D = A$ , tedy  $D$  jest měrou čísla  $A$  dle jednotek v  $C$ , jest pak i jednotka měrou čísla  $C$  dle jeho jednotek; tedy  $1:C=D:A$ . Avšak  $1:C=C:D$ ; pročež také  $1:C=C:D=D:A$ . Tedy mezi jednotku a číslo  $A$  vložena jsou spojitě čísla  $C, D$  za střední úměrné. Dále ježto  $A \times A = B$ , tedy  $A$  jest měrou čísla  $B$  dle svých jednotek; jest pak i jednotka měrou čísla  $A$  dle jeho jednotek; pročež  $1:A=A:B$ . A mezi jednotku a  $A$  vložena jsou dvě čísla za střední úměrné; tedy též mezi  $A, B$  se vejdu dvě čísla za střední úměrné (VIII. VIII.)<sup>1)</sup>. Když pak mezi dvě čísla se vejdu dvě čísla za střední úměrné a první je krychle, též druhé bude krychle (VIII. XXIII.). I jest  $A$  krychle, pročež i  $B$  jest krychle; což právě bylo dokázati.




## VI.

Když se číslo krychlové znásobí číslem krychlovým a vznikne jiné, vzniklé bude krychle.

Nuže znásobme krychlovým číslem  $A$  krychlové číslo  $B$  a vznikni  $C$ ; pravím, že  $C$  jest krychle.

Nuže budiž  $A \times A = D$ ;  $D$  tedy jest krychle. A ježto  $A \times A = D$  a  $A \times B =$



<sup>1)</sup> V VIII. VIII. dokázáno to vůbec o číslech, zde však první číslo jednotka!

$C$ , tedy  $A:B=D:C$ . A ježto  $A, B$  jsou krychle, jsou  $A, B$  podobná tělesa; pročež se vejdu mezi  $A, B$  dvě čísla za střední úměrné (VIII. XIX.), proto též mezi  $D$  a  $C$  se vejdu dvě čísla za střední úměrné (VIII. VIII.). A  $D$  jest krychle, tedy též  $C$  jest krychle (VIII. XXIII.); což právě bylo dokázati.

## V.

Když se číslem krychlovým znásobí nějaké číslo a vznikne krychle, též číslo znásobené bude krychle.

—————A

—————B

—————C

—————D

čísla za střední úměrné. I jest  $A$  krychle, pročež i  $B$  jest krychle; což právě bylo dokázati.

## VI.

Když se číslo samo sebou znásobí a vznikne krychle, též samo bude krychle.

Nuže buď  $A \times A$  rovno krychli  $B$ ; pravím, že též  $A$  jest krychle.

Nuže buď  $A \times B = C$ . Ježto tedy  $A \times A = B$  a  $A \times B = C$ , tedy  $C$  jest krychle. A ježto  $A \times A = B$ , tedy  $A$  jest měrou čísla  $B$  dle svých jednotek; jest však i jednotka měrou čísla  $A$  dle jeho jednotek. Proto  $1:A=A:B$ . A ježto  $A \times B = C$ , tedy  $B$  jest měrou čísla  $C$  dle jednotek v  $A$ . Jest pak i jednotka měrou čísla  $A$  dle jeho jednotek; pročež  $1:A=B:C$ . Avšak  $1:A=A:B$ , tedy  $A:B=B:C$ . A ježto  $B, C$  jsou krychle, jsou to podobná tělesa; tedy mezi  $B, C$  vejdu se dvě čísla za střední úměrné. Také  $B:C=A:B$ ;

pročež i mezi  $A, B$  se vejdu dvě čísla za střední úměrné. I jest  $B$  krychle; krychle tedy je též  $A$ <sup>2)</sup>; což právě bylo dokázati.

## VII.

Když se složeným číslem<sup>3)</sup> nějaké číslo znásobí a vznikne jiné, vzniklé bude těleso.

<sup>2)</sup> Dle VIII. XXIII.; neboť  $A:x=x:y=y:B$  možno též obrátiti takto:  $B:y=y:x=x:A$ .

<sup>3)</sup> Tím se rozumí, jak již z VII. vým. 13. poznati, nějaký součin.

Nuže znásobme složeným číslem  $A$  nějaké číslo  $B$ , a buď součinem  $C$ ; pravím, že  $C$  je těleso.

—————A

Neboť ježto  $A$  jest složené, bude mu nějaké číslo měrou. Budiž mu měrou  $D$ , a jakou měrou čísla  $A$  je  $D$ , tolik jednotek měj  $E$ . Ježto tedy  $D$  jest měrou čísla  $A$  dle jednotek v  $E$ , tedy  $E \times D = A$ . A ježto  $A \times B = C$  a  $A = D \times E$ , tedy  $D \times E \times B = C$ ; pročež  $C$  je těleso a strany jeho jsou  $D, E, B$ ; což právě bylo dokázati.

—————B

—————C

—————D      —————E

## VIII.

Když jest od jednotky počínajíc několik čísel spojitě úměrných, třetí od jednotky<sup>4)</sup> bude čtverec i dále ob číslo. čtvrté pak krychle a všecka ob dvě čísla, a sedmé krychle i spolu čtverec a dále ob pět čísel.

Budiž od jednotky počínajíc několik čísel spojitě úměrných  $A, B, C, D, E, F$ ; pravím, že od jednotky třetí, totiž  $B$ , je čtverec a všecka ob číslo, čtvrté pak  $C$  krychle a všecka ob dvě čísla, sedmé pak  $F$  krychle i spolu čtverec a všechna ob pět čísel.

Neboť ježto  $1:A=A:B$ , tedy jednotka je touž měrou čísla  $A$ , jakou  $A$  čísla  $B$ . Jednotka pak jest měrou čísla  $A$  dle jeho jednotek; též  $A$  tedy jest měrou čísla  $B$  dle jednotek v  $A$ . Pročež  $A \times A = B$ , tedy  $B$  je čtverec.

A ježto  $B, C, D$  jsou spojitě úměrná a  $B$  je čtverec, tedy je také  $D$  čtverec. Z téže příčiny ovšem též  $F$  je čtverec. Podobně zajisté dokážeme, že také všechna ob číslo jsou čtverce.

Pravím již, že také od jednotky čtvrté, totiž  $C$ , je krychle i všechna ob dvě čísla. Neboť ježto  $1:A=B:C$ , tedy jednotka je touž měrou čísla  $A$ , jakou  $B$  čísla  $C$ ; jednotka pak jest měrou čísla  $A$  dle jednotek v  $A$ ; pročež i  $B$  jest měrou čísla  $C$  dle jednotek v  $A$ . Tedy  $A \times B = C$ . Ježto tedy  $A \times A = B$  a  $A \times B = C$ , tedy  $C$  je krychle. A ježto  $C, D, E, F$  jsou spojitě úměrná a  $C$  jest krychle, tedy též  $F$  jest krychle. Bylo pak dokázáno, že také čtverec; pročež od jednotky číslo sedmé je krychle i čtverec. Podobně ovšem dokážeme, že také všechna od jednotky ob pět čísel jsou krychle i čtverce; což právě bylo dokázati.

—————A

—————B

—————C

—————D

—————E

—————F

## IX.


Když jest od jednotky počínajíc několik čísel za sebou spojitě úměrných a za jednotkou je čtverec, též

<sup>4)</sup> Všude včetně.

ostatní všechna budou čtverce; a když za jednotkou je krychle, též ostatní všechna budou krychle.

Budiž od jednotky počínajíc několik čísel  $A, B, C, D, E, F$  spojitě úměrných, a za jednotkou budiž  $A$  čtvercem; pravím, že též ostatní všechna budou čtverce.

Že ovšem třetí od jednotky, totiž  $B$ , je čtverec i všechna ob čísla, jest dokázáno (IX VIII.); pravím, že též ostatní všechna jsou čtverce. Neboť ježto  $A, B, C$  jsou spojitě úměrná a jest  $A$  čtverec, je také  $C$  čtverec. Dále, ježto  $B, C, D$  jsou spojitě úměrná a  $B$  je čtverec, také  $D$  je čtverec. Podobně ovšem dokážeme, že též ostatní všechna jsou čtverce.



Avšak buď již  $A$  krychlí; pravím, že též ostatní všechna jsou krychle.

Že ovšem od jednotky čtvrté, totiž  $C$ , je krychle i všechna ob dvě čísla, jest dokázáno (IX VIII.); pravím, že též ostatní všechna jsou krychle. Neboť ježto  $1:B=A:D$ , tedy jednotka je touž měrou čísla  $A$ , jakou  $A$  čísla  $B$ .

Jednotka však jest měrou čísla  $A$  dle jeho jednotek; tedy též  $A$  jest měrou čísla  $B$  dle svých jednotek; pročez  $A \times A = B$ . I jest  $A$  krychle; když pak se číslo krychlové samo sebou znásobí a dá jiné, vzniklé jest krychle; pročez i  $B$  jest krychle. A ježto čtyři čísla  $A, B, C, D$  jsou spojitě úměrná a jest  $A$  krychle, tedy též  $D$  jest krychle; z téže příčiny ovšem také  $E$  jest krychle a podobně ostatní všechna jsou krychle; což právě bylo dokázati.

#### X.


Když jest od jednotky počínajíc několik čísel spojitě úměrných a za jednotkou není čtverec, ani žádné jiné nebude čtverec kromě třetího od jednotky a všech ob čísla; a když za jednotkou není krychle, ani žádné jiné nebude krychle kromě čtvrtého od jednotky a všech ob dvě čísla.

Budiž od jednotky několik čísel spojitě úměrných  $A, B, C, D, E, F$  a za jednotkou nebudiž  $A$  čtverec; pravím, že ani žádné jiné nebude čtverec kromě třetího od jednotky a dále ob čísla.

Neboť možno-li, budiž  $C$  čtvercem; je však i  $B$  čtverec; tedy  $B$  se má k  $C$  jako číslo čtvercové k číslu čtvercovému. I jest  $B:C=A:D$ , tedy  $A, B$  mají se k sobě jako číslo čtvercové k číslu čtvercovému; pročez  $A, B$  jsou podobné roviny. I jest  $B$  čtverec, čtverec tedy též  $A$ , což právě proti podmince. Tedy  $C$  není čtverec. Podobně ovšem dokážeme, že ani žádné jiné není čtverec kromě třetího od jednotky a dále ob čísla.

Avšak již nebuď  $A$  krychlí; pravím, že ani žádné jiné nebude krychle kromě čtvrtého od jednotky a dále ob dvě čísla.

Neboť možno-li, budiž  $D$  krychlí. Jest pak i  $C$  krychle, neboť je čtvrté od jednotky; a jest  $C:D=B:C$ ; tedy též  $B$  má se k  $C$  jako číslo krychlové k číslu krychlovému. I jest  $C$  krychle; tedy též  $B$  je krychle. A ježto  $1:A=A:B$  a jednotka jest měrou čísla  $A$  dle jeho jednotek, tedy též  $A$  jest měrou čísla  $B$  dle svých jednotek. Pročez  $A \times A = B$ , což krychle. Když pak se znásobí číslo číslem a dá krychli, též samo bude krychle. Tedy též  $A$  jest krychle; což právě proti podmince. Pročez  $D$  není krychle. Podobně ovšem dokážeme, že ani žádné jiné není krychle kromě čtvrtého od jednotky a dále ob dvě čísla; což právě bylo dokázati.




#### XI.

Když jest od jednotky několik čísel spojitě úměrných, menší jest většího měrou dle některého z čísel úměrných, jež se tam naskytují.

Budiž od jednotky  $A$  počínajíc několik čísel spojitě úměrných  $B, C, D, E$ ; pravím, že z čísel  $B, C, D, E$  nejmenší  $B$  jest měrou čísla  $E$  dle jednoho z čísel  $C, D$ .

Neboť poněvadž  $A:B=D:E$ , jednotka  $A$  je touž měrou čísla  $B$ , jakou  $D$  čísla  $E$ . Pročez střídavě jednotka  $A$  je touž měrou čísla  $D$ , jakou  $B$  čísla  $E$ . Avšak jednotka  $A$  jest měrou čísla  $D$  dle jeho jednotek; pro i  $B$  jest měrou čísla  $E$  dle jednotek v  $D$ . Tedy menší  $B$  jest měrou většího  $E$  dle některého<sup>5)</sup> z čísel úměrných, která se tam naskytují.



#### Důsledek.

Také patrné, které místo za jednotkou má číslo měrové, že totéž místo má před měřeným i číslo, dle něhož jest měrou.


#### XII.

Když jest od jednotky několik čísel spojitě úměrných, kterákoli čísla kmenná jsou měrami posledního, táž budou měrami též čísla za jednotkou.

Budiž od jednotky kolikkoliv čísel (spojitě) úměrných, totiž  $A, B, C, D$ ; pravím, že táž čísla kmenná, která jsou měrami čísla  $D$ , budou měrami též čísla  $A$ .

<sup>5)</sup> Patrně jen dle  $D$ ; že však  $B$  číslu  $D$  jest měrou dle  $C$ , snadno se dokáže.

Nuže buď nějaké číslo kmenné  $E$  měrou čísla  $D$ ; pravím, že  $E$  jest měrou čísla  $A$ . Nuže nebuď; i jest  $E$  kmenné, každé pak číslo kmenné jest každému, jehož není měrou, kmenným; tedy  $E, A$  jsou navzájem kmenná. A ježto  $E$  jest měrou čísla  $D$ , budiž mu měrou dle  $F$ . Pročež  $E \times F = D$ . Dále, ježto  $A$  jest měrou čísla  $D$  dle jednotek v  $C$  (IX. XI. důsl.), tedy  $A \times C = D$ . Avšak zajisté též  $E \times F = D$ . Pročež  $A \times C = E \times F$ . Tedy  $A : E = F : C$ .  $A, E$  však jsou kmenná, kmenná pak také nejmenší, nejmenší pak jsou touž měrou těch, která mají též poměr, přední předního jako zadní zadního; tedy  $E$  jest měrou čísla  $C$ . Budiž mu měrou dle  $G$ . Tedy  $E \times G = C$ . Avšak zajisté dle předešlého (IX. XI. důsl.) též  $A \times B = C$ . Pročež  $A \times B = E \times G$ ; tedy  $A : E = G : B$ .  $A, E$  však jsou kmenná, kmenná pak také nejmenší, nejmenší pak jsou touž měrou těch, která mají též poměr, přední předního jako zadní zadního; tedy  $E$  jest měrou čísla  $B$ . Budiž mu měrou dle  $H$ ; pročež  $E \times H = B$ . Avšak zajisté též  $A \times A = B$ ; tedy  $E \times H = A \times A$ . Proto  $E : A = A : H$ .  $A, E$  však jsou kmenná, kmenná pak také nejmenší, nejmenší pak jsou touž měrou těch, která mají též poměr, přední předního jako zadní zadního; jest tedy  $E$  měrou čísla  $A$ , přední předního.



Avšak zajisté též není měrou; což právě nemožno. Pročež  $E, A$  nejsou navzájem kmenná; tedy složená. Složená pak mají nějaké číslo měrou. A ježto podmínkou, že  $E$  je kmenné; kmenné však nemá jiného čísla za míru leč sebe: tedy  $E$  jest měrou čísel  $A, E$ . A tak  $E$  jest měrou čísla  $A$ . Je však měrou též čísla  $D$ ; tedy  $E$  jest měrou čísel  $A, D$ . Podobně ovšem dokážeme, že táž čísla (jiná) kmenná, jež jsou měrami čísla  $D$ , budou měrami též čísla  $A$ ; což právě bylo dokázati.

## XIII.

Když jest od jednotky několik čísel spojitě úměrných a za jednotkou je kmenné, největšímu žádné nebude měrou kromě čísel úměrných, jež se tam vyskytují.

Budiž od jednotky několik čísel spojitě úměrných  $A, B, C, D$  a za jednotkou budiž  $A$  kmenné; pravím, že největšímu z nich  $D$  žádné jiné nebude měrou kromě  $A, B, C$ .

Neboť, možno-li, budiž mu měrou  $E$ , a nebuď  $E$  žádnému z čísel  $A, B, C$  rovno. Patrně zajisté, že  $E$  není kmenné; neboť jest-li  $E$  kmenné a jest měrou čísla  $D$ , bude měrou též číslu  $A$  (IX. XII.), kmennému, nejsou mu rovno; což právě jest nemožno. Pročež  $E$  není kmenné; tedy složené. Každé pak složené číslo má za míru nějaké číslo kmenné; tedy  $E$  jest měřitelné nějakým číslem kmenným. Pravím již, že mu nebude měrou žádné jiné číslo kmenné kromě  $A$ . Neboť jest-li jiné měrou čísla  $E$ ,  $E$  pak jest měrou čísla  $D$ , i ono tedy bude měrou čísla  $D$ ; pročež i číslu  $A$  bude měrou (IX. XII.), kmennému,

nejsouc mu rovno; což právě jest nemožno. Tedy  $A$  jest měrou čísla  $E$ . A ježto  $E$  jest měrou čísla  $D$ , budiž mu měrou dle  $F$ . Pravím, že  $F$  žádnému z čísel  $A, B, C$  není rovno. Neboť rovno-li  $F$  některému z čísel  $A, B, C$  a jest měrou čísla  $D$  dle  $E$ , tedy též jedno z čísel  $A, B, C$  je měrou čísla  $D$  dle  $E$ . Avšak jedno z čísel  $A, B, C$  jest měrou čísla  $D$  dle některého z čísel  $A, B, C$ ; tedy je též  $E$  některému z čísel  $A, B, C$  rovno; což proti podmínce. Pročež  $F$  není žádnému z čísel  $A, B, C$  rovno. Podobně ovšem dokážeme, že  $A$  jest měrou čísla  $F$ , dovozující opět, že  $F$  není kmenné. Neboť kmenné-li a měrou čísla  $D$ , měrou bude též číslu  $A$ , kmennému, nejsou mu rovno; což právě nemožno. Pročež  $F$  není kmenné; tedy složené. Každé však složené číslo jest nějakým číslem kmenným měřitelné; jest tedy číslu  $F$  nějaké číslo kmenné měrou. Pravím již, že jiné kmenné mu nebude měrou leč  $A$ . Neboť jest-li nějaké jiné kmenné číslu  $F$  měrou,  $F$  pak číslu  $D$ , tedy též ono (jiné) bude měrou číslu  $D$ ; pročež bude měrou i číslu  $A$ , kmennému, nejsou mu rovno; což právě nemožno. Tedy jest  $A$  měrou čísla  $F$ .


A ježto  $E$  jest měrou čísla  $D$  dle  $F$ , tedy  $E \times F = D$ . Avšak zajisté též  $A \times C = D$ ; pročež  $A \times C = E \times F$ . Tedy  $A : E = F : C$ .  $A$  však jest měrou čísla  $E$ , tedy též  $F$  jest měrou čísla  $C$ . Budiž mu měrou dle  $G$ . Podobně ovšem dokážeme, že  $G$  není rovno žádnému z čísel  $A, B$  a že  $A$  jest mu měrou. A ježto  $F$  jest měrou čísla  $C$  dle  $G$ , tedy  $F \times G = C$ ; avšak zajisté též  $A \times B = C$ ; pročež  $A \times B = F \times G$ . Tedy  $A : F = G : B$ .  $A$  však jest měrou čísla  $F$ , pročež i  $G$  jest měrou čísla  $B$ . Budiž mu měrou dle  $H$ . Podobně ovšem dokážeme, že není  $H = A$ . A ježto  $G$  jest měrou čísla  $B$  dle  $H$ , tedy  $G \times H = B$ . Avšak zajisté též  $A \times A = B$ ; pročež  $H \times G = A \times A$ . Tedy  $H : A = A : G$ .  $A$  však jest měrou čísla  $G$ ; jest tedy též  $H$  měrou čísla  $A$ , kmenného, nejsou mu rovno; což právě nesmyslné. Pročež největšímu, totiž  $D$ , jiné číslo nebude měrou kromě  $A, B, C$ ; což právě bylo dokázati<sup>6)</sup>.

## XIV.

Když jest nejmenší číslo měřitelné číslu kmennými, nebude měřitelné žádným jiným číslem kmenným kromě těch, která jsou mu měrami počátečními. Nuže buď  $A$  nejmenším číslem měřitelným kmennými číslu  $B, C, D$ ; pravím, že  $A$  nebude měřitelné žádným jiným číslem kmenným kromě  $B, C, D$ .

Neboť, možno-li buď mu měrou kmenné  $E$ , a nebudí  $E$  žádnému z čísel  $B, C, D$  rovno. A ježto  $E$  jest měrou čísla  $A$ , budiž


<sup>6)</sup> Je  $A, B, C$  jsou měrami čísla  $D$ , dokázáno v IX. XI.


 mu měrou dle  $F$ ; pročez  $E \times F = A$ .  
 I jest  $A$  měřitelné kmennými čísly  $B, C, D$ .  
 Když pak se dvě čísla spolu znásobí a čini jiné a vzniklému součinu jest měrou nějaké číslo kmenné, bude měrou i jednomu počátečnímu (VII. xxx.); tedy  $B, C, D$  jednomu z čísel  $E, F$  budou měrami. Číslo  $E$  ovšem nebudou měrami, neboť  $E$  jest kmenné a není žádnému z čísel  $B, C, D$  rovno. Tedy číslu  $F$ , menšímu než  $A$ , budou měrami; což právě nemožno. Neboť jest podmínkou, že  $A$ , měřitelné čísly  $B, C, D$ , jest nejmenší. Tedy číslu  $A$  nebude měrou číslo kmenné kromě čísel  $B, C, D$ ; což právě bylo dokázati.

## XV.

Když tři čísla spojitě úměrná jsou nejmenší z těch, která mají týž poměr, jaký ona, součet kterýchkoli dvou třetímu jest kmenný.

Třemi čísly spojitě úměrnými nejmenšími z těch, která mají týž poměr, jaký ona, buďtež  $A, B, C$ ; pravím, že součet kterýchkoli dvou z čísel  $A, B, C$  třetímu jest kmenný.  $A + B$  číslu  $C, B + C$  číslu  $A$  a též  $A + C$  číslu  $B$ .



Nuže vezměme za neimenší čísla z těch, která mají týž poměr, jaký  $A, B, C$ , dvě  $DE, EF$ <sup>7)</sup>. Patrně zajisté, že  $DE \times DE = A, DE \times EF = B$  a též  $EF \times EF = C$  (dle VIII. II.). A ježto  $DE, EF$  jsou nejmenší, jsou navzájem kmenná. Když pak jsou dvě čísla navzájem kmenná, též součet jednomu i druhému je

kmenný (VII. xxviii.); tedy též  $DF$  jednomu i druhému z čísel  $DE, EF$  je kmenné. Avšak zajisté též  $DE$  číslu  $EF$  je kmenné; tedy  $DF, DE$  jsou číslu  $EF$  kmenná. Když pak dvě čísla jsou nějakému číslu kmenná, též součin z nich je zbyvajícím kmenný (VII. xxiv.); pročez  $FD \times DE$  číslu  $EF$  je kmenné; proto též  $FD \times DE$  číslu  $EF^2$  je kmenné. Avšak  $FD \times DE = DE^2 + DE \times EF$ ; tedy  $DE^2 + DE \times EF$  číslu  $EF^2$  je kmenné. I jest  $DE^2 = A, DE \times EF = B$  a  $EF^2 = C$ . Tedy součet  $A + B$  jest číslu  $C$  kmenný. Podobně ovšem dokážeme, že také součet  $B + C$  číslu  $A$  je kmenný.

Pravím již, že též součet  $A + C$  číslu  $B$  je kmenný. Neboť ježto  $DF$  číslu  $DE$  i číslu  $EF$  je kmenné, též  $DF^2$  je součinu  $DE \times EF$  kmenné (VII. xxiv. xxv.). Avšak  $DF^2 = DE^2 + EF^2 + 2DE \times EF$ . Tedy též  $DE^2 + EF^2 + 2DE \times EF$  bude součinu  $DE \times EF$  kmenné. Odečteš-li,  $DE^2 + EF^2 + DE \times EF$  jest součinu  $DE \times EF$  kmenné;

<sup>7)</sup>  $DE, EF$  značí jen poměr  $A : B$  n.  $B : C$ , nedbajíc úměrnosti spojitě.


odečteš-li opět,  $DE^2 + EF^2$  jest součinu  $DE \times EF$  kmenné<sup>8)</sup>. I jest  $DE^2 = A, DE \times EF = B$  a  $EF^2 = C$ . Tedy součet  $A + C$  číslu  $B$  jest kmenný; což právě bylo dokázati.

## XVI.

Když jsou dvě čísla navzájem kmenná, jako se má první k druhému, tak nebude se míti druhé k žádnému jinému.

Nuže buďte dvě čísla  $A, B$  navzájem kmenná; pravím, že tak, jako  $A$  k  $B$ , nemá se  $B$  k žádnému jinému.

Nuže, možno-li, měj se  $A : B = B : C$ . Avšak  $A, B$  jsou kmenná, kmenná pak také nejmenší, nejmenší pak čísla jsou týmiž měrami těch, která mají týž poměr, přední předního jako zadní zadního; tedy  $A$  jest měrou číslu  $B$  (na třetímu místě), přední předního. Jest pak měrou i sobě; pročez  $A$  jest měrou číslům  $A, B$ , ač jsou navzájem kmenná; což právě nesmyslné. Tedy nebude se míti  $A : B = B : C$ ; což právě bylo dokázati.




## XVII.

Když jest kolikkolivěk čísel spojitě úměrných a krajní z nich jsou navzájem kmenná, jako se má první k druhému, tak nebude se míti poslední k žádnému jinému.

Budiž kolikkolivěk čísel spojitě úměrných,  $A, B, C, D$ , a krajní z nich  $A, D$  buďte navzájem kmenná; pravím, že tak, jako  $A$  k  $B$ , nemá se  $D$  k žádnému jinému.

Nuže, možno-li, měj se  $A : B = D : E$ ; střídavě tedy  $A : D = B : E$ . Avšak  $A, D$  jsou kmenná, kmenná pak také nejmenší, nejmenší pak čísla jsou týmiž měrami těch, která mají týž poměr, přední předního jako zadní zadního. Tedy  $A$  jest měrou čísla  $B$ . I má se  $A : B = B : C$ ; pročez i  $B$  jest měrou čísla  $C$ ; a tak též  $A$  jest měrou čísla  $C$ . A ježto  $B : C = C : D$ ,  $B$  pak jest měrou čísla  $C$ , jest tedy též  $C$  měrou čísla  $D$ . Avšak  $A$  bylo měrou čísla  $C$ , tedy  $A$  jest také měrou čísla  $D$ . Jest pak měrou i sobě samému. Pročez  $A$  jest měrou čísel  $A, D$ , ač jsou navzájem kmenná; což právě není možno. Tedy nebude se míti  $D$  k žádnému jinému číslu tak jako  $A$  k  $B$ ; což právě bylo dokázati.



<sup>8)</sup> Budiž  $DE^2 + EF^2 = M, DE \times EF = N$  a  $M + N = O$ ; součet  $O + N$  jest číslu  $N$  kmenný; tedy dle VII. xxviii. též  $O$  neboli  $M + N$  jest číslu  $N$  kmenné. A jestli  $M + N$  číslu  $N$  kmenné, též  $M$  je kmenné číslu  $N$ .

## XVIII.

Dána-li dvě čísla, vyšetři, možno-li k nim najítí třetí úměrné.

Danými dvěma čísly buďtež  $A, B$ , a budiž úkolem vyšetřiti, možno-li k nim najítí třetí úměrné.

$A, B$  tedy buď jsou navzájem kmenná buď nikoliv. A jsou-li navzájem kmenná, dokázáno jest, že není možno k nim najítí třetího úměrného (IX. xvi.).

—————A      —————B

—————C

—————D

Nuže nebuďte již  $A, B$  navzájem kmenná, a budiž  $B \times B = C$ . Tu  $A$  buď jest měrou čísla  $C$  buď není. Budiž mu nejprve měrou dle  $D$ ; pročez  $A \times D = C$ . Avšak zajisté i  $B^2 = C$ ; tedy  $A \times D = B^2$ . Proto  $A : B = B : D$ ; tedy k číslům  $A, B$  nalezeno třetí úměrné  $D$ .

Nuže nebuď již  $A$  měrou čísla  $C$ ; pravím, že není možno číslům  $A, B$  najítí třetího úměrného. Neboť možno-li, budiž nalezeno  $D$ . Tedy  $A \times D = B^2$ . Avšak  $B^2 = C$ ; tedy  $A \times D = C$ ; a tak znásobivše  $D$  číslem  $A$  dostali jsme  $C$ ; tedy  $A$  jest měrou čísla  $C$  dle  $D$ . Avšak podmínkou zajisté, že též není měrou; což právě nesmyslné. Pročez není možno číslům  $A, B$  najítí třetího úměrného, když  $A$  není měrou čísla  $C$ ; což právě bylo dokázati.

## XIX.

Dána-li tři čísla, vyšetři, kdy jest možno k nim najítí čtvrté úměrné.

Danými třemi čísly buďtež  $A, B, C$ , a budiž úkolem vyšetřiti, kdy jest možno k nim najítí čtvrté úměrné.

—————A

—————B

—————C

—————D

—————E

Buď zajisté nejsou spojitě úměrná a krajní z nich jsou navzájem kmenná, buď jsou spojitě úměrná a krajní z nich nejsou navzájem kmenná, buď ani nejsou spojitě úměrná ani nejsou krajní z nich navzájem kmenná, buď jsou i spojitě úměrná i krajní z nich navzájem kmenná. Jsou-li tedy  $A, B, C$  spojitě úměrná a krajní z nich  $A, C$  navzájem kmenná, dokázáno jest, že není možno k nim najítí čtvrtého čísla úměrného (IX. xvii.).

Nebuďte již  $A, B, C$  spojitě úměrná, krajní však buďtež opět navzájem kmenná; pravím, že i takto jest nemožno k nim najítí čtvrté úměrné<sup>9)</sup>. Nuže, možno-li, nalezeno buď  $D$ , tak aby se mělo  $A : B =$

<sup>9)</sup> Nesprávné; viz pozn. <sup>11)</sup>.

$C : D$ , a učiňme, aby bylo  $B : C = D : E$ <sup>10)</sup>. A ježto  $A : B = C : D$  a  $B : C = D : E$ , stejnořadně tedy  $A : C = C : E$ .  $A, C$  však jsou kmenná, kmenná pak i nejmenší, nejmenší pak jsou týmiž měrami těch, která mají týž poměr, přední předního jako zadní zadního; tedy  $A$  jest měrou číslu  $C$  (na třetím místě), přední přednímu, je však měrou i sobě samému. Pročez  $A$  jest měrou čísel  $A, C$ , ač jsou navzájem kmenná; což právě jest nemožno. Tedy k číslům  $A, B, C$  není možno najítí čtvrtého úměrného<sup>11)</sup>.

Avšak buďte již  $A, B, C$  opět spojitě úměrná,  $A, C$  však nebuďte navzájem kmenná; pravím, že jest možno k nim najítí čtvrté úměrné. Nuže budiž  $B \times C = D$ . Tedy  $A$  buď jest měrou čísla  $D$  buď není. Budiž mu nejprv měrou dle  $E$ ; pročez  $A \times E = D$ . Avšak zajisté také  $B \times C = D$ ; tedy  $A \times E = B \times C$ . Pročez  $A : B = C : E$ ; tedy k číslům  $A, B, C$  nalezeno jest  $E$  za čtvrté úměrné. — Avšak již nebuď  $A$  měrou čísla  $D$ ; pravím, že jest nemožno k číslům  $A, B, C$  najítí čtvrté úměrné. Nuže, možno-li, nalezeno buď  $E$ ; tedy  $A \times E = B \times C$ ; avšak  $B \times C = D$ , pročez i  $A \times E = D$ . Tedy  $A \times E = D$ ; pročez  $A$  jest měrou čísla  $D$  dle  $E$ ; a tak jest  $A$  měrou čísla  $D$ . Avšak též není měrou; což právě nesmyslné. Tedy není možno k číslům  $A, B, C$  najítí čtvrtého úměrného, když  $A$  není měrou čísla  $D$ .

Avšak již ani nebuďtež  $A, B, C$  spojitě úměrná ani krajní navzájem kmenná. I buď  $B \times C = D$ . Podobně se ovšem dokáže, jest-li  $A$  měrou čísla  $D$ , že možno k nim najítí úměrné; pakli není měrou, že nemožno; což právě bylo dokázati<sup>12)</sup>.

## XX.

Kmenných čísel jest více než jakékoli dané množství kmenných čísel.

Danými čísly kmennými buďtež  $A, B, C$ ; pravím, že jest více kmenných čísel než  $A, B, C$ .


Nuže vezměme v úvahu nejmenší číslo, jehož měrami jsou  $A, B, C$ , a budiž to  $DE$  a přičtème k  $DE$  jednotku  $DF$ .  $EF$  tedy buď je kmenné buď není. Budiž dříve kmenné; jsou tedy nalezena čísla kmenná  $A, B, C, EF$ , počtem více než  $A, B, C$ .

<sup>10)</sup> Jak to možno?

<sup>11)</sup> Že to chybné, ukáže již jediný příklad. Mějme čísla 3, 6, 8, která nejsou spojitě úměrná, ale krajní z nich 3 a 8 jsou navzájem kmenná. Čtvrté číslo úměrné jest 16, t. j.  $\frac{6 \times 8}{3}$ . Dle způsobu Eukleidova bylo by správné asi toto: Nebuďte již  $A, B, C$  spojitě

úměrná, krajní však opět buďte navzájem kmenná. Nuže buď  $B \times C = D$ . A tu  $A$  buď jest měrou čísla  $D$  buď není. Budiž nejprve měrou dle  $E$ . Pročez  $A \times E = D$ ; také však  $B \times C = D$ , tedy  $A \times E = B \times C$ ; pročez  $A : B = C : E$ . Tedy k číslům  $A, B, C$  nalezeno jest  $E$  za čtvrté úměrné. — Avšak již nebuď  $A$  měrou čísla  $D$ ; pravím, že jest nemožno k číslům  $A, B, C$  najítí čtvrté úměrné. — — Dále jako v druhé části odstavce následujícího.

<sup>12)</sup> Když jsou tedy  $A, B, C$  spojitě úměrná a spolu krajní navzájem kmenná, nemožno najítí čtvrté úměrné; v ostatních případech možno, jest-li  $A$  měrou čísla  $D$ ; pakli není, nemožno.




Avšak již nebuď  $EF$  kmenné; tedy jest mu nějaké číslo kmenné měrou. Budiž mu měrou kmenné  $G$ ; pravím, že  $G$  není rovno žádnému z čísel  $A, B, C$ . Nuže, možno-li, budiž rovno. Avšak  $A, B, C$  jsou měrami čísla  $DE$ ; tedy též  $G$  bude měrou čísla  $DE$ . Jest pak měrou i čísla  $EF$ ; také zbývající jednotky  $DF$  měrou bude  $G$ , ač jest číslo; což právě nesmyslné. Tedy  $G$  není rovno žádnému z čísel  $A, B, C$ . A bylo vzato za kmenné.

Tedy jest nalezeno více kmenných než dané množství  $A, B, C$ , totiž  $A, B, C, G$ ; což právě bylo dokázati.

## XXI.

Když se několik čísel sudých sečte, celek je sudý. Nuže budiž sečteno několik čísel sudých,  $AB, BC, CD, DE$ ; pravím, že celek  $AE$  jest sudý.




Neboť ježto každé z čísel  $AB, BC, CD, DE$  jest sudé, má za díl polovinu; pročež i celek  $AE$  má za díl polovinu.

Sudým pak jest číslo, které se rozpoluje; tedy  $AE$  jest sudé; což právě bylo dokázati.

## XXII.

Když se několik lichých čísel sečte a počet jejich jest sudý, celek bude sudý.

Nuže budiž sečteno několik čísel lichých počtu sudého,  $AB, BC, CD, DE$ ; pravím, že celek  $AE$  jest sudý.




Neboť ježto každé z čísel  $AB, BC, CD, DE$  jest liché, odečteme-li od každého jednotku, každý ze zbytků bude

sudý; pročež i součet jejich bude sudý. Jest pak i počet jednotek sudý; tedy též celek  $AE$  jest sudý; což právě bylo dokázati.

## XXIII.

Když se několik lichých čísel sečte a počet jejich jest lichý, též celek bude lichý.

Nuže buď sečteno několik čísel lichých a počet jejich buď lichý.  $AB, BC, CD$ ; pravím, že též celek  $AD$  jest lichý.



Budiž od  $CD$  odečtena jednotka  $DE$ ; zbytek  $CE$  je tedy sudý. Jest pak i  $CA$

sudé (IX. xxii.); pročež i celek  $AE$  jest sudý. A  $DE$  jest jednotka; tedy  $AD$  jest liché; což právě bylo dokázati.

## XXIV.

Když se odečte od čísla sudého sudé, zbytek bude sudý.

Nuže buď od čísla sudého  $AB$  odečteno sudé  $BC$ ; pravím, že zbytek  $CA$  jest sudý.




Neboť ježto  $AB$  jest sudé, má za díl polovinu. Z téže příčiny ovšem i  $BC$  má za díl polovinu; pročež i zbytek  $AC$  jest sudý; což právě bylo dokázati.

## XXV.

Když se odečte od čísla sudého liché, zbytek bude lichý.

Nuže od čísla sudého  $AB$  buď odečteno liché  $BC$ ; pravím, že zbytek  $CA$  jest lichý.

Nuže buď od  $BC$  odečtena jednotka  $CD$ ;  $DB$  tedy jest sudé. Jest pak též  $AB$  sudé; pročež i zbytek  $AD$  jest sudý.




A  $CD$  jest jednotka;  $CA$  tedy jest liché; což právě bylo dokázati.

## XXVI.

Když se odečte od čísla lichého liché, zbytek bude sudý.

Nuže buď od čísla lichého  $AB$  odečteno liché  $BC$ ; pravím, že zbytek  $CA$  jest sudý.

Nuže, ježto  $AB$  jest liché, buď odečtena jednotka  $BD$ ; zbytek tedy  $AD$  jest sudý. Z téže příčiny ovšem i  $CD$  jest sudé; pročež i zbytek  $CA$  jest sudý; což právě bylo dokázati.



## XXVII.

Když se odečte od čísla lichého sudé, zbytek bude lichý.


Nuže buď od čísla lichého  $AB$  odečteno sudé  $BC$ ; pravím, že zbytek  $CA$  jest lichý.

Nuže buď odečtena jednotka  $AD$ ; tedy  $DB$  jest sudé. Jest pak i  $BC$  sudé; tedy zbytek  $CD$  jest sudý. Pročež  $AC$  jest liché; což právě bylo dokázati.



## XXVIII.

Když se lichým číslem znásobí sudé a vznikne jiné, vzniklé bude sudé.




Nuže buď lichým číslem  $A$  znásobeno sudé  $B$  a součinem buď  $C$ ; pravím, že  $C$  jest sudé.

Neboť ježto  $A \times B = C$ , tedy  $C$  se skládá z tolika částí rovných číslu  $B$ , kolik jest v  $A$  jednotek. I jest  $B$  sudé; pročť  $C$  se skládá ze sudých. Když pak se sečte několik čísel sudých, celek jest sudý; tedy  $C$

est s udé; což právě bylo dokázati.

## XXIX.

Když se lichým číslem znásobí číslo liché a vznikne jiné, vzniklé bude liché.




Nuže znásobme lichým číslem  $A$  liché  $B$  a součinem buď  $C$ ; pravím, že  $C$  jest liché.

Neboť ježto  $A \times B = C$ , tedy  $C$  se skládá z tolika částí rovných číslu  $B$ , kolik jest v  $A$  jednotek. I jest  $A$  i  $B$  lichá; tedy  $C$  se skládá z čísel lichých,

jejichžto počet jest lichý. Pročť  $C$  jest liché (IX. xxiii.); což právě bylo dokázati.

## XXX.




Když jest číslo liché měrou čísla sudého, též polovině jeho bude měrou.

Nuže buď liché číslo  $A$  měrou sudého  $B$ ; pravím, že též polovině jeho bude měrou.

Nuže, ježto  $A$  jest měrou čísla  $B$ , buď mu měrou dle  $C$ ; pravím, že  $C$  není liché. Nuže, možno-li, budiž.  $A$  ježto  $A$  jest měrou čísla  $B$  dle  $C$ , tedy  $A \times C = B$ . Tedy  $B$  se skládá z čísel lichých a počet jejich jest lichý; pročť  $B$  jest liché; což nesmyslné, neboť jest podmínkou, že jest sudé. Tedy  $C$  není liché;  $C$  jest sudé. Pročť  $A$  jest měrou čísla  $B$  dle suda. Z té pří-

činy zajisté i polovině jeho bude měrou; což právě bylo dokázati.

## XXXI.



Když jest číslo liché nějakému číslu kmenné, také dvojnásobku jeho bude kmenné.

Nuže buď liché číslo  $A$  nějakému číslu  $B$  kmenným a dvojnásobkem čísla  $B$  budiž  $C$ ; pravím, že  $A$  číslu  $C$  je kmenné. Neboť nejsou-li  $[A, C]$  kmenná, bude jim nějaké číslo měrou. Budiž mě-

rou a budiž to  $D$ . I jest  $A$  liché, liché tedy jest i  $D$ . A ježto  $D$  jsouc liché jest měrou čísla  $C$  a  $C$  jest sudé, bude tedy měrou též polovině


čísla  $C$ . Polovina však čísla  $C$  jest  $B$ ; tedy  $D$  jest měrou čísla  $B$ . Je však měrou i číslu  $A$ . Tedy  $D$  jest měrou čísel  $A, B$ , navzájem kmenných; což právě není možno. Pročť nemožno, aby  $A$  nebylo číslu  $C$  kmenné; tedy  $A, C$  jsou navzájem kmenná; což právě bylo dokázati.

## XXXII.

Z čísel od dvojky počínajíc dvojnásobených<sup>13)</sup> každé jest jen sudosudé.

Nuže budiž od dvojky  $A$  počínajíc zdvojnásobeno několik čísel  $B, C, D$ ; pravím, že  $B, C, D$  jsou jen sudosudá (VII. vým. 8.).

Ze ovšem každé z čísel  $B, C, D$  jest sudosudé, patrné; neboť od dvojky počínajíc je zdvojnásobeno. Pravím, že také jen sudosudé. Nuže vezměme v úvahu jednotku. Poněvadž jest ovšem od jednotky počínajíc několik čísel spojitě úměrných a číslo  $A$  za jednotkou jest kmenné, největšímu z čísel  $A, B, C, D$ , totiž  $D$ , žádné jiné nebude měrou kromě  $A, B, C$  (IX. xiii.). I jest každé z čísel  $A, B, C$  sudé; tedy  $D$  jest jen sudosudé. Podobně ovšem dokážeme, že  $B$  i  $C$  jsou jen sudosudá; což právě bylo dokázati.



## XXXIII.

Když má číslo polovinu lichou, jest jen sudoliché.

Nuže měj číslo  $A$ <sup>14)</sup> polovinu lichou; pravím, že jest  $A$  jen sudoliché<sup>15)</sup>.

Ze zajisté jest sudoliché, patrné; neboť polovina jeho jsouc lichá jest mu měrou dle suda. Pravím ovšem, že také jen sudoliché. Neboť bude-li  $A$  též sudosudé, bude mu měrou číslo sudé dle sudého; pročť i polovině jeho, ač jest lichá, bude měrou číslo sudé; což právě jest nesmyslné. Tedy  $A$  jest jen sudoliché; což právě bylo dokázati.

## XXXIV.

Když číslo ani není z dvojnásobených od dvojky počínajíc ani nemá poloviny liché, jest sudosudé a sudoliché.

Nuže  $A$ <sup>14)</sup> nebuď ani z dvojnásobených od dvojky počínajíc ani neměj poloviny liché; pravím, že  $A$  jest i sudosudé i sudoliché<sup>16)</sup>.

Ze zajisté jest  $A$  sudosudé, patrné; neboť polovina jeho není lichá. Pravím ovšem, že jest i sudoliché. Neboť když půlíme  $A$  i polovinu jeho i stále tak činíme, dojdeme nějakého čísla lichého, jež bude měrou čísla  $A$  dle čísla sudého. Neboť pakli ne, dojdeme dvojky a

<sup>13)</sup> Totiž  $2A = B, 2B = 2^2A = C, 2C = 2^3A = D$  a t. d.

<sup>14)</sup> Vyobr. k tomu — pouhou přímkou — vynechal jsem.

<sup>15)</sup> Na př. 6, 14, 30 a p., t. j.  $2 \times 3, 2 \times 7, 2 \times 15 = 6 \times 5 = 10 \times 3$ .

<sup>16)</sup> Na př. 12, 20, 28 a p., t. j.  $2 \times 6 = 4 \times 3, 2 \times 10 = 4 \times 5, 2 \times 14 = 4 \times 7$ .




bude  $A$  z čísel od dvojky počínajíc dvojnásobených; což právě proti podmínce. Pročež  $A$  jest sudoliché. Dokázáno pak bylo, že též sudosudé. Tedy  $A$  jest i sudosudé i sudoliché; což právě bylo dokázati.

## XXXV.

Když jest kolikkolivěk čísel spojitě úměrných a od druhého i posledního se odečtou čísla rovná prvnímu; jako zbytek druhého k číslu prvnímu, tak se bude míti zbytek posledního k součtu všech předcházejících (prvotních).

Několika čísla spojitě úměrnými buďtež  $A, BC, D, EF$ , od nejmenšího  $A$  počínajíce, a odečtemež od  $BC$  i  $EF$  číslu rovná  $BG, FH$ ; pravím, že  $GC:A=EH:(A+BC+D)$ .



Nuže budiž  $BC=FK$  a  $FL=D$ . A ježto  $FK=BC$ , z nichž  $FH=BG$ , tedy zbytek  $HK=GC$ . A ježto  $EF:D=D:BC=BC:A$  a  $D=FL$ ,  $BC=FK$ ,  $A=EH$ , tedy  $EF:FL=FL:FK=FK:FH$ . Odčteně (V. vým. 15.)  $EL:LF=LK:FK=KH:FH$ . Má se tedy též jeden z předních k jednomu ze zadních jako součet předních k součtu zadních (VII. XII.); tedy  $KH:FH=(EL+LK+KH):(LF+FK+FH)$ . Avšak  $KH=CG$ ,  $FH=A$  a též  $LF+FK+HF=D+BC+A$ ; pročež  $CG:A=EH:(D+BC+A)$ . Tedy zbytek druhého čísla má se k číslu prvnímu jako zbytek posledního k součtu všech předcházejících; což právě bylo dokázati.


## XXXVI.

Když jest dáno po řadě od jednotky několik čísel v poměru jedné ke dvěma, až součet všech stane se číslem kmeným, a když se ten součet znásobí číslem posledním a vznikne jiné, vzniklé bude číslo dokonalé.

Nuže dáno buď několik čísel od jednotky počínajíc v poměru jedné ke dvěma, až součet všech (i s jednotkou) se stane číslem kmeným, totiž  $A, B, C, D$ , a součtu rovno buď  $E$  a budiž  $E \times D = FG$ ; pravím, že  $FG$  jest číslo dokonalé.

Nuže kolik jest čísel  $A, B, C, D$ , tolik vezměmež od  $E$  počínajíce v poměru jedné ke dvěma,  $E, HK, L, M$ ; stejnořadně tedy  $A:D=E:M$ ; pročež  $E \times D = A \times M$ . I jest  $E \times D = FG$ . Tedy  $A \times M = FG$ ; pročež  $M$  jest měrou čísla  $FG$  dle jednotek v  $A$ . I jest  $A$  dvojka; tedy  $FG = 2M$ . Jsou pak též  $M, L, HK, E$  po řadě dvojnásobná (sestupně); tedy  $E, HK, L, M, FG$  mají se k sobě po řadě jako jedna ke dvěma. Odečteme již od druhého  $HK$  a od posledního  $FG$  čísla prvnímu,  $E$ , rovná  $HN, FO$ ; tedy zbytek druhého čísla má se k prvnímu jako zbytek posledního k součtu všech předcházejících. Pročež  $NK:E=OG:(M+L+KH+E)$ . I jest  $NK=E$ ; tedy též  $OG=M+L+HK+E$ . Jest pak i  $FO=E$  a  $E=A+B+C+D+1$ .

Tedy celé  $FG=E+HK+L+M+A+B+C+D+1$  a má je za své míry. Pravím, že číslu  $FG$  též nebude žádné jiné měrou kromě  $A, B, C, D, E, HK, L, M$  a jednotky. Nuže, možno-li, budiž číslu  $FG$  nějaké měrou, totiž  $P$ , a  $P$  nebuď žádnému z čísel  $A, B, C, D, E, HK, L, M$  rovno. A jakou měrou čísla  $FG$  jest  $P$ , tolik jednotek měj  $Q$ ; tedy  $Q \times P = FG$ . Avšak zajisté též  $E \times D = FG$ ; tedy  $E:Q = P:D$ . A ježto  $A, B, C, D$  jsou od jednotky spojitě úměrná, tedy číslu  $D$  nebude žádné jiné číslo měrou kromě  $A, B, C$ . A jest podmínkou, že  $P$  není žádnému z čísel  $A, B, C$  rovno; pročež  $P$  nebude měrou čísla  $D$ . Avšak  $P:D = E:Q$ ; ani tedy  $E$  není měrou čísla  $Q$ . I jest  $E$  kmenné; každé však číslo kmenné každému, jemuž není měrou, jest kmenné (VII. XXIX.). Tedy  $E, Q$  jsou navzájem kmenná, kmenná však také nejmenší, nejmenší pak jsou týmiž měrami těch, která mají též poměr, přední předního jako zadní zadního. I má se  $E:Q = P:D$ ; tedy  $E$  je touž měrou čísla  $P$  jak  $Q$  čísla  $D$ . Číslu  $D$  však žádné jiné číslo není měrou kromě  $A, B, C$ ; tedy  $Q$  jest jednomu z čísel  $A, B, C$  rovno. Budiž rovno číslu  $B$ . A kolik jest čísel  $B, C, D$ , tolik vezměme čísel od  $E$  počínajíce, totiž  $E, HK, L$ . I mají  $E, HK, L$  též poměr jako  $B, C, D$ ; stejnořadně tedy  $B:D = E:L$ ; pročež  $B \times L = D \times E$ ; avšak  $D \times E = Q \times P$ ; tedy též  $Q \times P = B \times L$ . Tedy  $Q:B = L:P$ . I jest  $Q=B$ ; pročež i  $L=P$ , což právě nemožno. Neboť podmínkou jest, že  $P$  žádnému z daných není rovno. Tedy nebude číslu  $FG$  žádné číslo měrou kromě  $A, B, C, D, E, HK, L, M$  a jednotky. Také bylo dokázáno, že  $FG = A + B + C + D + E + HK + L + M + 1$ . Dokonalé pak jest číslo, které se rovná součtu svých dělitelů (měr); tedy  $FG$  jest číslo dokonalé; což právě bylo dokázati.



## Doplňky.

V. XIX.

Důsledek.

Poměry však trvají i při stejných násobcích i při úměrácích, ježto právě, když jest první číslo stejným násobkem druhého jako třetí čtvrtého, bude se míti též první k druhému jako třetí ke čtvrtému. Nikoli však též naopak: když se má první k druhému jako třetí ke čtvrtému, nebude vesměs také první stejným násobkem druhého a


lřetí čtvrtého, jako na př. při poměrech půldruhadílných nebo půltřetí-  
dílných nebo podobných; což právě bylo dokázati.

## VI. xx.

*Jinak.*

Dokážeme ovšem i jinak případněji, že trojúhelníky jsou stejnohlelé.

Nuže mějme opět mnohoúhelníky  $ABCDE$ ,  $FGHKL$  a vedme spojnice  $BE$ ,  $EC$ ,  $GL$ ,  $LH$ ; pravím, že  $\triangle ABE : FGL = EBC : LGH = CDE : HKL$ . Neboť ježto  $\triangle ABE \sim FGL$ , tedy  $\triangle ABE : FGL = BE^2 : GL^2$ . Z téže příčiny ovšem i  $\triangle BEC : GLH = BE^2 : GL^2$ . Pročež  $\triangle ABE : FGL = BEC : GLH$ . Dále, ježto  $\triangle EBC \sim LGH$ , tedy  $EBB : LGH = CE^2 : HL^2$ . Z téže příčiny ovšem i  $\triangle ECD : LHK = CE^2 : HL^2$ . Tedy  $\triangle BEC : LGH = CED : LHK$ . Bylo však dokázáno, že též  $EBC : LGH = ABE : FGL$ . Pročež také  $ABE : FGL = BEC : GLH = CED : LHK$ ; což právě bylo dokázati.



však dokázáno, že též  $EBC : LGH = ABE : FGL$ . Pročež také  $ABE : FGL = BEC : GLH = CED : LHK$ ; což právě bylo dokázati.

## VI. xxvii. \*)

*Jinak.*

Nuže buď opět  $AB$  rozpůlena v  $C$  a přistaveno  $AL$ , takže se mu nedostává doplňku  $LB$ , a buď opět k  $AB$  přistaven rovnoběžník  $AE$ , takže se mu nedostává doplňku  $EB$ , podobného a podobně položeného, jako jest útvar nad polovinou,  $LB$ ; pravím, že  $AL > AE$ .

Neboť ježto  $EB \sim LB$ , objímají touž úhlopříčku. Budiž úhlopříčkou jejich  $EB$  a obrazec buď vylinkován. A ježto  $LF = LH$ , protože  $FG = GH$ , tedy  $LF > KE$ .

Avšak  $LF = DL$  (I. XLIII), pročež také  $DL > EK$ . Společným přičtíme  $KD$ ; tedy celé  $AL > AE$ ; což právě bylo dokázati.

## VI. xxx.

*Jinak.*

Danou přímkou buď  $AB$ . Má se tedy  $AB$  rozdělití poměrem krajním a středním.

Nuže buď  $AB$  rozdělena v  $C$  tak, aby bylo  $AB \times BC = CA^2$  (II. xr.). Ježto tedy  $AB \times BC = CA^2$ , tedy  $BA : AC = AC : CB$ .

Tedy  $AB$  jest rozdělena v  $C$  poměrem krajním a středním; což právě bylo vykonati.

\*) Doplněk tento nepochybně cizí.

## VI. xxxi.

*Jinak.*

Ježto útvary podobné mají se k sobě jako dvojmoci stejnohleých stran (VI. xx.), tedy útvar z  $BC$  (viz přísl. vyobr. kn. VI.) má se k útvaru z  $BA$  jako dvojmoc z  $CB$  ke dvojmoci z  $BA$ . Také však čtverec z  $BC$  má se ke čtverci z  $BA$  jako dvojmoc z  $BC$  ke dvojmoci z  $BA$ . Protož i útvar z  $CB$  má se k útvaru z  $BA$  jako čtverec z  $CB$  ke čtverci z  $BA$ . Z téže příčiny ovšem též útvar z  $BC$  má se k útvaru z  $CA$  jako čtverec z  $BC$  ke čtverci z  $CA$ . A tak i útvar z  $BC$  má se k součtu útvarů z  $BA$ ,  $AC$  jako čtverec z  $BC$  k součtu čtverců z  $BA$ ,  $AC$ . Avšak  $BC^2 = BA^2 + AC^2$ ; pročež i útvar z  $BC$  roven je součtu útvarů z  $BA$ ,  $AC$ , podobných a podobně sestrojených [což právě bylo dokázati].

## VI. xxxiii. \*)


Pravím, že též oblouk  $BC$ :obl.  $EF =$  výseč  $GBC$ :vys.  $HEF$ .

Nuže vedme spojnice  $BC$ ,  $CK$  (tečkov.) a na obl.  $BC$ ,  $CK$  zvolme body  $O$ ,  $P$  a vedme též spojnice  $BO$ ,  $OC$ ,  $CP$ ,  $PK$ . A ježto  $BG = GK$  a  $GC = GC$  a svírají

stejně úhly a základna  $BC = KC$ , tedy též  $\triangle GBC = GCK$ . A ježto obl.  $BC = CK$ , též obl.  $(BAC)$ , jenž celý kruh doplňuje, roven jest oblouku  $(CAK)$  celý kruh doplňujícímu; pročež i  $\angle BOC = \angle CPK$  (III. xxvii.). Tedy úseč  $BOC \sim$  úseči  $CPK$ .

Také jsou na stejných tětivách  $BC$ ,  $CK$ . Úseče pak podobné na stejných tětivách jsou si rovny; pročež úseč  $BOC = CPK$ . Je však i  $\triangle GBC = GCK$ ; tedy též celá výseč  $BGC = GCK$ . Z téže příčiny ovšem i výseč  $GKL = GBC = GCK$ . Tedy tři výseče  $GBC$ ,  $GCK$ ,  $GKL$  jsou si rovny. Z téže příčiny ovšem i výseče  $HEF$ ,  $HFM$ ,  $HMN$  jsou si rovny. Kolikrát tedy obl.  $LB > BC$ , tolikrát i vys.  $GBL > GBC$ . Z téže příčiny ovšem též kolikrát obl.  $NE > EF$ , tolikrát i výseč  $HEN > HEF$ . Jestliže tedy obl.  $BK = EN$ , také vys.  $BGL = EHN$ , a jestliže obl.  $BL > EN$ , také vys.  $BGL > EHN$ , a jestliže menší, menší. Když jsou tedy čtyři veličiny, a to dva obl.  $BC$ ,  $EF$  a dvě vys.  $GBC$ ,  $EHF$ , vzali jsme za stejné násobky oblouku  $BC$  a výseče  $GBC$  oblouk  $BL$  a výseč  $GBL$  a za stejné násobky oblouku  $EF$  a výseče  $HEF$  oblouk  $EN$  a výseč  $HEN$ ; a dokázáno, když obl.  $BL > EN$ , že též výseč  $BGL > EHN$ , pakli stejný, stejná, pakli menší, menší. Pročež obl.  $BC : EF =$  vys.  $GBC : HEF$ .

\*) Doplněk Theonův.




## Důsledek.\*)

I jest patrné také, že jako se má výseč k výseči, tak se má též úhel k úhlu.

Obecně VII. xx.

Když jsou tři čísla  $A$ ,  $B$ ,  $C$  úměrou, součin krajních rovná se čtverci středního; a když součin krajních rovná se čtverci středního, ta tři čísla jsou úměrou.




Buďtež úměrou tři čísla  $A$ ,  $B$ ,  $C$ , takže  $A:B=B:C$ ; pravím, že  $A \times C = B^2$ . Nuže budiž  $B=D$ ; tedy  $A:B=D:C$ . Pročež  $A \times C = B \times D$  (VII. xix.). Avšak  $B \times D = B^2$ , neboť  $B=D$ . Tedy  $A \times C = B^2$ .

Avšak buď již  $A \times C = B^2$ ; Pravím, že  $A:B=B:C$ . Neboť ježto  $A \times C = B^2$  a  $B^2 = B \times D$ , tedy  $A:B=D:C$ . Avšak  $B=D$ , pročež  $A:B=B:C$ ; což právě bylo dokázati.

Obecně VII. xxii.

Když jsou tři čísla a jiná jim počtem rovná, po dvou brána jsou a v témž poměru, úměra pak jejich jest nestejnořadná, také stejnořadně budou v témž poměru.



Třemi čísly buďtež  $A$ ,  $B$ ,  $C$  a jinými jim počtem rovnými  $D$ ,  $E$ ,  $F$ , po dvou brána jsou v témž poměru, a úměra jejich buď nestejnořadná, t.  $A:B=E:F$  a  $B:C=D:E$ ; pravím, že také stejnořadně  $A:C=D:F$ .

Neboť ježto  $A:B=E:F$ , tedy  $A \times F = B \times E$ . Dále, ježto  $B:C=D:E$ , tedy  $D \times C = B \times E$ . Bylo pak dokázáno, že též  $A \times F = B \times E$ , pročež také  $A \times F = D \times C$ . Tedy  $A:C=D:F$ ; což právě bylo dokázati.

VII. xxxi.

## Jinak.

Složeným číslem buď  $A$ ; pravím, že nějaké číslo kmenné jest mu měrou.

Neboť ježto  $A$  je složené, bude mu číslo měrou; i budiž nejmenší z měr jeho  $B$ ; pravím, že  $B$  jest číslo kmenné. Neboť není-li, jest složené; bude mu tedy nějaké číslo měrou. Budiž mu měrou  $C$ . Pročež  $C < B$ . A ježto  $C$  jest měrou čísla  $B$ ,  $B$  však jest měrou čísla  $A$ , tedy též  $C$  jest měrou čísla  $A$ , jsouc menší než  $B$ ; což nemožno. Pročež  $B$  není složené; tedy kmenné; což právě bylo dokázati\*\*).

\*) Důsl. snad rovněž Theonův.

\*\*) Následuje scholion k VII. XXXIX., nesprávné a nejasné.


Scholion<sup>1)</sup>.

Poměr složený z poměrů najedeme dle VIII. v.; rozložíme poměr (složený) takto: budiž  $A:B=2:1$  (vlastně  $A=2B$ ), a od toho (poměru) má se oddělit  $3:1^2)$ . Budiž  $A:C=3:1$ . Zbývá činitel  $C:B$ . Pravím, že  $C:B$  jest poměr půldruhadilný<sup>3)</sup>. Nuže nebuď tak, nýbrž možno-li, budiž  $C=2B$ . Je však též  $A=3C$ , bude tedy též  $A=6B$ . Podmínkou však, že  $A=2B$ ; což nesrovnalé. Nebude tedy  $C=2B$ . Podobně ovšem dokážeme, že ani jiného poměru nemá  $C:B^4)$  kromě půldruhadilného.

IX. xxii.

## Jinak.

Nebo též takto: ježto tedy  $AB$  jest liché, odejměmež od něho jednotku  $FB$ ; tedy zbývající  $AF$  jest sudé. Dále, ježto  $BC$  jest liché a  $FB$  jest jednotka, tedy  $FC$  jest sudé; je však též  $AF$  sudé, pročež i celé  $AC$  jest sudé. Z téže příčiny ovšem i  $CE$  jest sudé. A tak i celek  $AE$  sudý jest.



## Kniha desátá.

## Výměry.

1. Souměřitelnými zovou se veličiny, které touž měrou se měří; nesouměřitelnými pak, jimž míra žádná nemůže státi se společnou.
2. Přímký jsou dvojmocně souměřitelné, když čtverce z nich touž plochou měřiti lze; nesouměřitelné, když čtvercům z nich nemůže žádná plocha státi se měrou společnou<sup>1)</sup>.
3. Uznáno-li toto, vysvítá z toho, že s danou přímkou jest nekonečné množství přímek souměřitelných, jakož i nesouměřitelných, dílem jen dle délky, dílem i dvojmocně. Nazýváme tedy danou přímku změrnou a přímký s ní souměřitelné, buďsi dle délky i dvojmocí, buďsi jen dvojmocně, změrnými, nesouměřitelné pak s ní nazýváme nezměrnými.
4. I čtverec dané přímký nazýváme změrným a s ním souměřitelné změrnými, s ním pak nesouměřitelné nezměrnými, i přímký, jejichžto čtverce jsou jim rovny, nezměrnými, a to byly-li by

<sup>1)</sup> Snad k VIII. v.

<sup>2)</sup> T. j. má se naléztí druhý činitel složeného poměru  $2:1$ , jehož jeden činitel jest

$3:1$ . Staně se dělením  $\frac{A:B}{A:C} = \frac{2:1}{3:1} = C:B = 2:3$ .

<sup>3)</sup> T. j. druhý člen jest  $1\frac{1}{2}$ krát větší než první.

<sup>4)</sup> Ve vyd. Heiberg.  $B:\Gamma$  (t. j.  $B:C$ ) =  $2:3$ , — chybně, snad chyba tisková.

<sup>1)</sup> Plochou —  $\chiωρίσον$  — rozumí se obyč. čtverec.

to čtverce, strany samy, pakli jiné nějaké útvary přímkové, strany čtverců jim rovných.

## I.

Jsou-li dány dvě veličiny nestejně, když od větší odečteme část větší než polovina a od zbytku opět větší než polovina a tak stále budeme činiti, zbude nějaká veličina, jež bude menší než daná veličina menší.

Buďte dvěma veličinami nestejnými  $AB$ ,  $C$ , z nichž větší  $AB$ ; pravím, že, když od  $AB$  odečteme část větší než polovina a od zbytku opět větší než polovina a tak stále budeme činiti, zbude nějaká veličina, jež bude menší než veličina  $C$ .

Neboť  $C$  znásobena jsouc bude někdy větší než  $AB$ . Buď znásobena a buď  $DE$  násobkem veličiny  $C$ , větším však než  $AB$ , a rozdělme  $DE$  v díly s  $C$  stejné  $DF$ ,  $FG$ ,  $GE$  a od  $AB$  odřízněme  $BH$ , větší než je polovina, od  $AH$  pak  $HK$ , větší než je polovina, a to stále činieme, dokud nebude v  $AB$  tolik částí, kolik má jich  $DE$ .


Buďtež tedy  $AK$ ,  $KH$ ,  $HB$  na počet stejné s  $DF$ ,  $FH$ ,  $GE$ , a ježto  $DE > AB$  a od  $DE$  odříznuta část  $EG$ , menší než polovina, od  $AB$  pak  $BH$ , větší než polovina, tedy zbytek  $GD > AH$ . A ježto  $GD > AH$  a od  $GD$  odříznuta polovina, t.  $GF$ , od  $AH$  pak  $HK$ , větší než polovina, tedy zbytek  $DF > AK$ . Avšak  $DF = C$ , tedy též  $C > AK$ . Pročež  $AK < C$ .

Tedy z veličiny  $AB$  zbývá veličina  $AK$ , menší jsouc než daná veličina menší  $C$ ; což právě bylo dokázati. — A podobně dokážeme, i když budou části odčítané polovinami.

## II.

Když ze dvou nestejných veličin střídavě se odčítá pokaždé menší od větší a zbytek nikdy nedoměřuje části předcházející, budou ty veličiny nesouměřitelné.

Nuže jsou-li dvě veličiny  $AB$ ,  $CD$  nestejně a menší jest  $AB$  a odčítáme-li vždy menší od větší, zbytek nikdy nedoměřuj části předcházející; pravím, že veličiny  $AB$ ,  $CD$  jsou nesouměřitelné.



Neboť jsou-li souměřitelné, bude je nějaká veličina měřiti. Měř je, možno-li, a buď to  $E$ ; a  $AB$  doměřujíc  $FD$  ostavuj menší sebe  $CF$ ,  $CF$  pak doměřujíc  $BG$  ostavuj menší sebe  $AG$ , a to děj se stále, dokud nezbude nějaká veličina, jež je menší než  $E$ . Staň se, a zbývej  $AG$ , menší než  $E$ . Ježto tedy  $E$  měří  $AB$ ,  $AB$  však měří  $DF$ , tedy

též  $E$  bude měřiti  $DF$ . Měří však i celou  $CD$ , bude tedy též zbytek  $CF$  měřiti. Avšak  $CF$  měří veličinu  $BG$ , tedy též  $E$  měří  $BG$ . Měří však i celou  $AB$ , tedy bude měřiti též zbytek  $AG$ , větší veličina veličinu menší; což právě nemožno. Tedy veličin  $AB$ ,  $CD$  nebude měřiti veličina žádná; pročež veličiny  $AB$ ,  $CD$  jsou nesouměřitelné.

Když tedy ze dvou nestejných veličin atd.

## III.

Jsou-li dány dvě veličiny souměřitelné, najdi největší jejich společnou míru.

Dvěma veličinami souměřitelnými buďtež  $AB$ ,  $CD$ , z nichžto menší  $AB$ ; má se tedy veličinám  $AB$ ,  $CD$  najíti největší společná míra.  $AB$  zajisté veličinu  $CD$  buď doměřuje buď nikoli. Doměřuje-li tedy, doměřuje pak i sebe, tedy  $AB$  je společnou měrou veličin  $AB$ ,  $CD$ ; i patrně, že též největší. Neboť větší než  $AB$  veličiny  $AB$  měřiti nebude.

Neměř již  $AB$  veličiny  $CD$ . A když střídavě budeme odčítati vždy menší od většího, zbytek jednou bude doměřovati část předcházející, ježto  $AB$ ,  $CD$  nejsou nesouměřitelné; i ostavuj  $AB$  doměřujíc  $ED$  menší sebe  $EC$ ,  $EC$  pak doměřujíc  $FB$  ostavuj menší sebe  $AF$ ,  $AF$  pak  $CE$  doměřuj.

Ježto tedy  $AF$  měří  $CE$ ,  $CE$  však měří  $FB$ , tedy též  $AF$  měří  $FB$ . Měří však i sebe, pročež bude  $AF$  měřiti i celou  $AB$ . Avšak  $AB$  měří  $DE$ , tedy též  $AF$  bude měřiti  $DE$ ; měří však i  $CE$ , tedy měří též celou  $CD$ . Tedy  $AF$  je společnou měrou veličin  $AB$ ,  $CD$ . Pravím ovšem, že též největší. Neboť sice bude nějaká veličina větší než  $AF$ , jež bude měřiti  $AB$ ,  $CD$ . Budiž to  $G$ . Ježto tedy  $G$  měří  $AB$ ;  $AB$  však měří  $ED$ , tedy též  $G$  bude měřiti  $ED$ . Měří však i celou  $CD$ ; tedy  $G$  bude měřiti též zbytek  $CE$ . Avšak  $CE$  měří  $FB$ , tedy též  $G$  bude měřiti  $FB$ . Měří však i celou  $AB$ , i zbytek  $AF$  bude měřiti, větší veličina veličinu menší; což právě nemožno. Tedy žádná veličina větší než  $AF$  nebude měřiti  $AB$ ,  $CD$ ; pročež  $AF$  je největší společnou měrou veličin  $AB$ ,  $CD$ .

Nalezena tedy největší společná míra dvou daných veličin souměřitelných  $AB$ ,  $CD$ ; což právě bylo dokázati (vykonati).

## Důsledek.

Z toho zajisté patrně, když je veličina měrou veličin dvou, že měřiti bude též největší jejich společnou míru.


## IV.

Jsou-li dány tři veličiny souměřitelné, najdi největší jejich společnou míru.

Danými třemi veličinami souměřitelnými buďtež  $A, B, C$ ; má se tedy veličinám  $A, B, C$  najíti největší společná míra.

Nuže mějme největší společnou míru dvou veličin  $A, B$  (X. III.) a buď jí  $D$ ;  $D$  zajisté veličině  $C$  buď jest měrou buď není. Buď dříve měrou. Ježto tedy  $D$  měří  $C$ , měří však též  $A, B$ , tedy  $D$  měří  $A, B, C$ ; pročež  $D$  je společnou měrou veličin  $A, B, C$ . I patrně, že též největší; neboť veličina větší než  $D$  veličin  $A, B$  neměří.

Nebuď již  $D$  měrou veličiny  $C$ . Pravím nejprve, že  $C$  a  $D$  jsou souměřitelné. Neboť ježto  $A, B, C$  jsou souměřitelné, bude je měřiti nějaká veličina, jež patrně i  $A, B$  bude měřiti, pročež i největší společnou míru veličin  $A, B$ , totiž  $D$ , bude měřiti. Měří však i  $C$ ; tedy řečená veličina bude měřiti  $C, D$ . Vezměme tedy jejich největší společnou míru a buď jí  $E$ . Ježto tedy  $E$  měří  $D$ ,  $D$  však měří  $A, B$ , tedy též  $E$  bude měřiti  $A, B$ . Měří však i veličinu  $C$ . Tedy  $E$  měří



$A, B, C$ ; pročež  $E$  je společnou měrou veličin  $A, B, C$ . Pravím ovšem, že též největší. Nuže buď, možno-li, nějaká veličina  $F$ , větší než  $E$ , a měř  $A, B, C$ . A ježto  $F$  měří  $A, B, C$ , tedy též  $A, B$  bude měřiti, jakož i největší společnou míru veličin  $A, B$  (X. III. důsl). Největší však společná míra veličin  $A, B$  jest  $D$ ;  $F$  tedy měří  $D$ . Měří však i veličinu  $C$ ; tedy  $F$  měří  $C, D$ ; pročež bude  $F$  měřiti též největší společnou míru veličin  $C, D$ . Jest pak to  $E$ ; tedy  $F$

bude měřiti  $E$ , větší veličina veličinu menší; což právě nemožno. Tedy žádná veličina nad  $E$  větší neměří veličin  $A, B, C$ . Pročež  $E$  jest největší společnou měrou veličin  $A, B, C$ , když  $D$  veličiny  $C$  neměří; pakli měří, tož samo  $D$ .

Největší tedy společná míra daných tří veličin souměřitelných jest nalezena.

#### Důsledek.

Z toho zajisté patrně, když veličina měří tři veličiny, že bude měřiti též největší jejich společnou míru.

Podobně ovšem najde se i při větším počtu (veličin) největší společná míra, i důsledek bude míti platnost. Což právě bylo dokázati.


#### V.

Veličiny souměřitelné mají se k sobě jako číslo k číslu.

Veličinami souměřitelnými buďtež  $A, B$ ; pravím, že  $A$  má se k  $B$  jako číslo k číslu.

Neboť ježto  $A, B$  jsou souměřitelné, nějaká veličina bude je měřiti. Měř je a buď to  $C$ . A kolikrát  $C$  je obsaženo v  $A$ , tolik jednotek buď v  $D$ , a kolikrát obsaženo  $C$  v  $B$ , tolik jednotek buď v  $E$ .

Ježto tedy  $C$  měří  $A$  dle jednotek v  $D$  a též jednotka měří  $D$  dle jednotek jeho, tedy jednotka je tolikrát obsažena v čísle  $D$  jako veličina  $C$  v  $A$ ; pročež  $C:A=1:D$ ; tedy zpětně  $A:C=D:1$ . Dále ježto  $C$  měří  $B$  dle jednotek v  $E$  a též jednotka měří  $E$  dle jednotek jeho, tedy jednotka je tolikrát obsažena v  $E$  jako  $C$  v  $B$ ; pročež  $C:B=1:E$ . Dokázáno však, že též  $A:C=D:1$ ; tedy stejnořadně  $A:B=D:E$ .



Tedy souměřitelné veličiny  $A, B$  mají se k sobě jako číslo  $D$  k číslu  $E$ ; což právě bylo dokázati.

#### VI.

Když se mají dvě veličiny k sobě, jako číslo k číslu, ty veličiny budou souměřitelné.

Nuže mějte se k sobě dvě veličiny  $A, B$ , jako číslo  $D$  k číslu  $E$ ; pravím, že jsou veličiny  $A, B$  souměřitelné.

Nuže kolik je v  $D$  jednotek, v tolik stejných dílů rozdělme  $A$ , a jednomu z nich buď rovno  $C$ ; a kolik je v  $E$  jednotek, z tolika veličin stejných s  $C$  skládej se  $F$ .


Ježto tedy, kolik jednotek má  $D$ , tolik je též v  $A$  veličin stejných s  $C$ , tedy jakou částí veličiny  $D$  jest jednotka, takovou jest i  $C$  veličiny  $A$ ; pročež  $C:A=1:D$ . Jednotka pak měří číslo  $D$ , tedy též  $C$  měří  $A$ . A ježto  $C:A=1:D$ , tedy zpětně  $A:C=D:1$ . Ježto dále, kolik jednotek má  $E$ , tolik má též  $F$  stejných s  $C$ , tedy  $C:F=1:E$ . Dokázáno pak, že též  $A:C=D:1$ ; tedy stejnořadně  $A:F=D:E$ . Avšak  $D:E=A:B$ , tedy též  $A$  má se stejně ku  $B$  jako k  $F$ . Má tedy  $A$  k  $B$  i  $F$  týž poměr; tedy  $B=F$ .  $C$  však měří  $F$ , pročež měří i  $B$ . Avšak zajisté též  $A$ ; tedy  $C$  měří  $A, B$ . Jest tedy  $A$  s  $B$  souměřitelné.

Když se tedy mají dvě veličiny k sobě, atd.

#### Důsledek.

Z toho zajisté patrně, když máme dvě čísla, na př.  $D, E$ , a přímku, na př.  $A$ , že jest možno učiniti, by se číslo  $D$  mělo k  $E$ ,


<sup>2)</sup> Ve vyd. Heiberg. jest ve vyobr. ještě jedna úsečka ( $H$ ), jež nemá účelu.



$A:F = D:E$ ; učiněno tedy, že též  $D:E = A^2:B^2$ ; což právě bylo dokázati.<sup>3)</sup>

## VII.

Veličiny nesouměřitelné nemají se k sobě jako číslo k číslu.



Veličinami nesouměřitelnými buďtež  $A$ ,  $B$ ; pravím, že nemá se  $A$  ku  $B$  jako číslo k číslu.

Neboť má-li se  $A$  ku  $B$  jako číslo k číslu, bude  $A$  s  $B$  souměřitelným. Není však; tedy nemá se  $A$  ku  $B$  jako číslo k číslu.

Tedy veličiny nesouměřitelné nemají se k sobě atd.

## VIII.

Když se nemají dvě veličiny k sobě jako číslo k číslu, budou ty veličiny nesouměřitelné (vyobr. jako předešlé).

Nuže nemějte se veličiny  $A$ ,  $B$  k sobě jako číslo k číslu; pravím, že jsou veličiny  $A$ ,  $B$  nesouměřitelné.

Neboť budou-li souměřitelné, bude se míti  $A$  ku  $B$  jako číslo k číslu. Nemá se však. Tedy veličiny  $A$ ,  $B$  jsou nesouměřitelné.

Když se tedy nemají dvě veličiny atd.

## IX.

Čtverce z přímek dle délky souměřitelných mají se k sobě jako číslo čtvercové k číslu čtvercovému; a čtverce, jež se mají k sobě jako číslo čtvercové k číslu čtvercovému, též strany budou míti dle délky souměřitelné. Čtverce pak z přímek dle délky nesouměřitelných nemají se k sobě jako číslo čtvercové k číslu čtvercovému; a čtverce, jež se nemají k sobě jako číslo čtvercové k číslu čtvercovému, ani stran nebudou míti dle délky souměřitelných.

<sup>3)</sup> Vyobr. předešlé sem se nehodí, neboť onde  $B = F$ , zde však  $B$  má býti střední úměrnou veličin  $A$ ,  $F$ . Proto jsem příslušné sem vyobr. přidal.

Nuže buďtež  $A$ ,  $B$  dle délky souměřitelné; pravím, že čtverec z  $A$  má se ke čtverci z  $B$  jako číslo čtvercové k číslu čtvercovému.

Neboť ježto  $A$  je s  $B$  dle délky souměřitelná, tedy  $A$  se má ku  $B$  jako číslo k číslu. Měj se jako  $C$  k  $D$ . Ježto tedy  $A:B = C:D$ , avšak poměr čtverce z  $A$  ke čtverci z  $B$  je dvojnásobně větší než  $A:B$ , — neboť útvary podobné mají se k sobě jako dvojnásobně stejnohlých stran (VI. xx. důsl.) —, a poměr čtverce z  $C$  ke čtverci z  $D$  je dvojnásobně větší než  $C:D$ , neboť dvě čísla čtvercová mají jedno číslo za střední úměrnou a čtverec ke čtverci má poměr dvojnásobně větší než strana ke straně (VIII. xi.) —, tedy též  $A^2:B^2 = C^2:D^2$ .

Nuže měj se již  $A^2:B^2 = C^2:D^2$ ; pravím, že  $A$  je s  $B$  souměřitelná dle délky.

Neboť ježto  $A^2:B^2 = C^2:D^2$ , avšak poměr čtverce z  $A$  ke čtverci z  $B$  je dvojnásobně větší než  $A:B$  a poměr čtverce z  $C$  ke čtverci z  $D$  je dvojnásobně větší než  $C:D$ , tedy též  $A:B = C:D$ . Tedy se má  $A$  k  $B$  jako číslo  $C$  k číslu  $D$ ; pročez  $A$  s  $B$  je dle délky souměřitelná.

Nuže buď již  $A$  s  $B$  dle délky nesouměřitelná; pravím, že nemá se  $A^2$  k  $B^2$  jako číslo čtvercové k číslu čtvercovému.

Neboť má-li se  $A^2$  k  $B^2$  jako číslo čtvercové k číslu čtvercovému, bude  $A$  s  $B$  souměřitelné. Není však; tedy  $A^2$  nemá se k  $B^2$  jako číslo čtvercové k číslu čtvercovému.

Neměj se již naopak  $A^2$  k  $B^2$  jako číslo čtvercové k číslu čtvercovému; pravím, že  $A$  je s  $B$  dle délky nesouměřitelná.

Neboť jest-li  $A$  s  $B$  souměřitelná, bude se míti  $A^2$  k  $B^2$  jako číslo čtvercové k číslu čtvercovému. Nemá se však; pročez  $A$  není s  $B$  dle délky souměřitelná.

Tedy čtverce z přímek dle délky souměřitelných atd.

## Důsledek.

I bude z toho, což dokázáno, patrné, že přímkou souměřitelné dle délky jsou vesměs i dle dvojnásobnosti, ty pak, jež dle dvojnásobnosti, nevesměs i dle délky.<sup>4)</sup>

## Výtěžek.

Dokázáno v oddíle arithmetickém<sup>5)</sup>, že se čísla podobných rovin mají k sobě jako číslo čtvercové k číslu čtvercovému, a když se dvě čísla mají k sobě jako číslo čtvercové k číslu čtvercovému, jsou

<sup>4)</sup> Co následuje, nepochybně nepochází od Eukl.


<sup>5)</sup> Srv. VIII. xxvi.

to čísla podobných rovin. A z toho patrně, že čísla nepodobných rovin, t. j. která nemají úměrných stran, nemají se k sobě jako číslo čtvercové k číslu čtvercovému. Neboť budou-li se míti, budou to podobné roviny; to však proti podmínce. Tedy čísla nepodobných rovin nemají se k sobě jako číslo čtvercové k číslu čtvercovému.

## X.

K dané přímce najdi dvě přímky s ní nesouměřitelné, jednu jen dle délky, druhou i dle dvojmoci.

Danou přímku budiž  $A$ ; mají se tedy k  $A$  naléztí dvě přímky s ní nesouměřitelné, jedna jen dle délky, druhá i dle dvojmoci.



Nuže mějme dvě čísla  $B, C$ , jež se nemají k sobě jako číslo čtvercové k číslu čtvercovému, t. j. roviny nepodobné, a učiněmež, aby se mělo  $B : C = A^2 : D^2$  (tomu zajisté jsme se naučili<sup>6)</sup>); tedy  $A^2$  a  $D^2$  jsou veličiny souměřitelné (X. VI.). A ježto se nemá  $B$  k  $C$  jako číslo čtvercové k číslu čtvercovému, tož ani  $A^2$  nemá se k  $D^2$  jako číslo čtvercové k číslu čtvercovému; jest tedy  $A$  s  $D$  dle délky nesouměřitelná (X. IX.). Za střední úměrnou přímek  $A, D$  vezměmež  $E$ ; tedy  $A : D = A^2 : E^2$  (V. výměr 9). Avšak  $A$  je s  $D$  dle délky nesouměřitelná; pročež i  $A^2$  a  $E^2$  jsou veličiny nesouměřitelné. Tedy  $A$  je s  $E$  dle dvojmoci nesouměřitelná.

Jsou tedy ku přímce dané  $A$  nalezeny dvě přímky s ní nesouměřitelné  $D, E$ , jen dle délky  $D$ , dle dvojmoci pak a ovšem i dle délky  $E$ ; [což právě bylo dokázati].


## XI.

Když jsou čtyři veličiny úměrou a první s druhou jest souměřitelná, i třetí bude souměřitelná se čtvrtou; a když první s druhou jest nesouměřitelná, nesouměřitelná bude i třetí se čtvrtou.

Buďtež úměrou čtyři veličiny  $A, B, C, D$ , tak že  $A : B = C : D$ , a budiž  $A$  s  $B$  souměřitelnou; pravím, že i  $C$  je s  $D$  souměřitelná.

Neboť ježto  $A$  s  $B$  jest souměřitelná, má se tedy  $A$  k  $B$  jako číslo k číslu. Také se má  $A : B = C : D$ ; tedy také  $C$  má se k  $D$  jako číslo k číslu; pročež  $C$  je s  $D$  souměřitelná (X. VI.).

Avšak buď již  $A$  s  $B$  nesouměřitelná; pravím, že i  $C$  bude s  $D$  nesouměřitelná.



<sup>6)</sup> Viz X. VI. důsl.

Neboť ježto  $A$  s  $B$  jest nesouměřitelná, tedy se nemá  $A$  k  $B$  jako číslo k číslu. A  $A : B = C : D$ ; pročež nemá se ani  $C$  k  $D$  jako číslo k číslu; tedy  $C$  je s  $D$  nesouměřitelná.

Když jsou tedy čtyři veličiny atd.

## XII.


Velichiny s touž veličinou souměřitelné jsou i navzájem souměřitelné.

Nuže budiž  $A$  i  $B$  souměřitelnou s  $C$ ; pravím, že je též  $A$  s  $B$  souměřitelná.

Neboť ježto jsou veličiny  $A, C$  souměřitelné, má se tedy  $A$  k  $C$  jako číslo k číslu. Měj se k ní jako  $D$  k  $E$ . Dále, ježto  $C$  jest souměřitelná s  $B$ , tedy  $C$  má se k  $B$  jako číslo k číslu. Měj se k ní jako  $F$  ku  $G$ . A když je dáno několik poměrů,  $D : E$  a  $F : G$ , za čísla po řadě v daných poměrech vezměme  $H, K, L$ , tak aby se mělo  $D : E = H : K$  a  $F : G = K : L$ .

Ježto tedy  $A : C = D : E$ , avšak  $D : E = H : K$ , tedy též  $A : C = H : K$ . Dále ježto  $C : B = F : G$ , avšak  $F : G = K : L$ , tedy též  $C : B = K : L$ . Také však  $A : C = H : K$ ; stejnořadně tedy  $A : B = H : L$ . Pročež  $A$  má se k  $B$  jako číslo  $H$  k číslu  $L$ . Tedy  $A$  je s  $B$  souměřitelná.

Tedy velichiny s touž veličinou souměřitelné i navzájem souměřitelné jsou; což právě bylo dokázati.



## XIII.

Když jsou dvě veličiny souměřitelné a jedna z nich je s nějakou veličinou nesouměřitelná, i zbývající bude s ní nesouměřitelná.

Dvěma veličinami souměřitelnými buďtež  $A, B$  a jedna z nich  $A$  s jinou nějakou  $C$  buď nesouměřitelnou; pravím, že i zbývající  $B$  je s  $C$  nesouměřitelná.

Neboť jest-li  $B$  s  $C$  souměřitelná, také však  $A$  s  $B$  jest souměřitelná, tedy souměřitelná je též  $A$  s  $C$ <sup>7)</sup>. Avšak jest i nesouměřitelná; což právě nemožné. Není tedy  $B$  s  $C$  souměřitelná; pročež nesouměřitelná.


Když jsou tedy dvě veličiny souměřitelné atd.

<sup>7)</sup> Dvě veličiny  $A$  a  $C$  s veličinou  $B$  souměřitelné (X. XII.).

## Výtěžek.

Dány-li dvě přímky nestejně, najdi, oč vyniká čtverec přímky delší nad čtverec přímky kratší.

Dvěma danými přímkami nestejnými buďtež  $AB$ ,  $C$ , z nichžto delší budiž  $AB$ ; má se tedy najíti, oč  $AB^2 > C^2$ .




Budiž na  $AB$  narýsován polokruh  $ADB$  a do něho zapusťme  $AD$  stejnou s  $C$  a vedme spojnicí  $DB$ . Patrně zajisté, že  $\angle ADB$  jest pravý a že  $AB^2 = AD^2$  (t. j.  $C^2$ ) +  $DB^2$ .

Podobně pak, i když dány dvě přímky, najde se takto přímka, jejížto čtverec je čtvercům jejich (součtu) roven.

Dvěma danými přímkami buďtež  $AD$ ,  $DB$  a budiž úkolem najíti přímku, jejížto čtverec je čtvercům jejich roven. Nuže postavme je na sebe kolmo, tak aby svíraly pravý úhel  $ADB$ , a vedme spojnicí  $AB$ ; patrně opět, že  $AB^2 = AD^2 + DB^2$ ; což právě bylo dokázati.

## XIV.

Když jsou čtyři přímky úměrou a rozdíl čtverců z první a druhé je čtverec přímky souměřitelné [dle délky] s první, také rozdíl čtverců ze třetí a čtvrté bude čtverec přímky souměřitelné [dle délky] s třetí. A když rozdíl čtverců z první a druhé je čtverec přímky nesouměřitelné [dle délky] s první, také rozdíl čtverců ze třetí a čtvrté bude čtverec přímky nesouměřitelné [dle délky] s třetí.



Buďtež úměrou čtyři přímky  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ,  $D$ , tak že  $A:B=C:D$ , a budiž  $A^2 = B^2 + E^2$  a  $C^2 = D^2 + F^2$ ; pravím, jest-li  $A$  s  $E$  souměřitelná, že je také  $C$  s  $F$  souměřitelná, pak-li  $A$  s  $E$  nesouměřitelná, že jest i  $C$  s  $F$  nesouměřitelná.

Neboť ježto  $A:B=C:D$ , tedy též  $A^2:B^2=C^2:D^2$  (VI. XXII.). Avšak  $A^2 = E^2 + B^2$  a  $C^2 = D^2 + F^2$ . Tedy  $(E^2 + B^2):B^2 = (D^2 + F^2):D^2$ . Pročež odečtením

(V. XVII.)  $E^2:B^2 = F^2:D^2$ ; tedy též  $E:B = F:D$ , a tak též obráceně  $B:E = D:F$ . Také však  $A:B=C:D$ ; pročež stejnořadně  $A:E = C:F$ . Jest-li tedy  $A$  s  $E$  souměřitelná, jest souměřitelná i  $C$  s  $F$ , pakli  $A$  s  $E$  nesouměřitelná, nesouměřitelná jest i  $C$  s  $F$ .

Když jsou tedy atd.

## XV.

Když se sečtou dvě veličiny souměřitelné, též celek bude s kteroukoli z nich souměřitelný; a když jest celek s jednou z nich souměřitelný, také počáteční veličiny budou souměřitelné.


Nuže buďte sečteny dvě veličiny souměřitelné  $AB$ ,  $BC$ ; pravím, že i celek  $AC$  bude s  $AB$  i s  $BC$  souměřitelný.

Neboť ježto  $AB$ ,  $BC$  jsou souměřitelné, bude jim nějaká veličina měrou. Budiž měrou a budiž to  $D$ . Ježto tedy  $D$  jest měrou veličin  $AB$ ,  $BC$ , bude měrou i celku  $AC$ . Je však měrou i veličin  $AB$ ,  $BC$ ; tedy  $D$  jest měrou veličin  $AB$ ,  $BC$ ,  $AC$ . Pročež  $AC$  jest souměřitelná s  $AB$  i s  $BC$ .

Avšak již buď  $AC$  souměřitelnou s  $AB$ ; pravím již, že též  $AB$ ,  $BC$  jsou souměřitelné.

Neboť ježto  $AC$ ,  $AB$  jsou souměřitelné, bude jim nějaká veličina měrou. Budiž měrou a budiž to  $D$ . Ježto tedy  $D$  jest měrou veličin  $AC$ ,  $AB$ , tedy též zbytku  $BC$  bude měrou. Jest pak měrou i veličiny  $AB$ ; tedy  $D$  jest měrou veličin  $AB$ ,  $BC$ ; pročež  $AB$ ,  $BC$  jsou souměřitelné.

Když se tedy sečtou dvě veličiny atd.




## XVI.

Když se sečtou dvě veličiny nesouměřitelné, též celek bude s kteroukoli z nich nesouměřitelný; a když jest celek s jednou z nich nesouměřitelný, také počáteční veličiny budou nesouměřitelné.

Nuže buďte sečteny dvě veličiny nesouměřitelné  $AB$ ,  $BC$ ; pravím, že též celek  $AC$  jest s  $AB$  i s  $BC$  nesouměřitelný.

Neboť nejsou-li  $CA$ ,  $AB$  souměřitelné, bude jim nějaká veličina měrou. Budiž měrou, možno-li, a budiž to  $D$ . Ježto tedy  $D$  jest měrou veličin  $CA$ ,  $AB$ , bude měrou i zbytku  $BC$ . Je však měrou i veličiny  $AB$ ;  $D$  jest tedy měrou veličin  $AB$ ,  $BC$ . Pročež  $AB$ ,  $BC$  jsou souměřitelné. Je však podmínkou, že jsou též nesouměřitelné; což právě jest nemožné. Tedy veličinám  $CA$ ,  $AB$  nebude žádná veličina měrou; pročež  $CA$ ,  $AB$  jsou nesouměřitelné. Podobně zajisté dokážeme, že též  $AC$ ,  $CB$  jsou nesouměřitelné. Jest tedy  $AC$  s  $AB$  i s  $BC$  nesouměřitelná.

Avšak buď již  $AC$  s jednou z veličin  $AB$ ,  $BC$  souměřitelnou. Budiž tedy nejprve s  $AB$ ; pravím, že též  $AB$ ,  $BC$  jsou souměřitelné. Neboť jsou-li souměřitelné, bude jim nějaká veličina měrou. Buď jim měrou a budiž to  $D$ . Ježto tedy  $D$  jest měrou veličin  $AB$ ,  $BC$ , bude též celku  $AC$  měrou. Jest však měrou i veličiny  $AB$ ;  $D$  jest tedy






měrou veličin  $CA$ ,  $AB$ . Pročež  $CA$ ,  $AB$  jsou souměřitelné; bylo však podmínkou, že jsou též nesouměřitelné; co právě jest nemožné. Tedy veličinám  $AB$ ,  $BC$  nebude měrou veličina žádná; pročež  $AB$ ,  $BC$  jsou nesouměřitelné.

Když se tedy sečtou dvě veličiny atd.

### Výtěžek.

Když se k nějaké přímce přistaví rovnoběžník, tak že se mu nedostává doplňku čtvercového, přistavený útvar jest roven obdélníku z úseček přímky přistavením vzniklých.



Nuže budiž ku přímce  $AB$  přistaven rovnoběžník  $AD$ , tak aby se mu nedostávalo doplňku čtvercového  $DB$ ; pravím, že  $AD = AC \times CB$ .

I jest to samo sebou zřejmé; neboť ežto  $DB$  je čtverec,  $DC = CB$  a  $AD = AC \times CD$ , t. j.  $AC \times CB$ .

Když se tedy k nějaké přímce atd.

### XVII.

Když jsou dvě přímky nestejně a k delší se přistaví útvar rovný čtvrtině čtverce přímky kratší, tak aby se mu nedostávalo doplňku čtvercového, a přímku dělí v části souměřitelné dle délky, rozdíl čtverců z delší a z kratší přímky bude čtverec přímky [dle délky] souměřitelné s přímkou delší. A když rozdíl čtverců z delší a z kratší přímky je čtverec přímky [dle délky] souměřitelné s přímkou delší a když se ku přímce delší přistaví útvar rovný čtvrtině čtverce přímky kratší, tak aby se mu nedostávalo doplňku čtvercového, dělí ji v části souměřitelné dle délky.

Nestejnými dvěma přímkami buďtež  $A$ ,  $BC$ , z nichžto delší  $BC$ , a přistaven buď k  $BC$  útvar rovný čtvrtině čtverce kratší přímky  $A$ ,

t. j.  $\left(\frac{A}{2}\right)^2$ , tak aby se mu nedostávalo

doplňku čtvercového, a budiž to  $BD \times DC$ <sup>9)</sup>,  $BD$  pak budiž s  $DC$  dle délky souměřitelnou; pravím, že  $BC^2 > A^2$  o čtverec přímky souměřitelné s  $BC$ .

Nuže budiž  $BC$  v bodě  $E$  rozpuřena a buď  $DE = EF$ ; tedy zbytek  $DC = BF$ .

A ježto přímka  $BC$  rozdělena jest v  $E$  na části stejné, v  $D$  pak na nestejně, tedy pravouhelník  $BD \times DC + ED^2 = EC^2$  (II. v.), a čtyřnásobně  $4 BD \times DC + 4 DE^2 = 4 EC^2$ . Avšak  $4 BD \times DC = A^2$  a  $4 DE^2 = DF^2$ , neboť  $DF = 2 DE$ ; a  $4 EC^2 = BC^2$ , neboť  $BC = 2 CE$ . Pročež

<sup>9)</sup> Třebas dle II. XIV. postupem opačným.

$A^2 + DF^2 = BC^2$ ; a tak  $BC^2 > A^2$  o  $DF^2$ ; tedy čtverec z  $BC$  jest větší nežli čtverec z  $A$  o čtverec z  $DF$ . Dokázati jest, že  $BC$  je též souměřitelná s  $DF$ . Ježto totiž  $BD$  jest dle délky souměřitelná s  $DC$ , také tedy  $BC$  jest souměřitelná s  $CD$  dle délky (X. xv.). Avšak  $CD$  jest dle délky souměřitelná s  $CD$  a  $BF$ , neboť  $CD = BF$ . Tedy též  $BC$  jest dle délky souměřitelná s  $BC$  a  $CD$ ; a tak i zbývající  $FD$  jest dle délky souměřitelná s  $BC$ . Pročež  $BC^2 > A^2$  o čtverec přímky souměřitelné.

Avšak buď již  $BC^2 > A^2$  o čtverec přímky souměřitelné a k  $BC$  přistaven buď útvar rovný čtvrtině  $A^2$ , tak aby se mu nedostávalo doplňku čtvercového, a budiž to  $BD \times DC$ . Dokázati jest, že jest  $BD$  dle délky s  $DC$  souměřitelná.

Touž úpravu vykonajíce zajisté podobně dokážeme, že  $BC^2 > A^2$  o  $FD^2$ . Jest pak  $BC^2 > A^2$  o čtverec přímky souměřitelné. Tedy  $BC$  je s  $FD$  dle délky souměřitelná; a tak  $BC$  je dle délky souměřitelná i s úsečkami zbývajících  $BF + DC$ . Avšak  $BF + DC$  jsou [dle délky] souměřitelné s  $DC$ . Pročež i  $BC$  je s  $CD$  dle délky souměřitelná; tedy též odčteně  $BD$  jest dle délky s  $DC$  souměřitelná.

Když jsou tedy dvě přímky nestejně atd.


### XVIII.

Když jsou dvě přímky nestejně a k delší se přistaví útvar rovný čtvrtině čtverce přímky kratší, tak aby se mu nedostávalo doplňku čtvercového, a přímku dělí v části nesouměřitelné [dle délky], rozdíl čtverců z delší a z kratší přímky bude čtverec přímky nesouměřitelné s přímkou delší. A když rozdíl čtverců z delší a z kratší přímky je čtverec přímky nesouměřitelné s přímkou delší a když se ku přímce delší přistaví útvar rovný čtvrtině čtverce přímky kratší, tak aby se mu nedostávalo doplňku čtvercového, dělí ji v části nesouměřitelné [dle délky].

Nestejnými dvěma přímkami buďtež  $A$ ,  $BC$ , z nichžto větší  $BC$ ; a k  $BC$  přistaven budiž útvar rovný čtvrtině čtverce přímky kratší  $A$ , tak aby se mu nedostávalo doplňku čtvercového, a budiž to  $BD \times DC$ , a buď  $BD$  s  $DC$  dle délky nesouměřitelnou; pravím, že  $BC^2 > A^2$  o čtverec přímky nesouměřitelné.

Neboť touž úpravu jako dříve vykonajíce podobně dokážeme, že  $BC^2 > A^2$  o  $FD^2$ . Má se dokázati, že  $BC$  je s  $DF$  dle délky nesouměřitelná. Ježto  $BD$  jest zajisté s  $DC$  dle délky nesouměřitelná, tedy též  $BC$  je s  $CD$  dle délky nesouměřitelná (X. xvi.). Avšak  $DC$  jest souměřitelná s  $BF$  i  $DC$ ; pročež i  $BC$  jest nesouměřitelná s  $BF$  i  $DC$ . A tak i se zbývající  $FD$  jest s  $BC$  dle délky nesouměřitelná. A  $BC^2 > A^2$  o  $FD^2$ ; pročež  $BC^2 > A^2$  o čtverec přímky nesouměřitelné.

Buď již naopak  $BC^2 > A^2$  o čtverec přímky nesouměřitelné a k  $BC$  přistaven budiž útvar rovný čtvrtině čtverce přímky  $A$ , tak aby se mu.



nedostávalo doplňku čtvercového, a budiž to  $BD \times DC$ ; má se dokázat, že jest  $BD$  s  $DC$  dle délky nesouměřitelná.

Touž zajisté úpravu vykonajíce podobně dokážeme, že  $BC^2 > A^2$  o  $FD^2$ . Avšak  $BC^2 > A^2$  o čtverec přímky nesouměřitelné. Tedy  $BC$  je s  $FD$  dle délky nesouměřitelná; a tak  $BC$  i se zbývajícím součtem  $BF + DC$  jest nesouměřitelná (X. xvi.). Avšak  $BF + DC$  je s  $DC$  dle délky nesouměřitelné; tedy též  $BC$  je s  $DC$  dle délky nesouměřitelná; a tak i odčteně  $BD$  jest dle délky nesouměřitelná s  $DC$ .

Když jsou tedy dvě přímky atd.


#### Výtěžek.

Ježto dokázáno jest, že přímky souměřitelné dle délky jsou vesměs i dle dvojmoci souměřitelné, které však dle dvojmoci, nejsou vesměs i dle délky, nýbrž mohou ovšem dle délky býti i souměřitelné i nesouměřitelné; patrně, když s danou změrnou jest nějaká dle délky souměřitelná, že se nazývá změrnou a s ní souměřitelnou nejen dle délky, nýbrž i dle dvojmoci, ježto souměřitelné dle délky jsou vesměs i dle dvojmoci souměřitelné.

Pakli s danou změrnou jest nějaká souměřitelná dle dvojmoci jest-li také dle délky, zove se i takto změrnou a s ní souměřitelnou dle délky i dvojmoci; pakli naopak nějaká přímka, s danou změrnou souměřitelná jsouc dle dvojmoci, je s ní dle délky nesouměřitelná, zove se i takto změrnou, jen dle dvojmoci souměřitelnou.

#### XIX.

Pravoúhelník objímáný přímkami změrnými a dle některého z řečených způsobů (v. výtěžek) dle délky souměřitelnými je změrný.



Nuže objímejte pravoúhelník  $AC$  přímkou změrné a dle délky souměřitelné  $AB, BC$ ; pravím, že jest  $AC$  změrné.

Nuže buď narýsován z  $AB$  čtverec  $AD$ ; tedy jest  $AD$  změrné. A ježto  $AB$  jest dle délky s  $BC$  souměřitelná a  $AB = BD$ , tedy  $BD$  je s  $BC$  souměřitelná dle délky. Také  $BD:BC = DA:AC$ . Pročež  $DA$  je s  $AC$  souměřitelné. Avšak  $DA$  je změrné; změrné je tedy též  $AC$ .


Tedy pravoúhelník objímáný přímkami atd

#### XX.

Když se přistaví změrný útvar ku přímce změrné, šířkou činí přímku změrnou a s tou, k níž přistaven jest, dle délky souměřitelnou.

Nuže přistavme ku přímce  $AB$ , opět dle některého z řečených způsobů (X. xviii. výt.) změrné, útvar změrný  $AC$ , šířkou činící přímku  $BC$ ; pravím, že  $BC$  je změrná a s  $BA$  dle délky souměřitelná.

Nuže narýsujeme na  $AB$  čtverec  $AD$ ; tedy  $AD$  je změrné. Změrné však je též  $AC$ ; pročež  $DA$  je s  $AC$  souměřitelné. A  $DA:AC = DB:BC$ ; tedy též  $DB$  je s  $BC$  souměřitelná. Avšak  $DB = BA$ ; pročež  $AB$  je souměřitelná s  $BC$ .  $AB$  však je změrná; tedy i  $BC$  je změrná a s  $AB$  dle délky souměřitelná.




Když se tedy přistaví změrný útvar ku přímce změrné atd.

#### XXI.

Pravoúhelník objímáný přímkami změrnými a jen ve dvojmoci souměřitelnými jest nezměrný, a přímka, jejížto čtverec jest mu roven, jest nezměrná, i nazývej se střední (středuicí).

Nuže objímejte pravoúhelník  $AC$  přímkou změrné a jen ve dvojmoci souměřitelné  $AB, BC$ ; pravím, že  $AC$  jest nezměrné a přímka ve dvojmoci jemu rovná jest nezměrná, i nazývej se střední.





Nuže narýsujeme na  $AB$  čtverec  $AD$ ; čtverec  $AD$  je tedy změrný. A ježto  $AB, BC$  dle délky jsou nesouměřitelné (vzali jsme je totiž za souměřitelné jen dle dvojmoci) a  $AB = BD$ , také  $DB$  je s  $BC$  dle délky nesouměřitelná. A  $DB:BC = AD:AC$  (VI. i.). Tedy  $DA$  je s  $AC$  nesouměřitelné (X. xi.). Avšak  $DA$  je změrné, pročež  $AC$  jest nezměrné. A tak také přímka ve dvojmoci s  $AC$  stejná jest nezměrná; i nazývej se střední<sup>9)</sup>; což právě bylo dokázati.

#### Výtěžek.

Když jsou dvě přímky, první má se ke druhé jako čtverec z první k pravoúhelníku z obou přímek.

<sup>9)</sup> Budiž  $AB \times BC = S^2$ ,  $AB:S = S:BC$ ; proto zajisté Eukl. přímku  $S$  nazývá nezměrnou »střední«. — Sestrojení možno takto: měj se  $CB:BE (= BF)$  jako čísla nečtvercová;  $CB:AB = AB:BF$ , z toho  $CB:BF = CB^2:AB^2$ , tedy  $CB, AB$  jsou jen ve dvojmoci souměřitelné.  $AB \times BC = BD \times BC = BG^2$ ; přímka tedy, jejížto čtverec je stejný s  $AC$ , jest  $BG$  a nazývá se nezměrnou střední.





$EF^2 = GD : FD = GE : EF$ ; což právě bylo dokázati.<sup>10)</sup>

Dvěma přímkami buďtež  $FE$ ,  $EG$ ; pravím, že  $FE : EG = FE^2 : FE \times EG$ .


Nuže narýsován buď z  $FE$  čtverec  $DF$  a budiž doplněno  $GD$ . Ježto tedy  $FE : EG = FD : DG$  a  $FD = FE^2$ ,  $DG = DE \times EG = FE \times EG$ , tedy  $FE : EG = FE^2 : FE \times EG$ . Podobně též  $GE \times EF$ :

## XXII.

Čtverec přímky střední přistavený<sup>11)</sup> ke změrné činí šířkou přímku změrnou a s tou, k níž přistaven, dle délky nesouměřitelnou.

Přímkou střední budiž  $A$ , změrnou pak  $CB$ , a k  $BC$  přistavme pravouhelník s  $A^2$  stejný o šířce  $CD$ ; pravím, že  $CD$  je změrná a s  $CB$  dle délky nesouměřitelná.

Neboť ježto  $A$  je střední, čtverec její rovná se pravouhelníku, objímanému přímkami změrnými, jen ve dvojmoci souměřitelnými (X. XXI.). Čtverec ten budiž stejný s  $GF$ ; avšak je stejný též s  $BD$ ; tedy  $BD = GF$ . Jsou však i stejnoúhlé; ve stejných pak a stejnoúhlých rovnoběžnicích strany při stejnoúhlých úhlech jsou k sobě v poměru obráceném (VI. XIV.); pročež  $BC : EG = EF : CD$ . Tedy též  $BC^2 : EG^2 = EF^2 : CD^2$ . Avšak  $CB^2$  je s  $EG^2$  souměřitelné, neboť obě je změrné; tedy též  $EF^2$  je s  $CD^2$  souměřitelné. Avšak  $EF^2$  je změrné, pročež i  $CD^2$  je změrné; tedy  $CD$  je změrná. A ježto  $EF$  je s  $EG$  dle délky nesouměřitelná, neboť jsou jen ve dvojmoci souměřitelné, a  $EF : EG = EF^2 : FE \times EG$ , tedy  $EF^2$  je s  $FE \times EG$  nesouměřitelné. Avšak s  $EF^2$  jest souměřitelné  $CD^2$ , neboť jsou to veličiny ve dvojmoci změrné, a s  $FE \times EG$  je  $DC \times CB$  souměřitelné, neboť jsou stejná s  $A^2$ , tedy též  $CD^2$  je s  $DC \times CB$  nesouměřitelné. Avšak  $CD^2 : DC \times CB = DC : CB$ ; pročež  $DC$  je s  $CB$  dle délky nesouměřitelná. Tedy  $CD$  je změrná a s  $CB$  dle délky nesouměřitelná; což právě bylo dokázati.



XXIII.

Přímka se střední souměřitelná je střední.


Přímkou střední budiž  $A$  a souměřitelnou s  $A$  budiž  $B$ ; pravím, že též  $B$  je střední.

<sup>10)</sup> Algebr. kratčeji:  $a : b = a : b$ ; násobením poměru druhého veličinou  $a$  bude:  $a : b = a^2 : ab$ .

<sup>11)</sup> Ovšem ve tvaru stejného obdélníku.

Nuže mějme změrnou  $CD$  a k  $CD$  přistavme pravouhelník  $CE$  stejný s  $A^2$ , jenžto šířkou činí přímku  $ED$ ; pročež  $ED$  je změrná a s  $CD$  dle délky nesouměřitelná (X. XXII.). A přistavme k  $CD$  pravouhelník  $CF$  s  $B^2$  stejný, jenžto šířkou činí  $DF$ .

Ježto tedy  $A$  je s  $B$  souměřitelná, též  $A^2$  je s  $B^2$  souměřitelné. Avšak  $A^2 = EC$  a  $B^2 = CF$ ; tedy  $EC$  je s  $CF$  souměřitelné. A  $EC : CF = ED : DF$ ; jest  $ED$  s  $DF$  dle délky souměřitelná.  $ED$  však je změrná a s  $DC$  dle délky nesouměřitelná; pročež i  $DF$  je změrná a s  $DC$  dle délky nesouměřitelná (X. XIII.); tedy  $CD$ ,  $DF$  jsou změrné jen ve dvojmoci souměřitelné. Přímka pak, jejížto čtverec jest roven pravouhelníku objímanému přímkami změrnými a jen ve dvojmoci souměřitelnými, je střední (X. XXI.). A přímka rovná ve dvojmoci útvaru  $CD \times DF$  jest  $B$ ; tedy  $B$  je střední.



Důsledek.

Z toho zajisté patrné, že útvar útvaru střednímu rovný je střední.

Výtěžek.


A rovněž tak, jako bylo při změrných přímkách řečeno, má platnost i při středních, že přímka se střední dle délky souměřitelná slove střední a s ní souměřitelnou nejen dle délky, nýbrž i dle dvojmoci, jelikož vůbec přímky souměřitelné dle délky jsou vesměs i dle dvojmoci souměřitelné. Když pak je s přímkou střední nějaká souměřitelná dle dvojmoci, jest-li též dle délky, též takto se zovou středními a dle délky i dvojmoci souměřitelnými, pakli jen dle dvojmoci (t. jsou souměřitelné), zovou se středními a jen ve dvojmoci souměřitelnými.

## XXIV.

Pravouhelník objímaný přímkami středními, dle délky některým z řečených způsobů souměřitelnými, je střední.

Nuže objímejte pravouhelník  $AC$  přímkou střední  $AB$ ,  $AC$ , souměřitelné dle délky; pravím, že  $AC$  je střední.

Nuže narýsujeme z  $AB$  čtverec  $AD$ ; tedy  $AD$  je střední. A ježto  $AB$  je s  $BC$  dle délky souměřitelná a s  $BD$  stejná, tedy též  $DB$  je s  $BC$  dle délky souměřitelná; a tak i  $DA$  je s  $AC$  souměřitelné (X. XI.). Avšak  $DA$  je střední, pročež také  $AC$  je střední, což právě bylo dokázati.




## XXV.

Pravouhelník objímáný přímkami středními a jen ve dvojnosti souměřitelnými, je buď změrný nebo střední.

Nuže objímejte pravouhelník  $AC$  přímkou střední  $AB$ ,  $BC$ , jen ve dvojnosti souměřitelné; pravím, že  $AC$  je buď změrné nebo střední.


Nuže narýsujme z  $AB$ ,  $BC$  čtverce  $AD$ ,  $BE$ ; tedy  $AD$  i  $BE$  jsou střední. A dána buď změrná  $FG$  a k  $FG$  přistavme pravouhelný rovnoběžník  $GH$  s  $AD$  stejný, jenžto šířkou činí  $FH$ , a k  $HM$  přistavme pravouhelný rovnoběžník  $MK$  s  $AC$  stejný, jenžto šířkou činí  $HK$ , a ještě podobně ke  $KN$  přistavme  $NL$ , stejný s  $BE$ , jenžto šířkou činí  $KL$ ; tedy  $FH$ ,  $HK$ ,  $KL$  jsou v přímce. Ježto tedy  $AD$  a  $BE$  jsou střední a  $AD = GH$  a  $BE = NL$ , tedy též  $GH$  a  $NL$  jsou střední. I jsou to útvary přistavené ke změrné  $FG$ , pročež  $FH$  i  $KL$  jsou změrné a s  $FG$  dle délky nesouměřitelné (X. xxii.).



A ježto  $AD$  s  $BE$  jest souměřitelné, tedy též  $GH$  jest souměřitelné s  $NL$ . A  $GH:NL = FH:KL$ ; pročež  $FH$  je s  $KL$  dle délky souměřitelná (X. xi.). Tedy  $FH$ ,  $KL$  jsou změrné a dle délky souměřitelné; pročež  $FH \times KL$  je změrné (X. xix.). A ježto  $DB = BA$  a  $OB = BC$ , tedy  $DB:BC = AB:BO$ . Avšak  $DB:BC = DA:AC$  a  $AB:BO = AC:CO$ ; pročež  $DA:AC = AC:CO$ . Avšak  $AD = GH$ ,  $AC = MK$ ,  $CO = NL$ ; tedy  $GH:MK = MK:NL$ ; pročež také  $FH:HK = HK:KL$ . Proto  $FH \times KL = HK^2$ . Avšak  $FH \times KL$  je změrné, tedy změrné jest i  $HK^2$ ; pročež  $HK$  je změrná. A jest-li souměřitelná dle délky s  $FG$ , jest  $HN$  změrné; pakli s  $FG$  jest dle délky nesouměřitelná,  $KH$  a  $HM$  jsou toliko ve dvojnosti souměřitelné; tu  $HN$  je střední. Tedy  $HN$  je buďto změrné nebo střední.  $HN$  však rovno  $AC$ ; pročež  $AC$  je buďto změrné nebo střední.

Tedy pravouhelník objímáný přímkami středními atd.

## XXVI.



Rozdíl útvarů středních není změrný.

Nuže, možno-li, budiž střední  $AB$  větší než střední  $AC$  o změrné  $DB$ , a dána buď změrná  $EF$ , a k  $EF$  přistavme pravouhelný rovnoběžník  $FH$  s  $AB$  stejný o šířce  $EH$  a odečteme  $FG$  stejné s  $AC$ , tedy zbývající  $BD = KH$ .  $DB$  pak je změrné; změrné je tedy též  $KH$ . Ježto tedy útvary  $AB$ ,  $AC$  jsou střední a  $AB = FH$ ,  $AC = FG$ , tedy též útvary  $FH$ ,  $FG$  jsou střední. I jsou přistaveny ke změrné  $EF$ , pročež  $HE$ ,  $EG$  jsou změrné a s  $EF$  dle délky nesouměřitelné (X. xxii.). A ježto  $DB$  je změrné a stejné s  $KH$ , tedy změrné jest i  $KH$ . I jest přista-

veno ke změrné  $EF$ ; pročež  $GH$  je změrná a s  $EF$  dle délky souměřitelná (X. xx.). Avšak i  $EG$  je změrná a s  $EF$  dle délky nesouměřitelná; pročež  $EG$  je s  $GH$  dle délky nesouměřitelná (X. xiii.) A  $EG:GH = EG^2:EG \times GH$ ; tedy  $EG^2$  je s  $EG \times GH$  nesouměřitelné. Avšak s  $EG^2$  jsou čtverce  $EG^2 + GH^2$  souměřitelné (neboť obé je změrné); s  $EG \times GH$  však souměřitelné jest  $2EG \times GH$  (neboť jest to dvojnásobek); tedy  $EG^2 + GH^2$  je s  $2EG \times GH$  nesouměřitelné. Proto též součet  $EG^2 + GH^2 + 2EG \times GH$ , což jest  $EH^2$ , je s  $EG^2 + GH^2$  nesouměřitelný (X. xvi.). Avšak  $EG^2 + GH^2$  je změrné; pročež  $EH^2$  jest nezměrné (X. vým. 4.). Tedy  $EH$  jest nezměrná. Avšak také změrná; což právě jest nemožné.


Tedy rozdíl útvarů středních není změrný; což právě bylo dokázati.

## XXVII.

Najdi přímkou střední jen ve dvojnosti souměřitelné, aby objímaly útvar změrný.

Mějme za dvě přímkou změrné, jen ve dvojnosti souměřitelné,  $A$ ,  $B$  a za střední úměrnou přímek  $A$ ,  $B$  vezmeme  $C$  a učiníme  $A:B = C:D$ .

A ježto  $A$ ,  $B$  jsou změrné a jen ve dvojnosti souměřitelné, tedy  $A \times B$ , t. j.  $C^2$ , je střední (X. xxi.). Pročež  $C$  je střední (*ib.*). A ježto  $A:B = C:D$ , avšak  $A$ ,  $B$  jsou jen ve dvojnosti souměřitelné, tedy též  $C$ ,  $D$  jsou jen ve dvojnosti souměřitelné. I jest  $C$  střední; pročež i  $D$  je střední (X. xxiii.). Tedy  $C$  a  $D$  jsou střední, jen ve dvojnosti souměřitelné. Pravím, že objímají útvar změrný. Neboť ježto  $A:B = C:D$ , střídavě tedy  $A:C = B:D$ . Avšak  $A:C = C:B$ , pročež  $C:B = B:D$ . Tedy  $C \times D = B^2$ ;  $B^2$  však je změrné, pročež i  $C \times D$  je změrné.




Jsou tedy nalezeny přímkou střední, jen ve dvojnosti souměřitelné, takže objímají útvar změrný; což právě bylo dokázati.

## XXVIII.

Najdi přímkou střední, jen ve dvojnosti souměřitelné, aby objímaly útvar střední (srv. X. xxv.)

Přímkami změrnými, jen ve dvojnosti souměřitelnými, buďtež  $A$ ,  $B$ ,  $C$  a za střední úměrnou přímek  $A$ ,  $B$  vezmeme  $D$  a učiníme  $B:C = D:E$ .

Ježto  $A$ ,  $B$  jsou změrné, jen ve dvojnosti souměřitelné, jest tedy  $A \times B$ , t. j.



$D^2$ , střední (X. XXI.); tedy  $D$  je střední. A ježto  $B, C$  jsou jen ve dvojmoci souměřitelné a  $B:C = D:E$ , tedy také  $D, E$  jsou jen ve dvojmoci souměřitelné. Avšak  $D$  je střední, pročež i  $E$  je střední (X. XXIII.); tedy  $D, E$  jsou střední, jen ve dvojmoci souměřitelné. Pravím již, že též objímají útvar střední. Neboť ježto  $B:C = D:E$ , střídavě tedy  $B:D = C:E$ ; avšak  $B:D = D:A$ , pročež i  $D:A = C:E$ . Tedy  $A \times C = D \times E$ ;  $A \times C$  však je střední, pročež i  $D \times E$  je střední.

Jsou tedy nalezeny přímky střední, jen ve dvojmoci souměřitelné, takže objímají útvar střední, což právě bylo dokázati.

#### Výtěžek I.

**A** Najdi dvě čísla čtvercová, by též součet jejich byl čtvercový.  
**D** Mějme dvě čísla  $AB, BC$ , a buďtež (pokaždé obě) buďto sudá buďto lichá. A ježto zbytek jest sudý, ať se odečte sudé od sudého, ať liché od lichého; zbytek tedy  $AC$  jest sudý. Rozpolme  $AC$  v  $D$ . Buďte pak též  $AB, BC$  buďto podobné roviny buďto čtverce, jež i samy jsou podobné roviny. Tedy  $AB \times BC + CD^2 = BD^2$  (II. VI.). I jest  $AB \times BC$  čtverec, ježto bylo dokázáno (IX. I.), když dvě podobné roviny<sup>12)</sup> vespolek se znásobí, že vzniklé číslo je čtverec. Jsou tedy nalezena dvě čísla čtvercová  $AB \times BC$  a  $CD^2$ , jejichžto součet je čtverec  $BD^2$ .

**C** I jest patrné, že opět nalezeny jsou dva čtverce  $BD^2$  a  $CD^2$ , takže rozdíl jejich  $AB \times BC$  je čtverec, jsou-li  $AB, BC$  podobné roviny. Pakli to nejsou podobné roviny, nalezeny jsou dva čtverce  $BD^2, DC^2$ , jejichžto rozdíl  $AB \times BC$  není čtverec; což právě bylo dokázati.

#### Výtěžek II.

**A** Najdi dvě čísla čtvercová, by součet jejich nebyl čtvercový.  
**G** Nuže budiž  $AB \times BC$ , jak jsme pravili (výt. I.), čtvercem a  $CA$  sudým a rozpolme  $CA$  v  $D$ ; patrné zajisté, že  $AB \times BC + CD^2 = BD^2$  (výt. I.). Odečteme jednotku  $DE$ ; tedy  $(AB \times BC + CE^2) < BD^2$ . Pravím již, že součet čtverců  $AB \times BC + CE^2$  není čtverec.

**H** Neboť bude-li to čtverec, buď jest roven čtverci  $BE^2$  buď jest menší než  $BE^2$ , nikoli však také větší, aby se jednotka nestala zlomkem.<sup>13)</sup>

**D** Budiž dříve, možno-li,  $AB \times BC + CE^2 = BE^2$  a budiž  $GA = 2DE$ . A ježto celek  $AC = 2CD$ , z čehož  $AG = 2DE$ , tedy též zbytek  $GC = 2EC$ ; pročež  $GC$  jest v  $E$  rozpuřeno. Tedy  $GB \times BC + CE^2 = BE^2$  (II. VI.). Avšak dle podmínky též  $AB \times BC + CE^2 = BE^2$ . Tedy  $GB \times BC + CE^2 = AB \times BC + CE^2$ ; a ode-

<sup>12)</sup> T. čísla plošného obsahu dvou podobných rovin.

<sup>13)</sup> Neboť součet jest menší než  $BD^2$ , a byl-li by větší než  $BE^2$ , byl by rozdíl menší než jednotka, tedy zlomek.

čteme-li společně  $CE^2$ , nabýváme výsledku, že  $AB = GB$ ; což právě nemožné. Pročež  $AB \times BC + CE^2$  nerovná se čtverci  $BE^2$ ; Pravím již, že není ani menší než  $BE^2$ . Nuže, možno-li, budiž to rovno čtverci  $BF^2$  a  $HA = 2DF$ , i dospějeme opět toho, že  $HC = 2CF$ ; a tak i  $CH$  jest rozpuřeno v  $F$ , a proto  $HB \times BC + FC^2 = BF^2$ . Je však dle podmínky též  $AB \times BC + CE^2 = BF^2$ . Tedy bude též  $HB \times BC + FC^2 = AB \times BC + CE^2$ ; což právě nemožné. Tedy  $AB \times BC + CE^2$  není rovno čtverci menšímu než  $BE^2$ . Bylo pak dokázáno, že ani čtverci  $BE^2$ . Pročež  $AB \times BC + CE^2$  není čtverec;<sup>14)</sup> což právě bylo dokázati.

#### XXIX.

Najdi dvě přímky změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné, tak aby rozdíl čtverců z delší a z kratší byl čtverec přímky s delší souměřitelné dle délky.

Nuže mějme nějakou změrnou  $AB$  a dvě čísla čtvercová  $CD, DE$ , tak aby rozdíl jejich  $CE$  nebyl čtverec a narýsován buď na  $AB$  polokruh  $AFB$  a učiňme  $DC:CE = BA^2:AF^2$  (X. VI. důsl.) a vedme spojnicí  $FB$ .

Ježto  $BA^2:AF^2 = DC:CE$ , tedy  $BA^2$  má se k  $AF^2$  jako číslo  $DC$  k číslu  $CE$ ; pročež  $BA^2$  je s  $AF^2$  souměřitelné. Avšak  $AB^2$  je změrné, změrné tedy je též  $AF^2$ , pročež je změrná též  $AF$ . A ježto  $DC$  nemá se k  $CE$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému, nemá se tedy ani  $BA^2$  k  $AF^2$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému; pročež  $AB$  je s  $AF$  dle délky nesouměřitelná (X. IX.); tedy  $AB, AF$  jsou změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné. A ježto  $DC:CE = BA^2:AF^2$ , tedy zvrtně  $CD:DE = AB^2:AF^2$  (V. vým. 16.).  $CD$  však má se k  $DE$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému, pročež také  $AB^2$  má se k  $BF^2$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému; tedy  $AB$  je s  $BF$  dle délky souměřitelná (X. IX.). I jest  $AB^2 = AF^2 + FB^2$ . Pročež  $AB^2 > AF^2$  o čtverec z  $BF$  s  $AB$  souměřitelné.

Nalezeny jsou tedy dvě přímky změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné  $BA, AF$ , takže rozdíl čtverců z delší a z kratší je čtverec přímky s delší souměřitelné dle délky; což právě bylo dokázati.

#### XXX.


Najdi dvě přímky změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné, tak aby rozdíl čtverců z delší a z kratší byl čtverec přímky s delší nesouměřitelné dle délky.

Mějme změrnou  $AB$  a dvě čísla čtvercová  $CE, ED$ , tak aby součet

<sup>14)</sup> Další asi tři řádky nepocházející od Eukl.

jejich  $CD$  nebyl čtverec a narýsujme na  $AB$  polokruh  $AFB$  a učiňme  $DC:CE=BA^2:AF^2$  (X. vi. důsl.) a veďme spojnicí  $FB$ .

Podobně zajisté jako svrchu dokážeme, že  $BA, AF$  jsou změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné. A ježto  $DC:CE=BA^2:AF^2$ , tedy zvrtně  $CD:DE=AB^2:BF^2$  (V. vým. 16.). Avšak  $CD$  nemá se k  $DE$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému; ani tedy  $AB^2$  nemá se k  $BF^2$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému. Pročež  $AB$  je s  $BF$  dle délky nesouměřitelná. I jest  $AB^2 > AF^2$  o čtverec přímky  $FB$  s  $AB$  nesouměřitelné.



Jsou tedy  $AB, AF$  změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné a  $AB^2 > AF^2$  o čtverec přímky  $FB$  s  $AB$  dle délky nesouměřitelné; což právě bylo dokázati.

XXXI.

Najdi dvě přímky střední, jen ve dvojmoci souměřitelné, aby objímaly útvar změrný a rozdíl čtverců z delší a z kratší aby byl čtverec přímky s delší souměřitelné dle délky.


Mějme dvě přímky změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné,  $A, B$ , tak aby rozdíl čtverců přímky delší  $A$  a kratší  $B$  byl čtverec přímky s delší souměřitelné dle délky (X. xxix.). I budiž  $C^2 = A \times B$ . Avšak  $A \times B$  je střední (X. xxix.); tedy též  $C^2$  je střední. A budiž  $C \times D = B^2$ ;  $B^2$  však je změrné, pročež i  $C \times D$  je změrné. A ježto  $A:B = A \times B:B^2$ , avšak  $A \times B = C^2$  a  $B^2 = C \times D$ , tedy  $A:B = C^2:C \times D$ . Avšak  $C^2:C \times D = C:D$ ; pročež také  $A:B = C:D$ . Jest pak  $A$  s  $B$  jen ve dvojmoci souměřitelná; pročež i  $C$  je s  $D$  souměřitelná jen ve dvojmoci. I jest  $C$  střední; střední je tedy též  $D$  (X. xxiii.). A ježto  $A:B = C:D$  a  $A^2 > B^2$  o čtverec přímky s  $A$  souměřitelné, také  $C^2 > D^2$  o čtverec přímky s  $C$  souměřitelné (X. xiv.).

Jsou tedy nalezeny dvě přímky střední, jen ve dvojmoci souměřitelné,  $C, D$ , jež objímají útvar změrný, a rozdíl čtverců z přímek  $C$  a  $D$  je čtverec přímky s  $C$  souměřitelné dle délky.

Podobně ovšem dokážeme také, že rozdíl je čtverec přímky nesouměřitelné, když  $A^2 > B^2$  o čtverec přímky s  $A$  nesouměřitelné (viz X. xxx.).


XXXIi.

Najdi dvě přímky střední, jen ve dvojmoci souměřitelné, aby objímaly útvar střední a rozdíl čtverců



z přímky delší a kratší aby byl čtverec přímky s delší souměřitelné.

Mějme tři přímky změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné,  $A, B, C$ , tak aby byla  $A^2 > C^2$  o čtverec přímky s  $A$  souměřitelné (X. xxix.), a budiž  $A \times B = D^2$ . Pročež  $D^2$  je střední; i  $D$  je tedy střední. Budiž pak  $B \times C = D \times E$ . A ježto  $A \times B:B \times C = A:C$ , avšak  $A \times B = D^2$  a  $B \times C = D \times E$ , tedy  $A:C = D^2:D \times E$ . Avšak  $D^2:D \times E = D:E$ ; pročež také  $A:C = D:E$ . Jest pak  $A$  s  $C$  ve dvojmoci souměřitelná; tedy též  $D$  s  $E$  jen ve dvojmoci souměřitelná. Avšak  $D$  je střední, střední je tedy též  $E$  (X. xxiii.). A ježto  $A:C = D:E$ ,  $A^2$  pak  $> C^2$  o čtverec přímky s  $A$  souměřitelné, tedy bude též  $D^2 > E^2$  o čtverec přímky s  $D$  souměřitelné. Pravím již, že také je  $D \times E$  střední. Neboť ježto  $B \times C = D \times E$ ,  $B \times C$  však je střední (X. xxix.) [neboť  $B, C$  jsou změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné]; pročež i  $D \times E$  je střední.



Jsou tedy nalezeny dvě přímky střední, jen ve dvojmoci souměřitelné,  $D, E$ , objímající útvar střední, takže rozdíl čtverců z přímky delší a kratší je čtverec přímky s delší souměřitelné.

Podobně ovšem opět dokážeme také, že rozdíl je čtverec přímky nesouměřitelné, když  $A^2 > C^2$  o čtverec přímky s  $A$  nesouměřitelné (viz X. xxx.).

Výtěšek.<sup>15)</sup>

Budiž  $ABC$  trojúhelníkem pravoúhlým, jenž má pravý úhel  $A$ , a veďme kolmici  $AD$ ; pravím, že  $CB \times BD = BA^2$ ,  $BC \times CD = CA^2$  a  $BD \times DC = AD^2$  a též  $BC \times AD = BA \times AC$ .


A nejprve, že  $CB \times BD = BA^2$ .

Neboť ježto v trojúhelníku pravoúhlém jest od pravého úhlu na základnu vedena kolmice  $AD$ ,  $\triangle ABD \sim \triangle ADC \sim \triangle ABC$ . A ježto  $\triangle ABC \sim \triangle ABD$ , tedy  $CB:BA = BA:BD$ ; pročež  $CB \times BD = BA^2$ .

Z téže příčiny ovšem i  $BC \times CD = AC^2$ .

A ježto v trojúhelníku pravoúhlém, když se vede od úhlu pravého na základnu kolmice, ta je střední úměrnou úsečkou základny, tedy  $BD:DA = DA:DC$ ; pročež  $BD \times DC = DA^2$ .

Pravím, že též  $BC \times AD = BA \times AC$ . Neboť ježto jest, jak jsme




<sup>15)</sup> Náleží jinam, nepochybně do kn. VI.

pravili,  $ABC \sim ABD$ , tedy  $BC:CA = BA:AD$ . Pročež  $BC \times AD = BA \times AC$ ; což právě bylo dokázati.

## XXXIII.

Najdi dvě přímky ve dvojmoci nesouměřitelné, aby součet čtverců jejich byl změrný, pravoúhelník však střední.

Mějme dvě přímky změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné,  $AB$ ,  $BC$ , tak aby čtverec z delší, t.  $AB^2$ , byl větší nežli čtverec přímky kratší, t.  $BC^2$ , o čtverec přímky s  $AB$  nesouměřitelné (X. xxx.) a rozpolme  $BC$  v  $D$  a ku přímce  $AB$  přistavme rovnoběžník, tak aby se mu nedostávalo doplňku čtvercového (VI. xxviii.), a budiž to  $AE \times EB$ , a narýsujme na  $AB$  polokruh  $AFB$  a vztyčme na  $AB$  kolmici  $EF$  a veďme spojnice  $AF$ ,  $FB$ .



A ježto přímky  $AB$ ,  $BC$  jsou nestejně a  $AB^2 > BC^2$  o čtverec přímky s  $AB$  nesouměřitelné a ku přímce  $AB$  přistaven jest rovnoběžník<sup>16)</sup> rovný čtvrtině čtverce  $BC^2$ , t. j.  $\left(\frac{BC}{2}\right)^2$ , a nedostává se mu doplňku čtvercového a je to  $AE \times EB$ , tedy jest  $AE$  s  $EB$  nesouměřitelná (X. xviii.). I má se  $AE:EB = BA \times AE:AB \times BE$ ; a  $BA \times AE = AF^2$ ,  $AB \times BE = BF^2$ , pročež jsou čtverce  $AF^2$  a  $BF^2$  nesouměřitelné (X. xi.); tedy  $AF$ ,  $FB$  jsou ve dvojmoci nesouměřitelné. A ježto  $AB$  je změrná, změrný tedy jest i čtverec  $AB^2$ ; pročež i součet  $AF^2 + BF^2$  je změrný (I. xlvi.). A ježto dále  $AE \times EB = EF^2$  a dle podmínky též  $AE \times EB = BD^2$ , tedy  $FE = BD$ ; pročež  $BC = 2FE$ . A tak též  $AB \times BC$  jest s  $AB \times EF$  souměřitelné.  $AB \times BC$  však je střední (X. xxi.); pročež i  $AB \times EF$  je střední. Avšak  $AB \times EF = AF \times FB$ ; tedy též  $AF \times FB$  je střední. Bylo pak také dokázáno, že součet čtverců jejich je změrný.

Jsou tedy nalezeny dvě přímky ve dvojmoci nesouměřitelné  $AF$ ,  $FB$ , takže součet čtverců jejich je změrný, pravoúhelník (součin) však střední; což právě bylo dokázati.

## XXXIV.


Najdi dvě přímky ve dvojmoci nesouměřitelné, aby součet čtverců jejich byl střední, pravoúhelník však změrný.

Mějme dvě přímky střední, jen ve dvojmoci souměřitelné,  $AB$ ,  $BC$ , aby jejich pravoúhelník byl změrný a byla  $AB^2 > BC^2$  o čtverec přímky s  $AB$  nesouměřitelné (X. xxxi.), a narýsujme na  $AB$  polokruh  $ADB$  a rozpolme  $BC$  v  $E$  a přistavme ku přímce  $AB$  rovnoběžník  $AF \times FB$ , stejný se čtvercem  $BE^2$ , tak aby se mu nedostávalo doplňku

<sup>16)</sup> Třeba si na obrázci domysliť.

čtvercového (VI. xxviii.); tu jest  $AF$  s  $FB$  dle délky nesouměřitelná (X. xviii.). I vztyčme v  $F$  na  $AB$  kolmici  $FD$  a veďme spojnice  $AD$ ,  $DB$ .

Ježto  $AF$  je s  $FB$  nesouměřitelná, tedy též  $BA \times AF$  jest s  $AB \times BF$  nesouměřitelné. Avšak  $BA \times AF = AD^2$ ,  $AB \times BF = DB^2$ ; pročež také  $AD^2$  je s  $DB^2$  nesouměřitelné. A ježto  $AB^2$  je střední, tedy též součet  $AD^2 + DB^2$  je střední. A ježto  $BC = 2DF$ , tedy též  $AB \times BC = 2AB \times FD$ .  $AB \times BC$  však je změrné, směrné jest tedy také  $AB \times FD$ . Avšak  $AB \times FD = AD \times DB$ ; pročež také  $AD \times DB$  je změrné.



Jsou tedy nalezeny dvě přímky ve dvojmoci nesouměřitelné  $AD$ ,  $DB$ , takže součet čtverců jejich je střední, pravoúhelník však změrný; což právě bylo dokázati.

## XXXV.

Najdi dvě přímky ve dvojmoci nesouměřitelné, aby součet čtverců jejich byl střední a pravoúhelník střední a mimo to se součtem čtverců jejich nesouměřitelný.

Mějme dvě přímky střední ve dvojmoci nesouměřitelné  $AB$ ,  $BC$ ,<sup>17)</sup> aby objímaly útvar střední a rozdíl čtverců jejich aby byl čtverec přímky s  $AB$  nesouměřitelné (X. xxxii.), a narýsujme na  $AB$  polokruh  $ADB$  a ostatek upravme podobně jako svrchu.

A ježto  $AF$  je s  $FB$  dle délky nesouměřitelná, jest také  $AD$  s  $DB$  ve dvojmoci nesouměřitelná (X. xi.). A ježto  $AB^2$  je střední, tedy též součet  $AD^2 + DB^2$  je střední. A ježto  $AF \times FB = BE^2 = DF^2$ , jest tedy  $BE = DF$ ; pročež  $BC = 2FD$ ; a tak též  $AB \times BC = 2AB \times FD$ . Avšak  $AB \times BC$  je střední, pročež také  $AB \times FD$  je střední. I je stejné  $AD \times DB$ ; tedy též  $AD \times DB$  je střední. A ježto  $AB$  je s  $BC$  dle délky nesouměřitelná,  $CB$  však s  $BE$  souměřitelná, tedy též  $AB$  je s  $BE$  dle délky nesouměřitelná; a tak i čtverec  $AB^2$  je s  $AB \times BE$  nesouměřitelný. Avšak  $AD^2 + DB^2 = AB^2$  a  $AB \times FD$ , t. j.  $AD \times DB = AB \times BE$ ; pročež součet  $AD^2 + DB^2$  je s  $AD \times DB$  nesouměřitelný.

Jsou tedy nalezeny dvě přímky  $AD$ ,  $DB$  ve dvojmoci nesouměřitelné, takže součet čtverců jejich je střední i pravoúhelník z nich je střední a mimo to se součtem čtverců jejich nesouměřitelný; což právě bylo dokázati.

## XXXVI.

Když se sečtou dvě přímky změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné, celá jest nezměrná; i nazývájme ji *dvoučástnou* (dvoučástnicí).

<sup>17)</sup> Dle vyobr. předešlého.

Nuže buďte sečteny dvě přímky změrné  $AB$ ,  $BC$ , jen ve dvojmoci souměřitelné; pravím, že celá  $AC$  jest nezměrná.

Neboť ježto  $AB$  je s  $BC$  dle délky nesouměřitelná (neboť jsou jen ve dvojmoci souměřitelné) a  $AB:BC = AB \times BC:BC^2$ , tedy jest  $AB \times BC$  s  $BC^2$  nesouměřitelné. Avšak s  $AB \times BC$  je  $2AB \times BC$  souměřitelné a s  $BC^2$  jest souměřitelný součet  $AB^2 + BC^2$  (neboť  $AB$ ,  $BC$  jsou změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné); tedy  $2AB \times BC$  je s  $AB^2 + BC^2$  nesouměřitelné. A součtetně  $2AB \times BC + AB^2 + BC^2$ , t. j.  $AC^2$ , je s  $AB^2 + BC^2$  nesouměřitelné (X. xvi.). Avšak  $AB^2 + BC^2$  je změrné, pročež  $AC^2$  je nezměrné; a tak též  $AC$  jest nezměrná, i nazýváme ji dvoučástnou; což právě bylo dokázati.<sup>18)</sup>



## XXXVII.

Když se sečtou dvě přímky střední, jen ve dvojmoci souměřitelné, jež objímají útvar změrný, celá jest nezměrná; i nazýváme ji dvoustřednicí první.

Nuže buďte sečteny dvě přímky střední, jen ve dvojmoci souměřitelné,  $AB$ ,  $BC$ , jež objímají útvar změrný (X. xxvii.); pravím, že celá  $AC$  jest nezměrná.

Neboť ježto  $AB$  je s  $BC$  dle délky nesouměřitelná, tedy též  $AB^2 + BC^2$  je s  $2AB \times BC$  nesouměřitelné; a součtetně  $AB^2 + BC^2 + 2AB \times BC$ , t. j.  $AC^2$  jest s  $2AB \times BC$  nesouměřitelné (X. xvi.). Avšak  $2AB \times BC$  je změrné, neboť dle podmínky  $AB$ ,  $BC$  objímají útvar změrný; pročež  $AC^2$  jest nezměrné; nezměrná tedy jest  $AC$ ; i nazýváme ji dvoustřednicí první; což právě bylo dokázati.




## XXXVIII.

Když se sečtou dvě přímky střední, jen ve dvojmoci souměřitelné, jež objímají útvar střední, celá jest nezměrná; i nazýváme ji dvoustřednicí druhou.

Nuže buďte sečteny dvě přímky střední, jen ve dvojmoci souměřitelné,  $AB$ ,  $BC$ , jež objímají útvar střední (X. xxviii.); pravím, že  $AC$  jest nezměrná.

Nuže mějme změrnou  $DE$  a přistavme k  $DE$  útvar  $DF$  rovný čtverci  $AC^2$ , šířkou činící  $DG$ . A ježto  $AC^2 = AB^2 + BC^2 + 2AB \times BC$ , tož přistavme k  $DE$  útvar  $EH$  stejný s  $AB^2 + BC^2$ ; zbývající tedy  $HF = 2AB \times BC$ . A ježto  $AB$ ,  $BC$  jsou střední, jest tedy střední též  $AB^2 + BC^2$ . Střední však je dle podmínky též  $2AB \times BC$ . Také  $AB^2 + BC^2 = EH$  a  $2AB \times BC = HF$ ; tedy  $EH$  i  $HF$  jsou střední. A jsou



<sup>18)</sup> X. XXI. pozn. 9. jest nezměrnou dvoučástnou  $CD$ .

přistaveny ke změrné  $DE$ ; pročež  $DH$  i  $HG$  jsou změrné a s  $DE$  dle délky nesouměřitelné (X. xxii.). Ježto tedy  $AB$  je s  $BC$  dle délky nesouměřitelná a  $AB:BC = AB^2:AB \times BC$ , tedy  $AB^2$  je s  $AB \times BC$  nesouměřitelné. Avšak s  $AB^2$  jest  $AB^2 + BC^2$  souměřitelné (X. xv.) a s  $AB \times BC$  jest souměřitelné  $2AB \times BC$ . Pročež  $AB^2 + BC^2$  je s  $2AB \times BC$  nesouměřitelné. Avšak  $AB^2 + BC^2 = EH$  a  $2AB \times BC = HF$ . Proto  $EH$  je s  $HF$  nesouměřitelné; a tak i  $DH$  je s  $HG$  dle délky nesouměřitelná. Tedy  $DH$ ,  $HG$  jsou změrné, jen dle dvojmoci souměřitelné. Pročež  $DG$  jest nezměrná (X. xxxvi.).  $DE$  však je změrná; pravoúhelník pak objímáný nezměrnou a změrnou jest nezměrný. Tedy útvar  $DF$  jest nezměrný, a přímka ve dvojmoci mu rovná jest nezměrná. Avšak  $DF = AC^2$ ; tedy  $AC$  jest nezměrná; i nazýváme ji dvoustřednicí druhou. Což právě bylo dokázati.

## XXXIX.

Když se sečtou dvě přímky ve dvojmoci nesouměřitelné a součet jejich čtverců je změrný, pravoúhelník však střední, celá přímka jest nezměrná; i nazýváme ji (nezměrnou) větší.

Nuže buďte sečteny dvě přímky ve dvojmoci nesouměřitelné  $AB$ ,  $BC$ , řečeným podmínkám vyhovující (X. xxxiii.); pravím, že  $AC$  jest nezměrná.

Neboť ježto  $AB \times BC$  je střední, též  $2AB \times BC$  střední jest. Avšak  $AB^2 + BC^2$  je změrné, tedy  $2AB \times BC$  je s  $AB^2 + BC^2$  nesouměřitelné; a tak též  $AB^2 + BC^2 + 2AB \times BC$ , což jest právě  $AC^2$ , jest s  $AB^2 + BC^2$  nesouměřitelné (X. xvi.). Pročež  $AC^2$  jest nezměrné; tedy též  $AC$  jest nezměrná; i nazýváme ji větší. Což právě bylo dokázati.



## XL.

Když se sečtou dvě přímky ve dvojmoci nesouměřitelné a součet čtverců jejich je střední, pravoúhelník pak změrný, celá přímka jest nezměrná, i nazýváme ji základnicí útvaru změrného a středního.

Nuže buďte sečteny dvě přímky ve dvojmoci nesouměřitelné  $AB$ ,  $BC$ , řečeným podmínkám vyhovující (X. xxxiv.); pravím, že  $AC$  jest nezměrná.

Neboť ježto součet  $AB^2 + BC^2$  je střední a  $2AB \times BC$  změrné, tedy  $AB^2 + BC^2$  je s  $2AB \times BC$  nesouměřitelné; pročež také  $AC^2$  je s  $2AB \times BC$  nesouměřitelné. Avšak  $2AB \times BC$  je změrné; pročež  $AC^2$  jest nezměrné.  $AC$  je tedy nezměrná; i nazýváme ji základnicí útvaru změrného a středního.<sup>19)</sup>




<sup>19)</sup> Eukl.: ἑστὸν καὶ μέσον δυναμῆν, t. j. přímka, která jest základem čtverce stejného se součtem útvaru změrného a středního.



## XLI.

Když se sečtou dvě přímky ve dvojmoci nesouměřitelné a součet čtverců jejich je střední i pravoúhelník střední a také se součtem čtverců jejich nesouměřitelný, celá přímka jest nezměrná, i nazýváme ji *základnicí dvou útvarů středních*.

Nuže buďte sečteny dvě přímky ve dvojmoci nesouměřitelné  $AB$ ,  $BC$ , řečeným podmínkám vyhovující (X. xxxv.); pravím, že  $AC$  jest nezměrná.



Mějme změrnou  $DE$  a k  $DE$  přistavme  $DF$  stejné s  $AB^2 + BC^2$  a  $GH$  stejné s  $2AB \times BC$ ; tedy celek  $DH = AC^2$ . A ježto  $AB^2 + BC^2$  je střední a stejné s  $DF$ , tedy též  $DF$  je střední. Také jest přistaveno ke změrné  $DE$ ; pročež  $DG$  je změrná a s  $DE$  dle délky nesouměřitelná (X. xxii.). Z téže příčiny ovšem i  $GK$  je změrná a s  $GF$ , t. j.  $DE$  dle délky nesouměřitelná. A ježto  $AB^2 + BC^2$  s  $2AB \times BC$  jest nesouměřitelné, je  $DF$  s  $GH$  nesouměřitelné; pročež i  $DG$  je s  $GK$  nesouměřitelná. A jsou změrné; tedy  $DG$ ,  $GK$  jsou změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné; pročež

$DK$  jest nezměrná řečená dvoučástná. Změrná však  $DE$ ; tedy  $DH$  jest nezměrné i čtverec mu rovný jest nezměrný. Základem pak čtverce stejného s  $HD$  jest  $AC$ ; pročež  $AC$  jest nezměrná, i nazýváme ji *základnicí dvou útvarů středních*.<sup>20)</sup> Což právě bylo dokázati.

## Výtěžek.

Že však řečené přímky nezměrné jen jednako se dělí v ty úsečky, z nichž se skládají, tvoříce jimi žádané útvary, dokážeme teprve vyložice napřed tento výtěžek.

Mějme přímku  $AB$  a rozdělme celou v části nestejně v  $C$  a v  $D$  a budiž podmínkou, že  $AC > DB$ ; pravím, že  $(AC^2 + CB^2) > (AD^2 + DB^2)$ .

Nuže rozpolme  $AB$  v  $E$ . A ježto  $AC > DB$ , odejměme společnou  $DC$ ; zbývající tedy  $AD > CB$ . Avšak  $AE = EB$ ; pročež  $DE < EC$ ; tedy body  $C$ ,  $D$  nejsou stejně vzdáleny bodu rozpolovacího. A ježto  $AC \times CB + EC^2 = EB^2$  (II. v.), avšak zajisté též  $AD \times DB + DE^2 = EB^2$ , tedy  $AC \times CB + EC^2 = AD \times DB + DE^2$ , z čehož  $DE^2 < EC^2$ ; pročež zbývající  $AC \times CB < AD \times DB$ , takže též  $2AC \times CB < 2AD \times DB$ . Tedy též zbývající<sup>21)</sup>  $(AC^2 + CB^2) > (AD^2 + DB^2)$ ; což právě bylo dokázati.

<sup>20)</sup> Eukl.: δύο μέσα ὀρθογώνη, jejíž čtverec jest roven součtu dvou útvarů středních.

<sup>21)</sup> To patrně z rovnice  $AC^2 + CB^2 + 2AC \times CB = AD^2 + DB^2 + 2AD \times DB$ .

## XLII.

Nezměrná přímka dvoučástná dělí se ve své části jen v jediném bodě.

Dvoučástnici budiž  $AB$ , rozdělena jsouc ve své části v  $C$ ; tedy  $AC$ ,  $CB$  jsou změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné (X. xxxvi.). Pravím, že  $AB$  nedělí se v jiném bodě na dvě přímky změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné.

Nuže, možno-li, buď rozdělena též v  $D$ , takže by též  $AD$ ,  $DB$  byly změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné.

Patrně arci, že  $AC$  není s  $DB$  totožná. Nuže, možno-li, budiž (totožná). Bude zajisté též  $AD = CB$ . I bude se míti  $AC : CB = BD : DA$ , a bude  $AB$  rozdělením v  $D$  na stejno rozdělena jako v  $C$ , což právě proti podmínce. Pročež  $AC$  není s  $DB$  totožná. Proto zajisté také body  $C$ ,  $D$  nejsou stejně vzdáleny bodu rozpolovacího. Jaký tedy jest rozdíl mezi  $AC^2 + CB^2$  a  $AD^2 + DB^2$ , takový je též mezi  $2AD \times DB$  a  $2AC \times CB$  proto, že též  $AC^2 + CB^2 + 2AC \times CB = AB^2 = AD^2 + DB^2 + 2AD \times DB$ .<sup>22)</sup> Avšak rozdíl mezi  $AC^2 + CB^2$  a  $AD^2 + DB^2$  je změrný, neboť to i ono je změrné; pročež i  $2AD \times DB$  a  $2AC \times CB$  mají rozdíl změrný, ač jsou střední; což právě nemožno, neboť rozdíl útvaru středního a středního není změrný (X. xxvi.).

Pročež přímka nezměrná dvoučástná nedělí se v bodech rozličných; tedy pouze v jediném; což právě bylo dokázati.

## XLIII.

Dvoustřednice první dělí se jen v jediném bodě.

Dvoustřednici první budiž  $AB$ , rozdělena jsouc v bodě  $C$ , tak aby úsečky  $AC$ ,  $CB$  byly střední, jen ve dvojmoci souměřitelné, a objímaly útvar změrný; pravím, že se  $AB$  nedělí v bodě jiném.

Nuže, možno-li, budiž rozdělena také  $A \quad D \quad C \quad B$  v  $D$ , takže by též  $AD$ ,  $DB$  byly střední, jen ve dvojmoci souměřitelné, a objímaly útvar změrný. Ježto tedy, jaký jest rozdíl mezi  $2AD \times DB$  a  $2AC \times CB$ , takový jest mezi  $AC^2 + CB^2$  a  $AD^2 + DB^2$  a rozdíl mezi  $2AD \times DB$  a  $2AC \times CB$  je změrný (neboť to i ono je změrné); tedy  $AC^2 + CB^2$  a  $AD^2 + DB^2$  mají též rozdíl změrný, ač jsou střední; což právě nemožné. (X. xxvi.).

Pročež dvoustřednice první nedělí se ve své části v bodech rozličných; tedy pouze v jediném; což právě bylo dokázati.

## XLIV.


Dvoustřednice druhá dělí se jen v jediném bodě.

Dvoustřednici druhou budiž  $AB$ , rozdělena jsouc v  $C$ , tak aby  $AC$ ,  $CB$  byly střední, jen ve dvojmoci souměřitelné, a objímaly útvar

<sup>22)</sup> Všeobecně:  $a + c = b + d$ ; z toho  $a - b = d - c$  nebo  $b - a = c - d$ .

střední (X. xxxviii.); patrně zajisté, že  $C$  není bod rozpolovací, ježto nejsou dle délky souměřitelné. Pravím, že  $AB$  se nedělí v bodě jiném.

Nuže, možno-li, budiž rozdělena také v  $D$ , tak aby  $AC$  nebyla s  $DB$  totožná, nýbrž dle podmínky  $AC$  větší (patrně zajisté, jak jsme svrchu (X. xli. výt.) dokázali, že též  $AD^2 + DB^2 < AC^2 + CB^2$ ) a aby  $AD$ ,  $DB$  byly střední, jen ve dvojmoci souměřitelné, a objímaly útvar střední. A mějme za změrnou  $EF$  a přistavme k  $EF$  rovnoběžník pravoúhlý  $EK$  rovný čtverci  $AB^2$  a oddělme  $EG$  rovné součtu  $AC^2 + CB^2$ ; zbytek



tedy  $HK = 2 AC \times CB$ . Dále již oddělme  $EL$ , rovné součtu  $AD^2 + DB^2$  (o němž jsme dokázali, že jest menší než  $AC^2 + CB^2$ ); tedy též zbývající  $MK = 2 AD \times DB$ . A ježto  $AC^2 + CB^2$  je střední, tedy také  $EG$  je střední. A přistaveno jest ke změrné  $EF$ ; pročež  $EH$  je změrná a s  $EF$  dle délky nesouměřitelná (X. xxii.). Z téže příčiny ovšem i  $HN$  je


změrná a s  $EF$  dle délky nesouměřitelná. A ježto  $AC$ ,  $CB$  jsou střední, jen ve dvojmoci souměřitelné, tedy  $AC$  je s  $CB$  dle délky nesouměřitelná. Avšak  $AC : CB = AC^2 : AC \times CB$ ; pročež  $AC^2$  je s  $AC \times CB$  nesouměřitelné. Avšak  $AC^2$  je souměřitelné s  $AC^2 + CB^2$ , neboť  $AC$ ,  $CB$  jsou ve dvojmoci souměřitelné. S  $AC \times CB$  však jest souměřitelné  $2 AC \times CB$ ; pročež také  $AC^2 + CB^2$  jest nesouměřitelné s  $2 AC \times CB$ . Avšak  $AC^2 + CB^2 = EG$  a  $2 AC \times CB = HK$ ; tedy  $EG$  je s  $HK$  nesouměřitelné. A tak též  $EH$  jest dle délky nesouměřitelná s  $HN$ . A jsou změrné; pročež  $EH$ ,  $HN$  jsou změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné. Když pak sečteme dvě přímky změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné, celá jest nezměrná, řečená dvoučástná (X. xxxvi.); tedy  $EN$  je dvoučástná, rozdělena v  $H$ . Týmž způsobem zajisté dokážeme, že též  $EM$ ,  $MN$  jsou změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné; i bude  $EN$  dvoučástnicí v rozličných bodech, totiž  $H$  a  $M$ , rozdělenou, [což nemožno (X. xlii.)], a není  $EH$  s  $MN$  totožná, ježto  $(AC^2 + CB^2) > (AD^2 + DB^2)$ ; pročež také  $AC^2 + CB^2$ , t. j.  $EG$ , o mnoho větší než  $2 AD \times DB$ , t. j.  $MK$ ; a tak též  $EH > MN$ . Tedy  $EH$  není s  $MN$  totožná; což právě bylo dokázati.

#### XLV.

Nezměrná větší dělí se jen v jediném bodě.

Nezměrnou větší budiž  $AB$ , rozdělena jsouc v  $C$ , tak aby byly  $AC$ ,  $CB$  ve dvojmoci nesouměřitelné a součet  $AC^2 + CB^2$  aby byl změrný,  $AC \times CB$  však nezměrný; pravím, že se  $AB$  nedělí v bodě jiném.

Nuže, možno-li, budiž rozdělena také v  $D$ , takže by též  $AD$ ,  $DB$  byly ve dvojmoci nesouměřitelné a součet  $AD^2 + DB^2$  byl změrný, pravoúhelník však jejich střední. A ježto rozdíl, jaký jest mezi  $AC^2 + CB^2$  a  $AD^2 + DB^2$ , takový jest i mezi  $2 AD \times DB$  a  $2 AC \times CB$ , avšak rozdíl mezi  $AC^2 + CB^2$  a  $AD^2 + DB^2$  je změrný (neboť to i ono je změrné); tedy též  $2 AD \times DB$  a  $2 AC \times CB$  mají rozdíl změrný, ač jsou střední; což právě ne-



možno (X. xxvi.). Pročež nezměrná větší nedělí se v rozličných bodech; tedy se dělí v bodě jediném; což právě bylo dokázati.

#### XLVI.

Základnice útvaru změrného a středního dělí se jen v jediném bodě.

Základnicí útvaru změrného a středního budiž  $AB$ , jsouc rozdělena v  $C$ , tak aby  $AC$ ,  $CB$  byly ve dvojmoci nesouměřitelné a součet  $AC^2 + CB^2$  aby byl střední,  $2 AC \times CB$  však změrné (X. xli.); pravím, že se  $AC$  nedělí v bodě jiném.

Nuže, možno-li, budiž rozdělena také v  $D$ ; takže by též  $AD$ ,  $DB$  byly ve dvojmoci nesouměřitelné a součet  $AD^2 + DB^2$  byl střední,  $2 AD \times DB$  však změrné. Ježto tedy rozdíl, jaký jest mezi  $2 AC \times CB$  a  $2 AD \times DB$ , takový jest i mezi  $AD^2 + DB^2$  a  $AC^2 + CB^2$ , avšak  $2 AC \times CB$  a  $2 AD \times DB$  mají rozdíl změrný; tedy též  $AD^2 + DB^2$  a  $AC^2 + CB^2$  mají rozdíl změrný, ač jsou střední; což právě jest nemožné (X. xxvi.). Pročež základnice útvaru změrného a středního nedělí se v rozličných bodech. Tedy se dělí v bodě jediném; což právě bylo dokázati.




#### XLVII.

Základnice dvou útvarů středních dělí se jen v jediném bodě.

Základnicí dvou útvarů středních budiž  $AB$ , jsouc rozdělena v  $C$ , tak aby  $AC$ ,  $CB$  byly ve dvojmoci nesouměřitelné a součet  $AC^2 + CB^2$  aby byl střední a  $AC \times CB$  střední a také se součtem  $AC^2 + CB^2$  nesouměřitelné (X. xli.); pravím, že se  $AB$ , vyhovujíc řečeným podmínkám, nedělí v bodě jiném.

Nuže, možno-li, budiž rozdělena v  $D$ , takže by opět patrně  $AC$  nebyla stejná s  $DB$ , nýbrž aby dle podmínky  $AC$  byla větší, a mějme za změrnou  $EF$  a přistavme k  $EF$  útvar  $EG$ , rovný součtu  $AC^2 + CB^2$ , a  $HK$  stejné s  $2 AC \times CB$ ; tedy celek  $EK = AB^2$ . Dále již přistavme k  $EF$  útvar  $EL$  stejný s  $AD^2 + DB^2$ ; tedy zbývající  $2 AD \times DB = MK$ . A ježto součet  $AC^2 + CB^2$  dle podmínky je střední, tedy rovněž  $EG$  je střední. Také jest přistaveno ke změrné  $EF$ ; pročež  $HE$  je změrná a s  $EF$  dle délky nesouměřitelná. Z téže příčiny ovšem i  $HN$  je změrná a s  $EF$  dle délky nesouměřitelná. A ježto součet  $AC^2 + CB^2$  je s  $2 AC \times CB$  nesouměřitelný, tedy též  $GE$  je s  $GN$  nesouměřitelné; a tak též  $EH$  jest nesouměřitelná s  $HN$ . A jsou změrné; pročež  $EH$ ,  $HN$  jsou změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné; tedy  $EN$  jest nezměrná dvoučástná, jsouc rozdělena v  $H$  (X. xxxvi.). Podobně ovšem dokážeme, že je také rozdělena v  $M$ . I není  $EH$  s  $MN$  stejná; nezměrná tedy dvoučástná jest rozdělena v rozličných bodech;



což právě jest nemožné (X. XLII.). Pročež základnice dvou útvarů středních nedělí se v rozličných bodech; tedy se dělí jen v jediném.

### Výměry druhé.

1. Dána-li přímka změrná a nezměrná dvoučástná, rozdělená ve své části, kteréž ve dvojmoci mají za rozdíl čtverec přímky s větší částí souměřitelné dle délky, když s danou změrnou jest dle délky souměřitelná část větší, [celá] nazývej se dvoučástnicí první.

2. Když pak menší část jest dle délky souměřitelná s danou změrnou, nazývej se dvoučástnicí druhou.

3. Když pak žádná z těch částí není dle délky souměřitelná s danou změrnou, nazývej se dvoučástnicí třetí.

4. Když zase naopak mají ve dvojmoci za rozdíl čtverec přímky s větší částí nesouměřitelné dle délky, jest-li s danou změrnou dle délky souměřitelná část větší, nazývej se dvoučástnicí čtvrtou.

5. Pakli menší část,<sup>23)</sup> pátou.

6. Pakli žádná,<sup>23)</sup> šestou.

### XLVIII.

Najdi dvoučástnici první.

Mějme dvě čísla  $AC$ ,  $CB$ , aby se měl součet jejich  $AB$  k  $BC$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému, k  $CA$  však aby se neměl jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému, a mějme nějakou přímku změrnou  $D$  a s  $D$  budiž dle délky souměřitelná  $EF$ . Tedy jest rovněž  $EF$  změrná. A učiňme  $BA:AC = EF^2:FG^2$  (X. vi. důsl.). Avšak  $AB:AC$  jako číslo k číslu; tedy též  $EF^2:FG^2$  jako číslo k číslu; pročež  $EF^2$  je s  $FG^2$  souměřitelné. I jest  $EF$  změrná, změrná tedy je také

$FG$ . A ježto  $BA$  nemá se k  $AC$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému, ani tedy  $EF^2$  nemá se k  $FG^2$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému; pročež  $EF$  je s  $FG$  dle délky nesouměřitelná. Tedy  $EF$ ,  $FG$  jsou změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné; pročež  $EG$  jest nezměrná dvoučástná (X. xxxvi.).

Pravím, že také první.

Neboť ježto  $BA:AC = EF^2:FG^2$  a  $BA > AC$ , tedy též  $EF^2 > FG^2$ . Budiž tedy  $EF^2 = FG^2 + H^2$ . A ježto  $BA:AC = EF^2:$

$FG^2$ , zvrtně tedy  $AB:BC = EF^2:H^2$ . Avšak  $AB:BC$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému; pročež i  $EF^2:H^2$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému. Tedy  $EF$  je s  $H$  dle délky souměřitelná; proto jest  $EF$  ve dvojmoci větší než  $FG$  o čtverec přímky s  $EF$  souměřitelné. I jsou  $EF$ ,  $FG$  změrné, a  $EF$  je s  $D$  dle délky souměřitelná.

Pročež  $EG$  je dvoučástnice první (vým. druhých č. 1.); což právě bylo dokázati.

<sup>23)</sup> Rozuměj: jest — není — dle délky souměřitelná s danou změrnou.

### XLIX.

Najdi dvoučástnici druhou.

Mějme dvě čísla  $AC$ ,  $CB$ , aby se měl součet jejich  $AB$  k  $BC$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému, k  $AC$  však aby se neměl jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému, a mějme změrnou  $D$  a s  $D$  budiž dle délky souměřitelná  $EF$ ; tedy jest  $EF$  změrná. Učiňme již také  $CA:AB = EF^2:FG^2$ . Tedy též  $FG$  je změrná. A ježto se nemá  $CA$  k  $AB$  jako číslo čtvercové k číslu čtvercovému, nemá se ani  $EF^2$  k  $FG^2$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému. Tedy  $EF$ ,  $FG$  jsou změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné; pročež  $EG$  jest nezměrná dvoučástná.

Má se již dokázati, že též druhá.






Neboť ježto obráceně  $BA:AC = GF^2:FE^2$ , avšak  $BA > AC$ , tedy též  $GF^2 > FE^2$ . Budiž  $GF^2 = EF^2 + H^2$ ; zvrtně tedy  $AB:BC = FG^2:H^2$ . Avšak  $AB:BC$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému, tedy též  $FG^2:H^2$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému. Jest tedy  $FG$  s  $H$  dle délky souměřitelná; pročež jest  $FG$  ve dvojmoci větší než  $FE$  o čtverec přímky s  $FG$  souměřitelné. I jsou  $FG$ ,  $FE$  změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné, a menší část  $EF$  je s danou přímku změrnou  $D$  dle délky souměřitelná.

Pročež  $EG$  je dvoučástnice druhá; což právě bylo dokázati (vým. druhých č. 2.).

### L.

Najdi dvoučástnici třetí.

Mějme dvě čísla  $AC$ ,  $CB$ , aby se měl součet jejich  $AB$  k  $BC$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému, k  $AC$  však aby se neměl jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému. Mějme pak i jiné číslo nečtvercové  $D$  a to neměj se ani k  $AB$  ani k  $AC$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému, a mějme nějakou přímku změrnou  $E$  a učiňme  $D:AB = E^2:FG^2$  (X. vi. důsl.); tedy  $E^2$  je s  $FG^2$  souměřitelné. I jest  $E$  změrná; změrná jest tedy též  $FG$ . A ježto se nemá  $D:AB$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému, ani  $E^2$  nemá se k  $FG^2$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému; pročež  $D$  jest dle délky s  $FG$  nesouměřitelná. Učiňme již dále  $BA:AC = FG^2:GH^2$ ; tedy  $FG^2$  je s  $GH^2$  souměřitelné. Avšak  $FG$  je změrná; změrná je tedy též  $GH$ . A ježto se nemá  $BA$  k  $AC$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému, ani  $FG^2$  se nemá k  $HG^2$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému; pročež  $FG$  je



s  $GH$  dle délky nesouměřitelná. Tedy  $FG$ ,  $GH$  jsou změrné, jen ve dvojmocí souměřitelné; proto  $FH$  jest nezměrná dvoučástná (X. xxxvi.).

Pravím ovšem, že také třetí.

Neboť ježto  $D:AB = E^2:FG^2$  a  $BA:AC = FG^2:GH^2$ , tedy stejnořadně  $D:AC = E^2:GH^2$ . Avšak  $D$  nemá se k  $AC$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému, pročez ani  $E^2$  nemá se ku  $GH^2$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému; tedy  $E$  je s  $GH$  dle délky nesouměřitelná. A ježto  $BA:AC = FG^2:GH^2$ , jest tedy  $FG^2 > GH^2$ . Budiž tedy  $FG^2 = GH^2 + K^2$ ; zvrtně tedy  $AB:BC = FG^2:K^2$ . Avšak  $AB$  se má k  $BC$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému; pročez i  $FG^2$  má se ke  $K^2$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému; tedy  $FG$  je s  $K$  dle délky souměřitelná. A tak  $FG$  jest ve dvojmocí větší než  $GH$  o čtverec přímky s  $FG$  souměřitelné. I jsou  $FG$ ,  $GH$  přímky změrné, jen ve dvojmocí souměřitelné, a žádná z nich není s  $E$  dle délky souměřitelná.

Tedy  $FH$  jest dvoučástnice třetí (vým. druhých č. 3.); což právě bylo dokázati.

## LI.

Najdi dvoučástnici čtvrtou.

Mějme dvě čísla  $AC$ ,  $CB$ , tak aby se nemělo  $AB$  k  $BC$ , ani ovšem k  $AC$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému. A mějme změrnou přímku  $D$  a s  $D$  budiž dle délky souměřitelná  $EF$ ; změrná je tedy též  $EF$ . A učiňme  $BA:AC = EF^2:FG^2$ ; tedy  $EF^2$  jest souměřitelné s  $FG^2$ ; pročez i  $FG$  je změrná. A ježto se nemá  $BA$  k  $AC$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému, ani  $EF^2$  se nemá k  $FG^2$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému; tedy jest  $EF$  s  $FG$  dle délky nesouměřitelná. Pročez  $EF$  a  $FG$  jsou přímky změrné, jen ve dvojmocí souměřitelné; a tak  $EG$  je dvoučástná (X. xxxvi.).

Pravím ovšem, že také čtvrtá.

Neboť ježto  $BA:AC = EF^2:FG^2$  [a  $BA > AC$ ], tedy  $EF^2 > FG^2$ . Budiž tedy  $EF^2 = FG^2 + H^2$ . Proto zvrtně  $AB:BC = EF^2:H^2$ . Avšak  $AB$  nemá se k  $BC$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému; tedy ani  $EF^2$  nemá se k  $H^2$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému. Pročez


$EF$  je s  $H$  dle délky nesouměřitelná; tedy  $FE^2 > FG^2$  o čtverec přímky s  $EF$  nesouměřitelné. I jsou  $EF$ ,  $FG$  přímky změrné, jen ve dvojmocí souměřitelné, a  $EF$  je s  $D$  dle délky souměřitelná.

Tedy jest  $EG$  dvoučástnice čtvrtá (vým. druhých č. 4.); což právě bylo dokázati.

## LII.

Najdi dvoučástnici pátou.

Mějme dvě čísla  $AC$ ,  $CB$ , tak aby se  $AB$  nemělo k žádnému z nich jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému a mějme nějakou přímku změrnou  $D$ , i budiž  $EF$  s  $D$  souměřitelná; jest tedy  $EF$  změrná. A učiňme  $CA:AB = EF^2:FG^2$ .  $CA$  však nemá se k  $AB$  jako



čtvercové číslo k číslu čtvercovému; tedy ani  $EF^2$  nemá se k  $FG^2$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému. Pročez  $EF$ ,  $FG$  jsou přímky změrné, jen ve dvojmocí souměřitelné; tedy  $EG$  jest dvoučástná.

Pravím ovšem, že také pátá.

Neboť ježto  $CA:AB = EF^2:FG^2$ , obráceně  $BA:AC = FG^2:EF^2$ ; pročez  $GF^2 > FE^2$ . Budiž tedy  $GF^2 = EF^2 + H^2$ . Pročez zvrtně  $AB:BC = GF^2:H^2$ .  $AB$  však nemá se k  $BC$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému; ani tedy  $FG^2$  nemá se k  $H^2$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému. Pročez  $FG$  je s  $H$  dle délky nesouměřitelná; a tak  $FG^2 > FE^2$  o čtverec přímky s  $FG$  nesouměřitelné. I jsou  $GF$ ,  $FE$  přímky změrné, jen ve dvojmocí souměřitelné, a část menší  $EF$  je s danou změrnou  $D$  dle délky souměřitelná.

Tedy jest  $EG$  dvoučástnice pátá (vým. druhých č. 5.); což právě bylo dokázati.


## LIII.

Najdi dvoučástnici šestou.

Mějme dvě čísla  $AC$ ,  $CB$ , tak aby se  $AB$  nemělo k žádnému z nich jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému; budiž pak i jiné číslo nečtvercové  $D$  a neměj se ani k  $BA$  ani k  $AC$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému, a mějme nějakou změrnou přímku  $E$  a učiňme  $D:AB = E^2:FG^2$ ; tedy  $E^2$  je s  $FG^2$  souměřitelné. I jest  $E$  změrná; pročez také  $FG$  je změrná. A ježto se nemá  $D$  k  $AB$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému, tedy ani  $E^2$  nemá se k  $FG^2$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému; pročez jest  $E$  s  $FG$  dle délky nesouměřitelná. Učiňme již opět  $BA:AC = FG^2:GH^2$ ; tedy  $FG^2$  je s  $GH^2$  souměřitelné. Pročez jest  $HG^2$  změrné;  $HG$  jest tedy změrná. A ježto se nemá  $BA$  k  $AC$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému, ani  $FG^2$  nemá se ku  $GH^2$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému; jest tedy  $FG$  s  $GH$  dle délky nesouměřitelná. Pročez  $FG$ ,  $GH$  jsou přímky změrné, jen ve dvojmocí souměřitelné; tedy  $FH$  je dvoučástná

Třeba již dokázati, že také šestá.

Neboť ježto  $D:AB = E^2:FG^2$  a též  $BA:AC = FG^2:GH^2$ , tedy stejnořadně  $D:AC = E^2:GH^2$ . Avšak  $D$  nemá se k  $AC$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému; nemá se tedy ani  $E^2$  ku  $GH^2$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému; pročez  $E$  je s  $GH$  dle délky nesouměřitelná. Bylo pak dokázáno, že je též s  $FG$  nesouměřitelná. Tedy jest i  $FG$  i  $GH$  s  $E$  dle délky nesouměřitelná. A ježto  $BA:AC = FG^2:GH^2$ , tedy  $FG^2 > GH^2$ . Budiž tedy  $FG^2 = GH^2 + K^2$ ; pročez zvrtně



$AB:BC=FG^2:K^2$ . Avšak  $AB$  nemá se k  $BC$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému; a tak ani  $FG^2$  nemá se ke  $K^2$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému. Tedy jest  $FG$  s  $K$  dle délky nesouměřitelná; pročež  $FG^2 > GH^2$  o čtverec přímky s  $FG$  nesouměřitelné. I jsou  $FG, GH$  přímky změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné a žádná z nich není dle délky souměřitelná s danou změrnou  $E$ .

Tedy jest  $FH$  dvoučástnice šestá (vým. druhých č. 6.); což právě bylo dokázati.

#### Výtězek.


Budtež  $AB, BC$  dvěma čtverci a  $DB$  čiň s  $BE$  přímkou, tedy též  $FB$  čiň s  $BG$  přímkou. I doplňme rovnoběžník  $AC$ ; pravím že  $AC$  je čtverec a že  $AB, BC$  mají za střední úměrnou  $DG$  a také že  $AC, CB$  mají za střední úměrnou  $DC$ .

Neboť ježto  $DB=BF, BE=BG$ , celá tedy  $DE=FG$ . Avšak  $DE=AH=KC, FG=AK=HC$ ; pročež také  $AH, KC, AK, HC$  jsou navzájem stejné. Tedy rovnoběžník  $AC$  je stejnostranný; jest pak i pravouhlý; tedy  $AC$  je čtverec. A ježto  $FB:BG=DB:BE$ , avšak  $FB:BG=AB:DG$  a  $DB:BE=DG:BC$ , tedy  $AB:DG=DG:BC$ ; pročež  $DG$  je střední úměrnou mezi  $AB, BC$ .

Pravím již, že také  $DC$  střední úměrnou mezi  $AC, CB$ .


Neboť ježto  $AD:DK=KG:GC$  (neboť jsou střídavě stejné) a součtetně  $AK:KD=KC:CG$ , avšak  $AK:KD=AC:CD$  a  $KC:CG=DC:CB$ , tedy též  $AC:DC=DC:BC$ ;

pročež  $DC$  je střední úměrnou mezi  $AC, CB$ ; což se mělo dokázati.




#### LIV.

Když útvar objímají přímka změrná a dvoučástnice první, strana čtverce s útvarem stejného jest nezměrná řečená dvoučástná.



Nuže útvar  $AC$  objímejte změrná  $AB$  a dvoučástnice první  $AD$ ; pravím, že strana čtverce s útvarem  $AC$  stejného jest nezměrná řečená dvoučástná.

Neboť ježto  $AD$  jest dvoučástná první, rozdělena budiž ve své části v  $E$ , a větší částí buď  $AE$ . Zjevně zajisté, že  $AE, ED$  jsou změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné a že  $AE^2 > ED^2$  o čtverec přímky s  $AE$  souměřitelné a že jest  $AE$  souměřitelná dle délky s danou změrnou  $AB$  (vým. druhých č. 1.). Tož rozpolme  $ED$  v bodě  $F$ . A ježto



$AE^2 > ED^2$  o čtverec přímky s  $AE$  souměřitelné, když tedy přistavíme k větší  $AE$  čtverec rovný čtvrtině čtverce části menší, t. čtverci  $EF^2$ , tak aby se nedostávalo doplňku čtvercového, rozdělujeme ji ( $AT$ ) v části souměřitelné (X. xvii.). Přistavme tedy k  $AE$  útvar s  $EF^2$  stejný, t.  $AG \times GE$ ; jest tedy  $AG$  s  $EG$  dle délky souměřitelná. I vedmež od  $G, E, F$  s  $AB, CD$  rovnoběžky  $GH, EK, FL$  a sestavme čtverec  $SN$  stejný s rovnoběžníkem  $AH$  a s  $GK$  stejný  $NQ$ , i budtež  $MN, NO$  v přímce; v přímce tedy jsou též  $RN, NP$ ; a budiž doplněn rovnoběžník  $SQ$ ; jest tedy  $SQ$  čtverec. A ježto  $AG \times GE = EF^2$ , tedy  $AG:EF = FE:EG$ ; pročež také  $AH:EL = EL:KG$ ; jest tedy  $EL$  střední úměrnou veličin  $AH, GK$ . Avšak  $AH = SN$  a  $GK = NQ$ ; pročež  $EL$  je střední úměrnou veličin  $SN, NQ$ . Je však týchž veličin  $SN, NQ$  střední úměrnou též  $MR$ ; tedy  $EL = MR$ , a tak též  $EL = PO$  (I. xliii.). Také však  $AH + GK = SN + NQ$ ; pročež celek  $AC = SQ$ , t. j.  $MO^2$ ; tedy  $AC = MO^2$ .

Pravím, že  $MO$  jest nezměrná dvoučástná.

Neboť ježto  $AG$  je s  $GE$  souměřitelná, též  $AE$  jest souměřitelná s  $AG$  i s  $GE$ . Dáno však, že  $AE$  je též s  $AB$  souměřitelná; tedy též  $AG, GE$  jsou s  $AB$  souměřitelné. I jest  $AB$  změrná, pročež změrné jsou též  $AG, GE$ ; změrné jsou tedy útvary  $AH, GK$  (X. xix.) a jest  $AH$  s  $GK$  souměřitelné. Avšak  $AH = SN$  a  $GK = NQ$ ; pročež i  $SN, NQ$ , t. j.  $MN^2, NO^2$ , jsou útvary změrné a souměřitelné. A ježto  $AE$  jest dle délky s  $ED$  nesouměřitelná, avšak  $AE$  s  $AG$  jest nesouměřitelná,  $DE$  pak souměřitelná s  $EF$ , tedy též  $AG$  nesouměřitelná s  $EF$  (IX. xiii.); a tak i útvar  $AH$  je s  $EL$  nesouměřitelný. Avšak  $AH = SN$  a  $EL = MR$ ; pročež i útvar  $SN$  jest nesouměřitelný s  $MR$ . Avšak  $SN:MR = PN:NR$ ; tedy  $PN$  je s  $NR$  nesouměřitelná. Avšak  $PN = MN$  a  $NR = NO$ ; tedy  $MN$  je s  $NO$  nesouměřitelná. I jest čtverec  $MN^2$  s  $NO^2$  souměřitelný a oba změrné;  $MN, NO$  jsou změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné.

Pročež  $MO$  je dvoučástnice (X. xxxvi.) a čtverec její stejný je s  $AC$ ; což právě bylo dokázati.


#### LV.

Když útvar objímají přímka změrná a dvoučástnice druhá, strana čtverce s útvarem stejného jest nezměrná řečená dvoustřednice první.

Nuže objímejtež útvar  $ABCD$  změrná  $AB$  a dvoučástnice druhá  $AD$ ; pravím, že strana čtverce rovného útvaru  $AC$  je dvoustřednice první.

Neboť ježto  $AD$  je dvoučástnice druhá, rozdělena buď ve své části v  $E$ , tak aby větší částí buď  $AE$ ; tedy  $AE, ED$  jsou změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné a  $AE^2 > ED^2$  o čtverec přímky s  $AE$  souměřitelné a menší část  $ED$  je s  $AB$  souměřitelná dle délky (vým. druhých č. 2.). Rozpolme  $ED$  v  $F$  a přistavme k  $AE$  útvar  $AG \times GE$  stejný s  $EF^2$ , tak aby se mu nedostávalo doplňku čtvercového; tedy  $AG$  je s  $GE$  dle délky souměřitelná (X. xvii.). I vedme z  $G, E, F$  přímky  $GH, EK, FL$  rovnoběžně s  $AB, CD$  a sestavme čtverec  $SN$  stejný s rovnoběžníkem  $AH$  a čtverec  $NQ$  stejný s  $GK$  a budiž  $MN$

s  $NO$  v přímce; jest tedy též  $RN$  s  $NP$  v přímce.  $A$  doplníme čtverce  $SQ$ : patrně zajisté z toho, co svrchu dokázáno (X. LIII. výt.), že  $MR$  je střední úměrná veličin  $SN$ ,  $NQ$  a stejná s  $EL$  a že  $MO^2 = AC$ .



Má se tedy dokázati, že  $MO$  je dvoustřednice první.


Ježto  $AE$  je dle délky s  $ED$  nesouměřitelná,  $ED$  však s  $AB$  souměřitelná, tedy  $AE$  je s  $AB$  nesouměřitelná. A ježto  $AG$  je souměřitelná s  $EG$ , také  $AE$  jest souměřitelná s  $AG$  i s  $GE$ . Avšak  $AE$  je dle délky s  $AB$  nesouměřitelná; tedy též  $AG$ ,  $GE$  jsou s  $AB$  nesouměřitelné. Pročež  $BA$ ,  $AG$ ,  $GE$  jsou změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné; a tak  $AH$ ,  $GK$  jsou útvary střední (X. XXI.). A tak i  $SN$ ,  $NQ$  jsou

střední. Také tedy  $MN$ ,  $NO$  jsou střední. A ježto  $AG$  je s  $GE$  dle délky souměřitelná, souměřitelný je též útvar  $AH$  s  $GK$ , t. j.  $SN$  s  $NQ$ , t. j.  $MN^2$  s  $NO^2$  (X. XI.). A ježto  $AE$  je s  $ED$  dle délky nesouměřitelná, avšak  $AE$  jest souměřitelná s  $AG$ ,  $ED$  pak souměřitelná s  $EF$ , tedy  $AG$  je s  $EF$  nesouměřitelná; a tak je též nesouměřitelný útvar  $AH$  s  $EL$ , t. j.  $SN$  s  $MR$ , t. j.  $PN$  s  $NR$ , t. j.  $MN$  s  $NO$  jest délky nesouměřitelná. Bylo pak dokázáno, že  $MN$ ,  $NO$  jsou také střední a ve dvojmoci souměřitelné; jsou tedy  $MN$ ,  $NO$  střední, jen ve dvojmoci souměřitelné. Pravím již, že též objímají útvar změrný. Neboť ježto dáno jest, že  $DE$  jest souměřitelná s  $AB$  i s  $EF$ , tedy jest  $EF$  souměřitelná s  $EK$ . A obě jsou změrné; změrný jest tedy útvar  $EL$ , t. j.  $MR$ ;  $MR$  však  $= MN \times NO$ . Když pak se sečtou dvě přímky střední, jen ve dvojmoci souměřitelné, objímajíce útvar změrný, celá jest nezměrná i nazývá se dvoustřednicí první (X. XXXVII.).

Tedy  $MO$  je dvoustřednice první; což právě bylo dokázati.

## LVI.

Když útvar objímají přímka změrná a dvoučástnice třetí, strana čtverce s útvarem stejného jest nezměrná řečená dvoustřednicí druhá.



Nuže objímejtež útvar  $ABCD$  přímka změrná  $AB$  a dvoučástnice třetí  $AD$  rozdělena jsouc ve své části v  $E$ , z nichž větší jest  $AE$ ; pravím, že strana čtverce s útvarem  $AC$  stejného jest nezměrná řečená dvoustřednicí druhá.

Nuže upravme totéž jako svrchu. A ježto  $AD$  je dvoučástná třetí, tedy  $AE$ ,  $ED$  jsou přímky změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné, a  $AE^2 > ED^2$  o čtverec přímky s  $AE$  souměřitelné a žádná z přím-

mek  $AE$ ,  $ED$  není s  $AB$  dle délky souměřitelná. Podobně ovšem, jako svrchu dokázáno, dokážeme, že  $MO^2 = AC$  a že  $MN$ ,  $NO$  jsou střední jen ve dvojmoci souměřitelné; a tak  $MO$  jest dvoustřednice.

Má se ovšem dokázati, že též druhá.

Ježto  $DE$  je dle délky nesouměřitelná s  $AB$ , t. j. s  $EK$ , souměřitelná však je  $DE$  s  $EF$ , tedy  $EF$  je s  $EK$  dle délky nesouměřitelná. I jsou změrné; tedy  $FE$ ,  $EK$  jsou změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné. Pročež  $EL$ , t. j.  $MR$ , jest útvar střední (X. XXI.); a objímají jej  $MN$ ,  $NO$ ; tedy  $MN \times NO$  jest útvar střední.

Tedy  $MO$  je dvoustřednice druhá (X. XXXVIII.); což právě bylo dokázati.

## LVII.


Když útvar objímají přímka změrná a dvoučástnice čtvrtá, strana čtverce s útvarem stejného jest nezměrná řečená větší.

Nuže objímejtež útvar  $AC$  přímka změrná  $AB$  a dvoučástnice čtvrtá  $AD$ , rozdělena jsouc ve své části v  $E$ , z nichž větší budiž  $AE$ ; pravím, že strana čtverce s útvarem  $AC$  stejného jest nezměrná řečená větší.

Neboť ježto  $AD$  je dvoučástnice čtvrtá, tedy  $AE$ ,  $ED$  jsou změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné, a  $AE^2 > ED^2$  o čtverec přímky s  $AE$  nesouměřitelné, a dle délky jest  $AE$  s  $AB$  souměřitelná (vým druhých čís. 4.).

Rozpolme  $DE$  v  $F$  a k  $AE$  přistavme rovnoběžník  $AG \times GE$  stejný s  $EF^2$ ; tedy  $AG$  je s  $GE$  dle délky nesouměřitelná (X. XVIII.).

Veďme s  $AB$  rovnoběžky  $GH$ ,  $EK$ ,  $FL$  a ostatně totéž upravme jako dříve; zjevno zajisté, že strana čtverce s útvarem  $AC$  stejného jest  $MO$ . Má se ovšem dokázati, že  $MO$  jest nezměrná řečená větší. Ježto  $AG$  s  $EG$  dle délky jest nesouměřitelná, nesouměřitelné je  $AH$  s  $GK$ , t. j.  $SN$  s  $NQ$ ; pročež  $MN$ ,  $NQ$  jsou ve dvojmoci nesouměřitelné. A ježto  $AE$  jest dle délky s  $AB$  souměřitelná,  $AK$  je změrné, i jest  $AK = MN^2 + NQ^2$ ; tedy také součet  $MN^2 + NQ^2$  je změrný. A ježto  $DE$  je s  $AB$ , t. j. s  $EK$ , dle délky nesouměřitelná, avšak  $DE$  jest souměřitelná s  $EF$ ,  $EF$  tedy je s  $EK$  dle délky nesouměřitelná. Pročež  $EK$ ,  $EF$  jsou změrné jen ve dvojmoci souměřitelné; tedy  $LE$ ; t. j.  $MR$ , jest střední (X. XXI.). A objímají je  $MN$ ,  $NO$ ; tedy  $MN \times NO$  je střední. Také jest  $MN^2 + NO^2$  změrné a  $MN$ ,  $NO$  jsou ve dvojmoci nesouměřitelné. Když pak se sečtou dvě přímky ve dvojmoci nesouměřitelné, činící součet svých čtverců změrným, pravouhelník pak středním, celá jest nezměrná a slove větší (X. XXXIX.).




Tedy  $MO$  jest nezměrná řečená větší, a čtverec její roven jest útvaru  $AC$ ; což právě bylo dokázati.

## LVIII.

Když útvar objímají přímka změrná a dvoučástnice pátá, strana čtverce s útvarem stejného jest nezměrná řečená základnice útvaru změrného a středního.

Nuže objímejtež útvar  $AC$  přímka změrná  $AB$  a dvoučástnice pátá  $AD$ , rozdělena jsouc ve své části v  $E$ , tak aby větší částí bylo  $AE$ ; pravím, že strana čtverce s útvarem  $AC$  stejného jest nezměrná řečená základnice útvaru změrného a středního.

Nuže upravme totéž jako v důkazech předešlých; zjevno zajisté, že stranou čtverce s útvarem  $AC$  stejného jest  $MO$ . Třeba ovšem dokázati, že  $MO$  jest základnice útvaru změrného a středního. Neboť ježto  $AG$  je s  $GE$  nesouměřitelná (X. xviii.), nesouměřitelné jest tedy též  $AH$  s  $HE$ , t. j.  $MN^2$  s  $NO^2$ ; pročež  $MN$ ,  $NO$  jsou ve dvojmoci nesouměřitelné.



A ježto  $AD$  je dvoučástnice pátá a úsečka její menší jest  $ED$ , tedy  $ED$  je s  $AB$  dle délky souměřitelná (vým. druhých č. 5). Avšak  $AE$  je s  $ED$  nesouměřitelná; proto též  $AB$  je s  $AE$  dle délky nesouměřitelná; tedy  $AK$ , t. j.  $MN^2 + NO^2$ , je střední. A ježto  $DE$  je s  $AB$ , t. j. s  $EK$ , dle délky souměřitelná, avšak  $DE$  jest souměřitelná s  $EF$ , tedy též  $EF$  je souměřitelná s  $EK$ . I jest  $EK$  změrná; proto též  $EL$ , t. j.  $MR$ , t. j.  $MN \times NO$  je změrné (X. xix.); pročež  $MN$ ,  $NO$  jsou ve dvojmoci nesouměřitelné a součet čtverců svých činí středním, pravouhelník pak změrným.

Tedy  $MO$  jest základnice útvaru změrného a středního (X. xl.) a čtverec její roven jest útvaru  $AC$ ; což právě bylo dokázati.

## LIX.


Když útvar objímají přímka změrná a dvoučástnice šestá, strana čtverce s útvarem stejného jest nezměrná řečená základnice dvou útvarů středních.

Nuže objímejtež útvar  $ABCD$  přímka změrná  $AB$  a dvoučástnice šestá  $AD$  rozdělena jsouc ve své části v  $E$ , tak aby větší částí bylo  $AE$ ; pravím, že strana čtverce s  $AC$  stejného jest základnice dvou útvarů středních.

Upravme totéž jako v důkazech předešlých. Patrně zajisté, že strana čtverce s  $AC$  stejného jest  $MO$  a že  $MN$  je s  $NO$  ve dvojmoci ne-

souměřitelná. A ježto  $EA$  je s  $AB$  dle délky nesouměřitelná, tedy  $EA$ ,  $AB$  jsou změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné; pročež  $AK$ , t. j.  $MN^2 + NO^2$ , je střední (X. xxi.). Dále, ježto  $ED$  je s  $AB$  dle délky nesouměřitelná, nesouměřitelná tedy je též  $FE$  s  $EK$ ; pročež  $FE$ ,  $EK$  jsou změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné; tedy  $EL$ , t. j.  $MR$ , t. j.  $MN \times NO$ , je střední. A ježto  $AE$  je s  $EF$  nesouměřitelná, též  $AK$  je s  $EL$  nesouměřitelná. Avšak  $AK = MN^2 + NO^2$  a  $EL = MN \times NO$ , tedy  $MN^2 + NO^2$  je s  $MN \times NO$  nesouměřitelné. A to i ono je střední, a  $MN$ ,  $NO$  jsou ve dvojmoci nesouměřitelné.

Tedy  $MO$  je základnice dvou útvarů středních (X. xli.), a  $MO^2 = AC$ ; což právě bylo dokázati.<sup>24)</sup>




## LX.

Čtverec přímky dvoučástné přistavený<sup>25)</sup> ke změrné šířkou činí dvoučástnici první.

Dvoučástnici budiž  $AB$ , rozdělena jsouc ve své části v  $C$ , tak, aby větší částí bylo  $AC$ , a dána buď změrná  $DE$  a k  $DE$  přistavme útvar  $DEFG$  stejný s  $AB^2$ , šířkou činící  $DG$ ; pravím, že  $DG$  je dvoučástnice první.

Nuže budiž k  $DE$  přistaven útvar  $DH$  stejný s  $AC^2$  a  $KL$  stejný s  $BC^2$ , zbývající tedy  $2AC \times CB = MF$ . Rozpolme  $MG$  v  $N$  a vedme s  $ML$ ,  $GF$  rovnoběžku  $NO$ . Tedy  $MO = NF = AC \times CB$ . A ježto  $AB$  jest dvoučástná, rozdělena jsouc ve své části v  $C$ , tedy  $AC$ ,  $CB$  jsou změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné (X. xxxvi.); proto čtverce  $AC^2$ ,  $CB^2$  jsou změrné a navzájem souměřitelné;<sup>26)</sup> pročež i součet  $AC^2 + CB^2$  je změrný, a je stejný s  $DL$ ;  $DL$  tedy je změrné. A jest přistaveno ke změrné  $DE$ ; pročež  $DM$  je změrná a s  $DE$  dle délky souměřitelná (X. xx.). Dále, ježto  $AC$ ,  $CB$  jsou změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné, tedy  $2AC \times CB$ , t. j.  $MF$ , je střední (X. xxi.). I jest přistaveno ke změrné  $ML$ ; tedy též  $MG$  je změrná a s  $ML$ , t. j. s  $DE$  nesouměřitelná. Jest pak též  $MD$  změrná a s  $DE$  dle délky souměřitelná; pročež  $DM$  je s  $MG$  dle délky nesouměřitelná. A jsou změrné;



<sup>24)</sup> Následuje výtěžek, že  $(a^2 + b^2) > 2ab$ , když  $a \geq b$ , nejspíše podvržený (srv. X. XLIV. ke konci).

<sup>25)</sup> Ve způsobě obdélníku.

<sup>26)</sup> Mějme  $a : b = a : b$ ; znásobíme jeden poměr veličinou  $a$ , druhý veličinou  $b$  nabudeme úměry  $a^2 : ab = ab : b^2$ .

proto  $DM$ ,  $MG$  jsou změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné; tedy  $DG$  je dvoučástnice (X. xxxvi.).

Má se ovšem dokázati, že také první.


Ježto  $AC^2$ ,  $CB^2$  mají za střední úměrnou  $AC \times CB^{26}$ , tedy rovněž  $DH$ ,  $KL$  mají za střední úměrnou  $MO$ . Pročež  $DH:MO = MO:KL$ , t. j.  $DK:MN = MN:MK$ ; tedy  $DK \times KM = MN^2$ . A ježto  $AC^2$  je s  $CB^2$  souměřitelné, také  $DH$  jest souměřitelné s  $KL$ ; a tak i  $DK$  jest souměřitelná s  $KM$ . A ježto  $(AC^2 + CB^2) > 2AC \times CB$  (pozn. 24.), tedy též  $DL > MF$ ; a tak i  $DM > MG$ . Také  $DK \times KM = MN^2 = \frac{1}{4}MG^2$ , a  $DK$  je s  $KM$  souměřitelná. Když pak jsou dvě přímky nestejně a přistaví se k delší části útvar rovný čtvrtině čtverce části kratší, tak aby se mu nedostávalo doplňku čtvercového, a dělí ji (delší) v úsečky souměřitelné, rozdíl čtverců jejich (těch přímek) je čtverec přímky s delší souměřitelné (X. xvii.). Tedy  $DM^2 > MG^2$  o čtverec přímky s  $DM$  souměřitelné. I jsou  $DM$ ,  $MG$  změrné, a  $DM$  jsouc částí delší jest dle délky souměřitelná s danou změrnou  $DE$ .

Tedy  $DG$  je dvoučástnice první (vým. druhých č. 1.); což právě bylo dokázati.

## LXI.

Čtverec dvoustřednice první přistavený<sup>25)</sup> ke změrné šířkou činí dvoučástnici druhou.

Dvoustřednicí první budiž  $AB$  rozdělena jsouc ve své úsečky střední v  $C$ , z nichž delší  $AC$ , a dána buď změrná  $DE$  a k  $DE$  přistavme rovnoběžník stejný s  $AB^2$ , šířkou činící  $DG$ ; pravím, že je  $DG$  dvoučástnice druhá.



Nuže upravme totéž jako před tím. A ježto  $AB$  je dvoustřednice první, jsouc rozdělena v  $C$ , tedy  $AC$ ,  $CB$  jsou střední, jen ve dvojmoci souměřitelné, objímající útvar změrný (X. xxxvii.); pročež také  $AC^2$ ,  $CB^2$  jsou střední (X. xxi.); tedy  $DL$  je

střední. A jest přistaveno ke změrné  $DE$ ; tedy  $MD$  je změrná a s  $DE$  dle délky nesouměřitelná (X. xxii.). Dále, ježto  $2AC \times CB$  je změrné, změrné jest i  $MF$ . A přistaveno jest ke změrné  $ML$ ; pročež také  $MG$  je změrná a dle délky souměřitelná s  $ML$ , t. j.  $DE$ ; tedy  $DM$  je s  $MG$  dle délky nesouměřitelná. A jsou změrné; tedy  $DM$ ,  $MG$  jsou změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné; pročež  $DG$  je dvoučástnice.

Třeba ovšem dokázati, že též druhá.


Nebot  $(AC^2 + CB^2) > 2AC \times CB$ , tedy též  $DL > MF$ , a tak i  $DM > MG$ . A ježto  $AC^2$  je s  $CB^2$  souměřitelné, také  $DH$  jest souměřitelné s  $KL$ ; a tak i  $DK$  jest souměřitelná s  $KM$ . I jest  $DK \times KM = MN^2$ ; tedy rozdíl čtverců  $DM^2$ ,  $MG^2$  je čtverec přímky s  $DM$  souměřitelné. Také jest  $MG$  s  $DE$  dle délky souměřitelná.

Tedy  $DG$  je dvoučástnice druhá (vým. druhých č. 2.)

## LXII.

Čtverec dvoustřednice druhé přistavený<sup>25)</sup> ke změrné šířkou činí dvoučástnici třetí.

Dvoustřednicí druhou budiž  $AB$ , jsouc rozdělena ve své střednice v  $C$ , tak aby delší úsečkou bylo  $AC$ , změrnou pak jakousi buď  $DE$ , a k  $DE$  přistavme rovnoběžník  $DF$  stejný s  $AB^2$ , který šířkou činí  $DG$ ; pravím, že  $DG$  je dvoučástnice třetí.



Upravme totéž jako v důkazech předešlých. A ježto  $AB$  je dvoustřednice druhá, jsouc rozdělena v  $C$ , tedy  $AC$ ,  $CB$  jsou střední, jen ve dvojmoci souměřitelné, objímající útvar střední (X. xxxviii.); a tak i součet  $AC^2 + CB^2$  je střední, a jest rovnou útvaru  $DL$ , pročež i  $DL$  je střední.

A přistaven je ke změrné  $DE$ ; změrná tedy jest i  $MD$  a dle délky s  $DE$  souměřitelná. Z téže příčiny zajisté i  $MG$  je změrná a s  $ML$ , t. j.  $DE$ , nesouměřitelná; tedy  $DM$  i  $MG$  jsou změrné a s  $DE$  dle délky nesouměřitelné. A ježto  $AC$  je dle délky nesouměřitelná s  $CB$  a  $AC:CB = AC^2:AC \times CB$ , také jest  $AC^2$  s  $AC \times CB$  nesouměřitelné. A tak i součet  $AC^2 + CB^2$  je nesouměřitelný s  $2AC \times CB$ , t. j.  $DL$  s  $MF$ ; a tak i  $DM$  jest nesouměřitelná s  $MG$ . A jsou změrné. Proto  $DG$  je dvoučástnice (X. xxxvi.).

Má se dokázati, že také třetí.

Podobně ovšem jako dříve při tom uvážíme, že  $MD > MG$  a že  $DK$  je souměřitelná s  $KM$ . A  $DK \times KM = MN^2$ ; tedy rozdíl čtverců  $DM^2$  a  $MG^2$  je čtverec přímky s  $DM$  souměřitelné (X. xvii.). A žádná z přímek  $DM$ ,  $MG$  není s  $DE$  dle délky souměřitelná.

Tedy  $DG$  je dvoučástnice třetí (vým. druhých č. 3.); což právě bylo dokázati.

## LXIII.


Čtverec nezměrné větší přistavený<sup>25)</sup> ke změrné šířkou činí dvoučástnici čtvrtou.

Nezměrnou větší budiž  $AB$ , jsouc rozdělena v  $C$ , tak, aby byla  $AC > CB$ , změrnou pak  $DE$ , a k  $DE$  přistavme  $DF$  stejně s  $AB^2$ , šířkou činící  $DG$ ; pravím, že  $DG$  jest dvoučástnice čtvrtá.

Upravme totéž jako v předešlých důkazech. A ježto  $AB$  jest nezměrná větší, jsouc rozdělena v  $C$ , jsou  $AC$ ,  $CB$  ve dvojmoci nesouměřitelné, součet čtverců činíce změrným, pravouhelník pak středním (X. xxxix.). Ježto tedy součet  $AC^2 + CB^2$  je změrný, tedy změrné jest i  $DL$ ; pročež i  $DM$  je změrná a s  $DE$  dle délky souměřitelná. Dále, ježto  $2AC \times CB$ , t. j.  $MF$ , je střední a přistaveno ke změrné  $ML$ , změrná tedy jest i  $MG$  a s  $DE$  dle délky nesouměřitelná (X. xxii.); pročež i  $DM$  je s  $MG$  dle délky nesouměřitelná. Tedy  $DM$ ,  $MG$  jsou změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné; pročež  $DG$  je dvoučástnice.

Má se dokázati, že také čtvrtá





Podobně zajisté jako dříve dokážeme, že  $DM > MG$  a  $DK \times KM = MN^2$ . Ježto tedy  $AC^2$  je s  $CB^2$  nesouměřitelné, proto nesouměřitelné jest i  $DH$  s  $KL$ ; a tak i  $DK$  je s  $KM$  nesouměřitelná. Když pak jsou dvě přímky nestejně a k větší se přistaví rovnoběžník rovný čtvrtině čtverce přímky menší, tak aby se mu nedostávalo doplňku čtvercového, a dělí ji v části nesouměřitelné, rozdíl čtverců jejich bude čtverec přímky s delší nesouměřitelné dle délky (X. XVIII.); tedy  $DM^2 > MG^2$  o čtverec přímky s  $DM$  nesouměřitelné. Také jsou  $DM$ ,  $MG$  změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné, a  $DM$  jest souměřitelná s danou změrnou  $DE$ .

Tedy  $DG$  je dvoučástnice čtvrtá (vým. druhých č. 4.); což právě bylo dokázati.

## LXIV.

Čtverec základnice útvaru změrného a středního přistavený<sup>25)</sup> ke změrné šířkou činí dvoučástnici pátou.

Základnicí útvaru změrného a středního budiž  $AB$ , jsouc rozdělena v úsečky v  $C$ , tak aby delší byla  $AC$ , a dána buď změrná  $DE$ , a k  $DE$  přistavme útvar  $DF$  stejný s  $AB^2$ , šířkou činící  $DG$ ; pravím, že  $DG$  je dvoučástnice pátá.

Upravme totéž jako před tím. Ježto tedy  $AB$  jest základnice útvaru změrného a středního, jsouc rozdělena v  $C$ , tedy  $AC$ ,  $CB$  jsou ve dvojmoci nesouměřitelné a součet čtverců jejich je střední, pravouhelník pak změrný (X. XL). Ježto tedy  $AC^2 + CB^2$  je střední, střední tedy jest  $DL$ ; a tak  $DM$  je změrná a dle délky nesouměřitelná s  $DE$  (X. XXII.). Dále, ježto změrné jest  $2 AC < CB$ , t. j.  $MF$ , změrná tedy jest  $MG$  a s  $DE$  souměřitelná. Pročež  $DM$  je s  $MG$  nesouměřitelná; tedy  $DM$ ,  $MG$  jsou změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné; a tak  $DG$  je dvoučástnice.

Pravím ovšem, že i pátá.

Podobně totiž dokážeme, že  $DK \times KM = MN^2$  a že  $DK$  je s  $KM$  dle délky nesouměřitelná; tedy  $DM^2 > MG^2$  o čtverec přímky s  $DM$  nesouměřitelné (X. XVIII.). I jsou  $DM$ ,  $MG$  jen ve dvojmoci souměřitelné, a kratší  $MG$  s  $DE$  dle délky souměřitelná.

Tedy  $DG$  je dvoučástnice pátá (vým. druhých č. 5.); což právě bylo dokázati.

## LXV.

Čtverec základnice dvou útvarů středních přistavený<sup>25)</sup> ke změrné šířkou činí dvoučástnici šestou.

Základnicí dvou útvarů středních budiž  $AB$ , jsouc rozdělena v  $C$ , změrnou pak budiž  $DE$ , a k  $DE$  přistavme útvar  $DF$  stejný s  $AB^2$ , šířkou činící  $DG$ ; pravím, že  $DG$  je dvoučástnice šestá.

Nuže upravme totéž jako dříve. A ježto  $AB$  jest základnice dvou útvarů středních, jsouc rozdělena v  $C$ , tedy  $AC$ ,  $CB$  jsou ve dvojmoci nesouměřitelné a součet čtverců jejich je střední a také součet čtverců jejich s pravouhelníkem nesouměřitelný (X. XLI.), a tak dle důkazů předešlých  $DL$  i  $MF$  jsou střední. A jsou přistaveny ke změrné  $DE$ ; změrná tedy jest  $DM$  i  $MG$  a s  $DE$  dle délky nesouměřitelná. A ježto součet  $AC^2 + CB^2$  je s  $2 AC \times CB$  nesouměřitelný, tedy  $DL$  je s  $MF$  nesouměřitelné. Pročež i  $DM$  jest nesouměřitelná s  $MG$ ; tedy  $DM$ ,  $MG$  jsou změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné; proto  $DG$  je dvoučástnice.

Pravím ovšem, že také šestá.

Podobně zajisté opět dokážeme, že  $DK \times KM = MN^2$  a že  $DK$  je s  $KM$  dle délky nesouměřitelná; a z téže příčiny ovšem  $DM^2 > MG^2$  o čtverec přímky s  $DM$  dle délky nesouměřitelné (X. XVIII.). A žádná z úseček  $DM$ ,  $MG$  není dle délky souměřitelná s danou změrnou  $DE$ .

Tedy  $DG$  je dvoučástnice šestá (vým. druhých č. 6.); což právě bylo dokázati.

## LXVI.



Přímka s dvoučástnicí dle délky souměřitelná i sama je dvoučástnice a v pořadí táž.

Dvoučástnicí budiž  $AB$  a s  $AB$  dle délky souměřitelnou budiž  $CD$ ; pravím  $CD$  je dvoučástnice a v pořadí táž jako  $AB$ .

Nuže, ježto  $AB$  je dvoučástnice, rozdělena buď ve své části v  $E$  a větší částí budiž  $AE$ ;  $AE$ ,  $EB$  jsou tedy změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné (X. XXXVI.). Učiňmež, aby se měla  $AB : CD = AE : CF$  (VI. XII.); tedy také zbývající  $EB : FD = AB : CD$ .  $AB$  však je s  $CD$  dle délky souměřitelná; souměřitelná tedy je též  $AE$  s  $CF$  a  $EB$  s  $FD$ . I jsou  $AE$ ,  $EB$  změrné; změrné jsou tedy též  $CF$ ,  $FD$ . A ježto  $AE : CF = EB : FD$ , střídavě tedy  $AE : EB = CF : FD$ . Avšak  $AE$ ,  $EB$  jsou jen ve dvojmoci souměřitelné; pročež i  $CF$ ,  $FD$  jsou jen ve dvojmoci souměřitelné. A jsou změrné; tedy  $CD$  je dvoučástnice.

Pravím ovšem, že je v pořadí táž jako  $AB$ .

Neboť rozdíl čtverců  $AE^2$  a  $EB^2$  je buďto čtverec přímky s  $AE$  souměřitelné nebo nesouměřitelné. Jestli tedy rozdíl čtverců  $AE^2$ ,  $EB^2$  čtverec přímky s  $AE$  souměřitelné, také  $CF^2$  bude větší než  $FD^2$  o čtverec přímky s  $CF$  souměřitelné (X. XIV.). A jestli  $AE$  souměřitelná s danou změrnou, také  $CF$  bude s ní souměřitelná (X. XII.), a



z té příčiny jsou  $AB$  i  $CD$  dvoučástnice první, t. j. v pořadí tytéž. Pakli  $EB$  jest souměřitelná s danou změrnou, také  $FD$  je s ní souměřitelná, a z té příčiny opět bude ( $CD$ ) v pořadí táž jako  $AB$ ; nebod obě budou dvoučástnice druhé. Pakli žádná z úseček  $AE$ ,  $EB$  není souměřitelná s danou změrnou, žádná z úseček  $CF$ ,  $FD$  nebude s ní souměřitelná (X. III.), a obě jsou (dvoučástnice) třetí. Pakli  $AE^2 > EB^2$  o čtverec přímky s  $AE$  nesouměřitelné (X. XIV.). A jestli  $AE$  souměřitelná s danou změrnou, také  $CF$  je s ní souměřitelná (X. XII.), a obě jsou čtvrté. Pakli  $EB$ , též  $FD$ , a obě jsou páté. Pakli žádná z úseček  $AE$ ,  $EB$ , také žádná z úseček  $CF$ ,  $FD$  není souměřitelná s danou změrnou, i budou obě šesté (vým. druhé).


A tak přímka s dvoučástnicí dle délky souměřitelná je dvoučástnice a v pořadí táž; což právě bylo dokázati.

## LXVII.

Přímka s dvoustřednicí dle délky souměřitelná i sama je dvoustřednice a v pořadí táž.

Dvoustřednicí budiž  $AB$  a s  $AB$  dle délky souměřitelnou buď  $CD$ ; pravím, že  $CD$  je dvoustřednice a v pořadí táž jako  $AB$ .

Nuže, ježto  $AB$  je dvoustřednice, rozdělena buď ve své střednice v  $E$ ;  $AE$ ,  $EB$  jsou tedy střední, jen ve dvojmoci souměřitelné. I učiníme, aby se měla  $AB:CD = AE:CF$ ; tedy také zbývající  $EB:FD =$



$AB:CD$ .  $AB$  však dle délky souměřitelná s  $CD$ , souměřitelná tedy jak  $AE$  tak  $EB$  i s  $CF$  i s  $FD$ . Avšak  $AE$ ,  $EB$  jsou střední; střední tedy též  $CF$ ,  $FD$ . A ježto  $AE:EB = CF:FD$  a jen ve dvojmoci souměřitelné jsou  $AE$ ,  $EB$ , také  $CF$ ,  $FD$  jsou jen ve dvojmoci souměřitelné. Bylo pak

dokázáno, že také střední; tedy  $CD$  je dvoustřednice.

Pravím ovšem, že je také v pořadí táž jako  $AB$ .

Nebod ježto  $AE:EB = CF:FD$ , tedy též  $AE^2:AE \times EB = CF^2:CF \times FD$ ; střídavě  $AE^2:CF^2 = AE \times EB:CF \times FD$ . Avšak  $AE^2$ ,  $CF^2$  jsou souměřitelné; tedy souměřitelné jsou též součiny  $AE \times EB$ ,  $CF \times FD$  (X. XI.). Jestli tedy  $AE \times EB$  změrné, také  $CF \times FD$  je změrné (a z té příčiny jest přímka dvoustřednice první); pakli střední, střední; a obě přímky jsou (dvoustřednice) druhé (X. XXXVII. XXXVIII.).

A proto  $CD$  bude v pořadí táž jako  $AB$ ; což právě bylo dokázati.


## LXVIII.

Přímka s nezměrnou větší souměřitelná i sama jest nezměrná větší.

Nezměrnou větší budiž  $AB$ , a s  $AB$  souměřitelnou buď  $CD$ ; pravím, že  $CD$  jest nezměrná větší.

Budiž  $AB$  rozdělena v  $E$ ;  $AE$ ,  $EB$  jsou tedy ve dvojmoci ne-souměřitelné a součet čtverců jejich je změrný, pravoúhelník pak střední (X. XXXIX.); a učiníme totéž jako dříve. A ježto  $AB:CD = AE:CF$ , rovněž  $AB:CD = EB:FD$ , tedy též  $AE:CF = EB:FD$ . Avšak  $AB$  je s  $CD$  souměřitelná; souměřitelná je tedy též  $AE$  i  $EB$  s  $CF$  i  $FD$ . A ježto  $AE:CF = EB:FD$ , také střídavě  $AE:EB = CF:FD$ ; pročež i součteně  $AB:BE = CD:DF$ ; tedy rovněž  $AB^2:BE^2 = CD^2:DF^2$ . Podobně zajisté dokážeme, že též  $AB^2:AE^2 = CD^2:CF^2$ . Tedy také  $AB^2:(AE^2 + EB^2) = CD^2:(CF^2 + FD^2)$ . Pročež i střídavě  $AB^2:CD^2 = (AE^2 + EB^2):(CF^2 + FD^2)$ . Avšak  $AB^2$  je s  $CD^2$  souměřitelné; tedy souměřitelné jest i  $AE^2 + EB^2$  s  $CF^2 + FD^2$ . I jest  $AE^2 + EB^2$  spolu změrné, i  $CF^2 + FD^2$  je tedy spolu změrné. Podobně pak i  $2AE \times EB$  je souměřitelné s  $2CF \times FD$ . A  $2AE \times EB$  je střední; střední tedy též  $2CF \times FD$ . Proto  $CF$ ,  $FD$  jsou ve dvojmoci nesouměřitelné (X. XIII.) a součet čtverců jejich je spolu změrný a pravoúhelník střední; pročež celá  $CD$  jest nezměrná řečená větší.

Tedy přímka s nezměrnou větší souměřitelná jest nezměrná větší; což právě bylo dokázati.




## LXIX.

Přímka se základnicí útvaru změrného a středního souměřitelná jest i (sama) základnice útvaru změrného a středního.

Základnicí útvaru změrného a středního budiž  $AB$ , a s  $AB$  souměřitelnou buď  $CD$ ; má se dokázati, že i  $CD$  jest základnice útvaru změrného a středního.

Rozdělena budiž  $AB$  ve své úsečky v  $E$ ; tedy  $AE$ ,  $EB$  jsou ve dvojmoci nesouměřitelné a součet čtverců jejich je střední, pravoúhelník však změrný (X. XL.); a upravme totéž jako dříve. Podobně zajisté dokážeme, že také  $CF$ ,  $FD$  jsou ve dvojmoci nesouměřitelné a že  $AE^2 + EB^2$  je s  $CF^2 + FD^2$  souměřitelné, součin pak  $AE \times EB$  s  $CF \times FD$ ; a tak i součet  $CF^2 + FD^2$  je střední,  $CF \times FD$  však změrné.


Tedy  $CD$  jest základnice útvaru změrného a středního; což právě bylo dokázati.



## LXX.

Přímka se základnicí dvou útvarů středních souměřitelná jest základnice dvou útvarů středních.

Základnicí dvou útvarů středních budiž  $AB$ , a s  $AB$  souměřitelná buď  $CD$ ; má se dokázati, že také  $CD$  jest základnice dvou útvarů středních.



Nuže, ježto  $AB$  jest základnice dvou útvarů středních, rozdělena buď ve své úsečky v  $E$ ;  $AE$ ,  $EB$  jsou tedy ve dvojmoci nesouměřitelné a součet čtverců jejich střední a pravouhelník střední a rovněž součet  $AE^2 + EB^2$  s  $AE \times EB^2$  nesouměřitelný (X. XLI.); i upravme totéž jako dříve. Podobně zajisté dokážeme, že také  $CF$ ,  $FD$  jsou ve dvojmoci nesouměřitelné a že souměřitelné jest  $AE^2 + EB^2$  s  $CF^2 + FD^2$  a  $AE \times EB$  s  $CF \times FD$ ; pročež i součet  $CF^2 + FD^2$  je střední i  $CF \times FD$  střední a mimo to  $CF^2 + FD^2$  s  $CF \times FD$  nesouměřitelné.


Tedy  $CD$  jest základnice dvou útvarů středních; což právě bylo dokázati.

## LXXI.

Když se přidruží<sup>27)</sup> útvar změrný ke střednímu, vznikají čtyři přímky nezměrné: buď dvoučástnice nebo dvoustřednice první nebo nezměrná větší nebo základnice útvaru změrného a středního.

Změrným útvarem budiž  $AB$ , středním pak  $CD$ ; pravím, že přímka ve dvojmoci s útvarem  $AD$  stejná jest buďto dvoučástnice nebo dvoustřednice první nebo nezměrná větší nebo základnice útvaru změrného a středního.

Neboť  $AB > CD$  neb  $AB < CD$ . Budiž dříve  $AB > CD$ ; a dána buď změrná  $EF$  a k  $EF$  přistavme  $EG$  stejně s  $AB$ , šířkou činicí  $EH$ ; a přistavme k  $EF$  (t. j. k  $HG$ ) útvar  $HI$  stejný s  $DC$ , šířkou činicí  $HK$ . A ježto  $AB$  je změrné a stejně s  $EG$ , změrné tedy také  $EG$ .



$A$  jest přistaveno k  $EF$ , šířkou činicí  $EH$ ;  $EH$  tedy je změrná a s  $EF$  dle délky souměřitelná (X. xx.). Dále ježto  $CD$  je střední a stejně s  $HI$ , střední tedy jest i  $HI$ . A jest přistaveno ke změrné  $EF$ , šířkou činicí  $HK$ ;  $HK$  je tedy změrná a dle délky nesouměřitelná s  $EF$  (X. xxii.). A ježto  $CD$  je střední,  $AB$  však změrné, tedy  $AB$  je s  $CD$  nesouměřitelné; a tak i  $EG$  jest nesouměřitelné s  $HI$ . Avšak  $EG : HI = EH : HK$ ; pročež  $EH$  je s  $HK$  dle délky nesouměřitelná. A obě

jsou změrné; tedy  $EH$ ,  $HK$  jsou změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné; jest tedy  $EK$  dvoučástnice, jsouc rozdělena v  $H$ . A ježto  $AB > CD$ , avšak  $AB = EG$  a  $CD = HI$ , tedy též  $EG > HI$ ; pročež i  $EH > HK$ . Buďto tedy  $EH^2 > HK^2$  o čtverec přímky s  $EH$  dle délky souměřitelné nebo nesouměřitelné. — Budiž dříve větší o čtverec sou-

<sup>27)</sup> Ve způsobě obdélníkův, aby jednu stranu měly společnou.

měřitelné; a delší  $HE$  jest souměřitelná s danou změrnou  $EF$ ; tedy  $EK$  je dvoučástnice první (vým. druhých č. 1.).  $EF$  pak je změrná; když pak útvar objímají přímka změrná a dvoučástnice první, přímka ve dvojmoci s útvarem stejná je dvoučástnice (X. LIV.). Přímka tedy ve dvojmoci s  $EI$  stejná je dvoučástnice; a tak i přímka stejná ve dvojmoci s  $AD$  dvoučástnice jest. — Nuže buď již  $EH^2 > HK^2$  o čtverec přímky s  $EH$  nesouměřitelné; a delší  $EH$  jest dle délky souměřitelná s danou změrnou  $EF$ ; pročež  $EK$  je dvoučástnice čtvrtá (vým. druhých č. 4.).  $EF$  pak je změrná; změrná a dvoučástnice čtvrtá, přímka ve dvojmoci s útvarem stejná jest nezměrná řečená větší (X. LVII.). Tedy přímka ve dvojmoci stejná s útvarem  $EI$  jest nezměrná větší; a tak i přímka ve dvojmoci stejná s  $AD$  jest nezměrná větší.

Nuže buď již  $AB < CD$ , tedy též  $EG < HI$  a tak i  $EH < HK$ . Avšak  $HK^2 > EH^2$  buď o čtverec přímky s  $HK$  souměřitelné nebo nesouměřitelné. Dříve buď větší o čtverec přímky souměřitelné dle délky; a kratší  $EH$  je dle délky souměřitelná s danou změrnou  $EF$ ; tedy  $EK$  je dvoučástnice druhá (vým. druhých č. 2.).  $EF$  pak je změrná; když pak útvar objímají přímka změrná a dvoučástnice druhá, přímka ve dvojmoci s útvarem stejná je dvoustřednice první (X. LV.). Pročež přímka ve dvojmoci stejná s  $EI$  je dvoustřednice první; a tak i přímka ve dvojmoci stejná s  $AD$  je dvoustřednice první. — Nuže již buď  $HK^2 > HE^2$  o čtverec přímky s  $HK$  nesouměřitelné. A kratší  $EH$  jest souměřitelná s danou změrnou  $EF$ ;  $EK$  je tedy dvoučástnice pátá (vým. druhých č. 5.).  $EF$  pak je změrná; když pak útvar objímají přímka změrná a dvoučástnice pátá, přímka ve dvojmoci s útvarem stejná jest základnice útvaru změrného a středního (X. LVIII.); a tak i přímka ve dvojmoci stejná s útvarem  $AD$  jest základnice útvaru změrného a středního.


Když se tedy přidruží útvar změrný ke střednímu, vznikají čtyři přímky nezměrné: buďto dvoučástnice nebo dvoustřednice první nebo nezměrná větší nebo základnice útvaru změrného a středního; což právě bylo dokázati.

## LXXII.

Když se k sobě přidruží<sup>28)</sup> dva útvary střední, vespolek nesouměřitelné, ze dvou zbývajících přímek<sup>28)</sup> stanou se nezměrné: buďto dvoustřednice druhá nebo základnice dvou útvarů středních.



Buďte k sobě přidružený dva útvary střední  $AB$ ,  $CD$ , vespolek

<sup>28)</sup> Kromě strany společné a jejich rovnoběžek, s ní stejných.



nesouměřitelné; pravím, že přímka ve dvojmoci s  $AD$  stejná jest buďto dvoustřednice druhá nebo základnice dvou útvarů středních.

Neboť buďto  $AB > CD$  nebo  $AB < CD$ . Budiž dříve třebaš  $AB > CD$ ; a dána buď změrná  $EF$ , a k  $EF$  přistavmež útvar  $EG$  s  $AB$  stejný, šířkou činící  $EH$ , a s  $CD$  stejný  $HI$ , šířkou činící  $HK$ .



A ježto  $AB$  i  $CD$  jsou střední, střední jsou tedy též  $EG$  i  $HI$ . A jsou přistaveny ke změrné  $FE$ , šířkami činíce  $EH$ ,  $HK$ ; pročež  $EH$  i  $HK$  jsou změrné a s  $EF$  dle délky nesouměřitelné (X. xxii.). A ježto  $AB$  je s  $CD$  nesouměřitelné a  $AB = EG$ ,  $CD = HI$ , tedy nesouměřitelné je též  $EG$  s  $HI$ . Avšak  $EG : HI = EH : HK$ ; pročež  $EH$  je s  $HK$  dle délky nesouměřitelná. Tedy  $EH$ ,  $HK$  jsou změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné; pročež  $EK$  je dvoučástnice. Avšak  $EH^2 > HK^2$  o čtverec přímky s  $EH$  souměřitelné

nebo nesouměřitelné. Budiž dříve větší o čtverec přímky dle délky souměřitelné. A není ani  $EH$  ani  $HK$  dle délky souměřitelná s danou změrnou  $EF$ ; tedy  $EK$  je dvoučástnice třetí (vým. druhých č. 3.).  $EF$  pak je změrná; když pak útvar objímají přímka změrná a dvoučástnice třetí, přímka ve dvojmoci s útvarem stejná je dvoustřednice druhá (X. lvi.). Tedy přímka ve dvojmoci stejná s  $EI$ , t. j. s  $AD$ , je dvoustřednice druhá. — Nuže buď již  $EH^2 > HK^2$  o čtverec přímky s  $EH$  nesouměřitelné I jsou  $EH$  i  $HK$  dle délky nesouměřitelné s  $EF$ ; tedy  $EK$  je dvoučástnice šestá (vým. druhých č. 6.). Když pak útvar objímají přímka změrná a dvoučástnice šestá, přímka ve dvojmoci s útvarem stejná jest základnice dvou útvarů středních (X. lix.). A tak i přímka ve dvojmoci stejná s  $AD$  jest základnice dvou útvarů středních.

(Podobně zajisté dokážeme, i když  $AB < CD$ , že přímka ve dvojmoci s  $AD$  stejná buď je dvoustřednice druhá nebo základnice dvou útvarů středních.)

Když se tedy k sobě přidruží dva útvary střední, vespolek nesouměřitelné, ze dvou zbývajících přímek stanou se nezměrné: buďto dvoustřednice druhá nebo základnice dvou útvarů středních.

Přímka dvoučástná a nezměrné od ní odvozené ani se střednicí ani navzájem nejsou totožné. Neboť čtverec přímky střední přistavený ke změrné šířkou činí přímku změrnou a nesouměřitelnou dle délky s tou, k níž jest přistaven (X. xxii.). Čtverec pak dvoučástnice přistavený ke změrné, šířkou činí dvoučástnici první (X. lx.). A čtverec dvoustřednice první přistavený ke změrné šířkou činí dvoučástnici druhou (X. lxi.). Čtverec pak dvoustřednice druhé přistavený ke změrné šířkou činí dvoučástnici třetí (X. lxii.). A čtverec nezměrné větší přistavený ke změrné šířkou činí dvoučástnici čtvrtou (X. lxiii.). Čtverec pak základnice útvaru změrného a středního přistavený ke změrné šířkou činí dvoučástnici pátou (X. lxiv.). A čtverec základnice


dvou útvarů středních přistavený ke změrné šířkou činí dvoučástnici šestou (X. lxv.). Řečené pak šířky liší se jak od přímky prvotní tak navzájem; od prvotní, poněvadž je to změrná, navzájem pak, ježto v pořadí nejsou tytéž; a tak i samy přímky nezměrné navzájem se liší.

## LXXIII.

Když se oddělí od přímky změrné změrná, jen ve dvojmoci s celou souměřitelná, zbývající část jest nezměrná; i nazývej se *úsečnicí*.

Nuže budiž od změrné  $AB$  oddělena změrná  $BC$  jen ve dvojmoci s celou souměřitelná; pravím, že zbývající  $AC$  jest nezměrná řečená úsečnice.

Neboť ježto  $AB$  je s  $BC$  dle délky nesouměřitelná a  $AB : BC = AB^2 : AB \times BC$ , tedy nesouměřitelné jest  $AB^2$  s  $AB \times BC$ . Avšak s  $AB^2$  souměřitelné jsou čtverce  $AB^2 + BC^2$  (X. xv.) a s  $AB \times BC$  souměřitelné jest  $2 AB \times BC$ . A jelikož  $AB^2 + BC^2 = 2 AB \times BC + CA^2$  (II. vii.), tedy též se zbývajícím  $AC^2$  nesouměřitelné jest  $AB^2 + BC^2$ . Avšak  $AB^2 + BC^2$  je změrné; tedy  $AC$  jest nezměrná; nazývej se *úsečnicí*. Což právě bylo dokázati.



## LXXIV.

Když se od přímky střední oddělí střední, jen ve dvojmoci s celou souměřitelná, objímající s celou útvar změrný, zbývající část jest nezměrná; i nazývej se *střednicovou úsečnicí první*.

Nuže budiž od přímky střední  $AB$  oddělena střední  $BC$ , jen ve dvojmoci s  $AB$  souměřitelná, s  $AB$  však činící útvar změrný  $AB \times BC$ ; pravím, že zbývající  $AC$  jest nezměrná; i nazývej se *střednicovou úsečnicí první*.

Neboť, ježto  $AB$ ,  $BC$  jsou střední, střední jsou i čtverce  $AB^2$ ,  $BC^2$ . Změrné však  $2 AB \times BC$ ; tedy  $AB^2 + BC^2$  je s  $2 AB \times BC$  nesouměřitelné; pročež i se zbývajícím  $AC^2$  jest  $2 AB \times BC$  nesouměřitelné, ježto, když i s jednou částí celek jest nesouměřitelný, i prvotní veličiny budou nesouměřitelné (X. xvi.). Avšak  $2 AB \times BC$  je změrné, proto  $AC^2$  jest nezměrné. Tedy  $AC$  jest nezměrná; i nazývej se *střednicovou úsečnicí první*.




## LXXV.

Když se od přímky střední oddělí střední, jen ve dvojmoci s celou souměřitelná, objímající s celou útvar střední, zbývající část jest nezměrná; i nazývej se *střednicovou úsečnicí druhou*.

Nuže budiž od přímky střední  $AB$  oddělena střední  $BC$ , jen ve dvojnosti s celou  $AB$  souměřitelná, objímající však s celou  $AB$  útvar střední  $AB \times BC$  (X. xxviii.); pravím, že zbývající  $AC$  jest nezměrná; i nazývej se střednicovou úsečnicí druhou.

Nuže dána buď změrná  $DI$ , a k  $DI$  přistavmež útvar  $DE$  stejný s  $AB^2 + BC^2$ , šířkou činicí  $DG$ , a přistavme k  $DI$  útvar  $DH$  stejný s  $2AB \times BC$ , šířkou činicí  $DF$ ; zbývající tedy  $FE = AC^2$  (II. vii.). A ježto čtverce  $AB^2$  i  $BC^2$  jsou střední a souměřitelné, tedy střední jest i  $DE$ , a přistaveno jest ke změrné  $DI$ , šířkou činicí  $DG$ ; změrná tedy jest i  $DG$  a s  $DI$  dle délky nesouměřitelná. Dále, ježto  $AB \times BC$



je střední, tedy též  $2AB \times BC$  je střední. A je stejné s  $DH$ ; pročez i  $DH$  je střední. A jest přistaveno ke změrné  $DI$ , šířkou činicí  $DF$ ; tedy  $DF$  je změrná a s  $DI$  dle délky nesouměřitelná (X. xxii.). A ježto  $AB$ ,  $BC$  jsou jen ve dvojnosti souměřitelné, tedy  $AB$  je s  $BC$  dle délky nesouměřitelná; pročez nesouměřitelný jest i čtverec  $AB^2$  s  $AB \times BC$ . Avšak s  $AB^2$  souměřitelné jest  $AB^2 + BC^2$  (X. xv.), a s  $AB \times BC$  souměřitelné jest  $2AB \times BC$ ; tedy  $2AB \times BC$  je s  $AB^2 + BC^2$  nesouměřitelné. Avšak  $AB^2 + BC^2 = DE$  a  $2AB \times BC = DH$ . Tedy  $DE$  je s  $DH$  nesouměřitelné. A  $DE:DH = GD:DF$ ; pročez  $GD$  je s  $DF$  nesouměřitelné. A obě jsou změrné; tedy  $GD$ ,  $DF$  jsou změrné jen ve dvojnosti souměřitelné; proto  $FG$  jest úsečnice (X. lxxiii.).  $DI$  však je změrná; útvar pak objímáný přímkou změrnou a nezměrnou jest nezměrný (X. xx.), a přímka s ním ve dvojnosti stejná nezměrná jest. A  $AC^2 = FE$ ; tedy  $AC$  jest nezměrná. I nazývej se střednicovou úsečnicí druhou; což právě bylo dokázati.

## LXXVI.

Když se oddělí od přímky přímka, ve dvojnosti s celou nesouměřitelná, a s celou činí zároveň součet čtverců změrný, pravoúhelník pak střední, zbývající část nezměrná jest; i nazývej se nezměrnou menší.

Nuže budiž od přímky  $AB$  oddělena  $BC$  ve dvojnosti s celou nesouměřitelná, vyhovujíc daným podmínkám (X. xxxiii.); pravím, že zbývající  $AC$  jest nezměrná řečená menší.



Neboť, ježto  $AB^2 + BC^2$  je změrné a  $2AB \times BC$  střední, tedy  $AB^2 + BC^2$  je s  $2AB \times BC$  nesouměřitelné, a zvrtně se zbývající  $AC^2$  nesouměřitelné jest  $AB^2 + BC^2$  (X. xvi.). Avšak  $AB^2 + BC^2$  je změrné; pročez  $AC^2$  jest nezměrné. Tedy  $AC$  jest nezměrná; i nazývej se nezměrnou menší; což právě bylo dokázati.

## LXXVII.

Když se oddělí od přímky přímka, ve dvojnosti s celou nesouměřitelná, a s celou činí součet čtverců střední a dvojnásobný pravoúhelník změrný, zbývající část nezměrná jest; i nazývej se základnicí útvaru se změrným celku střednímu rovného.

Nuže budiž od přímky  $AB$  oddělena přímka  $BC$ , ve dvojnosti s  $AB$  nesouměřitelná, vyhovujíc daným podmínkám (X. xxxiv.); pravím, že zbývající  $AC$  je svrchu řečená nezměrná.

Neboť, ježto  $AB^2 + BC^2$  je střední a  $2AB \times BC$  změrné, tedy  $AB^2 + BC^2$  je s  $2AB \times BC$  nesouměřitelné; tedy též zbývající  $AC^2$  jest nesouměřitelné s  $2AB \times BC$  (X. xvi.). A  $2AB \times BC$  je změrné; tedy  $AC^2$  jest nezměrné. Pročez  $AC$  jest nezměrná; i nazývej se základnicí útvaru se změrným celku střednímu rovného.




## LXXVIII.

Když se oddělí od přímky přímka, ve dvojnosti s celou nesouměřitelná, a s celou činí jak součet čtverců střední tak i dvojnásobný pravoúhelník střední a také součet čtverců s dvojnásobným pravoúhelníkem nesouměřitelný, zbývající část nezměrná jest; i nazývej se základnicí útvaru se středním celku střednímu rovného.

Nuže budiž od přímky  $AB$  oddělena přímka  $BC$ , jsouc ve dvojnosti s  $AB$  nesouměřitelná, vyhovujíc daným podmínkám (X. xxxv.); pravím, že zbývající  $AC$  jest nezměrná řečená základnicí útvaru se středním celku střednímu rovného.

Nuže dána změrná  $DI$ , a k  $DI$  přistavmež útvar  $DE$  stejný s  $AB^2 + BC^2$ , šířkou činicí  $DG$ , a oddělmež útvar  $DH$  stejný s  $2AB \times BC$  (šířkou činicí  $DF$ ). Tedy zbytek  $FE = AC^2$ ; a tak  $AC$  je stranou čtverce stejného s  $FE$ . A ježto  $AB^2 + BC^2$  je střední a stejné s  $DE$ , tedy  $DE$  je střední. A přistaveno jest ke změrné  $DI$ , šířkou činicí  $DG$ ; pročez  $DG$  je změrná a s  $DI$  dle délky nesouměřitelná. Dále, ježto  $2AB \times BC$  je střední a stejné s  $DH$ ; tedy  $DH$  je střední. A jest přistaveno ke změrné  $DI$ , šířkou činicí  $DF$ ; pročez také  $DF$  je změrná a s  $DI$  dle délky nesouměřitelná. A poněvadž  $AB^2 + BC^2$  je s  $2AB \times BC$  nesouměřitelné, tedy též  $DE$  je s  $DH$  nesouměřitelné. A  $DE:DH = DG:DF$ ; pročez  $DG$  jest nesouměřitelná s  $DF$ . A obě jsou změrné; tedy  $DG$ ,  $DF$  jsou změrné jen ve dvojnosti souměřitelné. Pročez  $FG$  jest úsečnice (X. lxxiii.);  $FH$  pak změrná. Útvar však objímáný přímkou změrnou a úsečnicí jest nezměrný (srv. X. xxvi.), a přímka



14\*

ve dvojmoci s ním stejná jest nezměrná. I jest  $FE = AC^2$ ; tedy  $AC$  jest nezměrná; i nazývej se základnicí útvaru se středním celku střednímu rovného; což právě bylo dokázati.

## LXXIX.

K úsečnici pouze jediná přísluší přímka změrná, s celou jen ve dvojmoci souměřitelná.

Úsečnici budiž  $AB$  a k ní příslušej  $BC$ ; tedy  $AC$ ,  $CB$  jsou změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné; pravím, že k  $AB$  jiná nepřislouší změrná, s celou jen ve dvojmoci souměřitelná.

Nuže, možno-li, příslušej  $BD$ ; též  $AD$ ,  $BD$  tedy jsou jen ve dvojmoci souměřitelné (X. LXXIII.). A ježto  $(AD^2 + DB^2) - 2AD \times DB = (AC^2 + CB^2) - 2AC \times CB$  (neboť rozdíl tu i onde jest  $AB^2$  [II. VII.]); tedy střídavě  $(AD^2 + DB^2) - (AC^2 + CB^2) = 2AD \times DB - 2AC \times CB$ . Avšak  $(AD^2 + DB^2) - (AC^2 + CB^2)$  je změrné, neboť to i ono je změrné. Pročež i  $2AD \times DB - 2AC \times CB$  je změrné; což právě jest nemožné; neboť to i ono je střední (X. XXI.), rozdíl pak útvarů středních není změrný (X. XXVI.). Tedy k  $AB$  jiná nepřislouší přímka změrná, s celou jen ve dvojmoci souměřitelná.

Tedy k úsečnici pouze jediná přísluší přímka změrná, s celou jen ve dvojmoci souměřitelná; což právě bylo dokázati.

## LXXX.

K střednicové úsečnici první pouze jediná přísluší přímka střední, s celou jen ve dvojmoci souměřitelná a objímající s celou útvar změrný.

Nuže buď střednicovou úsečnici první  $AB$  a k  $AB$  příslušej  $BC$ ; tedy  $AC$ ,  $CB$  jsou střední, jen ve dvojmoci souměřitelné a objímají útvar změrný  $AC \times CB$  (X. LXXIV.); pravím, že k  $AB$  jiná nepřislouší přímka střední, s celou jen ve dvojmoci souměřitelná a objímající s celou útvar změrný.

Nuže, možno-li, příslušej také  $DB$ ; tedy  $AD$ ,  $DB$  jsou střední, jen ve dvojmoci souměřitelné, a objímají útvar změrný  $AD \times DB$ . A ježto  $(AD^2 + DB^2) - 2AD \times DB = (AC^2 + CB^2) - 2AC \times CB$  (neboť tu i onde je též rozdíl  $AB^2$  [II. VII.]); tedy střídavě  $(AD^2 + DB^2) - (AC^2 + CB^2) = 2AD \times DB - 2AC \times CB$ . Avšak  $2AD \times DB - 2AC \times CB$  je změrné, neboť to i ono je změrné. Pročež také  $(AD^2 + DB^2) - (AC^2 + CB^2)$  je změrné; což právě jest nemožné; neboť obojí je střední (X. LXXIV.). Rozdíl pak útvarů středních není změrný (X. XXVI.).

Tedy k střednicové úsečnici první pouze jediná přísluší přímka střední, s celou jen ve dvojmoci souměřitelná a objímající s celou útvar změrný; což právě bylo dokázati.

## LXXXI.

K střednicové úsečnici druhé pouze jediná přísluší přímka střední, s celou jen ve dvojmoci souměřitelná a objímající s celou útvar střední.


Střednicovou úsečnici druhou budiž  $AB$  a k  $AB$  příslušej  $BC$ ; tedy  $AC$ ,  $BC$  jsou střední, jen ve dvojmoci souměřitelné, a objímají útvar střední  $AC \times CB$  (X. LXXV.); pravím, že k  $AB$  jiná nebude příslušet přímka střední, s celou jen ve dvojmoci souměřitelná a objímající s celou útvar střední.

Nuže, možno-li, příslušej  $BD$ ; tedy též  $AD$ ,  $DB$  jsou střední, jen ve dvojmoci souměřitelné, a objímají útvar střední  $AD \times DB$ . I buď dána změrná  $EF$ , a k  $EF$  přistavmež útvar  $EG$  stejný s  $AC^2 + CB^2$ , šířkou činicí  $EM$ ; oddělmež útvar  $HG$  stejný s  $2AC \times CB$ , šířkou činicí  $HM$ ; tedy zbývající  $EL = AB^2$ ; a tak  $AB$  je stranou čtverce stejného s  $EL$ . Opět již přistavme k  $EF$  útvar  $EI$  stejný s  $AD^2 + DB^2$ , šířkou činicí  $EN$ ; jest pak rovněž  $EL = AB^2$ ; zbývající tedy  $HI = 2AD \times DB$  (II. VII.). A ježto  $AC$ ,  $CB$  jsou střední, střední tedy také jest  $AC^2 + CB^2$ . A  $AC^2 + CB^2 = EG$ ; pročež i  $EG$  je střední. A přistaveno jest ke změrné  $EF$ , šířkou činicí  $EM$ ; tedy  $EM$  je střední a s  $EF$  dle délky nesouměřitelná. Dále, ježto  $AC \times CB$  je střední, též  $2AC \times CB$  je střední (X. XXII. důsl.). A je stejné s  $HG$ ; tedy též  $HG$  je střední. A jest přistaveno ke změrné  $EF$ , šířkou činicí  $HM$ ; pročež i  $HM$  je změrná a s  $EF$  dle délky nesouměřitelná. A ježto  $AC$ ,  $CB$  jsou jen ve dvojmoci souměřitelné, tedy  $AC$  je s  $CB$  dle délky nesouměřitelná. Avšak  $AC:CB = AC^2:AC \times CB$ ; pročež  $AC^2$  je s  $AC \times CB$  nesouměřitelné. Avšak s  $AC^2$  jest souměřitelné  $AC^2 + CB^2$  a s  $AC \times CB$  souměřitelné jest  $2AC \times CB$ ; tedy  $AC^2 + CB^2$  je s  $2AC \times CB$  nesouměřitelné. I jest  $AC^2 + CB^2 = EG$  a  $2AC \times CB = GH$ ; pročež  $EG$  je s  $GH$  nesouměřitelné. A  $EG:HG = EM:HM$ ; tedy  $EM$  je s  $HM$  dle délky nesouměřitelná. A obě jsou změrné; proto  $EM$ ,  $MH$  jsou změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné. Tedy  $EH$  jest úsečnice (X. LXXIII.), a přísluší k ní  $HM$ . Podobně zajisté dokážeme, že též  $HN$  k ní přísluší; tedy k úsečnici jiná a jiná přísluší přímka, s celou jen ve dvojmoci souměřitelná; což právě jest nemožné (X. LXXIX.).


Tedy k střednicové úsečnici druhé pouze jediná přísluší přímka střední, s celou jen ve dvojmoci souměřitelná a objímající s celou útvar střední; což právě bylo dokázati.

## LXXXII.

K nezměrné menší pouze jediná přísluší přímka ve dvojmoci s celou nesouměřitelná, činicí s celou součet čtverců změrný a dvojnásobný pravoúhelník střední.



Nezměrnou menší budiž  $AB$ , a k  $AB$  příslušej  $BC$ ; tedy  $AC$ ,  $CB$  jsou ve dvojmoci nesouměřitelné a činí součet čtverců změrný a dvojnásobný pravoúhelník střední (X. LXXVI.); pravím, že k  $AB$  jiná přímka nebude příslušetí týmž podmínkám vyhovující.




Nuže, možno-li příslušej  $BD$ ; tedy též  $AD$ ,  $BD$  jsou ve dvojmoci nesouměřitelné, vyhovující svrchu řečeným podmínkám. A ježto  $(AD^2 + DB^2) - (AC^2 + CB^2) = 2 AD \times DB - 2 AC \times CB$  a  $(AD^2 + DB^2) - (AC^2 + CB^2)$  je změrné (neboť to i ono je změrné), také tedy  $2 AD \times DB - 2 AC \times CB$  je změrné, což právě jest nemožné (X. XXVI.), neboť obojí je střední.

Tedy k nezměrné menší pouze jediná přísluší přímka ve dvojmoci s celou nesouměřitelná a činící s celou součet čtverců zároveň změrný, dvojnásobný pak pravoúhelník střední; což právě bylo dokázati.

## LXXXIII.

K základnici útvaru se změrným celku střednímu rovného pouze jediná přísluší přímka ve dvojmoci s celou nesouměřitelná, činící s celou součet čtverců střední a dvojnásobný pravoúhelník změrný.

Základnici útvaru se změrným celku střednímu rovného budiž  $AB$  a k  $AB$  příslušej  $BC$ ; tedy  $AC$ ,  $CB$  jsou ve dvojmoci nesouměřitelné, daným podmínkám vyhovující (X. LXXVII.); pravím, že k  $AB$  nebude jiná přímka příslušetí týmž podmínkám vyhovující.



Nuže, možno-li, příslušej  $BD$ ; tedy též přímky  $AD$ ,  $DB$  jsou ve dvojmoci nesouměřitelné, daným podmínkám vyhovující. Ježto tedy stejně jako před tím (X. LXXXII)  $AD^2 + DB^2 - (AC^2 + CB^2) = 2 AD \times DB - 2 AC \times CB$ , avšak  $2 AD \times DB - 2 AC \times CB$  je změrné (neboť to i ono je změrné); tedy též  $(AD^2 + DB^2) - (AC^2 + CB^2)$  je změrné; což právě jest nemožné, neboť to i ono je střední (X. XXVI.). Tedy k  $AB$  nebude jiná příslušetí přímka ve dvojmoci s celou nesouměřitelná a vyhovující s celou svrchu řečeným podmínkám; tedy bude příslušetí pouze jediná; což právě bylo dokázati.


## LXXXIV.

K základnici útvaru se středním celku střednímu rovného pouze jediná přísluší přímka ve dvojmoci s celou nesouměřitelná, činící s celou součet čtverců střední a dvojnásobný pravoúhelník střední a také se součtem čtverců nesouměřitelný.

Základnici útvaru se středním celku střednímu rovného budiž  $AB$ , a k ní příslušej  $BC$ ; tedy  $AB$ ,  $CB$  jsou ve dvojmoci nesouměři-

telné, vyhovující svrchu řečeným podmínkám. Pravím, že k  $AB$  nebude jiná přímka příslušetí oněm podmínkám vyhovující.

Nuže, možno-li, příslušej  $BD$ , takže by též  $AD$ ,  $DB$  byly ve dvojmoci nesouměřitelné a činily zároveň  $AD^2 + DB^2$  středním a  $2 AD \times DB$  středním a rovněž  $AD^2 + DB^2$  nesouměřitelným s  $2 AD \times DB$ ; a dána buď změrná  $EF$ , a k  $EF$  přistavmež  $EG$  stejné s  $AC^2 + CB^2$ , šířkou činící  $EM$ , a přistavme k  $EF$  útvar  $HG$  stejný s  $2 AC \times CB$ , šířkou činící  $HM$ ; tedy zbývající  $AB^2 = EL$  (II. VII.); tedy  $AB$  je strana čtverce stejného s  $EL$ . Dále přistavme k  $EF$  útvar  $EI$  stejný s  $AD^2 + DB^2$ , šířkou činící  $EN$ . Jest pak rovněž  $AB^2 = EL$ . Tedy zbývající  $2 AD \times DB = HI$  (II. VII.). A ježto  $AC^2 + CB^2$  je střední a stejné s  $EG$ , tedy též  $EG$  je střední. A jest přistaveno ke změrné  $EF$ , šířkou činící  $EM$ ; pročež  $EM$  je změrná a dle délky s  $EF$  nesouměřitelná (X. XXII.). Dále, ježto  $2 AC \times CB$  je střední a stejné s  $HG$ , tedy též  $HG$  je střední. A jest přistaveno ke změrné  $EF$ , šířkou činící  $HM$ ; pročež  $HM$  je změrná a dle délky s  $EF$  nesouměřitelná. A ježto  $AC^2 + CB^2$  je s  $2 AC \times CB$  nesouměřitelné, nesouměřitelné jest i  $EG$  s  $GH$ ; tedy též  $EM$  je s  $MH$  dle délky nesouměřitelná. A obě jsou změrné; tedy  $EM$ ,  $MH$  jsou změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné. Pročež  $EH$  jest úsečnice (X. LXXIII.), a k ní přísluší  $HM$ . Podobně zajisté dokážeme, že opět  $EH$  jest úsečnice a že k ní přísluší  $HN$ . Tedy k úsečnici jiná a jiná přísluší přímka změrná, jen ve dvojmoci s celou souměřitelná; což dokázáno nemožným (X. LXXIX.). Nebude tedy k  $AB$  příslušetí přímka jiná.



Tedy k  $AB$  pouze jediná přísluší přímka ve dvojmoci s celou nesouměřitelná, činící s celou součet čtverců zároveň střední a dvojnásobný pravoúhelník střední a také součet čtverců jejich s dvojnásobným pravoúhelníkem nesouměřitelný; což právě bylo dokázati.

## Výměry třetí.

1. Dána-li přímka změrná a úsečnice, když celá ve dvojmoci jest větší než příslušná o čtverec přímky s celou souměřitelné dle délky a celá jest souměřitelná dle délky s danou změrnou, nazýváje úsečnicí první.

2. Když pak příslušná jest souměřitelná dle délky s danou změrnou a celá ve dvojmoci jest větší než příslušná o čtverec přímky s celou souměřitelné, nazýváje se úsečnicí druhou.

3. Když pak žádána<sup>29)</sup> není dle délky souměřitelná s danou

<sup>29)</sup> T. j. ani přímka celá ani ta, která k úsečnici přísluší.

změrnou, celá však jest ve dvojmoci větší než příslušná o čtverec přímky s celou souměřitelné, nazývej se úsečnicí třetí.

4. Když naopak celá ve dvojmoci jest větší než příslušná o čtverec přímky s celou nesouměřitelné (dle délky), celá-li je dle délky souměřitelná s danou změrnou, nazývej se úsečnicí čtvrtou.

5. Pak-li příslušná<sup>30)</sup>, pátou.

6. Pak-li žádná, šestou.

## LXXXV.

Najdi úsečnici první.

Mějme přímku změrnou  $A$ , a buď s  $A$  dle délky souměřitelnou  $BG$ ; změrná tedy jest i  $BG$ . A mějme dvě čísla čtvercová  $DE$ ,  $EF$ , rozdíl však jejich  $FD$  nebuď čtvercový; tedy nemá se ani  $ED$  k  $DF$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému. I učinme  $ED:DF = BG^2:GC^2$  (X. VI. důsl.); tedy  $BG^2$  je s  $GC^2$  souměřitelné.  $BG^2$  však je změrné; změrné tedy též  $GC^2$ ; pročež i  $GC$  je změrná. A jelikož nemá se  $ED$  k  $DF$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému, ani tedy  $BG^2$  nemá se ku  $GC^2$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému; pročež  $BG$  je s  $GC$  dle délky nesouměřitelná. A obě jsou změrné;  $BG$ ,  $GC$  jsou tedy změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné; pročež  $BC$  jest úsečnice (X. LXXIII.).

Pravím ovšem, že také první.

Nuže budiž  $BG^2 - GC^2 = H^2$ . A ježto  $ED:DF = BG^2:GC^2$ ; tedy také zvrtně  $DE:EF = GB^2:H^2$ . Avšak  $DE$  má se k  $EF$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému, neboť to i ono je čtverec; tedy též  $GB^2$  má se k  $H^2$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému; pročež  $BG$  je s  $H$  dle délky souměřitelná. A  $BG^2 - GC^2 = H^2$ ; tedy  $BG$  jest ve dvojmoci větší než  $GC$  o čtverec přímky souměřitelné dle délky s  $BG$ . I jest celá  $BG$  souměřitelná s danou změrnou  $A$ ; pročež  $BC$  jest úsečnice první (vým. tř. č. 1.).

Tedy nalezena jest úsečnice první  $BC$ ; což právě bylo naléztí.

## LXXXVI.

Najdi úsečnici druhou.

Mějme změrnou přímku  $A$ , a budiž s  $A$  dle délky souměřitelnou  $GC$ . Tedy  $GC$  je změrná. A mějme dvě čísla čtvercová  $DE$ ,  $EF$ , rozdíl však jejich  $DF$  nebuď čtvercový. I učinmež  $FD:DE = CG^2:GB^2$  (X. VI. důsl.). Tedy  $CG^2$  je s  $GB^2$  souměřitelné.  $CG^2$  však je změrné, změrné tedy jest i  $GB^2$ ; pročež  $BG$  je změrná. A ježto  $GC^2$  nemá se ku  $GB^2$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému,  $CG$  je s  $GB$  dle

<sup>30)</sup> T. je dle délky souměřitelná s danou změrnou.

délky nesouměřitelná. A obě jsou změrné; tedy  $CG$ ,  $GB$  jsou změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné; pročež  $BC$  jest úsečnice (X. LXXIII.).

Pravím ovšem, že také druhá.

Budiž  $BG^2 - GC^2 = H^2$ . Ježto tedy  $BG^2:GC^2 = ED:DF$ , tedy zvrtně  $BG^2:H^2 = DE:EF$ . I jest jak  $DE$  tak  $EF$  čtverec; pročež  $BG^2$  má se k  $H^2$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému; tedy  $BG$  je s  $H$  dle délky souměřitelná. A  $BG^2 - GC^2 = H^2$ ; a tak  $BG$  jest ve dvojmoci větší než  $GC$  o čtverec přímky s  $BG$  souměřitelné dle délky. A přímka příslušná  $CG$  je s danou změrnou  $A$  souměřitelná; pročež  $BC$  jest úsečnice druhá (vým. tř. č. 2.).

Tedy nalezena jest úsečnice druhá  $BC$ ; což právě bylo dokázati.



## LXXXVII.

Najdi úsečnici třetí.

Mějme přímku změrnou  $A$  a mějme tři čísla  $E$ ,  $BC$ ,  $CD$ , aby se neměla k sobě jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému, avšak  $CB$  měj se k  $BD$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému, a učinme  $E:BC = A^2:FG^2$  a  $BC:CD = FG^2:GH^2$ . Ježto tedy  $E:BC = A^2:FG^2$ , tedy  $A^2$  je s  $FG^2$  souměřitelné.  $A^2$  však je změrné; proto změrné také  $FG^2$ ;  $FG$  je tedy změrná. A ježto se nemá  $E$  k  $BC$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému, ani tedy  $A^2$  nemá se k  $FG^2$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému; pročež  $A$  je s  $FG$  dle délky nesouměřitelná. Dále, ježto  $BC:CD = FG^2:GH^2$ , tedy  $FG^2$  je s  $GH^2$  souměřitelné.  $FG^2$  však je změrné; změrné tedy též  $GH^2$ ; proto  $GH$  je změrná. A ježto  $BC$  nemá se k  $CD$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému, ani tedy  $FG^2$  nemá se ku  $GH^2$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému; pročež  $FG$  je s  $GH$  nesouměřitelná dle délky. A obě jsou změrné; tedy  $FG$ ,  $GH$  jsou změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné; pročež  $FH$  jest úsečnice.

Pravím ovšem, že také třetí.

Neboť, ježto  $E:BC = A^2:FG^2$  a  $BC:CD = FG^2:GH^2$ , tedy stejnořadně  $E:CD = A^2:HG^2$ . Avšak  $E$  nemá se k  $CD$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému, ani tedy  $A^2$  nemá se k  $HG^2$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému; pročež  $A$  je s  $GH$  dle délky nesouměřitelná. Tedy ani  $FG$  ani  $GH$  není s danou změrnou  $A$  dle délky souměřitelná. I budiž  $FG^2 - GH^2 = K^2$ . Ježto tedy  $BC:CD = FG^2:GH^2$ , tož zvrtně  $BC:CD = FG^2:K^2$ .  $BC$  pak má se k  $BD$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému; tedy také  $FG^2$  má se ke  $K^2$  jako čtvercové číslo





k číslu čtvercovému. Pročež  $FG$  je s  $K$  dle délky souměřitelná, i jest  $FG$  ve dvojmoci větší než  $GH$  o čtverec přímky s  $FG$  souměřitelné. A není ani  $FG$  ani  $GH$  s danou změrnou  $A$  dle délky souměřitelná; pročež  $FH$  jest úsečnice třetí (vým. tř. č. 3).

Tedy nalezena jest úsečnice třetí  $FH$ ; což právě bylo dokázati.

## LXXXVIII.

Najdi úsečnici čtvrtou.

Mějme přímku změrnou  $A$  a s  $A$  dle délky souměřitelnou  $BG$ ; tedy změrná jest i  $BG$ . A mějme dvě čísla  $DF$ ,  $FE$ , tak aby se celá  $DE$  neměla ani k  $DF$  ani k  $EF$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému; učiňme  $DE:EF=BG^2:GC^2$ ; tedy  $BG^2$  je s  $GC^2$  souměřitelné. Avšak  $BG^2$  je změrné; pročež i  $GC^2$  je změrné; tedy  $GC$  je změrná. A ježto  $DE$  nemá se k  $EF$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému, tedy ani  $BG^2$  nemá se ku  $GC^2$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému; pročež  $BG$  je s  $GC$  dle délky nesouměřitelná. A obě jsou změrné; proto  $BG$ ,  $GC$  jsou změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné; tedy  $BC$  jest úsečnice.


Pravím ovšem, že také čtvrtá.

Budiž tedy  $BG^2-GC^2=H^2$ . A tak, ježto  $DE:EF=BG^2:GC^2$ , také zvrtně tedy  $ED:DF=GB^2:H^2$ .  $ED$  však se nemá k  $DF$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému; pročež ani  $GB^2$  nemá se k  $H^2$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému; tedy  $BG$  je s  $H$  dle délky nesouměřitelná. I jest  $BG^2-GC^2=H^2$ ; proto  $BG$  jest ve dvojmoci větší než  $GC$  o čtverec přímky s  $BG$  nesouměřitelné. A celá  $BG$  je dle délky s danou změrnou  $A$  souměřitelná; pročež  $BC$  jest úsečnice čtvrtá (vým. tř. č. 4.).

Tedy nalezena jest úsečnice čtvrtá; což právě bylo dokázati.

## LXXXIX.

Najdi úsečnici pátou.



Mějme přímku změrnou  $A$ , a buď s  $A$  dle délky souměřitelná  $CG$ ; tedy  $CG$  je změrná. A mějme dvě čísla  $DF$ ,  $FE$ , tak aby se opět nemělo  $DE$  ani k  $DF$  ani k  $FE$  jako číslo čtvercové k číslu čtvercovému; a učiňme  $FE:ED=CG^2:GB^2$ . Tedy změrné jest i  $GB^2$ ; pročež i  $BG$  je změrná. A ježto  $DE:EF=BG^2:GC^2$ ,  $DE$  však nemá se k  $EF$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému, tedy ani  $BG^2$  nemá se ku  $GC^2$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému; pročež  $BG$  je s  $BC$  dle délky nesouměřitelná. A obě jsou změrné; tedy  $BG$ ,  $GC$  jsou změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné; pročež  $BC$  jest úsečnice.

Tedy nalezena jest úsečnice pátá; což právě bylo dokázati.

Pravím ovšem, že také pátá.

Nuže budiž  $BG^2-GC^2=H^2$ . Ježto tedy  $BG^2:GC^2=DE:EF$ , proto zvrtně  $ED:DF=BG^2:H^2$ .  $ED$  však nemá se k  $DF$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému, tedy ani  $BG^2$  nemá se k  $H^2$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému; pročež  $BG$  je s  $H$  dle délky nesouměřitelná. A  $BG^2-GC^2=H^2$ ; tedy  $GB$  jest ve dvojmoci větší než  $GC$  o čtverec přímky s  $GB$  dle délky nesouměřitelné. A příslušná  $CG$  je dle délky souměřitelná s danou změrnou  $A$ ; pročež  $BC$  jest úsečnice pátá (vým. tř. č. 5.).

Tedy nalezena jest úsečnice pátá  $BC$ ; což právě bylo dokázati.

## XC.


Najdi úsečnici šestou.

Mějme přímku změrnou  $A$  a tři čísla  $E$ ,  $BC$ ,  $CD$ , která se nemají k sobě jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému; mimo to pak také neměj se  $CB$  k  $BD$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému, a učiňmež  $E:BC=A^2:FG^2$  a  $BC:CD=FG^2:GH^2$ .

Ježto tedy  $E:BC=A^2:FG^2$ , tu jest  $A^2$  s  $FG^2$  souměřitelné. Avšak  $A^2$  je změrné; změrné tedy také  $FG^2$ ; proto změrná jest i  $FG$ . A ježto  $E$  nemá se k  $BC$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému, tedy nemá se ani  $A^2$  k  $FG^2$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému; pročež  $A$  je s  $FG$  dle délky nesouměřitelná. Dále, ježto  $BC:CD=FG^2:GH^2$ , tedy  $FG^2$  je s  $GH^2$  souměřitelné.  $FG^2$  však je změrné; pročež i  $GH^2$  je změrné; změrná tedy jest i  $GH$ . A ježto  $BC$  nemá se k  $CD$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému, tedy nemá se ani  $FG^2$  ku  $GH^2$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému; pročež  $FG$  je s  $GH$  dle délky nesouměřitelná. A obě jsou změrné; proto  $FG$ ,  $GH$  jsou změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné. Tedy  $FH$  jest úsečnice.

Pravím ovšem, že také šestá.

Neboť, ježto  $E:BC=A^2:FG^2$  a  $BC:CD=FG^2:GH^2$ , stejnořadně tedy  $E:CD=A^2:GH^2$ . Avšak  $E$  nemá se k  $CD$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému; pročež nemá se ani  $A^2$  ku  $GH^2$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému; tedy  $A$  je s  $GH$  dle délky nesouměřitelná; pročež ani  $FG$  ani  $GH$  není dle délky se změrnou  $A$  souměřitelná. Budiž tedy  $FG^2-GH^2=K^2$ . Ježto tedy  $BC:CD=FG^2:GH^2$ , proto zvrtně  $CB:BD=FG^2:K^2$ . Avšak  $CB$  nemá se k  $BD$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému, tedy ani  $FG^2$  nemá se ku  $K^2$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému; pročež  $FG$  je s  $K$  dle délky nesouměřitelná. A  $FG^2-GH^2=K^2$ ; protož  $FG$  jest ve dvojmoci větší než  $GH$  o čtverec přímky s  $FG$  nesouměřitelné dle délky. Také ani  $FG$  ani  $GH$  není s danou změrnou  $A$  dle délky souměřitelná. Pročež  $FH$  jest úsečnice šestá (vým. tř. č. 6.).




Tedy nalezena jest úsečnice šestá  $FH$ ; což právě bylo dokázati.

## XCI.

Když útvar objímají přímka změrná a úsečnice první, přímka ve dvojmoci s útvarem stejná jest úsečnice.

Nuže objímejtež útvar  $AB$  přímka změrná  $AC$  a úsečnice první  $AD$ ; pravím, že přímka ve dvojmoci s  $AB$  stejná jest úsečnice.

Nuže, ježto  $AD$  jest úsečnice první, příslušej k ní  $DG$ ; tedy  $AG$ ,  $GD$  jsou změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné (X. LXXIII.). A celá  $AG$  jest souměřitelná s danou změrnou  $AC$ , a  $AG$  jest ve dvojmoci větší než  $GD$  o čtverec přímky s  $AG$  souměřitelné dle délky (vým. tř. č. 1.); když se tedy k  $AG$  přistaví útvar rovný čtvrtině čtverce



$DG^2$ , aby se mu nedostávalo doplňku čtvercového, dělí ji v části souměřitelné (X. XVII.). Rozpolme  $DG$  v  $E$  a k  $AG$  přistavmež útvar stejný s  $EG^2$ , aby se mu nedostávalo doplňku čtvercového, a buď to  $AF \times FG$ ; tedy  $AF$  je s  $FG$  souměřitelná. A z bodů  $E, F, G$  vedme s  $AC$  rovnoběžné  $EH, FI, GK$ .

A ježto  $AF$  je s  $FG$  dle délky souměřitelná, tedy též  $AG$  jest i s  $AF$  i s  $FG$  dle délky souměřitelná. Avšak  $AG$  jest souměřitelná s  $AC$ ; pročež také  $AF, FG$  jsou dle délky souměřitelné s  $AC$ . I jest  $AC$  změrná; tedy  $AF$  i  $FG$  jsou změrné;

a tak i útvary  $AI, FK$  jsou změrné. A ježto  $DE$  je dle délky souměřitelná s  $EG$ , tedy také  $DG$  jest souměřitelná dle délky s  $DE$  i s  $EG$ . Avšak  $DG$  je změrná a s  $AC$  dle délky nesouměřitelná (X. XIII.); proto též  $DE, EG$  jsou změrné a s  $AC$  dle délky nesouměřitelné; tedy útvary  $DH, EK$  jsou střední (X. XXI.).

Tož dejme tomu, že  $AI$  rovno čtverci  $LM$ , a oddělme čtverec  $NO$ , stejný s  $FK$ , mající  $\sphericalangle LPM$  společný; tedy  $LM, NO$  jsou na téže úhlopříčce (VI. XXVI.). Budiž úhlopříčkou jejich  $PR$  a obrazec buď vyznačen.\*) Ježto tedy pravouhelník  $AF \times FG = EG^2$ , proto  $AF:EG = EG:FG$ . Avšak  $AF:EG = AI:EK$  a  $EG:FG = EK:FK$ ; tedy  $AI, EK$  mají za střední úměrnou  $EK$ . Mají však i  $LM, NO$  za střední úměrnou  $MN$ , jak bylo dříve (X. LIII. výt.) dokázáno, i jest  $AI = LM$  a  $KF = NO$ ; pročež i  $MN = EK$ . Avšak  $FK = DH$  a  $MN = LO$ ; pročež  $DK$  rovno soudělníku  $UVX$  spolu s  $NO$ . Jest pak též  $AK = LM + NO$ ; tedy zbývající  $AB = ST$ .  $ST$  však jest  $LN^2$ ; pročež  $LN^2 = AB$ ;  $LN$  je tedy ve dvojmoci stejná s  $AB$ .

Pravím ovšem, že  $LN$  jest úsečnice.

Neboť, ježto  $AI, FK$  jsou útvary změrné a stejné s  $LM, NO$ ,

\*) V dol. obr. mylně  $RFM$  m. správného označení  $RTM$ .

tedy  $LM$ , t. j.  $LP^2$ , a  $NO$ , t. j.  $PN^2$ , jsou útvary změrné; pročež i  $LP, PN$  jsou změrné. Dále, ježto  $DH$  je střední a stejné s  $LO$ , též  $LO$  je střední. Ježto tedy  $LO$  je střední,  $NO$  pak změrné, tedy  $LO$  je s  $NO$  nesouměřitelné. A  $LO:NO = LP:PN$ ; pročež  $LP$  je s  $PN$  dle délky nesouměřitelná. A obě jsou změrné; tedy  $LP, PN$  jsou změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné; pročež  $LN$  jest úsečnice (X. LXXIII.). A jest ve dvojmoci rovna útvaru  $AB$ ; a tak přímka ve dvojmoci rovná útvaru  $AB$  jest úsečnice.

Když tedy útvar objímají přímka změrná atd.

## XCII.


Když útvar objímají přímka změrná a úsečnice druhá, přímka ve dvojmoci s útvarem stejná je střednicová úsečnice první.

Nuže objímejtež útvar  $AB$  přímka změrná  $AC$  a úsečnice druhá  $AD$ ; pravím, že přímka ve dvojmoci s útvarem  $AB$  stejná je střednicová úsečnice první.

Nuže k  $AD$  příslušej  $DG$ ; tedy  $AD, GD$  jsou změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné (X. LXXIII.); a příslušná  $DG$  jest souměřitelná s danou změrnou  $AC$ , celá pak  $AG$  jest ve dvojmoci větší než příslušná  $GD$  o čtverec přímky s  $AG$  souměřitelné dle délky. Ježto tedy rozdíl mezi  $AG^2$  a  $GD^2$  je čtverec přímky s  $AG$  souměřitelné, proto když se k  $AG$  přistaví útvar rovný čtvrtině čtverce  $GD^2$ , tak aby se mu nedostávalo doplňku čtvercového, rozděljuje ji v části souměřitelné. Rozpolme tedy

$DG$  v  $E$  a k  $AG$  přistavmež útvar rovný čtverci  $EG^2$ , aby se mu nedostávalo doplňku čtvercového, a budiž to  $AF \times FG$ ; tedy  $AF$  je s  $FG$  dle délky souměřitelná. Pročež  $AG$  je dle délky souměřitelná s  $AF$  i s  $FG$  (X. XV.). Avšak  $AG$  je změrná a s  $AC$  dle délky nesouměřitelná; proto též  $AF, FG$  jsou změrné a s  $AC$  dle délky nesouměřitelné; tedy  $AI, FK$  jsou útvary střední (X. XX.). Dále, ježto  $DE$  jest souměřitelná s  $EG$ , tedy také  $DG$  jest souměřitelná s  $DE$  i s  $EG$ . Avšak  $DG$  jest souměřitelná dle délky s  $AC$ ; pročež  $DH, EK$  jsou útvary změrné.

Zřídme tedy čtverec  $LM = AI$  a oddělmež  $NO = FK$ , které má s  $LM$  též  $\sphericalangle LPM$ ; tedy čtverce  $LM, NO$  jsou na téže úhlopříčce. Budiž úhlopříčkou jejich  $PR$  a obrazec buď vyznačen. Ježto tedy  $AI, FK$  jsou útvary střední a stejné s  $LP^2, PN^2$ , též  $LP^2, PN^2$  jsou střední; proto jsou též  $LP, PN$  střední, jen ve dvojmoci souměřitelné. A ježto  $AF \times FG = EG^2$ , tedy  $AF:EG = EG:FG$ ; avšak  $AF:EG = AI:EK$ ; a  $EG:FG = EK:FK$ . Pročež  $AI, FK$  mají za střední úměrnou  $EK$ . Avšak i  $LM, NO$  mají za střední úměrnou  $MN$ ; i jest  $AI = LM$



a  $FK = NO$ ; tedy též  $MN = EK$ . Avšak  $EK = DH$  a  $MN = LO$ ; pročež celé  $DK$  rovná se soudelníku  $UVX$  spolu s  $NO$ . Ježto tedy celé  $AK = LM + NO$ , z čehož  $DK = UVX + NO$ , proto zbývající  $AB = TS$ .  $TS$  pak jest  $LN^2$ ; tedy  $LN^2$  je stejné s útvarem  $AB$ ; pročež  $LN$  rovná se ve dvojmoci útvaru  $AB$ .

Pravím, že  $LN$  je střednicová úsečnice první.

Neboť, ježto  $EK$  je změrné a stejné s  $LO$ , tedy  $LO$ , t. j.  $LP \times PN$ , je změrné. Dokázáno pak, že  $NO$  je střední; pročež  $LO$  je s  $NO$  nesouměřitelné. A  $LO : NO = LP : PN$ ; tedy  $LP, PN$  jsou dle délky nesouměřitelné (X. xi.). A tak  $LP, PN$  jsou střední, jen ve dvojmoci souměřitelné, a objímají útvar změrný; pročež  $LN$  je střednicová úsečnice první (X. LXXIV.); a jest  $LN^2 = AB$ .


Tedy přímka ve dvojmoci stejná s útvarem  $AB$  je střednicová úsečnice první; což právě bylo dokázati.

## XCIII.

Když útvar objímají přímka změrná a úsečnice třetí, přímka ve dvojmoci s útvarem stejná je střednicová úsečnice druhá.

Nuže objímejtež útvar  $AB$  přímka změrná  $AC$  a úsečnice třetí  $AD$ ; pravím, že přímka ve dvojmoci s útvarem  $AB$  stejná je střednicová úsečnice druhá.

Nuže k  $AD$  příslušej  $DG$ ; tedy  $AG, GD$  jsou změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné, a žádná z přímek  $AG, GD$  není dle délky souměřitelná s danou změrnou  $AC$ , celá však  $AG$  jest ve dvojmoci větší než příslušná  $DG$  o čtverec přímky s  $AG$  souměřitelné. Ježto tedy



$AG^2 > GD^2$  o čtverec přímky s  $AG$  souměřitelné, proto když se k  $AG$  přistaví útvar rovný čtvrtině čtverce  $DG^2$ , tak aby se mu nedostávalo doplňku čtvercového, bude ji dělití v části souměřitelné. Rozpolme tedy  $DG$  v  $E$  a k  $AG$  přistavmež útvar rovný čtverci  $EG^2$ , tak aby se mu nedostávalo doplňku čtvercového, a budiž to  $AF \times FG$ . A vedme z bodů  $E, F, G$  přímky s  $AC$  rovnoběžné  $EH, FI, GK$ ; jsou tedy  $AF, FG$  souměřitelné; pročež také  $AI$  je s  $FK$  souměřitelné. A ježto  $AF, FG$  jsou dle délky souměřitelné,

tedy též  $AG$  je dle délky souměřitelná s  $AF$  i s  $FG$  (X. xv.).  $AG$  však je změrná a s  $AC$  dle délky nesouměřitelná, a tak rovněž  $AF, FG$  (X. xiii.). Tedy  $AI$  i  $FK$  jsou střední (X. xx.). Dále ježto  $DE$  je s  $EG$  dle délky souměřitelná, tedy rovněž  $DG$  je dle délky souměřitelná s  $DE$  i s  $EG$ .  $GD$  však je změrná a s  $AC$  dle délky nesouměřitelná; pročež i  $DE, EG$  jsou změrné a dle délky s  $AC$  nesouměřitelné; tedy  $DH, EK$  jsou útvary střední. A ježto  $AG, GD$  jsou jen

ve dvojmoci souměřitelné, tedy  $AG$  je s  $GD$  nesouměřitelná dle délky. Avšak  $AG$  je dle délky souměřitelná s  $AF$  a  $DG$  s  $EG$ ; pročež  $AF$  je s  $EG$  dle délky nesouměřitelná. Též  $AF : EG = AI : EK$ ; tedy  $AI$  je s  $EK$  nesouměřitelné.

Zřídme tedy čtverec  $LM = AI$  a oddělmež  $NO = FK$  o témž úhlu ako  $LM$ ; pročež  $LM, NO$  jsou na téže úhlopříčce. Úhlopříčkou jejich jbudíž  $PR$  a útvar buď vyznačen. Ježto tedy  $AF \times FG = EG^2$ , tedy  $AF : EG = EG : FG$ . Avšak  $AF : EG = AI : EK$  a  $EG : FG = EK : FK$ ; proto též  $AI : EK = EK : FK$ ; tedy  $AI, FK$  mají za střední úměrnou  $EK$ . Také však  $LM, NO$  mají za střední úměrnou  $MN$  (X. LIII. výt.); i jest  $AI = LM$  a  $FK = NO$ ; pročež i  $EK = MN$ . Avšak  $MN = LO$  a  $EK = DH$ ; tedy  $DK = UVX + NO$ . Jest pak také  $AK = LM + NO$ ; tedy také zbývající  $AB = ST$ , t. j.  $LN^2$ ; pročež  $LN$  jest ve dvojmoci stejná s útvarem  $AB$ .

Pravím, že  $LN$  je střednicová úsečnice druhá.

Neboť, ježto bylo dokázáno, že  $AI, FK$  jsou střední a stejná s  $LP^2, PN^2$ , tedy střední jsou též  $LP^2, PN^2$ ; pročež  $LP, PN$  jsou střední. A ježto  $AI$  je s  $FK$  souměřitelné, tedy též  $LP^2$  jest souměřitelné s  $PN^2$ . Dále, ježto bylo dokázáno, že  $AI$  je s  $EK$  nesouměřitelné, tedy rovněž  $LM$  jest nesouměřitelné s  $MN$ , t. j.  $LP^2$  s  $LP \times PN$ ; a tím též  $LP$  je dle délky nesouměřitelná s  $PN$ ; tedy  $LP, PN$  jsou střední, jen ve dvojmoci souměřitelné.

Pravím ovšem, že objímají též útvar střední.

Neboť, ježto bylo dokázáno, že jest  $EK$  střední a stejně s  $LP \times PN$ , tedy rovněž  $LP \times PN$  je střední; a tak  $LP, PN$  jsou střední jen ve dvojmoci souměřitelné a objímají útvar střední. Pročež  $LN$  je střednicová úsečnice druhá (X. LXXV.), a  $LN^2 = AB$ .


Tedy přímka ve dvojmoci stejná s útvarem  $AB$  je střednicová úsečnice druhá; což právě bylo dokázati.

## XCIV.

Když útvar objímají přímka změrná a úsečnice čtvrtá, přímka ve dvojmoci s útvarem stejná jest nezměrná menší.

Nuže objímejtež útvar  $AB$  přímka změrná  $AC$  a úsečnice čtvrtá  $AD$ ; pravím, že přímka ve dvojmoci s útvarem  $AB$  stejná jest nezměrná menší.

Nuže k  $AD$  příslušej  $DG$ ; tedy  $AG, GD$  jsou změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné, a  $AG$  jest dle délky souměřitelná s danou změrnou  $AC$ , celá pak  $AG$  jest ve dvojmoci větší než příslušná  $DG$  o čtverec přímky s  $AG$  nesouměřitelné dle délky. Ježto tedy  $AG^2 > GD^2$  o čtverec přímky s  $AG$  dle délky nesouměřitelné, proto když se k  $AG$  přistaví útvar rovný čtvrtině čtverce  $DG^2$ , tak, aby se



mu nedostávalo doplňku čtvercového, bude ji dělití v části nesouměřitelné (X. XVIII.). Rozpolme tedy  $DG$  v  $E$  a k  $AG$  přistavmež útvar stejný s  $EG^2$ , aby se mu nedostávalo doplňku čtvercového, a budiž to  $AF \times FG$ ; tož jest  $AF$  s  $FG$  dle délky nesouměřitelná. Vedme tedy z bodů  $E, F, G$  přímky s  $AC, BD$  rovnoběžné  $EH, FI, GK$ . Ježto tedy  $AG$  je změrná a s  $AC$  dle délky souměřitelná, proto celé  $AK$  je změrné. Dále, ježto  $DG$  je s  $AC$  nesouměřitelná dle délky a obě jsou změrné,  $DK$  tedy je střední. Dále, ježto  $AF$  je s  $FG$  dle délky nesouměřitelná, proto též  $AI$  jest souměřitelné s  $FK$ . Zřídme tedy čtverec  $LM = AI$  a oddělimež  $NO = FK$  o témž  $\sphericalangle LPM$ . Tedy čtverce  $LM, NO$  jsou na téže úhlopříčce. Budiž úhlopříčkou jejich  $PR$  a obrazec buď vyznačen. Ježto tedy  $AF \times FG = EG^2$ , proto  $AF:EG = EG:FG$ ; avšak  $AF:EG = AI:EK$  a  $EG:FG = EK:FK$ ; tedy  $AI, FK$  mají za střední úměrnou  $EK$ . Rovněž pak mají  $LM, NO$  za střední úměrnou  $MN$ , také jest  $AI = LM$  a  $FK = NO$ ; tedy též  $EK = MN$ . Avšak  $EK = DH$  a  $MN = LO$ ; proto celé  $DK = UVX + NO$ . Ježto tedy celé  $AK = LM + NO$ , z čehož  $DK = UVX + NO$ , proto zbývající  $AB = ST$ , t. j.  $LN^2$ ; tedy  $LN$  jest ve dvojmoci stejná s útvarem  $AB$ .

Pravím, že  $LN$  jest nezměrná řečená menší.


Neboť, ježto  $AK$  je změrné a rovno čtvercům  $LP^2 + PN^2$ , tedy  $LP^2 + PN^2$  je změrné. Dále, ježto  $DK$  je střední a  $DK = 2LP \times PN$ , tedy  $2LP \times PN$  je střední. A jelikož bylo dokázáno, že  $AI$  je s  $FK$  nesouměřitelné, proto také čtverec  $LP^2$  jest nesouměřitelný s  $PN^2$ . Tedy  $LP, PN$  jsou ve dvojmoci nesouměřitelné, činíce součet čtverců změrný, dvojnásobný pak pravoúhelník střední. Pročež  $LN$  jest nezměrná řečená menší (X. LXXVI.), a  $LN^2 = AB$ .

Tedy přímka ve dvojmoci stejná s  $AB$  jest nezměrná menší; což právě bylo dokázati.

## XCV.

Když útvar objímají přímka změrná a úsečnice pátá, přímka ve dvojmoci s útvarem stejná jest základnice útvaru se změrným celku střednímu rovného.

Nuže objímejtež útvar  $AB$  přímka změrná  $AC$  a úsečnice pátá  $AD$ ; pravím, že přímka ve dvojmoci s útvarem  $AB$  stejná jest základnice útvaru se změrným celku střednímu rovného.



Nuže k  $AD$  příslušej  $DG$ ; tedy  $AG, GD$  jsou změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné, a příslušná  $GD$  je dle délky souměřitelná s danou změrnou  $AC$ , celá pak  $AG$  jest ve dvojmoci větší než příslušná  $DG$  o čtverec přímky s  $AG$  nesouměřitelné. Když se tedy k  $AG$  přistaví útvar rovný čtvrtině čtverce  $DG^2$ , tak aby se mu nedostávalo doplňku čtvercového, bude ji dělití v části nesouměřitelné. Nuže rozpolme  $DG$  v bodě  $E$  a při-

stavme k  $AG$  útvar stejný s  $EG^2$ , aby se mu nedostávalo doplňku čtvercového, a budiž to  $AF \times FG$ ; tedy jest  $AF$  s  $FG$  dle délky nesouměřitelná. A ježto  $AG$  s  $CA$  je dle délky nesouměřitelná a obě jsou změrné, proto  $AK$  je střední. Dále, ježto  $DG$  je změrná a s  $AC$  dle délky souměřitelná,  $DK$  je změrné. Zřídme tedy čtverec  $LM = AI$  a oddělimež  $NO = FK$  o témž  $\sphericalangle LPM$ ; proto jsou  $LM, NO$  na téže úhlopříčce. Budiž úhlopříčkou jejich  $PR$  a obrazec buď vyznačen. Podobně zajistě dokážeme, že  $LN^2 = AB$ .

Pravím, že  $LN$  jest základnice útvaru se změrným celku střednímu rovného.

Neboť, ježto bylo dokázáno, že jest  $AK$  střední a rovno součtu  $LP^2 + PN^2$ , tedy  $LP^2 + PN^2$  je střední. Dále ježto  $DK$  je změrné a stejné s  $2LP \times PN$ , i to je změrné. A ježto  $AI$  je s  $FK$  nesouměřitelné, proto nesouměřitelné jest i  $LP^2$  s  $PN^2$ ; tedy  $LP, PN$  jsou ve dvojmoci nesouměřitelné a činí součet čtverců střední, dvojnásobný pak pravoúhelník změrný. Pročež zbývající  $LN$  jest nezměrná řečená základnice útvaru se změrným celku střednímu rovného (X. LXXVII.); a  $LN^2 = AB$ .


Tedy přímka ve dvojmoci s útvarem  $AB$  stejná jest základnice útvaru se změrným celku střednímu rovného; což právě bylo dokázati.

## XCVI.

Když útvar objímají přímka změrná a úsečnice šestá, přímka ve dvojmoci s útvarem stejná jest základnice útvaru se středním celku střednímu rovného.

Nuže objímejtež útvar  $AB$  přímka změrná  $AC$  a úsečnice šestá  $AD$ ; pravím, že přímka ve dvojmoci s útvarem  $AB$  stejná jest základnice útvaru se středním celku střednímu rovného.

Nuže k  $AD$  příslušej  $GD$ ; tedy  $AG, GD$  jsou změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné, a žádná z nich není dle délky souměřitelná s danou změrnou  $AC$ , celá pak  $AG$  jest ve dvojmoci větší než příslušná  $DG$  o čtverec přímky s  $AG$  dle délky nesouměřitelné. Ježto tedy  $AG^2 > GD^2$  o čtverec přímky s  $AG$  dle délky nesouměřitelné, proto když se k  $AG$  přistaví útvar rovný čtvrtině čtverce  $DG^2$ , tak aby se mu nedostávalo doplňku čtvercového, bude ji dělití v části nesouměřitelné (X. XVIII.). Rozpolme tedy  $DG$  v  $E$  a k  $AG$  přistavmež útvar stejný s  $EG^2$ , aby se mu nedostávalo doplňku čtvercového, a budiž to  $AF \times FG$ ; tedy  $AF$  je s  $FG$  dle délky nesouměřitelná. A  $AF:FG = AI:FK$ ; pročež  $AI$  je s  $FK$  nesouměřitelné. A ježto  $AG, AC$  jsou změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné,  $AK$  je střední (X. XXI.). Dále ježto  $AC, DG$  jsou změrné a dle délky nesouměřitelné, také  $DK$



je střední. Ježto tedy  $AG$ ,  $GD$  jsou jen ve dvojmoci souměřitelné, jest proto  $AG$  s  $GD$  dle délky nesouměřitelná. A  $AG:GD=AK:KD$ ; pročež  $AK$  je s  $KD$  nesouměřitelné. Zřídme tedy čtverec  $LM=AI$  a oddělmež  $NO=FK$  o téměř úhlu; tedy  $LM$ ,  $NO$  jsou na téže úhlopříčce. Úhlopříčkou jejich budiž  $PR$  a budiž obrazec vyznačen. Podobně zajisté jako svrchu dokážeme, že  $LN^2=AB$ .

Pravím, že  $LN$  jest základnice útvaru se středním celku střednímu rovného.

Neboť, ježto bylo dokázáno, že  $AK$  je střední a stejné s  $LP^2+PN^2$ , tedy  $LP^2+PN^2$  je střední. Ježto dále bylo dokázáno, že  $DK$  je střední a stejné s  $2LP \times PN$ , také  $2LP \times PN$  je střední. A ježto shledáno bylo  $AK$  s  $DK$  nesouměřitelným, také součet  $LP^2+PN^2$  jest nesouměřitelný s  $2LP \times PN$ . A ježto  $AI$  je s  $FK$  nesouměřitelné, tedy nesouměřitelné též  $LP^2$  s  $PN^2$ ; pročež  $LP$ ,  $PN$  jsou ve dvojmoci nesouměřitelné, činíce součet čtverců střední a dvojnásobný pravoúhelník střední a mimo to součet čtverců s dvojnásobným pravoúhelníkem nesouměřitelný. Pročež  $LN$  jest nezměrná řečená základnice útvaru se středním celku střednímu rovného (X. LXXVIII.); a  $LN^2=AB$ .

Tedy přímka ve dvojmoci s útvarem stejná jest základnice útvaru se středním celku střednímu rovného; což právě bylo dokázati.



## LCVII.

Čtverec úsečnice přistavený ku přímce změrné šířkou činí úsečnici první.

Úsečnicí budiž  $AB$ , změrnou pak  $CD$ , a k  $CD$  buď přistaveno  $CE$  stejné s  $AB^2$ , takže šířkou činí  $CF$ ; pravím, že  $CF$  jest úsečnice první.

Nuže k  $AB$  příslušej  $BG$ ; tedy  $AG$ ,  $GB$  jsou změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné (X. LXXIII.). I přistavme k  $CD$  útvar  $CH$  stejný s  $AG^2$  a  $KL$  stejný s  $BG^2$ . Tedy celé  $CL=AG^2+GB^2$ , z čehož  $CE=AB^2$ ; pročež zbývající  $FL=2AG \times GB$ . Rozpolmež  $FM$  v bodě  $N$  a z  $N$  vedme  $NO$  rovnoběžně s  $CD$ ; tedy  $FO=LN=AG \times GB$ .

A ježto  $AG^2+GB^2$  je změrné a  $AG^2+GB^2=DM$ , proto  $DM$  je změrné; a jest přistaveno ke změrné  $CD$ , šířkou činíc  $CM$ ; tedy  $CM$  je změrná a s  $CD$  dle délky souměřitelná (X. xx.). Dále, ježto  $2AG \times GB$  je střední (X. XXI.) a  $2AG \times GB=FL$ , tedy  $FL$  je střední; a jest přistaveno ke změrné  $CD$ , šířkou činíc  $FM$ ; pročež  $FM$  je změrná a s  $CD$  dle délky nesouměřitelná (X. XXII.). A ježto  $AG^2+GB^2$  je změrné a  $2AG \times GB$  střední, tedy  $AG^2+GB^2$  je s  $2AG \times GB$  nesouměřitelné. A  $AG^2+GB^2=CL$ ,  $2AG \times GB=FL$ ; proto  $DM$  je s  $FL$  nesouměřitelné. Avšak  $DM:FL=CM:FM$ ; pročež  $CM$  je s  $FM$  dle délky nesoumě-



řitelná. A obě jsou změrné; tedy  $CM$ ,  $MF$  jsou změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné; pročež  $CF$  jest úsečnice (X. LXXIII.).

Pravím ovšem, že také první.

Neboť, ježto  $AG^2$ ,  $GB^2$  mají za střední úměrnou  $AG \times GB$  (X. XXI. výt.) a  $AG^2=CH$ ,  $BG^2=KL$ ,  $AG \times GB=NL$ , tedy mají též  $CH$ ,  $KL$  za střední úměrnou  $NL$ . Pročež  $CH:NL=NL:KL$ . Avšak  $CH:NL=CK:MN$  a  $NL:KL=NM:KM$ ; tedy  $CK \times KM=NM^2=1/4 EM^2$ . A ježto  $AG^2$  je s  $GB^2$  souměřitelné, také  $CH$  je s  $KL$  souměřitelné. Rovněž  $CH:KL=CK:KM$ ; pročež  $CK$  je s  $KM$  souměřitelná. Ježto tedy  $CM$ ,  $MF$  jsou dvě přímky nestejně a k  $CM$  je přistaven útvar  $CK \times KM$ , rovný čtvrtině čtverce  $FM^2$ , takže se mu nedostává doplňku čtvercového, a  $CK$  jest souměřitelná s  $KM$ , tedy  $CM^2 > MF^2$  o čtverec přímky s  $CM$  dle délky souměřitelné (X. XVII.). A  $CM$  je dle délky souměřitelná s danou změrnou  $CD$ ; pročež  $CF$  jest úsečnice první (vým. tř. č. 1.).

Tedy čtverec úsečnice přistavený ku přímce změrné šířkou činí úsečnici první; což právě bylo dokázati.

## XCVIII.

Čtverec střednicové úsečnice první přistavený ku přímce změrné šířkou činí úsečnici druhou.

Střednicovou úsečnicí první budiž  $AB$ , přímku pak změrnou  $CD$  a k  $CD$  přistaven buď útvar  $CE$ , stejný s  $AB^2$ , takže šířkou činí  $CF$ ; pravím, že  $CF$  jest úsečnice druhá.

Nuže k  $AB$  příslušej  $BG$ ; tedy  $AG$ ,  $GB$  jsou střední, jen ve dvojmoci souměřitelné a objímají útvar změrný (X. LXXIV.). A k  $CD$  přistavmež útvar  $CH$ , stejný s  $AG^2$ , takže šířkou činí  $CK$ , a  $KL$  stejný s  $BG^2$ , šířkou činíc  $KM$ ; celé tedy  $LC=AG^2+GB^2$ ; pročež i  $CL$  je střední. A jest přistaveno ke změrné  $CD$ , šířkou činíc  $CM$ ; tedy  $CM$  je změrná a s  $CD$  dle délky nesouměřitelná (X. XXII.). A ježto  $CL=AG^2+GB^2$ , z čehož  $AB^2=CE$ ; proto zbývající  $2AG \times GB=FL$ . Avšak  $2AG \times GB$  je změrné; tedy  $FL$  je změrné. A přistaveno jest ke změrné  $FE$ , šířkou činíc  $FM$ ; proto též  $FM$  je změrná a s  $CD$  dle délky souměřitelná (X. XX.). Ježto tedy  $AG^2+GB^2$ , t. j.  $CL$ , je střední, avšak  $2AG \times GB$ , t. j.  $FL$ , změrné, proto  $CL$  je s  $FL$  nesouměřitelné. A  $CL:FL=CM:FM$ ; tedy  $CM$  je s  $FM$  dle délky nesouměřitelná. A obě jsou změrné; pročež  $CM$ ,  $MF$  jsou změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné; tedy  $CF$  jest úsečnice (X. LXXIII.).

Pravím ovšem, že také druhá.

Nuže rozpolme  $FM$  v  $N$  a z  $N$  vedme  $NO$  rovnoběžně s  $CD$ ; tedy  $FO=NL=AG \times GB$ . A ježto čtverce  $AG^2$ ,  $GB^2$  mají za střední úměrnou  $AG \times GB$  a  $AG^2=CH$ ,  $AG \times GB=NL$ ,  $BG^2=KL$ , proto též  $CH$ ,  $KL$  mají za střední úměrnou  $NL$ ; tedy  $CH:NL=NL:KL$ .

Avšak  $CH:NL=CK:NM$  a  $NL:KL=NM:MK$ ; pročež  $CK:NM=NM:KM$ ; tedy  $CK \times KM=NM^2$ , t. j. čtvrtině čtverce  $FM^2$ . Ježto tedy  $CM, MF$  jsou dvě přímky nestejně a k delší  $CM$  přistaven útvar  $CK \times KM$ , rovný čtvrtině čtverce  $MF^2$ , takže se mu nedostává doplňku čtvercového, a dělí ji v části souměřitelné<sup>31)</sup>, tedy  $CM^2 > MF^2$  o čtverec přímky s  $CM$  dle délky souměřitelné (X. xvii). A příslušná  $FM$  je dle délky souměřitelná s danou změrnou  $CD$ ; pročež  $CF$  jest úsečnice druhá (vým. tř. č. 2).

Tedy čtverec střednicové úsečnice první přistavený ku přímce změrné šířkou činí úsečnici druhou; což právě bylo dokázati.

## IC.

Čtverec střednicové úsečnice druhé přistavený ku přímce změrné šířkou činí úsečnici třetí.

Střednicovou úsečnici druhou budiž  $AB$ , přímkou pak změrnou  $CD$  a k  $CD$  přistaven buď útvar  $CE$  stejný s  $AB^2$ , takže šířkou činí  $CF$ ; pravím, že  $CF$  jest úsečnice třetí.

Nuže k  $AB$  příslušej  $BG$ ; tedy  $AG, GB$  jsou střední, jen ve dvojmoci souměřitelné a objímají útvar střední (X. lxxv.). A k  $CD$  přistavmež útvar  $CH$  stejný s  $AG^2$ , takže šířkou činí  $CK$ , a ke  $KH$  přistavmež útvar  $KL$  stejný s  $BG^2$ , takže šířkou činí  $KM$ ; celé tedy  $CL=AG^2+GB^2$  (a  $AG^2+GB^2$  je střední); pročež i  $CL$  je střední.

A přistaveno jest ke změrné  $CD$ , šířkou činí  $CM$ ; tedy  $CM$  je změrná a s  $CD$  dle délky nesouměřitelná (X. xxii.). A ježto celé  $CL=AG^2+GB^2$ , z čehož  $CE=AB^2$ , proto zbývající  $FL=2AG \times GB$ . Rozpolme tedy  $FM$  v bodě  $N$  a s  $CD$  vedme rovnoběžku  $NO$ ; tož  $FO=NL=AG \times GB$ . Avšak  $AG \times GB$  je střední; střední tedy jest i  $FL$ . A jest přistaveno ke změrné  $EF$ , šířkou činí  $FM$ ; pročež

i  $FM$  je změrná a dle délky s  $CD$  nesouměřitelná. A ježto  $AG, GB$  jsou jen ve dvojmoci souměřitelné, tedy dle délky jest  $AG$  s  $GB$  nesouměřitelná; pročež také  $AG^2$  je s  $AG \times GB$  nesouměřitelné (X. xxi. výt.). Avšak s  $AG^2$  souměřitelné jest  $AG^2+GB^2$ ,  $AG \times GB$  pak s  $2AG \times GB$ ; tedy  $AG^2+GB^2$  je s  $2AG \times GB$  nesouměřitelné. Avšak  $AG^2+GB^2=CL$  a  $2AG \times GB=FL$ ; pročež  $CL$  je s  $FL$  nesouměřitelné. A  $CL:FL=CM:FM$ ; tedy  $CM$  je s  $FM$  dle délky nesouměřitelná. A obě jsou změrné; pročež  $CM, MF$  jsou změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné; tedy  $CF$  jest úsečnice (X. lxxiii.).

Pravím ovšem, že také třetí.

Neboť, ježto  $AG^2$  jest souměřitelné s  $GB^2$ , souměřitelné tedy též  $CH$  s  $KL$ ; a tak i  $CK$  s  $KM$ . A ježto  $AG^2, GB^2$  mají za střední úměrnou  $AG \times GB$  a  $AG^2=CH, GB^2=KL, AG \times GB=NL$ , tedy také  $CH, KL$  mají za střední úměrnou  $NL$ ; pročež  $CH:NL=NL:KL$ .

<sup>31)</sup> Neboť  $AG^2$  je s  $BG^2$  souměřitelné a  $AG^2:GB^2=CH:KL=CK:KM$ .

Avšak  $CH:NL=CK:NM$  a  $NL:KL=NM:KM$ ; tedy  $CK:NM=NM:KM$ ; pročež  $CK \times KM=NM^2$ , t. j.  $\frac{1}{4}FM^2$ . Ježto tedy  $CM, MF$  jsou dvě přímky nestejně a k  $CM$  jest přistaven útvar rovný čtvrtině čtverce  $MF^2$ , takže se mu nedostává doplňku čtvercového a dělí ji v části souměřitelné, tedy  $CM^2 > MF^2$  o čtverec přímky s  $CM$  souměřitelné. A žádná z přímek  $CM, MF$  není dle délky souměřitelná s danou změrnou  $CD$ ; pročež  $CF$  jest úsečnice třetí (vým. tř. č. 3).

Tedy čtverec střednicové úsečnice druhé přistavený ku přímce změrné šířkou činí úsečnici třetí; což právě bylo dokázati.

## C.


Čtverec přímky nezměrné menší přistavený ku přímce změrné šířkou činí úsečnici čtvrtou.

Nezměrnou menší budiž  $AB$ , změrnou pak  $CD$  a ke změrné  $CD$  přistavmež útvar  $CE$  stejný s  $AB^2$ , šířkou činí  $CF$ ; pravím, že  $CF$  jest úsečnice čtvrtá.

Nuže k  $AB$  příslušej  $BG$ ; tedy  $AG, GB$  jsou ve dvojmoci nesouměřitelné a činí součet  $AG^2+GB^2$  změrný a  $2AG \times GB$  střední (X. lxxvi.). I přistavme k  $CD$   $CH$  stejné s  $AG^2$ , šířkou činí  $CK$ , a  $KL$  stejné s  $GB^2$ , šířkou činí  $KM$ ; pročež celé  $CL=AG^2+GB^2$ . A  $AG^2+GB^2$  je změrné; změrné tedy také  $CL$ . A přistaveno jest ke změrné  $CD$ , šířkou činí  $CM$ ; pročež i  $CM$  je změrná a dle délky s  $CD$  souměřitelná (X. xx.). A ježto celé  $CL=AG^2+GB^2$ , z čehož  $CE=AB^2$ ; proto zbývající  $FL=2AG \times GB$ . Rozpolme tedy  $FM$  v bodě  $N$  a z  $N$  vedme s  $CD$  nebo s  $ML$  rovnoběžnou  $NO$ ; tedy  $FO=NL=AG \times GB$ . A ježto  $2AG \times GB$  je střední a stejné s  $FL$ , tedy také  $FL$  je střední. A přistaveno jest k  $FE$ , šířkou činí  $FM$ ; pročež  $FM$  je změrná a s  $CD$  dle délky nesouměřitelná (X. xxii.). A ježto  $AG^2+GB^2$  je změrné a  $2AG \times GB$  střední, tedy  $AG^2+GB^2$  je s  $2AG \times GB$  nesouměřitelné. Avšak  $AG^2+GB^2=CL$  a  $2AG \times GB=FL$ ; pročež  $CL$  je s  $FL$  nesouměřitelné. A  $CL:FL=CM:FM$ ; tedy  $CM$  je s  $MF$  nesouměřitelná dle délky. A obě jsou změrné; pročež  $CM, MF$  jsou změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné; tedy  $CF$  jest úsečnice (X. lxxiii.).

Pravím ovšem, že také čtvrtá.

Neboť, ježto  $AG, GB$  jsou ve dvojmoci nesouměřitelné, tedy též  $AG^2$  je s  $GB^2$  nesouměřitelné. A  $AG^2=CH, GB^2=KL$ ; pročež nesouměřitelné jest  $CH$  s  $KL$ . Avšak  $CH:KL=CK:KM$ ; tedy  $CK$  je s  $KM$  dle délky nesouměřitelná. A ježto  $AG^2, GB^2$  mají za střední úměrnou  $AG \times GB$  a  $AG^2=CH, GB^2=KL, AG \times GB=NL$ , tedy  $CH, KL$  mají za střední úměrnou  $NL$ ; pročež  $CH:NL=NL:KL$ . Avšak  $CH:NL=CK:NM$  a  $NL:KL=NM:KM$ ; tedy  $CK:NM=NM:KM$ . Pročež  $CK \times KM=NM^2=\frac{1}{4}FM^2$ . Ježto tedy  $CM, MF$  jsou dvě přímky nestejně a k  $CM$  jest přistaven útvar  $CK \times KM$  stejný se  $\frac{1}{4}MF^2$ , takže



se mu nedostává doplňku čtvercového, a dělí ji v části nesouměřitelné, proto  $CM^2 > MF^2$  o čtverec přímky s  $CM$  nesouměřitelné (X. XVIII.). Acelá  $CM$  je dle délky souměřitelná se změrnou  $CD$ ; pročež  $CF$  jest úsečnice čtvrtá (vým. tř. č. 4.).



Tedy čtverec přímky nezměrné menší atd.

## CI

Čtverec základnice útvaru, se změrným celku střednímu rovného, přistavený ku přímce změrné šířkou činí úsečnici pátou.

Základnicí útvaru se změrným celku střednímu rovného budiž  $AB$ , změrnou pak  $CD$  a k  $CD$  přistaven buď útvar  $CE$  stejný s  $AB^2$ , šířkou činící  $CF$ ; pravím, že  $CF$  jest úsečnice pátá.

Nuže k  $AB$  příslušej  $BG$ ; tedy přímky  $AG$ ,  $GB$  jsou ve dvojmoci nesouměřitelné a součet čtverců jejich je střední, dvojnásobný pak pravouhelník změrný (X. LXXVII.). A k  $CD$  přistavmež útvar  $CH$  stejný s  $AG^2$  a  $KL$  stejný s  $GB^2$ ; celé tedy  $CL = AG^2 + GB^2$ . A součet  $AG^2 + GB^2$  jest zároveň střední, pročež i  $CL$  je střední. I jest přistaveno ke změrné  $CD$ , šířkou činíc  $CM$ ; tedy  $CM$  je změrná a s  $CD$  nesouměřitelná (X. XXII.). A ježto celé  $CL = AG^2 + GB^2$ , z čehož  $CE = AB^2$ , proto zbývající  $FL = 2AG \times GB$ . Rozpolme tedy  $FM$  v  $N$  a vedme z  $N$  s  $CD$  nebo  $ML$  rovnoběžnou  $NO$ ; pročež  $FO = NL = AG \times GB$ . A ježto  $2AG \times GB$  je změrné a stejné s  $FL$ , tedy  $FL$  je změrné. A přistaveno jest ke změrné  $EF$ , šířkou činíc  $FM$ ; pročež  $FM$  je změrná a s  $CD$  dle délky souměřitelná (X. XX.). A ježto  $CL$  je střední,  $FL$  pak změrné; tedy  $CL$  je s  $FL$  nesouměřitelné. Avšak  $CL:FL = CM:FM$ ; pročež  $CM$  je s  $MF$  nesouměřitelná. A obě jsou změrné;  $CM$ ,  $MF$  jsou tedy změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné; pročež  $CF$  jest úsečnice. (X. LXXIII.).



Pravím ovšem, že také pátá.

Podobně zajisté dokážeme, že  $CK \times KM = NM^2 = \frac{1}{4} FM^2$ . A ježto  $AG^2$  je s  $GB^2$  nesouměřitelné a  $AG^2 = CH$ ,  $GB^2 = KL$ , tedy  $CH$  je s  $KL$  nesouměřitelné. A  $CH:KL = CK:KM$ ; pročež  $CK$  je s  $KM$  dle délky nesouměřitelná. Ježto tedy  $CM$ ,  $MF$  jsou dvě přímky nestejně a k  $CM$  přistaven jest útvar stejný se  $\frac{1}{4} FM^2$ , takže se mu nedostává doplňku čtvercového, a rozděluje ji v části nesouměřitelné, tedy  $CM^2 > MF^2$  o čtverec přímky s  $CM$  nesouměřitelné (X. XVIII.). A příslušná  $FM$  je s danou změrnou  $CD$  souměřitelná; tedy  $CF$  jest úsečnice pátá (vým. tř. č. 5.); což právě bylo dokázati.



## CII.

Čtverec základnice útvaru se středním celku střednímu rovného přistavený ke změrné šířkou činí úsečnici šestou.

Základnicí útvaru se středním celku střednímu rovného budiž  $AB$ , přímku pak změrnou  $CD$  a k  $CD$  přistaven buď útvar  $CE$  stejný s  $AB^2$ , takže šířkou činí  $CF$ ; pravím, že  $CF$  jest úsečnice šestá.

Nuže k  $AB$  příslušej  $BG$ ; tedy  $AG$ ,  $GB$  jsou ve dvojmoci nesouměřitelné a součet čtverců jejich je střední a  $2AG \times GB$  střední a  $AG^2 + GB^2$  s  $2AG \times GB$  nesouměřitelné (X. LXXVIII.). Nuže přistavme k  $CD$  útvar  $CH$  stejný s  $AG^2$ , šířkou činící  $CK$ , a  $KL$  stejný s  $GB^2$ ; celé tedy  $CL = AG^2 + GB^2$ ; střední tedy také  $CL$ .

A přistaveno jest ke změrné  $CD$ , šířkou činíc  $CM$ ; pročež  $CM$  je změrná a s  $CD$  dle délky nesouměřitelná (X. XXII.). Ježto tedy  $CL = AG^2 + GB^2$ , z čehož  $CE = AB^2$ , proto zbývající  $FL = 2AG \times GB$ . A  $2AG \times GB$  je střední; pročež i  $FL$  je střední. A přistaveno jest ke změrné  $FE$ , šířkou činíc  $FM$ ; tedy  $FM$  je změrná a s  $CD$  dle délky nesouměřitelná (X. XXII.). A ježto  $AG^2 + GB^2$  jest nesouměřitelné s  $2AG \times GB$  a  $AG^2 + GB^2 = CL$ ,  $2AG \times GB = FL$ ; proto  $CL$  je s  $FL$  nesouměřitelné. A  $CL:FL = CM:FM$ ; tedy  $CM$  je s  $MF$  dle délky nesouměřitelná. A obě jsou změrné. Pročež  $CM$ ,  $MF$  jsou změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné; tedy  $CF$  jest úsečnice (X. LXXIII.).



Pravím ovšem, že také šestá.

Nuže, ježto  $FL = 2AG \times GB$ , rozpolmež  $FM$  v  $N$  a z  $N$  vedme  $NO$  rovnoběžně s  $CD$ ; tedy  $FO = NL = AG \times GB$ . A ježto  $AG$ ,  $GB$  jsou ve dvojmoci nesouměřitelné, tedy  $AG^2$  je s  $GB^2$  nesouměřitelné. Avšak  $AG^2 = CH$  a  $GB^2 = KL$ ; pročež  $CH$  je s  $KL$  nesouměřitelné. A  $CH:KL = CK:KM$ ; tedy  $CK$  je s  $KM$  nesouměřitelná. A ježto  $AG^2$ ,  $GB^2$  mají za střední úměrnou  $AG \times GB$  a  $AG^2 = CH$ ,  $GB^2 = KL$ ,  $AG \times GB = NL$ ; tedy rovněž  $CH$ ,  $KL$  mají za střední úměrnou  $NL$ . Pročež  $CH:NL = NL:KL$ . A proto právě  $CM^2 > MF^2$  o čtverec přímky s  $CM$  nesouměřitelné (X. XVIII.). A žádná z nich není souměřitelná s danou změrnou  $CD$ ; tedy  $CD$  jest úsečnice šestá (vým. tř. č. 6.); což právě bylo dokázati.

## CIII.


Přímka s úsečnicí dle délky souměřitelná jest úsečnice a v pořadí táž.

Úsečnicí budiž  $AB$  a s  $AB$  buď dle délky souměřitelnou  $CD$ ; pravím, že i  $CD$  jest úsečnice a v pořadí táž jako  $AB$ .

Nuže, ježto  $AB$  jest úsečnice, příslušej k ní  $BE$ ;  $AE$ ,  $EB$  jsou tedy změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné (X. LXXIII.). A učinmež  $AB:CD = BF:DF$ ; a jako člen ke členu, tak součet k součtu; tedy též celá  $AE:CF = AB:CD$ . Avšak  $AB$  je s  $CD$  dle délky souměřitelná, pročež také  $AE$  jest souměřitelná s  $CF$  a  $BE$  s  $DF$ . I jsou  $AE$ ,  $EB$  změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné; tedy také  $CF$ ,  $FD$  jsou změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné; (pročež  $CD$  jest úsečnice.

Právím ovšem, že také v pořadí táž jako  $AB$ ).

Ježto tedy  $AE:CF=BE:DF$ , proto střídavě  $AE:EB=CF:FD$ .  
Buďte zajisté  $AE^2 > EB^2$  o čtverec přímky s  $AE$  souměřitelné nebo



nesouměřitelné. Jestliže tedy  $AE^2 > EB^2$  o čtverec přímky souměřitelné, také bude  $CF^2 > FD^2$  o čtverec přímky s  $CF$  souměřitelné (X. XIV.). A jestli  $AE$  souměřitelná dle délky s danou změrnou, také  $CF$ , pakli  $BE$ , také  $DF$ , pakli žádná z přímek  $AE$ ,  $EB$ , také ani  $CF$  ani  $FD$ . Pakli  $AE^2 > EB^2$

o čtverec přímky s  $AE$  nesouměřitelné, také bude  $CF^2 > FD^2$  o čtverec nesouměřitelné. A jestli  $AE$  souměřitelná dle délky s danou změrnou, také  $CF$ , pakli  $BE$ , také  $DF$ , pakli žádná z přímek  $AE$ ,  $EB$ , tož ani  $CF$  ani  $FD$ .

Tedy  $CD$  jest úsečnice a v pořadí táž jako  $AB$ ; což právě bylo dokázati.

## CIV.

Přímka se střednicovou úsečnicí souměřitelná je střednicová úsečnice a v pořadí táž.

Střednicovou úsečnicí budiž  $AB$  a s  $AB$  dle délky souměřitelnou buď  $CD$ ; pravím, že i  $CD$  je střednicová úsečnice a v pořadí táž jako  $AB$ .

Nuže, ježto  $AB$  je střednicová úsečnice, příslušej k ní  $EB$ ; tedy  $AE$ ,  $EB$  jsou střední, jen ve dvojmoci souměřitelné (X. LXXIV. n.). I učiňmež  $AB:CD=BE:FD$ ; souměřitelná tedy je též  $AE$  s  $CF$  a  $BE$  s  $DF$ . Avšak  $AE$ ,  $EB$  jsou střední, jen ve dvojmoci souměřitelné; pročež i  $CF$ ,  $FD$  jsou střední, jen ve dvojmoci souměřitelné; tedy  $CD$  je střednicová úsečnice.

Právím ovšem, že také v pořadí je táž jako  $AB$ .  
Ježto  $AE:EB=CF:FD$  (avšak  $AE:EB=AE^2:AE \times EB$  a  $CF:FD=CF^2:CF \times FD$ ), tedy též  $AE^2:AE \times EB=CF^2:CF \times FD$  (a střídavě  $AE^2:CF^2=AE \times EB:CF \times FD$ ).  $AE^2$  však jest souměřitelné s  $CF^2$ ; proto též  $AE \times EB$  jest souměřitelné s  $CF \times FD$ . Jestli tedy  $AE \times EB$  změrné, změrné bude též  $CF \times FD$ , pakli  $AE \times EB$  střední, střední též  $CF \times FD$ .

Tedy  $CD$  je střednicová úsečnice a v pořadí táž jako  $AB$ ; což právě bylo dokázati.

## CV.

Přímka s nezměrnou menší souměřitelná jest nezměrná menší.

Nuže buď nezměrnou menší  $AB$  a s  $AB$  souměřitelnou  $CD$ ; pravím, že i  $CD$  jest nezměrná menší.

Nuže upravme totéž; a ježto  $AE$ ,  $EB$  jsou ve dvojmoci nesouměřitelné, tedy ve dvojmoci nesouměřitelné jsou i  $CF$ ,  $FD$ . Ježto tedy  $AE:EB=CF:FD$ , proto též  $AE^2:EB^2=CF^2:FD^2$ . Tedy součtetně  $(AE^2+EB^2):EB^2=(CF^2+FD^2):FD^2$  (i střídavě);  $BE^2$  však je s  $DF^2$  souměřitelné; pročež i  $AE^2+EB^2$  jest souměřitelné s  $CF^2+FD^2$ . Avšak  $AE^2+EB^2$  je změrné, změrné je tedy též  $CF^2+FD^2$ . Dále, ježto  $AE^2:AE \times EB=CF^2:CF \times FD$  a  $AE^2$  je s  $CF^2$  souměřitelné, tedy též  $AE \times EB$  jest souměřitelné s  $CF \times FD$ .  $AE \times EB$  však je střední (X. LXXVI.), střední tedy také  $CF \times FD$ ; proto  $CF$ ,  $FD$  jsou ve dvojmoci nesouměřitelné a součet čtverců jejich je změrný, pravoúhelník pak střední.

Tedy  $CD$  jest nezměrná menší (X. LXXVI.); což právě bylo dokázati.

## CVI.

Přímka se základnicí útvaru, se změrným celku střednímu rovného, souměřitelná jest základnice útvaru se změrným celku střednímu rovného.

Základnicí útvaru se změrným celku střednímu rovného budiž  $AB$  a s  $AB$  souměřitelnou  $CD$ ; pravím, že i  $CD$  jest základnice útvaru se změrným celku střednímu rovného.

Nuže k  $AB$  příslušej  $BE$ ; tedy  $AE$ ,  $EB$  jsou ve dvojmoci nesouměřitelné a součet čtverců jejich  $AE^2+EB^2$  je střední, pravoúhelník pak změrný (X. LXXVII.). A upravme totéž. Podobně zajisté jako dříve (X. cv.) dokážeme, že  $CF:FD=AE:EB$  a že souměřitelné jest  $AE^2+EB^2$  s  $CF^2+FD^2$  a  $AE \times EB$  s  $CF \times FD$ ; a tak i  $CF$ ,  $FD$  jsou ve dvojmoci nesouměřitelné a  $CF^2+FD^2$  je střední,  $CF \times FD$  však změrné.




Tedy  $CD$  jest základnice útvaru se změrným celku střednímu rovného; což právě bylo dokázati.

## CVII.

Přímka se základnicí útvaru, se středním celku střednímu rovného, souměřitelná i sama jest základnice útvaru se středním celku střednímu rovného.

Základnicí útvaru se středním celku střednímu rovného budiž  $AB$  a s  $AB$  budiž souměřitelnou  $CD$ ; pravím, že i  $CD$  jest základnice útvaru se středním celku střednímu rovného.

Nuže k  $AB$  příslušej  $BE$  a budiž upraveno totéž; tedy  $AE$ ,  $EB$  jsou ve dvojmoci nesouměřitelné a součet čtverců jejich je střední i pravoúhelník střední a také součet čtverců jejich s tím pravoúhelníkem nesouměři-






telný (X. LXXVIII.). A jak bylo dokázáno (X. CIV.), jsou  $AE$ ,  $EB$  souměřitelné s  $CF$ ,  $FD$  a  $AE^2 + EB^2$  s  $CF^2 + FD^2$  a  $AE \times EB$  s  $CF \times FD$ ; pročež i  $CF$ ,  $FD$  jsou ve dvojmoci nesouměřitelné a součet čtverců jejich střední i pravouhelník střední a také součet čtverců jejich s tím pravouhelníkem nesouměřitelný.

Tedy  $CD$  jest základnice útvaru se středním celku střednímu rovného; což právě bylo dokázati.

## CVIII.

Oddělíme-li od útvaru změřného střední, přímka ve dvojmoci útvaru zbývajícimu rovná jest jedna ze dvou nezměřných, buď úsečnice nezměřná menší.

Nuže oddělmež od útvaru změřného  $BC$  střední  $BD$ ; pravím, že přímka ve dvojmoci rovná útvaru zbývajícimu  $EC$  jest jedna ze dvou nezměřných, buď úsečnice buď nezměřná menší.



Nuže mějme přímku změřnou  $FG$  a k  $FG$  přistavme pravouhlý rovnoběžník  $GH$  stejný s  $BC$  a oddělme  $GK$  stejné s  $DB$ ; pročež zbývající  $EC = LH$ . Ježto tedy  $BC$  je změřné,  $BD$  však střední a  $BC = GH$ ,  $BD = GK$ , tedy  $GII$  je změřné a  $GK$  střední. A přistavena jsou ke změřné  $FG$ ; pročež  $FH$  je změřná a s  $FG$  dle délky souměřitelná (X. xx.),  $FK$  pak změřná a s  $FG$  dle délky nesouměřitelná (X. xxII.); tedy  $FH$  je s  $FK$  dle délky nesouměřitelná (X. XIII.). Proto  $FH$ ,  $FK$  jsou změřné, jen ve dvojmoci

souměřitelné; tedy  $KH$  jest úsečnice a k ní přísluší  $KF$  (X. LXXIII.). Buďto zajisté  $HF^2 > FK^2$  o čtverec přímky souměřitelné nebo nikoliv.

Budiž větší dříve o čtverec souměřitelné. I jest celá  $HF$  s danou změřnou  $FG$  dle délky souměřitelná; tedy  $KH$  jest úsečnice první (vým. tř. č. 1.). Přímka však ve dvojmoci stejná s útvarem, jež objímají přímka změřná a úsečnice první, jest úsečnice (X. xci.). Tedy přímka ve dvojmoci stejná s  $LH$ , t. j. s  $EC$ , jest úsečnice.

Pakli  $HF^2 > FK^2$  o čtverec přímky s  $HF$  nesouměřitelné a celá  $FH$  je s danou změřnou  $FG$  dle délky souměřitelná,  $KH$  jest úsečnice čtvrtá (vým. tř. č. 4.). Přímka pak ve dvojmoci stejná s útvarem, jež objímají přímka změřná a úsečnice čtvrtá, jest nezměřná menší (X. xciv.); což právě bylo dokázati.

## CIX.


Oddělíme-li od útvaru středního změřný, jiné vznikají dvě přímky nezměřné, buďto střednicová úsečnice první nebo základnice útvaru se změřným celku střednímu rovného.

Nuže oddělmež od útvaru středního  $BC$  změřný  $BD$ ; pravím, že přímka ve dvojmoci stejná se zbytkem  $EC$  jest jedna ze dvou nezměřných, buďto střednicová úsečnice první nebo základnice útvaru se změřným celku střednímu rovného.

Nuže mějme přímku změřnou  $FG$  a přistavmež útvary podobně. Stejně zajisté jest  $FH$  změřná a dle délky s  $FG$  nesouměřitelná a  $KF$  změřná a dle délky s  $FG$  souměřitelná; tedy  $FH$ ,  $FK$  jsou změřné, jen ve dvojmoci souměřitelné (X. XIII.); pročež  $KH$  jest úsečnice (X. LXXIII.) a k ní přísluší  $FK$ . Buďto zajisté  $HF^2 > FK^2$  o čtverec přímky s  $HF$  souměřitelné nebo nesouměřitelné.

Jestli tedy  $HF^2 > FK^2$  o čtverec souměřitelné a příslušná  $FK$  je dle délky s danou změřnou  $FG$  souměřitelná,  $KH$  jest úsečnice druhá (vým. tř. č. 2). Avšak  $FG$  změřná; tedy přímka ve dvojmoci stejná s  $LII$ , t. j. s  $EC$ , je střednicová úsečnice první (X. xcII.).

Pakli  $HF^2 > FK^2$  o čtverec nesouměřitelné a příslušná  $FK$  je dle délky s danou změřnou  $FG$  souměřitelná,  $KH$  jest úsečnice pátá (vým. tř. č. 5.); pročež přímka ve dvojmoci stejná s  $EC$  jest základnice útvaru se změřným celku střednímu rovného (X. xcV.); což právě bylo dokázati.




## CX.

Oddělíme-li od útvaru středního střední, s celkem nesouměřitelný, vznikají dvě ostatní přímky nezměřné, buďto střednicová úsečnice druhá nebo základnice útvaru se středním celku střednímu rovného.

Nuže oddělmež jako v dosavadních vyobrazeních od útvaru středního  $BC$  střední  $BD$ , s celkem nesouměřitelný; pravím, že přímka ve dvojmoci s  $EC$  stejná jest jedna ze dvou nezměřných, buďto střednicová úsečnice druhá nebo základnice útvaru se středním celku střednímu rovného.

Neboť ježto  $BC$ ,  $BD$  jsou střední (a  $BC$  s  $BD$  jest nesouměřitelné), stejně budou  $FH$ ,  $FK$  změřné a s  $FG$  dle délky nesouměřitelné (X. xxII.). A ježto  $BC$  je s  $BD$ , t. j.  $GH$  s  $GK$ , nesouměřitelné, také  $FH$  je s  $FK$  nesouměřitelná; tedy  $FH$ ,  $FK$  jsou změřné, jen ve dvojmoci souměřitelné; pročež  $KH$  jest úsečnice (X. LXIII.) (a k ní přísluší  $FK$ ). Buďto zajisté  $FH^2 > FK^2$  o čtverec přímky s  $FH$  souměřitelné nebo nesouměřitelné.



A jestli ovšem  $FH^2 > FK^2$  o čtverec přímky s  $FH$  souměřitelné a žádná z přímek  $FH$ ,  $FK$  není dle délky souměřitelná s danou změrnou  $FG$ ,  $KH$  jest úsečnice třetí (vým. tř. č. 3.).  $KL$  však je změrná, a pravouhelník, jež objímají přímka změrná a úsečnice třetí, jest nezměrný a přímka ve dvojmoci jemu rovná nezměrná jest, i slove střednicová úsečnice druhá (X. xciii.); a tak i přímka ve dvojmoci s  $LH$ , t. j. s  $EC$ , stejná je střednicová úsečnice druhá.

Pakli  $FH^2 > FK^2$  o čtverec nesouměřitelné a žádná z přímek  $HF$ ,  $FK$  není s  $FG$  dle délky souměřitelná,  $KH$  jest úsečnice šestá (vým. tř. č. 6.). Přímka pak ve dvojmoci stejná s útvarem, jež objímají přímka změrná a úsečnice šestá, jest základnice útvaru se středním celku střednímu rovného (X. xcvi.). Tedy přímka ve dvojmoci stejná s  $LH$ , t. j. s  $EC$ , jest základnice útvaru se středním celku střednímu rovného; což právě bylo dokázati.

## CXI.

Úsečnice není stejná s dvoučástnicí.


Úsečnicí budiž  $AB$ ; pravím, že  $AB$  není stejná s dvoučástnicí.

Nuže, možno-li, budiž; i dána buď změrná  $DC$  a k  $CD$  přistavme pravouhelník  $CE$  stejný s  $AB^2$ , šířkou činicí  $DE$ . Ježto tedy  $AB$  jest úsečnice,  $DE$  jest úsečnice první (X. xcvi.). K ní příslušej  $EF$ ; tedy  $DF$ ,  $FE$  jsou změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné, a  $DF^2 > FE^2$  o čtverec přímky s  $DF$  souměřitelné a  $DF$  je dle délky souměřitelná s danou změrnou  $DC$  (vým. tř. č. 1.). Dále, ježto  $AB$  je dvoučástnice,  $DE$  je tedy dvoučástnice první (X. lx.). Rozdělena buď ve své části v  $G$  a větší částí buď  $DG$ ; proto  $DG$ ,  $GE$  jsou změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné, a  $DG^2 > GE^2$  o čtverec přímky s  $DG$  souměřitelné a větší část  $DG$  je dle délky souměřitelná s danou změrnou  $DC$  (vým. dr. č. 1.). Tedy také  $DF$  je dle délky souměřitelná s  $DG$ ; pročež i zbývající  $GF$  jest souměřitelná dle délky s  $DF$ . (Ježto tedy  $DF$  jest souměřitelná s  $GF$  a  $DF$  je změrná,

proto jest i  $GF$  změrná. Ježto tedy  $DF$  je dle délky souměřitelná s  $GF$ ) a  $DF$  je dle délky nesouměřitelná s  $EF$ ; nesouměřitelná tedy dle délky s  $EF$  jest i  $FG$ . Pročež  $GF$ ,  $FE$  jsou změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné; tedy  $EG$  jest úsečnice. Avšak i změrná; což právě jest nemožné.

Tedy úsečnice není stejná s dvoučástnicí; což bylo dokázati.

Úsečnice a přímky nezměrné od ní odvozené nejsou ani se střednicí ani vespolek stejné. Neboť čtverec střednice, přistaven jsa ke změrné, šířkou činí přímku změrnou a s tou, k níž jest přistaven, dle délky nesouměřitelnou (X. xxii.); čtverec pak úsečnice, přistaven jsa ke změrné, šířkou činí úsečnici první (X. xvii.); a čtverec střed-



nicové úsečnice, přistaven jsa ke změrné, šířkou činí úsečnici druhou (X. xcvi.); a čtverec střednicové úsečnice druhé, přistaven jsa ke změrné, šířkou činí úsečnici třetí (X. xcix.); čtverec pak nezměrné menší, přistaven jsa ke změrné, šířkou činí úsečnici čtvrtou (X. c.); čtverec pak základnice útvaru se změrným celku střednímu rovného, přistaven jsa ke změrné, šířkou činí úsečnici pátou (X. ci.); a čtverec základnice útvaru se středním celku střednímu rovného, přistaven jsa ke změrné, šířkou činí úsečnici šestou (X. cii.). Ježto tedy řečené šířky jak od první tak i navzájem se liší, od první, jelikož to přímka změrná, navzájem pak, ježto nejsou v pořadí tytéž, patrné, že i samy přímky nezměrné navzájem se liší. A ježto bylo dokázáno, že úsečnice není stejná s dvoučástnicí, a přímky od úsečnice odvozené, přistaveny jsou ke změrné, šířkami činí úsečnice, každá dle svého pořadí, přímky pak od dvoučástnice odvozené činí dvoučástnice i samy dle svého pořadí; jedny tedy jsou odvozeninami úsečnice a druhé odvozeninami dvoučástnice, takže všech nezměrných přímek je v pořadí třináct:

1. střednice,
2. dvoučástnice,
3. dvoustřednice první,
4. dvoustřednice druhá,
5. nezměrná větší,
6. základnice útvaru změrného a středního,
7. základnice dvou útvarů středních,
8. úsečnice,
9. střednicová úsečnice první,
10. střednicová úsečnice druhá,
11. nezměrná menší,
12. základnice útvaru se změrným celku střednímu rovného,
13. základnice útvaru se středním celku střednímu rovného.\*)

## Kniha jedenáctá.

### Výměry.

1. Těleso jest, co má délku a šířku a výšku.
2. Hranicí pak tělesa plocha.
3. Přímka jest na rovině kolmo, když se všemi přímkami, s ní se stýkajícími a jsoucími v rovině, tvoří úhly pravé.
4. Rovina jest na rovině kolmo, když přímky v jedné z rovin, vedené kolmo na společnou průsečnici rovin, jsou na druhé rovině kolmo.
5. Sklonem přímky k rovině jest, když se od vyvýšeného konce přímky spustí na rovinu kolmice a od paty její k patě přímky na rovině se vede spojnice, úhel sevřený spojnici a přímkou vztýčenou.

\*) Dále jsou ve vyd. Heibg. ještě poučky CXII.—CXV., nepochybně dodavek cizí.

6. Sklonem roviny k rovině jest úhel sevřený kolmicemi v obou rovinách vedenými k témuž bodu na společné průsečnici.
7. Pravíme, že jest rovina k rovině stejně skloněna jako jiná k jiné, když jsou řečené úhly sklonů navzájem sobě rovny.
8. Rovnoběžné jsou roviny nesbíhavé.
9. Podobny jsou útvary tělesové omezené podobnými rovinami, na počet stejnými.
10. Stejně pak i podobné (shodné) jsou útvary tělesové omezené rovinami podobnými, stejnými počtem i velikostí.
11. Tělesový úhel je sklon více než dvou čar navzájem se stýkajících, a to v netěže ploše, ke všem těm čarám.\*) Jinak: tělesový úhel jest úhel sevřený více než dvěma úhly rovinnými, v netěže rovině jsoucimi, v jednom bodě vrcholícími.
12. Jehlan jest útvar tělesový omezený rovinami od jedné roviny k jednomu bodu se sbíhajícími.
13. Hranol jest útvar tělesový omezený rovinami, z nichž dvě protější jsou stejné i podobné a rovnoběžné, ostatní pak rovnoběžníky.
14. Koule jest útvar omezený tími, že se kolem pevného průměru polokruhu polokruh otočí, až se opět vrátí na totéž místo, odkud se počal otáčeti.
15. Osou koule jest ona přímka pevná, kolem níž se polokruh otáčí (14.).
16. Střed koule je týž jako polokruhu (14.).
17. Průměrem pak koule jest nějaká přímka vedená středem a na obou stranách zakončená povrchem koule.
18. Kužel jest útvar omezený tím, že se trojúhelník pravoúhlý otočí kolem pevné jedné ze stran pravý úhel svírajících, až se opět vrátí na totéž místo, odkud se počal otáčeti. A když pevná přímka se rovná druhé při úhlu pravém se otáčející, kužel bude pravoúhlým, pakli je menší, tupoúhlým, pakli větší, ostroúhlým.\*\*)
19. Osou kužele jest pevná přímka, kolem níž se otáčí ten trojúhelník (18.).
20. Základnou pak kruh rýsovaný otáčenou přímkou (18.).
21. Válec jest útvar omezený tím, že se rovnoběžník pravoúhlý otočí kolem pevné jedné ze stran rovnoběžníku pravý úhel svírajících, až se opět vrátí na totéž místo, odkud se počal otáčeti.
22. Osou válce jest pevná přímka, kolem níž se otáčí ten rovnoběžník (21.).
23. Základnami pak jsou kruhy rýsované pohybem dvou přímek protějších (21.).
24. Podobny jsou kůžele a válce, které mají úměrné osy a průměry základnen.
25. Krychle jest útvar tělesový omezený šesti stejnými čtverci.
26. Osmistěn jest útvar tělesový omezený osmi trojúhelníky stejnými a stejnostrannými.

\*) Snad od některého Eukleidova předchůdce.

\*\*\*) Hledí se k úhlu v temeni.

27. Dvacetistěn jest útvar tělesový omezený dvaceti trojúhelníky stejnými a stejnostrannými.
28. Dvanáctistěn jest útvar tělesový omezený dvanácti pětlúhelníky stejnými a stejnostrannými i stejnoúhlými.


## I.

Není možno, by nějaká část přímky byla na rovině položená, nějaká pak část na zvýšené.

Nuže buď, možno-li, nějaká část  $AB$  přímky  $ABC$  na rovině položená a nějaká část  $BC$  na zvýšené.

Bude tedy nějaká přímka s přímkou  $AB$  nepřetržitě v přímce na rovině položená. Buď to  $BD$ ; dvou tedy přímek  $ABC$ ,  $ABD$  společnou úsečkou jest  $AB$ ; což právě nemožno, jelikož průměry, když ze středu  $B$  a rozpětím  $AB$  narýsujeme kruh<sup>1)</sup>, zaberou nestejně oblouky kruhu.

Tedy není možno, by nějaká část přímky — —




## II.

Když se dvě přímky navzájem protínají, jsou v jediné rovině, a každý trojúhelník jest v jediné rovině.

Nuže protínají se navzájem přímky  $AB$ ,  $CD$  v bodě  $E$ ; pravím, že  $AB$ ,  $CD$  jsou v jediné rovině a každý trojúhelník jest v jediné rovině.


Nuže vytkneme na  $EC$ ,  $EB$  nahodilé body  $F$ ,  $G$  a vedme spojnice  $CB$ ,  $FG$  a protněme je přímkami  $FH$ ,  $GK$ ; pravím nejprve, že  $\triangle ECB$  jest v jediné rovině. Neboť jestli část trojúhelníku  $ECB$ , buď  $FHC$  nebo  $GBK$ , v rovině položená, ostatek pak v jiné, také nějaká část přímky  $EC$  nebo  $EB$  bude v rovině položená, druhá pak v jiné; pakli část  $FCBG$  trojúhelníku  $ECB$  jest v rovině položená, ostatek pak v jiné, také nějaká část přímky  $EC$  i  $EB$  bude v rovině položená, druhá pak v jiné; což dokázáno nesmyslným (XI. 1.). Tedy  $\triangle ECB$  jest v jediné rovině. Ve které však je  $\triangle ECB$ , v té také  $EC$  i  $EB$ ; ve které však  $EC$  i  $EB$ , v té též  $AB$ ,  $CD$ . Pročež přímky  $AB$ ,  $CD$  jsou v jediné rovině i každý trojúhelník jest v jediné rovině; což právě bylo dokázati.



<sup>1)</sup> Totiž v rovině  $ACD$ , oblouk  $AC$  je menší, obl.  $ACD$  větší.

## III.

Když se dvě roviny navzájem protínají, společný průsek jejich jest přímka.



Nuže protínají se navzájem roviny  $AB, BC$  a společným průsekem jejich budiž čára  $DB$ ; pravím, že čára  $DB$  je přímka.

Nuže, není-li, spojme  $D$  a  $B$  v rovině  $AB$  přímkou  $DEB$  a v rovině  $BC$  přímkou  $DFB$ . Budou mítí zajisté obě přímkou  $DEB$  a  $DFB$  společné konce a budou patrně objímati plochu; což právě nesmyslné. Tedy  $DEB, DFB$  nejsou přímky. Podobně zajisté dokážeme, že ani žádná jiná z  $D$  do  $B$  vedená čára


nebude přímka kromě  $DB$ , společného to průseku rovin  $AB, BC$ .

Když se tedy dvě roviny navzájem protínají, společný průsek jejich je přímka; což právě bylo dokázati.

## IV.

Když se postaví přímka na přímky dvě navzájem se protínající ve společném průseku kolmo, i na jejich<sup>2)</sup> rovině bude kolmo.

Nuže budiž z  $E$  vztýčena nějaká přímka  $EF$  na dvou přímkách  $AB, CD$  navzájem v bodě  $E$  se protínajících kolmo; pravím, že  $EF$  jest kolmo i na rovině přímek  $AB, CD$ .



Nuže odřízněmež úsečky navzájem stejné  $AF, EB, CE, ED$  a vedme bodem  $E$  jakkoli přímkou  $GEH$  a spojnice  $AD, CB$  a ještě z nahodilého bodu  $F$ <sup>3)</sup> vedme spojnice  $FA, FG, FD, FC, FH, FB$ . A ježto dvě strany  $AE, ED$  jsou stejné s  $CE, EB$  a svírají stejné úhly (vrcholové), tedy základna  $AD = CB$  a bude  $\triangle AED = CEB$ ; a tak i  $\angle DAE = EBC$ . Také však  $\angle AEG = BEH$ . Oba zajisté trojúhelníky  $AGE, BEH$  mají po dvou úhlech střídavě stejných a po jedné straně stejné při stejných úhlech, t.  $AE =$

$EB$ ; pročež i ostatní strany budou mítí s ostatními stranami stejné. Tedy  $GE = EH, AG = BH$ . A ježto  $AE = EB$ , společnou pak kolmice  $FE$ , tedy základna  $FA = FB$ . Z téže příčiny ovšem i  $FC = FD$ . A ježto  $AD = CB$  a též  $FA = FB$ , jest zajisté po dvou stranách,  $FA, AD$  a  $FB, BC$ , střídavě stejných; také dokázáno, že základna  $FD = FC$ ; pročež i  $\angle FAD = FBC$ . A ježto dále bylo dokázáno, že  $AG = BH$ , avšak zajisté i  $FA = FB$ ; obě tedy  $FA, AG$  jsou s  $FB, BH$  střídavě

<sup>2)</sup> Eukl. τῆ δὲ ἀπὸ τῶν ἐπιπέδων, na rovině jimi proložené.

<sup>3)</sup> Ovšem na kolmici  $EF$ , třebaš i prodloužené

stejně. Také dokázáno, že  $\angle FAG = FBH$ ; tedy základna  $FG = FH$ . A ježto dále bylo dokázáno, že  $GE = EH$ , společnou pak  $EF$ , obě zajisté  $GE, EF$  jsou střídavě stejné s  $HE, EF$ ; i základna  $FG = FH$ ; pročež  $\angle GEF = HEF$ . Tedy  $\angle GEF = HEF = R$ . Proto  $FE$  na  $EH$ , nahodile bodem  $E$  vedené, jest kolmo. Podobně zajisté dokážeme, že  $FE$  i se všemi přímkami s ní se stýkajícími a jsoucími v položené rovině bude činiti úhly pravé. Přímka pak jest na rovině kolmo, když se všemi přímkami s ní se stýkajícími a jsoucími v téže rovině činí úhly pravé; tedy  $FE$  stojí na položené rovině kolmo. Položená pak rovina je ta, jež proložena přímkami  $AB, CD$ . Tedy  $FE$  jest na rovině přímek  $AB, CD$  kolmo.

Když se tedy postaví přímka na přímky dvě navzájem se protínající ve společném průseku kolmo, i na jejich rovině bude kolmo; což právě bylo dokázati.


## V.

Když se přímka na třech přímkách navzájem se stýkajících ve společném průseku postaví kolmo, ty tři přímky jsou v jediné rovině.

Nuže postavme nějakou přímkou  $AB$  na třech přímkách  $BC, BD, BE$  ve styčném bodě  $B$  kolmo; pravím, že  $BC, BD, BE$  jsou v jediné rovině.

Nuže nebudte, nýbrž, možno-li, buďte  $BD, BE$  v rovině položené,  $BC$  však ve zvýšené, a proložme přímkami  $AB, BC$  rovinu; bude zajisté společným průsekem v položené rovině přímka (XI. III.). Budiž jí  $BF$ . Pročež jsou v jediné rovině, proložené přímkami  $AB, BC$ , tři přímky  $AB, BC, BF$ . A ježto  $AB$  jest na  $BD$  i  $BE$  kolmo, tedy jest  $AB$  kolmo také na rovině přímek  $BD, BE$ . Rovina pak přímek  $BD, BE$  jest položená; pročež  $AB$  jest kolmo na rovině položené. A tak i se všemi přímkami s ní se stýkajícími a jsoucími v té položené rovině činiti bude  $AB$  pravé úhly. Stýká pak se s ní  $BF$ , jsouc v rovině položené; tedy  $ABF = R$ . Dáno však, že též  $ABC = R$ ; pročež  $\angle ABF = ABC$ . A jsou v jediné rovině<sup>4)</sup>; což právě jest nemožné. Tedy přímka  $BC$  není v rovině zvýšené; pročež tři přímky  $BC, BD, BE$  jsou v jediné rovině.

Když se tedy přímka — — <sup>5)</sup>.



## VI.


Když jsou dvě přímky na téže rovině kolmo, ty přímky budou rovnoběžné.

<sup>4)</sup> Totiž  $ABFC$ .

<sup>5)</sup> Slova ze záhlaví tuto se opakuji s dodatkem, »což právě bylo dokázati«.

Nuže buďte dvě přímky  $AB$ ,  $CD$  na položené rovině kolmo; pravím, že  $AB \parallel CD$ .

Nuže sbíhejte se s položenou rovinou v bodech  $B$ ,  $D$ , i vedme spojnicí  $BD$  a zřídme na položené rovině  $DE \perp BD$  a budiž  $DE = AB$  a vedme spojnicí  $BE$ ,  $AE$ ,  $AD$ .



A ježto  $AB$  jest na položené rovině kolmo, také se všemi přímkami s ní se stýkajícími a jsoucími v položené rovině bude činiti úhly pravé. Stýkají pak se s  $AB$  i  $BD$  i  $BE$ , jsouce v položené rovině; pročež  $\sphericalangle ABD = ABE = R$ . Z téže příčiny ovšem i  $\sphericalangle CDB = CDE = R$ . A ježto  $AB = DE$  a společnou  $BD$ , obě zajisté strany  $AB$ ,  $BD$  jsou střídavě stejné s  $ED$ ,  $DB$ , a svírají úhly pravé; tedy základna  $AD = BE$ . A ježto  $AB = DE$ , avšak též  $AD = BE$ , obě zajisté  $AB$ ,  $BE$  jsou střídavě stejné s  $ED$ ,  $DA$ ; a


základna jejich  $AE$  je společná; tedy  $\sphericalangle ABE = EDA$ . Avšak  $ABE = R$ , pročež i  $\sphericalangle EDA = R$ ; tedy jest  $ED \perp DA$ . Je však kolmo též na  $BD$  i  $DC$ ; tedy  $ED$  stojí kolmo na třech přímkách  $BD$ ,  $DA$ ,  $DC$  v bodě styčném. Pročež tři přímky  $BD$ ,  $DA$ ,  $DC$  jsou v jediné rovině (XI. v.). Ve které však jsou  $DB$ ,  $DA$ , v té také  $AB$ , neboť každý trojúhelník jest v jediné rovině; jsou tedy přímky  $AB$ ,  $BD$ ,  $DC$  v jediné rovině. A  $\sphericalangle ABD$ ,  $BDC$  jsou pravé; pročež  $AB \parallel CD$  (I. xxviii.).

Když jsou tedy dvě přímky —

### VII.

Když jsou dvě přímky rovnoběžné a vytkne se na obou po nahodilém bodě, spojnice těch bodů je v téže rovině jako ty rovnoběžky.

Dvěma přímkami rovnoběžnými buďtež  $AB$ ,  $CD$ , a vytkněme na obou nahodilé body  $E$ ,  $F$ ; pravím, že spojnice bodův  $E$ ,  $F$  je v téže rovině jako ty rovnoběžky.



Nuže nebuď, nýbrž, možno-li, budiž ve zvýšené jako  $EGF$ , a vedme přímkou  $EGF$  rovinu; průsekem zajisté činiti bude v rovině položené přímkou (XI. iii.). Buď jí  $EF$ ; a tak dvě přímky  $EGF$ ,  $EF$  budou objímati plochu; což právě jest nemožné.

Tedy spojnice bodův  $E$ ,  $F$  není v rovině zvýšené; pročež přímkou body  $E$ ,  $F$  spojující jest v rovině rovnoběžek  $AB$ ,  $CD$ .


Když jsou tedy dvě přímky rovnoběžné —

### VIII.

Když jsou dvě přímky rovnoběžné a jedna z nich jest na nějaké rovině kolmo, i zbývající bude na téže rovině kolmo.

Dvěma přímkami rovnoběžnými buďtež  $AB$ ,  $CD$ , jedna pak z nich,  $AB$ , buď na položené rovině kolmo; pravím, že také zbývající  $CD$  bude na téže rovině kolmo.

Nuže stýkejte se  $AB$ ,  $CD$  s rovinou položenou v bodech  $B$ ,  $D$ , a vedme spojnicí  $BD$ ; tedy  $AB$ ,  $CD$ ,  $BD$  jsou v jediné rovině (XI. vii.). Vedme k  $BD$  v položené rovině kolmici  $DE$  a buď  $DE = AB$  a vedme spojnicí  $BE$ ,  $AE$ ,  $AD$ . A ježto  $AB$  jest na rovině položené kolmo, tož i na všech přímkách s ní se stýkajících a jsoucích v položené rovině jest  $AB$  kolmo; pročež  $\sphericalangle ABD = ABE = R$ . A ježto přímkou  $BD$  prochází rovnoběžkami  $AB$ ,  $CD$ , tedy  $\sphericalangle ABD + CDB = 2R$ .  $ABD$  však jest úhel pravý; pročež i  $\sphericalangle CDB$  jest pravý; tedy  $CD \perp BD$ . A ježto  $AB = DE$ , společnou pak  $BD$ , obě zajisté  $AB$ ,  $BD$  jsou s  $ED$ ,  $DB$  střídavě stejné a  $\sphericalangle ABD = EDB$ , neboť jsou oba pravé; tedy základna  $AD = BE$ . A ježto  $AB = DE$  a  $BE = AD$ , obě zajisté  $AB$ ,  $BE$  jsou střídavě stejné s  $ED$ ,  $AD$  a základnou jejich společnou  $AE$ ; pročež



$\sphericalangle ABE = EDA$ .  $ABE$  však jest pravý, pravý tedy též  $EDA$ ; tedy  $ED \perp AD$ . Avšak jest kolmo též na  $DB$ ; pročež  $ED$  jest kolmo i na rovině přímkou  $BD$ ,  $DA$ . Také tedy se všemi přímkami s ní se stýkajícími a jsoucími v rovině  $BDA$  bude činiti  $ED$  úhly pravé. Avšak v rovině  $BDA$  jest  $DC$ , jelikož právě v rovině  $BDA$  jsou  $AB$ ,  $BD$ , a ve které  $AB$ ,  $BD$ , v té jest i  $DC$ . Tedy  $ED \perp DC$ ; a tak i  $CD \perp DE$ . Avšak i  $CD \perp BD$ . Pročež  $CD$  stojí na dvou přímkách  $DE$ ,  $DB$ , navzájem se protínajících, v průseku  $D$  kolmo; a tak  $CD$  jest kolmo též na rovině  $DE$ ,  $DB$ . Rovina pak přímkou  $DE$ ,  $DB$  jest položena; pročež  $CD$  jest na rovině položené kolmo.


Když jsou tedy dvě přímky rovnoběžné —

### IX.

Přímky s touž přímkou rovnoběžné, i když s ní nejsou v téže rovině, také navzájem jsou rovnoběžné.

Nuže buďtež  $AB$ ,  $CD$  rovnoběžné s  $EF$ , nejsouce s ní v téže rovině; pravím, že  $AB \parallel CD$ .

Nuže vytkněme na  $EF$  nahodilý bod  $G$  a v něm na rovině přímkou  $EF$ ,  $AB$  vedme k  $EF$  kolmici  $GH$ , v rovině pak přímkou  $FE$ ,  $CD$  vedme opět k  $EF$  kolmici  $GK$ . A ježto  $EF$  jest na  $GH$  i  $GK$  kolmo, tedy  $EF$  jest kolmo též na rovině přímkou  $GH$ ,  $GK$  (XI. iv.). A  $EF \parallel AB$ ; pročež také  $AB$  jest kolmo na rovině  $HGK$  (XI. viii.). Z téže příčiny ovšem i  $CD$  jest kolmo na rovině  $HGK$ ; tedy  $AB$  i  $CD$  jsou na




rovině  $HGK$  kolmo. Když pak jsou dvě přímky na téže rovině kolmo, ty přímky jsou rovnoběžné (XI. VI.); pročež  $AB \parallel CD$ ; což právě bylo dokázati.

## X.

Když dvě přímky navzájem se stýkající jsou rovnoběžné se dvěma přímkami navzájem se stýkajícími a nejsou s nimi v téže rovině, budou svíratí stejné úhly.

Nuže buďte dvě přímky navzájem se stýkající  $AB, BC$  rovnoběžné se dvěma přímkami navzájem se stýkajícími  $DE, EF$  a nebuďte s nimi v téže rovině; pravím, že  $\sphericalangle ABC = DEF$ .



Nuže vezměme  $BA, BC$  a  $ED, EF$  střídavě za stejné a vedme spojnice  $AD, CF, BE, AC, DF$ . A ježto  $BA = ED$  a jsou rovnoběžné, též  $AD$  je s  $BE$  stejná a rovnoběžná (I. xxxiii.). Z téže příčiny ovšem i  $CF$  je s  $BE$  stejná a rovnoběžná; tedy  $AD, CF$  jsou s  $BE$  stejné i rovnoběžné. Přímky pak s touž přímkou rovnoběžné, byť i nebyly s ní v téže rovině, jsou i navzájem rovnoběžné (XI. ix.); pročež  $AD$  je s  $CF$  rovnoběžná a stejná. A stýkají se s nimi  $AC, DF$ ; tedy též  $AC$  je s  $DF$  stejná


i rovnoběžná. A ježto obě strany  $AB, BC$  jsou s  $DE, EF$  střídavě stejné i základna  $AC = DF$ , proto  $\sphericalangle ABC = DEF$ .

Když tedy dvě přímky navzájem se stýkající — —

## XI.

Z daného bodu zvýšeného spust na danou rovinu kolmici.

Daným bodem zvýšeným budiž  $A$ , danou pak rovinou položená; má se tedy z bodu  $A$  na položenou rovinu spustiti kolmice.



Nuže vedme v položené rovině nějakou nahodilou přímku  $BC$  a z bodu  $A$  zřídme na  $BC$  kolmici  $AD$  (I. xii.). Jestli tedy  $AD$  kolmo i na položené rovině, byl by úkol vykonán. Pakli ne, vedme z bodu  $D$  na položené rovině k  $BC$  kolmici  $DE$  a vedme z  $A$  k  $DE$  kolmici  $AF$  a bodem  $F$  vedme  $GH$  rovnoběžně s  $BC$ .

A ježto  $BC$  jest na  $DA$  i  $DE$  kolmo, tedy  $BC$  jest i na rovině  $EDA$  kolmo. A s ní rovnoběžná jest  $GH$ ; když pak jsou dvě přímky rovnoběžné a jedna

z nich jest na nějaké rovině kolmo, i zbývající na téže rovině bude kolmo (XI. viii.); pročež i  $GH$  jest kolmo na rovině přímkou  $ED, DA$ . I na všech tedy přímkách s ní se stýkajících a jsoucích v rovině přímkou  $ED, DA$  jest  $GH$  kolmo. Stýká však se s ní  $AF$ , jsouc v rovině přímkou  $ED, DA$ ; pročež  $GH$  jest na  $FA$  kolmo; a tak i  $FA \perp HG$ . Také však  $AF \perp DE$ ; tedy  $AF$  jest kolmo na  $GH$  i  $DE$ . Když pak se postaví přímka na dvě přímky navzájem se stýkající ve styčném bodě kolmo, také na jejich rovině bude kolmo. Tedy  $FA$  jest kolmo na rovině přímkou  $ED, GH$ . Rovina pak přímkou  $ED, GH$  jest rovina položená; pročež  $AF$  jest na položené rovině kolmo.

Z daného tedy bodu zvýšeného  $A$  spuštěna jest na položenou rovinu kolmice  $AF$ ; což právě bylo vykonati.

## XII.


Vztyč na dané rovině z daného na ní bodu kolmici.

Danou rovinou budiž rovina položená a bodem na ní buď  $A$ ; má se tedy z bodu  $A$  na položené rovině vztýčiti kolmice.

Mysleme si nějaký zvýšený bod  $B^{\circ}$  a z  $B$  spustme na položenou rovinu kolmici  $BC$  (XI. xi.) a z bodu  $A$  vedme  $AD$  rovnoběžně s  $BC$ .

Ježto tedy dvě přímky  $AD, CB$  jsou rovnoběžné a jedna z nich  $BC$  jest na položené rovině kolmo, proto i zbývající  $AD$  jest na položené rovině kolmo (XI. viii.).


Tedy jest na dané rovině z bodu na ní  $A$  vztýčena kolmice  $AD$ ; což právě bylo vykonati.



## XIII.

V témž bodě na téže rovině nepostavíš dvou přímkou kolmo na téže straně.

Nuže, možno-li, buďte v témž bodě  $A$  na položené rovině postaveny na téže straně přímky dvě  $AB, AC$  a proložme přímkami  $AB, AC$  rovinu; průsekem zajisté bodem  $A$  v položené rovině činiti bude přímku. Buď jí  $DAE$ ; tedy  $AB, AC, DAE$  jsou v jediné rovině. A ježto  $CA$  jest na položené rovině kolmo, tedy též se všemi přímkami s ní se stýkajícími a jsoucimi v položené rovině bude činiti pravé úhly. Stýká pak se s ní  $DAE$ , jsouc v položené rovině; proto  $\sphericalangle CAE = R$ . Z téže příčiny ovšem



<sup>o</sup>) Bod  $B$  jsem položil nahoru,  $C$  dolů (u Heiberga opačně); neboť  $B$  bod zvýšený.


i  $\sphericalangle BAE = R$ ; pročež  $\sphericalangle CAE = BAE$ . A jsou v téže rovině; což právě jest nemožné.

Tedy v témž bodě na téže rovině — —

## XIV.

Na kterých rovinách táž přímka jest kolmo, ty roviny budou rovnoběžné.

Nuže buď nějaká přímka  $AB$  kolmo na rovinách  $CD$  i  $EF$ ; pravím, že jsou ty roviny rovnoběžné.





Neboť, nejsou-li, prodlužovány jsouce setkají se. Stýkají se; budou zajisté společným průsekem činiti přímku. Budiž to  $GH$ ; a vytkněme na  $GH$  nahodilý bod  $K$  a veďme spojnice  $AK$ ,  $BK$ . A ježto  $AB$  jest kolmo na rovině  $EF$ , tedy také na přímce  $BK$ , která jest v prodloužené rovině  $EF$ , jest  $AB$  kolmo; pročež  $\sphericalangle ABK = R$ . Z téže příčiny ovšem

i  $\sphericalangle BAK = R$ . Tedy v  $\triangle ABK$  součet dvou úhlů  $ABK + BAK$  jest roven dvěma pravým; což právě jest nemožné. Pročež roviny  $CD$ ,  $EF$  prodlužovány jsouce se nesetkají; jsou tedy roviny  $CD$ ,  $EF$  rovnoběžné.

Na kterých tedy rovinách — —

## XV.

Když jsou dvě přímky navzájem se stýkající se dvěma přímkami navzájem se stýkajícími rovnoběžné, nejsouce s nimi v téže rovině, roviny jejich jsou rovnoběžné.<sup>7)</sup>



Nuže buďte dvě přímky navzájem se stýkající  $AB$ ,  $BC$  rovnoběžné se dvěma přímkami navzájem se stýkajícími  $DE$ ,  $EF$ , nejsouce s nimi v téže rovině; pravím, že roviny přímek  $AB$ ,  $BC$  a  $DE$ ,  $EF$  prodlužovány jsouce navzájem se nesetkají.<sup>8)</sup>

Nuže veďme z bodu  $B$  na rovinu přímek  $DE$ ,  $EF$  kolmici  $BG$  a ta dopadej na rovinu v bodě  $G$  a z  $G$  veďme  $GH \parallel ED$  a  $GK \parallel EF$ . A ježto  $BG$  jest kolmo na rovině přímek  $DE$ ,  $EF$ , tedy také se všemi přímkami s ní se stýkajícími a jsoucími v rovině přímek  $DE$ ,  $EF$  bude činiti úhly pravé. Stýkají se pak s ní  $GH$

i  $GK$ , jsouce v rovině přímek  $DE$ ,  $EF$ ; pročež  $\sphericalangle BGH = BGK = R$ .

<sup>7)</sup> Totiž roviny obou dvojic.

<sup>8)</sup> Nesmí ovšem úhel přímkami sevřený býti  $2R$  ani  $4R$ .

A ježto  $AB \parallel GH$  (XI. ix.), tedy  $\sphericalangle GBA + BGH = 2R$ . Avšak  $\sphericalangle BGH = R$ , tedy též  $\sphericalangle GBA = R$ ; pročež  $GB \perp BA$ . Z téže příčiny ovšem  $GB \perp BC$ . Ježto tedy přímka  $GB$  na dvou přímkách  $BA$ ,  $BC$  vzájemně se stýkajících stojí kolmo, proto  $GB$  jest i na rovině přímek  $BA$ ,  $BC$  kolmo.<sup>9)</sup> Na kterých však rovinách táž přímka jest kolmo, ty roviny jsou rovnoběžné (XI. xiv.); pročež rovina přímek  $AB$ ,  $BC$  je s rovinou přímek  $DE$ ,  $EF$  rovnoběžná.

Když jsou tedy dvě přímky navzájem — —


## XVI.

Když dvě roviny rovnoběžné protíná nějaká rovina, společné jejich průseky jsou rovnoběžné.

Nuže protínej dvě rovnoběžné roviny  $AB$ ,  $CD$  rovina  $EFGH$  a společnými jejich průseky buďtež  $EF$ ,  $GH$ ; pravím, že  $EF \parallel GH$ .

Nuže, není-li tomu tak,  $EF$ ,  $GH$  jsouce prodlužovány setkají se buď na straně  $F$ ,  $H$  buď na straně  $E$ ,  $G$ . Prodlouženy buďte na straně  $F$ ,  $H$  a stýkají se nejprve v  $K$ .

A ježto  $EFK$  jest v rovině  $AB$ , proto i všechny body na  $EFK$  jsou v rovině  $AB$ . A jedním z bodů na přímce  $EFK$  jest  $K$ ; tedy  $K$  jest v rovině  $AB$ . Z téže příčiny ovšem jest  $K$  i v rovině  $CD$ ; pročež roviny  $AB$ ,  $CD$  jsouce prodlužovány setkají se. Nestýkají se však, jelikož dáno jest, že jsou rovnoběžné; tedy přímky  $EF$ ,  $GH$  jsouce prodlužovány na straně  $F$ ,  $H$  se nesetkají. Podobně ovšem dokážeme, že přímky  $EF$ ,  $GH$  jsouce prodlužovány nesetkají se ani na straně  $E$ ,  $G$ . Přímky pak na žádné straně se nestýkající jsou rovnoběžné; pročež  $EF \parallel HG$ .



Když tedy dvě rovnoběžné roviny — —


## XVII.

Když jsou dvě přímky protínány rovnoběžnými rovinami, budou protínány v týchž poměrech

Nuže buďte přímky  $AB$ ,  $CD$  protínány rovnoběžnými rovinami  $GH$ ,  $KL$ ,  $MN$  v bodech  $A$ ,  $E$ ,  $B$ ,  $C$ ,  $F$ ,  $D$ ; pravím, že  $AE:EB = CF:FD$

Nuže veďme spojnice  $AC$ ,  $BD$ ,  $AD$  a protínej  $AD$  rovinu  $KL$  v bodě  $O$  a veďme spojnice  $EO$ ,  $OF$ . A ježto dvě ro-

<sup>9)</sup> Následuje několik řádků zbytečných, nepochybně cizích.



viny rovnoběžné  $KL$ ,  $MN$  protíná rovina  $EBDO$ , společné jejich průseky  $EO$ ,  $BD$  jsou rovnoběžné (X. xvi.). Z téže příčiny ovšem, ježto dvě roviny rovnoběžné  $GH$ ,  $KL$  protíná rovina  $AOFC$ , společné jejich průseky  $AC$ ,  $OF$  jsou rovnoběžné. A ježto v  $\triangle ABD$  jest  $EO \parallel BD$ , tedy  $AE:EB = AO:OD$  (VI. II.). Ježto dále v  $\triangle ADC$  jest  $OF \parallel AC$ ,  $AO:OD = CF:FD$ . Bylo však dokázáno, že též  $AO:OD = AE:EB$ ; pročež také  $AE:EB = CF:FD$ .

Když jsou tedy dvě přímky protínány — —


## XVIII.

Když je přímka na nějaké rovině kolmo, také všechny roviny jí proložené budou na téže rovině kolmo.

Nuže buď nějaká přímka  $AB$  na položené rovině kolmo; pravím, že také všechny roviny přímkou  $AB$  proložené jsou na položené rovině kolmo.

Nuže proložme přímkou  $AB$  rovinu  $DE$  a společným průsekem roviny  $DE$  a roviny položené budiž  $CE$ , a vytkněme na  $CE$  nahodilý bod  $F$  a z  $F$  vztýčme na  $CE$  v rovině  $DE$  kolmici  $FG$ . A ježto  $AB$  jest na položené rovině kolmo, proto i na všech přímkách s ní se stýkajících a jsoucích v položené rovině jest  $AB$  kolmo (vým. 3.), a tak i na  $CE$  jest kolmo; tedy  $\sphericalangle ABF = R$ . Avšak i  $\sphericalangle GFB = R$ ; pročež  $AB \parallel FG$ .  $AB$  však jest kolmo na rovině položené; tedy též  $FG$  jest kolmo na rovině položené (XI. VIII.). I jest rovina na rovině kolmo, když přímky v jedné rovině vedené kolmo na společný průsek rovin jsou na rovině druhé kolmo (vým. 4.). A dokázáno bylo, že  $FG$  v jedné z rovin, t. v  $DE$ , na společném průseku jejich  $CE$  vztýčena byvši kolmo, jest kolmo na rovině položené; pročež rovina  $DE$  jest na položené kolmo. Podobně zajisté se dokáže, že také všechny roviny přímkou  $AB$  proložené jsou na rovině položené kolmo.

Když je tedy přímka na nějaké rovině — —



## XIX.

Když jsou dvě roviny navzájem se protínající na nějaké rovině kolmo, také společný jejich průsek na téže rovině bude kolmo.

Nuže buďte dvě roviny  $AB$ ,  $BC$  kolmo na rovině položené, společným pak jejich průsekem  $BD$ ; pravím, že  $BD$  jest kolmo na rovině položené.

Nuže nebuď tak a z bodu  $D$  vztýčme v rovině  $AB$  na přímce  $AD$  kolmici  $DE$ , v rovině pak  $BC$  na  $CD$  kolmici  $DF$ .

A ježto rovina  $AB$  jest na položené kolmo a na společném průseku jejich  $AD$  vztýčena v rovině  $AB$  kolmice  $DE$ , tedy  $DE$  jest kolmo na rovině položené (vým. 4.). Podobně ovšem dokážeme, že i  $DF$  jest na položené rovině kolmo. Pročež jsou z téhož bodu  $D$  na rovině položené dvě přímky vztýčeny kolmo na téže straně; což právě jest nemožné (XI. XIII.). Proto na položené rovině z bodu  $D$  nevztýčíš kolmice kromě  $DB$ , společného to průseku rovin  $AB$ ,  $BC$ .

Když jsou tedy dvě roviny navzájem se protínající — —

## XX.

Když úhel tělesový svírají tři úhly rovinné, dva kterékoli, jakkoli střídány jsouce, jsou větší než zbývající.

Nuže svírejtež úhel tělesový  $A$  tři úhly rovinné  $BAC$ ,  $CAD$ ,  $DAB$ ; pravím, že z úhlův  $BAC$ ,  $CAD$ ,  $DAB$  dva kterékoli, jakkoli střídány jsouce, jsou větší než zbývající.

Jsou-li ovšem úhly  $BAC$ ,  $CAD$ ,  $DAB$  navzájem stejné, patrné, že dva kterékoli jsou větší než zbývající. Pakli ne, větší buď  $BAC^{10)}$ , a zřídme na přímce  $AB$  z bodu na ní  $A$  v rovině  $BAC$   $\sphericalangle BAE$  stejný s  $DAB$  a budiž  $AE = AD$ , a bodem  $E$  prodloužena jsouc  $BEC$  protínej přímky  $AB$ ,  $AC$  v bodech  $B$ ,  $C$ , a veďme spojnice  $DB$ ,  $DC$ . A ježto  $DA = AE$ , společnou pak  $AB$ , dvě střídavě dvěma rovné, i  $\sphericalangle DAB = BAE$ ; tedy základna  $DB = BE$ . A ježto  $(BD + DC) > BC$ , z nichžto, jak dokázáno,  $DB = BE$ , proto zbývající  $DC > EC$ . A ježto  $DA = AE$  a společnou  $AC$  a základna  $DC > EC$ , tedy  $\sphericalangle DAC > EAC$  (I. xxv.). Bylo pak dokázáno, že též  $\sphericalangle DAB = BAE$ ; pročež  $(\sphericalangle DAB + DAC) > BAC^{11)}$ . Podobně zajisté dokážeme, že též ostatní po dvou brány jsouce jsou větší než zbývající.

Když tedy úhel tělesový — —

## XXI.



Každý tělesový úhel svírají úhly rovinné menší než čtyři pravé.

Tělesový úhel  $A$  svírejtež úhly rovinné  $BAC$ ,  $CAD$ ,  $DAB$ ; pravím, že součet  $\sphericalangle BAC + CAD + DAB$  jest menší než čtyři pravé.

Nuže vytkněme na přímkách  $AB$ ,  $AC$ ,  $AD$  nahodilé body  $B$ ,  $C$ ,  $D$  a veďme

<sup>10)</sup> Totiž větší než  $BAD$ .

<sup>11)</sup> K nerovnosti  $\sphericalangle DAC > EAC$  přičteme na obou stranách  $\sphericalangle EAB (= DAB)$ , bude  $(DAB + DAC) > (EAB + EAC)$  neboli  $(DAB + DAC) > BAC$ .






spojnice  $BC, CD, DB$ . A ježto tělesový úhel  $B$  objímají tři úhly rovinné  $CBA, ABD, CBD$ , dva kterékoli jsou větší než zbývající (XI. xx.); pročež  $(\sphericalangle CBA + ABD) > CBD$ . Z téže příčiny ovšem i  $(\sphericalangle BCA + ACD) > BCD$  a  $(\sphericalangle CDA + ADB) > CDB$ ; tedy šest úhlů  $(CBA + ABD + BCA + ACD + CDA + ADB) > (CBD + BCD + CDB)$ . Avšak  $\sphericalangle CBD + BCD + BDC = 2R$  (I. xxxii.); pročež oněch šest  $(CBA + ABD + BCA + ACD + CDA + ADB) > 2R$ . A ježto v každém z trojúhelníkův  $ABC, ACD, ADB$  tři úhly (vnitřní) rovnají se dvěma pravým, tedy v těch třech trojúhelnících devět úhlů  $CBA + ACB + BAC + ACD + CDA + CAD + ADB + DBA + BAD = 6R$ , z nichžto šest  $(ABC + BCA + ACD + CDA + ADB + DBA) > 2R$ ; pročež tři zbývající  $BAC + CAD + DAB$ , jež svírají úhel tělesový, jsou menší než čtyři pravé.

Každý tedy tělesový úhel svírají — —


## XXII.

Když jsou tři úhly rovinné, z nichžto dva jakkoli střídány jsou větší než zbývající, a svírají je ramena stejná, ze spojnic těch stejných ramen jest možno sestavit trojúhelník.

Třemi úhly rovinnými buďtež  $ABC, DEF, GHK$ , z nichžto dva, jakkoli střídány jsou, jsou větší než zbývající, totiž  $(\sphericalangle ABC + DEF) > GHK$ ,  $(\sphericalangle DEF + GHK) > ABC$  a též  $(\sphericalangle GHK + ABC) > DEF$ , a ramena  $AB, BC, DE, EF, GH, HK$  buďte stejná, i vedme spojnice  $AC, DF, GK$ ; pravím, že možno je z přímk stejných s  $AC, DF, GK$  sestavit trojúhelník, t. j. že dvě kterékoli z přímk  $AC, DF, GK$  jsou delší než zbývající.



Jsou-li ovšem  $\sphericalangle ABC, DEF, GHK$  stejné, patrné, že též  $AC, DF, GK$  jsou stejné a že ze stejných  $AC, DF, GK$  možno jest sestavit trojúhelník. Pak-li ne, buďtež nestejně, a zřídme na přímce  $HK$  při bodě na ní  $H$   $\sphericalangle KHL$  stejný s  $ABC$ , a budiž  $HL$  rovna některému z ramen  $AB, BC, DE, EF, GH, HK$  a vedme spojnice  $KL, LG$ <sup>12)</sup>. A ježto dvě strany  $AB, BC$  jsou s  $KH, HL$  stejné a  $\sphericalangle B = KHL$ , tedy základna  $AC = KL$ . A ježto  $(\sphericalangle ABC + GHK) > DEF$  a  $\sphericalangle ABC = KHL$ , tedy  $\sphericalangle GHL > DEF$ . A ježto dvě strany  $GH, HL$  se dvěma  $DE, EF$  jsou stejné a  $\sphericalangle GHL > DEF$ , proto základna  $GL > DF$ . Avšak  $(GK + KL) > GL$ ; tedy  $GK + KL$  jest mnohem větší než  $DF$ .  $KL$  však je stejná s  $AC$ ; pročež  $AC + GK$  jest větší než zbývající  $DF$ . Podobně ovšem



<sup>12)</sup> Vyobr. druhé, u Heiberga nesprávné, tuto jest opraveno.



dokážeme, že také  $(AC + DF) > GK$  a rovněž  $(DF + GK) > AC$ . Tedy jest možno z přímk stejných s  $AC, DF, GK$  sestavit trojúhelník; což právě bylo dokázati.

## XXIII.

Ze tří rovinných úhlů, z nichžto dva jakkoli střídány jsou větší než zbývající, sestav úhel tělesový; nutno jest ovšem, aby ty tři byly čtyř pravých menší.

Danými třemi úhly rovinnými buďtež  $ABC, DEF, GHK$ , z nichžto dva jakkoli střídány jsou větší než zbývající a mimo to ty tři čtyř pravých menší; má se tedy z úhlů stejných s  $ABC, DEF, GHK$  sestavit úhel tělesový.

Odřízneme ramena stejná  $AB, BC, DE, EF, GH, HK$  a vedme spojnice  $AC, DF, GK$ ; tedy jest možno z přímk stejných s  $AC, DF, GK$  sestavit trojúhelník (XI. xxii.). Sestavmež  $LMN$ , tak, aby byla  $AC = LM, DF = MN$  a též  $GK = NL$ , a opišme kolem  $\triangle LMN$  kruh  $LMN$  a vytkněme střed jeho a budiž to  $O$  a vedme spojnice  $LO, MO, NO$ ; pravím, že  $AB > LO$ . Neboť, není-li, jest  $AB$  buď stejná s  $LO$  nebo jest menší. Budiž nejprve stejná, a ježto  $AB = LO$ , avšak  $AB = BC$  a  $OL = OM$ ; dvě tedy  $AB, BC$  jsou se dvěma  $LO, OM$  stejné i základna  $AC$  položena za stejnou s  $LM$ ; pročež  $\sphericalangle ABC = LOM$ . Z téže příčiny ovšem i  $\sphericalangle DEF = MON$  a rovněž  $\sphericalangle GHK = NOL$ ; tedy tři úhly  $ABC, DEF, GHK$  jsou jednotlivě stejné s  $LOM, MON, NOL$ . Avšak tři  $\sphericalangle LOM + MON + NOL = 4R$ . Pročež i tři  $\sphericalangle ABC + DEF + GHK = 4R$ . Podmínkou však, že jsou také menší než čtyři pravé; což právě nesrovnalé. Tedy není  $AB = LO$ . Pravím již, že  $AB$  není ani menší než  $LO$ . Nuže, možno-li, budiž, a vezměmež  $OP$  za stejnou s  $AB$  a  $OQ$  za stejnou s  $BC$  a vedme spojnici  $PQ$ . A ježto  $AB = BC$ , také  $OP = OQ$ , a tak i zbývající  $LP = QM$ . Pročež  $LM \parallel PQ$  a  $\triangle LMO$  s  $PQO$  stejnoúhlý (I. xxix.); tedy  $OL : LM = OP : PQ$ ; střídavě  $LO : OP = LM : PQ$ . Avšak  $LO > OP$ , pročež i  $LM > PQ$ . Avšak  $LM$  vzata za stejnou s  $AC$ , tedy  $AC > PQ$ . Ježto tedy dvě  $AB, BC$  se dvěma  $PO, OQ$  jsou stejné a základna  $AC > PQ$ , proto  $\sphericalangle ABC > POQ$ . Podobně ovšem dokážeme, že i  $\sphericalangle DEF > MON$  a  $\sphericalangle GHK > NOL$ . Tedy tři  $(\sphericalangle ABC + DEF + GHK) > (\sphericalangle LOM + MON + NOL)$ . Avšak podmínkou jest, že  $(\sphericalangle ABC$




+DEF+GHK) < 4R; pročež součet  $\sphericalangle LOM + MON + NOL$  jest o mnoho menší nežli 4R. Avšak též stejný; což právě nesmyslné<sup>t</sup> Tedy není  $AB < LO$ . Bylo pak dokázáno, že ani stejná; pročež  $AB > LO$ .

Vztyčme tedy v bodě O v rovině kruhové LMN kolmici OR, a budiž  $AB^2 - LO^2 = OR^2$  a vedme spojnice RL, RM, RN. A ježto RO jest kolmo na rovině kruhové LMN, tedy též na každé z přímek LO, MO, NO jest RO kolmo. A ježto  $LO = OM$ , společnou pak jest kolmice OR, proto základna  $RL = RM$ . Z téže příčiny ovšem také  $RN = RL = RM$ ; tedy tři RL, RM, RN jsou navzájem stejné. A ježto  $AB^2 - LO^2 = OR^2$ , tedy  $AB^2 = LO^2 + OR^2$ . Součet pak  $LO^2 + OR^2 = LR^2$ , neboť  $\sphericalangle LOR = R$ ; pročež  $AB^2 = LR^2$ ; tedy  $AB = RL$ . Avšak  $AB = BC = DE = EF = GH = HK$  a  $RL = RM = RN$ ; a tak AB, BC, DE, EF, GH, HK, RL, RM, RN jsou stejné. A ježto dvě LR, RM jsou stejné se dvěma AB, BC a podmínkou jest, že základna  $LM = AC$ , tedy  $\sphericalangle LRM = ABC$ . Z téže příčiny ovšem i  $\sphericalangle MRN = DEF$  a  $LRN = GHK$ .

Ze tří tedy úhlů rovinných LRM, MRN, NRL, jež jsou stejné se třemi danými  $\sphericalangle ABC, DEF, GHK$ , sestaven jest úhel tělesový R, jež svírají úhly LRM, MRN, NRL; což právě bylo vykonati.

Výtěšek.

Jakým však způsobem  $AB^2 - LO^2$  možno vzíti za stejné s  $OR^2$ , dokážeme takto: Mějme přímky AB, LO a budiž AB větší a zřídme na ní polokruh ABC a v polokruhu ABC zapustmež AC stejnou s LO, jež není větší<sup>13)</sup> než průměr AB, a vedme spojnici CB. Ježto tedy  $\sphericalangle ACB$  je v polokruhu ACB, tedy  $\sphericalangle ACB = R$  (III. xxxi.). Pročež  $AB^2 = AC^2 + CB^2$ . A tak  $AB^2 - AC^2 = CB^2$ . Avšak  $AC = LO$ ; tedy  $AB^2 - LO^2 = CB^2$ . Vezmeme-li tedy OR za stejnou s BC, bude  $AB^2 - LO^2 = OR^2$ ; což se mělo vykonati.



XXIV.

Když těleso omezují roviny rovnoběžné, (protější roviny jeho jsou stejné rovnoběžníky<sup>14)</sup>).

Nuže omezujtěž těleso CDHG roviny rovnoběžné AC a GF, AH a DE, BF a AE; pravím, že protější jeho roviny jsou stejné rovnoběžníky.


Neboť ježto dvě roviny rovnoběžné BG, CE protíná rovina AC, společné průseky jejich jsou rovnoběžné; tedy  $AB \parallel DC$ . Dále, ježto

<sup>13)</sup> Ba dokonce menší býti musí.  
<sup>14)</sup> Výrok jen za některých podmínek pravdivý. Tak na př. o osmistěnu, kdež také dvě a dvě protější roviny jsou rovnoběžné, výrok ten platnosti nemá. Eukl. patrně míní plochami meznými šest čtyřúhelníků.

dvě roviny rovnoběžné BF, AE protíná rovina AC, společné průseky jejich jsou rovnoběžné; tedy  $BC \parallel AD$ . Bylo pak dokázáno, že též  $AB \parallel DC$ ; tedy AC jest rovnoběžník. Podobně zajisté dokážeme, že také DF, FG, GB, BF, AE jsou rovnoběžníky<sup>15)</sup>.

Vedme spojnice AH, DF. A ježto  $AB \parallel DC, BH \parallel CF$ , dvě tedy přímky AB, BH navzájem se stýkající jsou rovnoběžné se dvěma přímkami DC, CF v netěže rovině; pročež budou svíratí stejné úhly (XI. xv.); tedy  $\sphericalangle ABH = DCF$ . A ježto AB, BH jsou se dvěma DC, CF střídavě stejné a  $\sphericalangle ABH = DCF$ , tedy základna  $AH = DF$  a  $\triangle ABH = DCF$ . I jest rovnoběžník  $BG = 2 ABH$  a  $CE = 2 DCF$ ; pročež rovnoběžník  $BG = CE$ . Podobně ovšem dokážeme, že také  $AC = GF$  a  $BF = AE$ .

Když tedy těleso omezují roviny rovnoběžné, — —




XXV.

Když rovnoběžnostěn<sup>16)</sup> protne rovina rovnoběžná s rovinami protějšími, bude se míti základna k základně jako těleso k tělesu.

Nuže protínej rovnoběžnostěn ABCD rovina FG, rovnoběžná s protějšími rovinami RA, DH; pravím že  $AEFV : EHCF = ABFU : EGCD$ .

Nuže prodlužme AH na obě strany, a buď s přímkou AE několik stejných AK, KL a s EH několik stejných HM, MN, a doplňme rovnoběžníky LP, KV, HX, MS a tělesa LQ, KR, DM, MT. A ježto  $LK = KA = AE$ , také rovnoběžníky LP, KV, AF jsou si rovny, rovněž KO, KB, AG a též LY, KQ, AR; neboť jsou protější (XI. xxiv.). Z téže příčiny ovšem také rovnoběžníky EC, HX, MS jsou si rovny, rovněž HG, HI, IN a též DH, MZ, NT; tedy tři roviny těles LQ, KR, AU jsou třem rovinám rovny. Avšak ty tři jsou rovny třem rovinám protějším; pročež ta tři tělesa LQ, KR, AU jsou si rovna (XI. xxiv.). Z téže příčiny ovšem i tři tělesa ED, DM, MT jsou si rovna. Tedy kolikrát větší jest LF než základna AF, tolikrát větší je též těleso LU než AU. Z téže příčiny ovšem, kolikrát větší jest základna NF než FH, tolikrát větší je též těleso NU než HU. A jestli základna  $LF = NF$ ,



<sup>15)</sup> Kdyby však bylo boků na př. šest, také po dvou protějším rovnoběžných, byly by roviny BG CE třeba také rovnoběžné, avšak šestiúhelníky.  
<sup>16)</sup> Těleso omezené šesti rovnoběžníky, z nichž dva a dva protější rovnoběžné (viz vyobr. předešlé).

také těleso  $LU = NU$ , a jestli základna  $LF > NF$ , také těleso  $LU > NU$ , a jestli menší, menší. Když jsou tedy čtyři veličiny, dvě základny  $AF, FH$  a dvě tělesa  $AU, UH$ , vzata jest základna  $LF$  a těleso  $LU$  za stejný násobek základny  $AF$  a tělesa  $AU$  i základna  $NF$  a těleso  $NU$  za stejný násobek základny  $HF$  a tělesa  $HU$ ; také dokázáno jest, jestli základna  $LF$  větší než  $FN$ , že také těleso  $LU$  jest větší než  $NU$ , pakli stejná; stejné, pakli menší, menší. Tedy základna  $AF$  má se k základně  $FH$  jako těleso  $AU$  k tělesu  $UH$ ; což právě bylo dokázati.

## XXVI.

Na dané přímce a při bodě na ní sestav úhel tělesový danému úhlu tělesovému rovný.

Danou přímkou buď  $AB$  a daným na ní bodem  $A$ , daným pak úhlem tělesovým  $D$ , jež svírají úhly rovinné  $EDC, FDE, FDC$ ; má se tedy na přímce  $AB$  při bodě na ní  $A$  sestavití úhel tělesový rovný úhlu tělesovému  $D$ .

Nuže vytkneme  $DF$  nahodilý bod  $F$  a spustme z  $F$  na rovinu přímek  $ED, DC$  kolmici  $FG$ , a dopadej na rovinu v  $G$ , a veďme spojnicu  $DG$  i sestavme na přímce  $AB$  v bodě na ní  $A$   $\sphericalangle BAL$  stejný s  $EDC$  a  $\sphericalangle BAK$  stejný s  $EDG$ , a budiž  $AK = DG$ , a vztýčme z bodu  $K$  na rovinu  $BAL$  kolmici  $KH$ , a budiž  $KH = FG$ , i veďme spojnicu  $HA$ ; pravím, že tělesový  $\sphericalangle A$ , sevřený úhly  $BAL, BAH, HAL$ , roven jest úhlu tělesovému  $D$ , sevřenému úhly  $EDC, EDF, FDC$ .

Nuže odřízneme stejná ramena  $AB, DE$  a veďme spojnice  $HB, KB, FE, GE$ . A ježto  $FG$  jest na rovině položené kolmo, tedy také se všemi přímkami s ní se stýkajícími a jsoucími v rovině položené činiti bude úhly pravé; pročež  $\sphericalangle FGD = FGE = R$ . Z téže příčiny ovšem i  $\sphericalangle HKA = HKB = R$ . A ježto strany  $KA, AB$  jsou

střídavě stejné s  $GD, DE$  a svírají stejné úhly, tedy základna  $KB = GE$ . Avšak též  $KH = GF$ , a svírají (t.  $KH$  s  $KB$  a  $FG$  s  $GE$ ) stejné úhly; pročež  $HB = FE$ . Dále ježto  $AK, KH$  jsou střídavě stejné s  $DG, GF$  a svírají stejné úhly, tedy základna  $AH = FD$ . Jest pak také  $AB = DE$ ; pročež  $HA, AB$  jsou střídavě stejné s  $DF, DE$ , i základna  $HB = FE$ ; tedy  $\sphericalangle BAH = EDF$ . Z téže příčiny ovšem i  $\sphericalangle HAL = FDC$ <sup>17)</sup>. Jest pak i  $\sphericalangle BAL = EDC$ <sup>18)</sup>.

Na dané tedy přímce  $AB$  v bodě na ní  $A$  sestaven jest úhel tělesový  $A$  stejný s daným úhlem tělesovým  $D$ ; což právě bylo vykonati.

<sup>17)</sup> Následuje část zbytečná a beze vší pochybnosti cizí.


<sup>18)</sup> Tedy sestavený úhel tělesový jest sevřen stejnými úhly rovinnými jako daný. Že takové úhly tělesové jsou stejné, jest tu axiomatem.

## XXVII.

Na dané přímce narýsuj rovnoběžnostěn danému rovnoběžnostěnu podobný a podobně položený.

Danou přímkou budiž  $AB$ , daným pak rovnoběžnostěnem  $CD$ ; má se tedy na dané přímce  $AB$  narýsovatí rovnoběžnostěn danému rovnoběžnostěnu  $CD$  podobný a podobně položený.

Nuže sestavme na přímce  $AB$  při bodě na ní  $A$  tělesový úhel stejný s  $C$ , sevřený úhly  $BAH, HAK, KAB$ , tak aby  $\sphericalangle BAH$  byl stejný  $ECF, BAK$  s  $ECG$  a  $KAH$  s  $KCF$  (XI. xxvi.); i učinmež  $EC:CG = BA:AK$  a  $GC:CF = KA:AH$ . Tedy také stejnořadně  $EC:CF = BA:AH$ . A doplňme rovnoběžník  $HB$  i těleso  $AL$ .



A ježto  $EC:CG = BA:AK$  a strany při stejných  $\sphericalangle ECG, BAK$  jsou úměrné, tedy rovnoběžník  $GE \sim KB$ . Z téže příčiny ovšem i rovnoběžník  $KH \sim GF$  a rovněž  $FE \sim HB$ ; tři tedy rovnoběžníky tělesa  $CD$  podobny jsou třem rovnoběžníkům tělesa  $AL$ . Avšak jedna trojice jest rovna i podobna třem rovinám protějším i druhá trojice jest rovna i podobna třem rovinám protějším; pročež celé těleso  $CD \sim AL$ .


Tedy na dané přímce  $AB$  jest narýsován rovnoběžnostěn  $AL$ , danému rovnoběžnostěnu  $CD$  podobný a podobně položený; což právě bylo vykonati.

## XXVIII.

Když se rovnoběžnostěn protne rovinou úhlopříček protějšších rovin, těleso tou rovinou se rozpůlí.

Nuže protněme rovnoběžnostěn  $AB$  rovinou  $CDEF$  úhlopříček protějšších rovin  $CF, DE$ ; pravím, že těleso  $AB$  rovinou  $CDEF$  se rozpůlí.


Neboť, ježto  $\triangle CGF = CFB$  a  $\triangle ADE = DEH$ , také však rovnoběžník  $CA = EB$  (neboť jsou protějšší) a  $GE = CH$ , tedy i hranol omezený dvěma trojúhelníky  $CGF, ADE$  a třemi rovnoběžníky  $GE, AC, CE$  roven jest hranolu omezenému dvěma trojúhelníky  $CFB, DEH$  a třemi rovnoběžníky  $CH, BE, CE$ , neboť jsou omezeny rovinami počtem i velikostí stejnými (vým. 10.). Pročež celé těleso  $AB$  rovinou  $CDEF$  jest rozpůleno; což právě bylo dokázati.



## XXIX.

Rovnoběžnostěny o téže základně a téže výšce, jejichžto přímky zvýšené<sup>19)</sup> stýkají se s týmiž přímkami, jsou si rovny.

Rovnoběžnostěny  $CM$ ,  $CN$  mějte touž základnu  $AB$  a touž výšku a zvýšené přímky jejich  $AG$ ,  $AF$ ,  $LM$ ,  $LN$ ,  $CD$ ,  $CE$ ,  $BH$ ,  $BK$  stýkejte se s týmiž přímkami  $FN$ ,  $DK$ ; pravím, že těleso  $CM = CN$ .




Neboť, ježto  $CH$  i  $CK$  jsou rovnoběžníky,  $CB$  je stejné s  $DH$  i s  $EK$ , a tak i  $DH = EK$ . Společnou  $EH$  odečteme; tedy zbývající  $DE = HK$ . A tak i  $\triangle DCE = HBK$  a rovnoběžník  $DG = HN$ . Z téže příčiny ovšem také  $\triangle AFG = MLN$ . Jest pak i rovnoběžník  $CF = BM$  a  $CG = BN$ , neboť jsou protější; pročez i hranol omezený dvěma  $\triangle AFG$ ,  $DCE$  a třemi rovnoběžníky  $AD$ ,  $DG$ ,  $CG$  jest roven hranolu omezenému dvěma  $\triangle MLN$ ,  $HBK$  a třemi rovnoběžníky  $BM$ ,  $HN$ ,  $BN$ . Přičteme společně těleso, jehož základnou jest rovnoběžník  $AB$  a protější rovinou  $EGHM$ ; celý tedy rovnoběžnostěn  $CM = CN$ .

Tedy rovnoběžnostěny o téže základně a téže výšce, — —

## XXX.

Rovnoběžnostěny o téže základně a téže výšce, jejichžto přímky zvýšené<sup>19)</sup> nestýkají se s týmiž přímkami, jsou si rovny.

Rovnoběžnostěny  $CM$ ,  $CN$  mějte touž základnu  $AB$  i touž výšku a zvýšené přímky jejich  $AF$ ,  $AG$ ,  $LM$ ,  $LN$ ,  $CD$ ,  $CE$ ,  $BH$ ,  $BK$  nestýkejte se s týmiž přímkami; pravím, že těleso  $CM = CN$ .



Nuže prodlužme  $NK$ ,  $DH$  a stýkejte se v  $R$ , a ještě prodlužme  $FM$ ,  $GE$  do  $P$ ,  $Q$  a vedme spojnice  $AO$ ,  $LP$ ,  $CQ$ ,  $BR$ . Tu těleso  $CM$ , jehož základnou jest rovnoběžník  $ACBL$  a protější rovinou její  $FDHM$ , rovno je tělesu  $CP$ , jehož základnou jest  $ACBL$  a protější rovinou její  $OQRP$ ; neboť jsou na téže základně  $ACBL$  a mají touž výšku a zvýšené přímky jejich  $AF$ ,  $AO$ ,  $LM$ ,  $LP$ ,  $CD$ ,  $CQ$ ,  $BH$ ,  $BR$  stýkají se s týmiž přímkami

<sup>19)</sup> Míni se hrany poboční.

$FP$ ,  $DR$  (X. xxix.). Avšak těleso  $CP$ , jehož základnou jest rovnoběžník  $ACBL$  a protější rovinou její  $OQRP$ , jest rovno tělesu  $CN$ , jehož základnou rovnoběžník  $ACBL$ , protější pak rovinou  $GEKN$ ; neboť opět jsou na téže základně  $ACBL$  i mají touž výšku a zvýšené přímky jejich  $AG$ ,  $AO$ ,  $CE$ ,  $CQ$ ,  $LN$ ,  $LP$ ,  $BK$ ,  $BR$  stýkají se s týmiž přímkami  $GQ$ ,  $NR$ . A tak i těleso  $GM = CN$ .

Tedy rovnoběžníky o téže základně a téže výšce, — —


## XXXI.

Rovnoběžnostěny o stejných základnách a téže výšce jsou si rovny.

Rovnoběžnostěny  $AE$ ,  $CF$  mějte stejné základny  $AB$ ,  $CD$  a touž výšku; pravím, že těleso  $AE = CF$ .

Dříve tedy buďte zvýšené přímky  $HK$ ,  $BE$ ,  $AG$ ,  $LM$  a  $PQ$ ,  $DF$ ,  $CO$ ,  $RS$ \*) na základnách  $AB$ ,  $CD$  kolmo, a prodlužme  $CR$  přímo o  $RT$  a sestavme na přímce  $RT$  a při bodě na ní  $R$   $\sphericalangle TRU$  stejný s  $ALB$ , a budiž  $RT = AL$  a  $RU = LB$ , a doplňme základnu  $RX$  a těleso  $YU$ . A ježto dvě strany  $TR$ ,  $RU$  jsou střídavě stejné s  $AL$ ,  $LB$  a svírají stejné úhly, tedy rovnoběžník  $RX \cong HL$  (VI. xiv.).

A ježto dále  $AL = RT$  a  $LM = RS$  a svírají úhly pravé, tedy rovnoběžník  $RY \cong AM$ . Z téže příčiny ovšem též  $LE \cong SU$ . Pročez tři rovnoběžníky tělesa  $AE$  jsou se třemi rovnoběžníky tělesa  $YU$  stejné a jim podobné (t. j. shodné). Avšak jedna i druhá trojice je shodná jednotlivě se třemi rovinami protějšími; tedy celý rovnoběžnostěn  $AE = YU$ . Prodlužme  $DR$ ,  $XU$ , a stýkejte se v  $Z$ , a bodem  $T$  vedme s  $DZ$  rovnoběžku  $aTe$  a prodlužme  $PD$  do  $a$  a doplňme tě-




tesa  $ZY$ ,  $RI$ . Těleso  $YZ$ , jehož základnou jest rovnoběžník  $RY$ , protější pak rovinou její  $Zd$ , zajisté rovná se tělesu  $YU$ , jehož základnou jest rovnoběžník  $RY$ , protější pak rovinou  $UV$ ; neboť jsou na téže základně  $RY$  a mají touž výšku a zvýšené přímky jejich  $RZ$ ,  $RU$ ,  $Te$ ,  $TX$ ,  $Sb$ ,  $Sc$ ,  $Yd$ ,  $YV$  stýkají se s týmiž přímkami  $ZX$ ,  $bV$ . Avšak těleso  $YU = AE$ ; pročez i těleso  $YZ = AE$ . A ježto rovnoběžník  $RUXT = ZT$ , neboť mají touž základnu  $RT$  a jsou mezi týmiž rovnoběžkami  $RT$ ,  $ZX$ , avšak  $RUXT = CD$ ; tedy též rovnoběžník  $ZT = CD$ . Jiný pak jest  $DT$ ; pročez základna  $CD:DT = ZT:DF$ . A ježto rovnoběžnostěn  $CI$  protíná rovina  $RF$ , rovnoběžná s rovinami protějšími, základna  $CD$  má se k  $DT$  jako těleso  $CF$  k  $RI$ . Z téže příčiny ovšem, ježto rovnoběžnostěn  $ZI$  protíná rovina  $RY$ , rovnoběžná s rovinami pro-

\*) Tak má býti v hořejší části obrazce m.  $RP$ .

těššími, základna  $ZT$  má se k  $TD$  jako těleso  $ZY$  k  $RI$ . Avšak  $CD:DT=ZT:DF$ ; tedy také  $CF:RI=ZY:RI$ . Pročež  $CF$  i  $ZY$  mají k  $RI$  týž poměr; tedy těleso  $CF=ZY$ . Avšak bylo dokázáno, že  $ZY=AE$ ; pročež také  $AE=CF$ .

Nebuďte již přímkou zvýšené  $AG, HK, BE, LM, CN^{20)}$ ,  $PQ, DF,$




$RS$  (vyobr. druhé) kolmo na základnách  $AB, CD$ ; pravím opět, že  $AE=CF$ . Nuže spustíme z bodů  $K, E, G, M, Q, F, N, S$  na rovinu položenou kolmo  $KO, ET, GU, MV$ , a  $QX, FY, NZ, SI$ , a stýkejte se v rovině v bodech  $O, T, U, V$  a  $X, Y, Z, I$ , a vedme spojnice  $OT, OU, UV, TV$  a  $XY, XZ, ZI, IY$ . Jest zajisté těleso  $KV=QI$ , neboť jsou na stejných základnách  $KM, QS$  a mají touž výšku a zvýšené přímkou jsou na základnách kolmo. Avšak těleso  $KV=AE$  a  $QI=CF$ , neboť mají touž základnu a touž

výšku a zvýšené přímkou nestýkají se s týmiž přímkami (XI. xxx.). Pročež také těleso  $AE=CF$ .


Tedy rovnoběžnostěny o stejných základnách — —

XXXII.

Rovnoběžnostěny o téže výšce mají se k sobě jako základny.



Rovnoběžnostěny  $AB, CD$  mějte touž výšku; pravím, že rovnoběžnostěny  $AB, CD$  mají se k sobě jako základny, t. j.  $AB:CD=AE:CF$ .



Nuže k  $FG$  přistavme  $FH$ , stejně s  $AE$ , a na základně  $FH$  do téže výšky jako  $CD$  doplňme rovnoběžnostěn  $GK$ . Těleso  $AB$  zajisté je stejné s  $GK$ , neboť jsou na stejných základnách  $AE, FH$  a mají touž výšku. A ježto rovnoběžnostěn  $CK$  protíná rovina  $DG$ , rovnoběžná s rovinami protějššími, tedy základna  $CF:FH=CD:DH$  (XI. xxv.).

Avšak základna  $FH=AE$  a těleso  $DH=AB$ ; pročež také  $AB:CD=AE:CF$ .

Tedy rovnoběžnostěny o téže výšce — —

XXXIII.

Podobné rovnoběžnostěny mají se k sobě jako trojmoci stejnohých hran.

<sup>20)</sup> Ve vyd. Heibg. písmena v textu s písmeny v obr. se neshodují.

Podobnými rovnoběžnostěny buďtež  $AB, CD^*)$  a budiž  $AL$  s  $CF$  stejnohrou; pravím, že  $AB:CD=AE^3:CF^3$ .

Nuže prodlužme přímo  $AE, GE, HE$  o úsečky  $EK, EL, EM$  a budiž  $EK=CF, EL=FN$  a rovněž  $EM=FR$  a doplňme rovnoběžník  $KL$  i těleso  $KP$ . A ježto dvě strany  $KE, EL$  dvěma  $CF, FN$  jsou střídavě rovny; avšak i  $\sphericalangle KEL=CFN$ , jelikož právě pro podobnost těles  $AB, CD$  i  $\sphericalangle AEG=CFN$ , tedy rovnoběžník  $KL \cong CN$ . Z téže příčiny ovšem také rovnoběžník  $KM \cong CR$  a rovněž  $EP \cong DF$ ; tedy tři rovnoběžníky tělesa  $KP$  jsou shodné se třemi rovnoběžníky tělesa  $CD$ . Avšak jedna i druhá trojice je shodná jednotlivě se třemi rovinami protějššími; tedy celé těleso  $KP \cong CD$ . Doplňme rovnoběžník  $GK$  a na základnách  $GK, KL$  do stejné výšky jako  $AB$  doplňme těleso  $EO, LQ$ . A ježto pro podobnost těles  $AB, CD$  má se  $AE:CF=EG:FN=EH:FR$  a  $CF=EK, FN=EL, FR=EM$ , tedy  $AE:EK=GE:EL=HE:EM$ . Avšak  $AE:EK=AG:GK$  a  $GE:EL=GK:KL$  a  $HE:EM=QE:KM$ ; pročež také rovnoběžník  $AG:GK=GK:KL=QE:KM$ . Avšak  $AG:GK=AB:EO$  a  $GK:KL=OE:QL$  a  $QE:KM=QL:KP$  (XI. xxxii.); tedy též  $AB:EO=EO:QL=QL:KP$ . Když pak jsou čtyři veličiny spojitě úměrné, první se má ke čtvrté jako trojmoc z první ke trojmoci z druhé (V. vým. 10. pozn. 5.); pročež  $AB:KP=AB^3:EO^3$ . Avšak  $AB:EO=AG:GK=AE:EK$ ; a tak i těleso  $AB:KP=AE^3:EK^3$ . Avšak těleso  $KP=CD$  a hrana  $EK=CF$ ; proto těleso  $AB$  má se k tělesu  $CD$  jako trojmoc stejnohých hran jeho  $AE$  ke trojmoci stejnohých hran  $CF$ .

Tedy podobné rovnoběžnostěny mají se k sobě — —

Důsledek.<sup>21)</sup>

Z toho zajisté patrné, když jsou čtyři přímkou úměrné (spojitě), že první bude se míti ke čtvrté jako rovnoběžnostěn z první k rovnoběžnostěnu z druhé podobnému a podobně sestrojenému, ježto také první má se ke čtvrté jako trojmoc z první ke trojmoci z druhé.

XXXIV.

Základny stejných rovnoběžnostěnu mají se k sobě obráceným poměrem výšek; a kterých rovnoběžnostěnu základny mají se k sobě obráceným poměrem výšek, ty jsou stejné.

Stejnými rovnoběžnostěny buďtež  $AB, CD$ ; pravím, že základny rovnoběžnostěnu  $AB, CD$  mají se k sobě obráceným poměrem výšek,

\*) Na konci prodloužené  $KE$  budiž roh označen  $A$  (omylem vypuštěno).

<sup>21)</sup> Nejspíše cizí.

a to základna  $EH$  k základně  $NQ$  jako výška tělesa  $CD$  k výšce tělesa  $AB$ .

Nuže buďte dříve zvýšené přímky  $AG$ ,  $EF$ ,  $LB$ ,  $HK$  a  $CM$ ,  $NO$ ,  $PD$ ,  $QR$  na základnách jejich kolmo; pravím, že základna  $EH:NQ=CM:AG$ .

Jest-li tedy základna  $EH=NQ$ , jest pak i těleso  $AB=CD$ , bude též  $CM=AG$ . Neboť rovnoběžnostěny o stejné výšce mají se k sobě jako základny (XI. xxxii.<sup>22</sup>) I bude základna  $EH:NQ=CM:AG$ , i patrně, že základny rovnoběžnostěnu mají se k sobě obráceným poměrem výšek.<sup>23</sup>)

Nebuď již základna  $EH=NQ$ , nýbrž větší buď  $EH$ . Jest pak i těleso  $AB=CD$ ; pročez i  $CM>AG$ .<sup>22</sup>) Budiž tedy  $AG=CT$ , a doplňme na základně  $NQ$  do výšky  $CT$  rovnoběžnostěn  $CV$ . A ježto těleso  $AB=CD$ , vedle toho pak jest  $CV$ , stejné pak veličiny mají k téměř poměr

týž, tedy  $AB:CV=CD:CV$ . Avšak  $AB:CV=EH:NQ$  (XI. xxxii.), neboť tělesa  $AB$ ,  $CV$  jsou stejně vysoká; a  $CD:CV=MQ:TQ=CM:CT$ ; pročez i základna  $EH:NQ=MC:CT$ . Avšak  $CT=AG$ ; pročez i základna  $EH:NQ=MC:AG$ . Tedy základny rovnoběžnostěnuv  $AB$ ,  $CD$  mají se k sobě obráceným poměrem výšek.

Mějte se již naopak základny rovnoběžnostěnuv  $AB$ ,  $CD$  k sobě obráceným poměrem výšek, a to měj se  $EH$  k  $NQ$  jako výška tělesa  $CD$  k výšce tělesa  $AB$ ; pravím, že těleso  $AB=CD$ .

Buďtež opět přímky zvýšené na základnách kolmo. A jestli  $EH=NQ$ , a má se  $EH$  k  $NQ$  jako výška tělesa  $CD$  k výšce tělesa  $AB$ , tedy je také výška tělesa  $CD$  rovna výšce tělesa  $AB$ . Rovnoběžnostěny však o stejných základnách a o téže výšce jsou si rovny (XI. xxxi.); pročez těleso  $AB=CD$ .

Nebuď již základna  $EH=NQ$ , nýbrž větší buď  $EH$ ; větší tedy jest i výška tělesa  $CD$  než výška tělesa  $AB$ , t. j.  $CM>AG$ . Budiž opět  $AG=CT$  a podobně doplňme těleso  $CV$ . Ježto  $EH:NQ=MC:AG$  a  $AG=CT$ , tedy  $EH:NQ=MC:CT$ . Avšak  $EH:NQ=AB:CV$ , neboť jsou tělesa  $AB$ ,  $CV$  stejně vysoká; a  $CM:CT=MQ:QT=CD:CV$ . Proto také  $AB:CV=CD:CV$ ; tedy  $AB$ ,  $CD$  mají k  $CV$  týž poměr. Tedy těleso  $AB=CD$ .

Nebuďte již přímky zvýšené [vyobr. druhé<sup>24</sup>)]  $FE$ ,  $BL$ ,  $GA$ ,  $HK$  a  $ON$ ,  $DP$ ,  $MC$ ,  $RQ$ \*) na základnách jejich kolmo, i vedme z bodů  $F$ ,  $G$ ,  $B$ ,  $K$  a  $O$ ,  $M$ ,  $D$ ,  $R$  na roviny  $FH$ ,  $NQ$ <sup>25</sup>) kolmice, a stýkejte


<sup>22</sup>) Následující, tuto vynechané řádky jsou asi podvrženy.

<sup>23</sup>) V tomto případě i poměrem přímým, jelikož výšky jsou stejné.

<sup>24</sup>) V obrázci dolejším za kolmý pokládám hranol  $DY$ , ne naopak, jako u Heibga; dle toho jsem písmena zaměnil.

\*) Označení rohu  $Q$  ( $RQ$ ,  $PQ$ ,  $CQ$ ) budiž doplněno (nedopatřením vypuštěno).

<sup>25</sup>) Pro lepší zřetelnost otoč dolejší obr. rovinou  $DOMR$  nahoru.



se s rovinami v bodech  $S$ ,  $T$ ,  $U$ ,  $V$  a  $X$ ,  $Y$ ,  $Z$ ,  $m$ , a doplňme tělesa  $FV$ ,  $OZ$ ; pravím, že i tak, jestli  $AB=CD$ , základny mají se k sobě obráceným poměrem výšek, a to  $EH$  k  $NQ$  jako výška tělesa  $CD$  k výšce tělesa  $AB$ .

Ježto  $AB=CD$ , avšak  $AB=BT$ , neboť mají touž základnu  $FK$  a touž výšku, a  $CD=DY$ , neboť opět mají touž základnu  $RO$  a touž výšku; tedy  $BT=DY$ . Pročez  $FK$  má se k  $OR$  jako výška tělesa  $DY$  k výšce tělesa  $BT$ . Avšak  $FK=EH$  a  $OR=NQ$ ; tedy základna  $EH$  má se k základně  $NQ$  jako výška tělesa  $DY$  k výšce tělesa  $BT$ . Tělesa však  $DY$  s  $DC$  a  $BT$  s  $BA$  mají touž výšku; pročez  $EH$  má se k  $NQ$  jako výška tělesa  $DC$  k výšce tělesa  $AB$ <sup>26</sup>). Tedy základny rovnoběžnostěnuv  $AB$ ,  $CD$  mají se k sobě obráceným poměrem výšek.

Mějte se již naopak základny rovnoběžnostěnuv  $AB$ ,  $CD$  k sobě obráceným poměrem výšek, a to základna  $EH$  měj se k  $NQ$  jako výška tělesa  $CD$  k výšce tělesa  $AB$ ; pravím, že těleso  $AB=CD$ .

Neboť, vykonáme-li touž úpravu, ježto  $EH$  má se k  $NQ$  jako výška tělesa  $CD$  k výšce tělesa  $AB$  a  $EH=FK$ , jakož i  $NQ=OR$ ; tedy  $FK$  má se k  $OR$  jako výška tělesa  $CD$  k výšce tělesa  $AB$ . Avšak tělesa  $AB$  s  $BA$  a  $CD$  s  $DY$  mají touž výšku; pročez  $FK$  má se k  $OR$  jako výška tělesa  $DY$  k výšce tělesa  $BT$ . Tedy základny rovnoběžnostěnuv  $BT$ ,  $DY$  mají se k sobě obráceným poměrem výšek; pročez těleso  $BT=DY$ . Avšak  $BT=BA$ , neboť mají touž základnu  $FK$  a touž výšku. A těleso  $DY=DC$ <sup>22</sup>); tedy jest i těleso  $AB=CD$ ; což právě bylo dokázati.


### XXXV.

Když jsou dva rovinné úhly stejné a vztýčíme na jejich vrcholích přímky, svírající s přímkami počátečními střídavě stejné úhly, a vytkneme na přímkách vztýčených nahodilě body a z nich na roviny počátečních úhlů spustíme kolmice a z bodů vzniklých na rovinách vedeme k počátečním úhlům (vrcholům) spojnice, svírají budou s přímkami vztýčenými stejné úhly.


Dvěma stejnými úhly přímkovými buďte  $BAC$ ,  $EDF$ , a v bodech  $A$ ,  $D$  vztýčme přímky  $AG$ ,  $DM$ , aby svíraly s přímkami počátečními<sup>27</sup>) střídavě stejné úhly,  $MDE$  stejný s  $GAB$ ,  $MDF$  s  $GAC$ , a vytkneme na  $AG$ ,  $DM$  nahodilě body  $G$ ,  $M$  a spustme z bodů  $G$ ,  $M$  na roviny  $BAC$ ,  $EDF$  kolmice  $GL$ ,  $MN$ , a stýkejte se s rovinami v  $N$ ,  $L$ , a vedme spojnice  $LA$ ,  $ND$ ; pravím, že  $\sphericalangle GAL=MDN$ .

<sup>26</sup>) Jako by to byly rovnoběžnostěny kolmé.

<sup>27</sup>) Totiž s rameny těch úhlův.



Budiž  $DM=AH$ , a bodem  $H$  vedme  $HK$  rovnoběžně s  $GL$ ;  $GL$  však jest kolmo na rovině  $BAC$ , pročež i  $HK$  jest na rovině  $BAC$  kolmo. Vedme z bodů  $K, N$  na  $AB, AC, DF, DE$  kolmice  $KC, NF, KB, NE$  a spojnice  $HC, CB^{28)}, MF, FE^{29)}$ . Ježto  $HA^2=HK^2+KA^2$  a  $KA^2=KC^2+CA^2$ , tedy též  $HA^2=HK^2+KC^2+CA^2$ . A  $HK^2+KC^2=HC^2$ ; pročež  $HA^2=HC^2+CA^2$ ; tedy  $\sphericalangle HCA$  jest pravý. Z téže příčiny ovšem i  $\sphericalangle DFM$  jest pravý. Proto  $\sphericalangle ACH=DFM$ . Jest pak též  $\sphericalangle HAC=MDF$ . Jsou tedy dva trojúhelníky  $HAC, MDF$ , kteréž mají po dvou úhlech střídavě stejných a po jedné stejné straně při jednom ze stejných úhlů, t.  $HA=MD$ ; budou tedy míti též ostatní strany ostatním stranám střídavě rovné. Pročež  $AC=DF$ . Podobně zajisté dokážeme, že též  $AB=DE^{29)}$ . Ježto tedy  $AC=DF$  a  $AB=DE$ , dvě strany tedy  $CA, AB$  jsou střídavě rovné dvěma stranám  $FD, DE$ . Avšak i  $\sphericalangle CAB=FDE$ ; pročež základna  $BC=EF$  a trojúhelník



trojúhelníku a ostatní úhly ostatním úhlům; tedy  $\sphericalangle ACB=DFE$ . Jest pak i pravý  $ACK$  roven pravému  $DFN$ ; pročež i zbývající  $BCK=ENF$ . Z téže příčiny ovšem i  $\sphericalangle CBK=ENF$ . Dva jsou tedy trojúhelníky  $BCK, ENF$ , kteréž mají po dvou úhlech střídavě stejných a po jedné stejné straně při stejných úhlech, t.  $BC=EF$ ; pročež i ostatní strany ostatním stranám budou míti rovné. Tedy  $CK=EN$ . Jest pak též  $AC=DF$ ; dvě tedy  $AC, CK$  jsou střídavě rovné dvěma  $DF, FN$ ; a svírají stejné úhly. Proto základna  $AK=DN$ . A ježto  $AH=DM$ , také  $AH^2=DM^2$ . Avšak  $AH^2=AK^2+KH^2$ , neboť  $\sphericalangle AKH=R$ , a  $DM^2=DN^2+NM^2$ , neboť  $\sphericalangle DNM=R$ ; tedy  $AK^2+KH^2=DN^2+NM^2$ , z čehož  $AK^2=DN^2$ ; tedy zbývající  $KH^2=NM^2$ ; pročež  $HK=NM$ . A ježto dvě strany  $HA, AK$  jsou střídavě rovné dvěma  $MD, DN$  i základna  $HK$ , jak bylo dokázáno, je stejná s  $MN$ , proto  $\sphericalangle HAK=MDN$ .

Když jsou tedy dva rovinné úhly stejné — —

*Důsledek.*

Z toho zajisté patrné, když dva úhly rovinné jsou stejné a vztýčí se na nich stejné přímky, svírající s přímkami počátečními střídavě stejné úhly, že kolmice<sup>29)</sup> od nich spuštěné na roviny, v nichžto jsou počáteční úhly, jsou si rovné (což právě bylo dokázáno).

XXXVI.

Jsou-li tři přímky (spojitě) úměrné, rovnoběžno-

<sup>28)</sup> U Heiberga v obr. vynechána.


<sup>29)</sup> V úkolu předešlém jsou to  $KH, NM$ .

stěn z těch tří rovná se rovnoběžnostěnu z prostřední, stejnostrannému a s řečeným stejnoúhlému.

Třemi úměrnými přímkami buďtež  $A, B, C$ , t.  $A:B=B:C$ ; pravím, že těleso z  $A, B, C$  rovná se tělesu z  $B$ , stejnostrannému a s řečeným stejnoúhlému<sup>30)</sup>.

Mějme tělesový úhel při  $E$ , jež svírají úhly  $DEG, GEF, FED$ , a budiž  $DE=GE=EF=B$ , a doplníme rovnoběžnostěn  $EK$ , a budiž  $LM=A$ , a sestavme na přímce  $LM$  při bodě na ní  $L$  úhel tělesový stejný s  $E$ , aby jej svíraly úhly  $NLO, OLM, MLN$ , a budiž  $LO=B$

a  $LN=C$ . A ježto  $A:B=B:C$  a  $A=LM, B=LO=ED, C=LN$ ; tedy  $LM:EF=DE:LN$ . A tak strany při stejných úhlech  $NLM, DEF$  mají se k sobě poměrem obráceným; pročež rovnoběžník  $MN=DF$  (VI. xiv.). A ježto dva rovinné úhly přímkové  $DEF, NLM$  jsou si rovné a z nich (t. z vrcholů jejich) vztýčeny jsou přímky  $LO, EG$  a svírají s počátečními přímkami střídavě stejné úhly, tedy kolmice spuštěné z bodů  $G, O$  na roviny  $MLN, DEF^{31)}$  jsou si rovné (XI. xxxv. důsl.); pročež tělesa  $LH, EK$  mají stejnou výšku. Rovnoběž-




nostěnv pak mající stejné základny a stejné výšky jsou si rovné (XI. xxxi.); proto těleso  $HL=EK$ . A těleso  $LH$  je z  $A, B, C$  a těleso  $EK$  z  $B$ ; tedy rovnoběžnostěn z  $A, B, C$  jest roven tělesu z  $B$ , stejnostrannému a s řečeným stejnoúhlému; což právě bylo dokázáno.

XXXVII.

Když jsou čtyři přímky úměrou, také rovnoběžnostěny z nich podobné a podobně sestrojené budou úměrou; a když rovnoběžnostěny z nich podobné a podobně sestrojené jsou úměrou, i samy přímky budou úměrou.

Buďtež úměrou čtyři přímky  $AB, CD, EF, GH$ , tak že  $AB:CD=EF:GH$ , a sestrojme z  $AB, CD, EF, GH$  rovnoběžnostěny podobné a podobně položené  $KA, LC, ME, NG$ ; pravím, že  $KA:LC=ME:NG$ .

Neboť, ježto rovnoběžnostěn  $KA \sim LC$ , tedy  $KA:LC=AB^3:CD^3$  (XI. xxxiii.). Z téže příčiny ovšem též  $ME:NG=EF^3:GH^3$ . Také  $AB:CD=EF:GH$ ; pročež také  $AK:LC=ME:NG^{32)}$ .



<sup>30)</sup> Z vyobr. u Heiberga patrné, že to nejsou tělesa stejná; opravil jsem.

<sup>31)</sup> Roviny  $MLN, DEF$  třeba si mysliti položenými.

<sup>32)</sup> Jest-li totiž  $\frac{AB}{CD} = \frac{EF}{GH}$ , jest také  $\left(\frac{AB}{CD}\right)^3 = \left(\frac{EF}{GH}\right)^3$ .

Avšak již se měj těleso  $AK:LC=ME:NG$ ; pravím že přímka  $AB:CD=EF:GH$ .


Neboť, poněvadž opět  $KA:LC=AB^3:CD^3$  a též  $ME:NG=EF^3:GH^3$  a  $KA:LC=ME:NG$ , tedy též  $AB:CD=EF:GH$ .

Když jsou tedy čtyři přímky úměrou, — —

## XXXVIII.

Když se v krychli rozpůlí strany protějšších rovin a body rozpolovacími se proloží roviny, společný průsek rovin a úhlopříčka té krychle navzájem se půlí.

Nuže rozpolme v krychli  $AF$  strany protějšších rovin  $CF$ ,  $AH$  v bodech  $K$ ,  $L$ ,  $M$ ,  $N$ ,  $O$ ,  $P$ ,  $Q$ ,  $R$  a body rozpolovacími proložme roviny  $KN$ ,  $OR$ , a společným průsekem rovin budiž  $US$  a úhlopříčkou krychle  $AF$  budiž  $DG$ ; pravím, že  $UT=TS$  a  $DT=TG$ .



Nuže vedme spojnice  $DU$ ,  $UE$ ,  $BS$ ,  $SG$ . A ježto  $DO \parallel PE$ , střídavé úhly  $DOU$ ,  $UPE$  jsou si rovny (I. xxix.). A ježto  $DO=PE$ ,  $OU=UP$  a svírají stejné úhly, tedy základna  $DU=UE$  a  $\triangle DOU$  je stejný s  $\triangle PUE$  i ostatní úhly jsou stejné s úhly ostatními; pročež  $\sphericalangle OUD=PUE$ . Proto zajisté  $DUE$  jest přímka (I. xiv.). Z téže příčiny ovšem i  $BSG$  jest přímka a  $BS=SG$ . A ježto  $CA$  je s  $DB$  stejná i rovnoběžná, avšak  $CA$  je také s  $EG$


stejná i rovnoběžná, tedy je též  $DB$  stejná i rovnoběžná s  $EG$ . A spojují (protínají) je přímky  $DE$ ,  $BG$ ; pročež  $DE \parallel BG$  (I. xxxiii.). Proto  $\sphericalangle EDT=BGT$ , neboť jsou střídavé, a  $\sphericalangle DTU=GTS$ . Tedy  $DTU$ ,  $GTS$  jsou dva trojúhelníky, jež mají po dvou stejných úhlech a po jedné stejné straně při jednom ze stejných úhlů, t.  $DU=GS$ , neboť jsou to poloviny přímek  $DE$ ,  $BG$ ; i ostatní strany budou míti s ostatními stranami stejné. A tak  $DT=TG$  a  $UT=TS$ .

Když se tedy v krychli rozpůlí strany — —

## XXXIX.

Když mají dva hranoly stejnou výšku a jeden má za základnu rovnoběžník, druhý pak trojúhelník a rovnoběžník je dvojnásobkem trojúhelníku, ty hranoly budou stejné<sup>33)</sup>.

Dvěma hranoly o stejné výšce buďtež  $ABCDEF$  a  $GHKLMN$  a onen



<sup>33)</sup> Hranolem, jehož základnou jest rovnoběžník, míní se tu klín, s jehož základnou jest rovnoběžná přímka, nikoli rovina.

měj za základnu rovnoběžník  $AF$ , tento pak trojúhelník  $GHK$ , a budiž  $AF=2GHK$ ; pravím, že hranol  $ABCDEF$  jest roven hranolu  $GHKLMN$ .

Doplníme tělesa  $AO$ ,  $GP$ . Ježto rovnoběžník  $AF=2\triangle GHK$  a též rovnoběžník  $HK=2\triangle GHK$ , tedy  $AF=HK$ . Rovnoběžnostěny pak o stejných základnách a téže výšce jsou si rovny (XI. xxxi.); pročež těleso  $AO=GP$ . I jest hranol  $ABCDEF$  polovinou tělesa  $AO$  a polovinou tělesa  $GP$  hranol  $GHKLMN$ ; tedy hranol  $ABCDEF=GHKLMN$ .

Když tedy mají dva hranoly stejnou výšku — —

## Kniha dvanáctá.

## I.

Podobné mnohoúhelníky do kruhů vepsané mají se k sobě jako čtverce průměrů.

Kruhy buďtež  $ABC$ ,  $FGH$  a v nich podobnými mnohoúhelníky buďtež  $ABCDE$ ,  $FGHKL$ , průměry pak těch kruhů buďte  $BM$ ,  $GN$ ; pravím, že  $ABCDE:FGHKL=BM^2:GN^2$ .

Nuže vedme spojnice  $BE$ ,  $AM$ ,  $GL$ ,  $FN$ . A poněvadž  $ABCDE \sim FGHKL$ , také  $\sphericalangle BAE=GFL$  a  $BA:AE=GF:FL$ . Jsou tedy dva trojúhelníky  $BAE$ ,  $GFL$ , kteréž mají po jednom úhlu stejném,  $\sphericalangle BAE=GFL$ , a při stejných úhlech úměrné strany; pročež  $\triangle ABE$  je s  $\triangle FGL$  stejnoúhlý (VI. vi). Tedy  $\sphericalangle AEB=FLG$ . Avšak  $\sphericalangle AEB=AMB$ , neboť jsou na též oblouku (III. xxvii.), a  $\sphericalangle FLG=FNG$ ; pročež i  $\sphericalangle AMB=FNG$ . Jest pak také  $\sphericalangle BAM=R=GFN$ ; tedy též zbývající je zbývajícímu roven. Pročež  $\triangle ABM$  je s  $\triangle FGN$  stejnoúhlý. Tedy  $BM:GN=BA:GF$ . Avšak dvojmocně větší než  $BM:GN$  jest  $BM^2:GN^2$ , a dvojmocně větší než  $BA:GF$  jest  $ABCDE:FGHKL$  (VI. xx.); pročež také  $ABCDE:FGHKL=BM^2:GN^2$ .


Tedy podobné mnohoúhelníky do kruhů vepsané — —

## II.

Kruhy mají se k sobě jako čtverce průměrů.


Kruhy buďtež  $ABCD$ ,  $EFGH$ , průměry pak jejich  $BD$ ,  $FH$ ; pravím, že  $ABCD:EFGH=BD^2:FH^2$ .

Neboť nemá-li se  $ABCD:EFGH=BD^2:FH^2$ , bude se míti  $BD^2$  k  $FH^2$  jako kruh  $ABCD$  buď k menšímu útvaru než je kruh  $EFGH$  nebo k většímu. Měj se dříve jako k menšímu, totiž k  $S$ . I vpišme do kruhu





$EFGH$  čtverec  $EFGH$ <sup>1)</sup>; vepsaný čtverec je zajiště větší než polovina kruhu  $EFGH$ , ježto právě, když body  $E, F, G, H$ , vedeme tečné kruhu, polovina čtverce kolem kruhu opsaného je čtverec  $EFGH$ <sup>2)</sup> a kruh jest menší než opsaný čtverec; pročež vepsaný čtverec  $EFGH$  jest větší než polovina kruhu  $EFGH$ <sup>3)</sup>. Rozpolme oblouky  $EF, EG, GH, HE$  v bodech  $K, L, M, N$  a vedme spojnice  $EK, KF, FL, LG, GM, MH, HN, NE$ ; jest tedy i každý z trojúhelníkův  $EKF, FLG, GMH, HNE$  větší než příslušné úseče kruhové, ježto právě, když body  $K, L, M, N$  vedeme tečné kruhu a doplníme na přímkách  $EF, FG, GH, HE$  rovnoběžníky, každý z trojúhelníkův  $EKF, FLG, GMH, HNE$  bude polovinou příslušného rovnoběžníku, avšak příslušná úseč jest rovnoběžníku menší; a tak každý z trojúhelníkův  $EKF, FLG, GMH, HNE$  jest větší než polovina příslušné úseče kruhové. Tedy rozpolující zbývající oblouky a vedoucí spojnice a to stále činíce ostavíme nějaké úsečnice kruhové, které budou menší než rozdíl kruhu  $EFGH$  a útvaru  $S$ . Dokázáno bylo totiž v první poučce knihy desáté, dány-li dvě veličiny nestejně, když se od větší odečte část větší než



polovina a od zbytku větší než polovina a to stále se děje, že zbude nějaká veličina, jež bude menší než daná veličina menší. Zbývej tedy, a buďtež úseče  $EK, KF, FL, LG, GM, MH, HN, NE$  kruhu  $EFGH$  menší než rozdíl kruhu  $EFGH$  a útvaru  $S$ . Pročež zbývající mnohoúhelník  $EKF LGMHN > S$ . Vpíšme též do kruhu  $ABCD$  mnohoúhelník  $AOBPCQDR$  podobný mnohoúhelníku  $EKF LGMHN$ ; tedy  $BD^2 : FH^2 = AOBPCQDR : EKFLGMHN$ . Avšak též  $BD^2 : FH^2 = \text{kruh } ABCD : S$ ; pročež i  $\text{kruh } ABCD : S = \text{mnohoúhelník } AOBPCQDR : EKFLGMHN$ ; tedy střídavě  $\text{kruh } ABCD$  má se ke svému mnohoúhelníku jako útvar  $S$  k mnohoúhelníku  $EKF LGMHN$ . Ale  $\text{kruh } ABCD$  jest větší než mnohoúhelník vepsaný, pročež i útvar  $S > EKFLGMHN$ . Avšak i menší; což právě jest nemožné. Tedy  $BD^2$  nemá se k  $FH^2$  jako  $\text{kruh } ABCD$  k nějakému útvaru menšímu než jest  $\text{kruh } EFGH$ . Podobně zajiště dokážeme, že nemá se ani  $FH^2$  k  $BD^2$  jako  $\text{kruh } EFGH$  k nějakému útvaru menšímu než jest  $\text{kruh } ABCD$ .

Pravím již, že nemá se  $BD^2$  k  $FH^2$  ani jako  $\text{kruh } ABCD$  k nějakému útvaru většímu než jest  $\text{kruh } EFGH$ .

<sup>1)</sup> Naznačil jsem přímkami čárkovanými (u Heiberga vůbec nenaznačen).

<sup>2)</sup> Neboť čtverec opsaný, třebaž  $Z$ , jest čtverec průměru, t.  $d^2$ , čtverec vepsaný z jest  $\frac{d^2}{2}$  (viz I. XLVII.); tedy  $z = \frac{Z}{2}$ . Dotud nedokázáno.

<sup>3)</sup> Neboť, jestli (pozn. 2.)  $Z = 2z$  a jestli  $z > z$  větší než celý kruh, bude  $z$  větší než polovina kruhu.

Nuže, možno-li, měj se jako k většímu  $T$ <sup>4)</sup> Obráceně tedy má se  $FH^2$  k  $BD^2$  jako útvar  $T$  ke kruhu  $ABCD$ . Avšak útvar  $T$  má se ke kruhu  $ABCD$  jako  $\text{kruh } EFGH$  k nějakému útvaru menšímu než jest  $\text{kruh } ABCD$ ; pročež také  $FH^2$  má se k  $BD^2$  jako  $\text{kruh } EFGH$  k útvaru menšímu než jest  $\text{kruh } ABCD$ ; což právě dokázáno nemožným. Tedy nemá se  $BD^2$  k  $FH^2$  jako  $\text{kruh } ABCD$  k nějakému útvaru většímu než jest  $\text{kruh } EFGH$ . Dokázáno pak bylo, že ani jako k menšímu; a tak  $BD^2 : FH^2 = \text{kruh } ABCD : EFGH$ .


Tedy kruhy mají se k sobě — —<sup>5)</sup>

### III.

Každý jehlan, mající za základnu trojúhelník, dělí se ve dva jehlany stejné a navzájem i celému podobné, jež mají za základny trojúhelníky<sup>6)</sup>, a ve dva stejné hranoly; a ty dva hranoly jsou větší než polovina celého jehlanu.

Mějme jehlan, jehož základnu jest  $\triangle ABC$ , temenem pak bod  $D$ ; pravím že jehlan  $ABCD$  dělí se ve dva jehlany navzájem stejné, mající za základny trojúhelníky, a celému podobné a ve dva stejné hranoly; a ty dva hranoly jsou větší než polovina celého jehlanu.

Nuže rozpolme  $AB, BC, CA, AD, DB, DC$  v bodech  $E, F, G, H, K, L$  a vedme spojnice  $HE, EG, GH, HK, KL, LH, KF, FG$ . Ježto  $AE = EB, AH = DH$ , tedy  $EH \parallel BK$  (VI. II.). Z téže příčiny ovšem i  $HK \parallel AB$ . Pročež  $HEBK$  jest rovnoběžník; tedy  $HK = EB$ . Avšak  $EB = EA$ ; pročež také  $AE = HK$ . Jest pak také  $AH = HD$ ; obě tedy  $EA, AH$  jsou oběma  $KH, HD$  střídavě rovny; i  $\sphericalangle EAH = KHD$ ; pročež  $EH = KD$ . Proto též  $\triangle AEH \cong HKD$ . Z téže příčiny ovšem i  $\triangle AHG \cong HLD$ . A ježto dvě přímky navzájem se stýkající  $EH, HG$  jsou rovnoběžné se dvěma přímkami navzájem se stýkajícími  $KD, DL$  v netěže rovině, budou svíratí stejné úhly (XI. x.). Pročež  $\sphericalangle EHG = KDL$ . A ježto dvě přímky (strany)  $EH, HG$  jsou se dvěma  $KD, DL$  střídavě stejné a  $\sphericalangle EHG = KDL$ , tedy základna  $EG = KL$ ; pročež  $\triangle EHG \cong KDL$ . Z téže příčiny ovšem i  $\triangle AEG \cong HKL$ . Tedy jehlan, jehož základnu je  $\triangle AEG$  a temenem bod  $H$ , jest roven i podoben jehlanu, jehož základnu jest  $\triangle HKL$  a temenem bod  $D$  (XI. vým. 10.). A ježto v  $\triangle ADB$  jest vedena k jedné straně  $AB$  rovnoběžka  $HK$ ,  $\triangle ADB$  jest  $\triangle DHK$  stejnoúhlý, a mají strany úměrné; pročež  $\triangle ADB \sim DHK$ . Z téže příčiny zajiště i  $\triangle DBC \sim DKL$  a  $\triangle ADC \sim DLH$ . A ježto dvě přímky navzájem se stýkající  $BA, AC$



<sup>4)</sup> Eukl. má tu opět  $S$ , takže  $S$  pokládá poprvé za menší, podruhé za větší; přizpůsobil jsem obrazec i označení, aby rozdílnost byla patrná.

<sup>5)</sup> Následuje výtěžek nepochybně cizí.

<sup>6)</sup> Dodavek zbytečný; jsou celému podobny.

jsou rovnoběžné se dvěma přímkami navzájem se stýkajícími  $KH$ ,  $HL$  v netěže rovině, svíratí budou stejné úhly. Tedy  $\sphericalangle BAC = \sphericalangle KHL$ . A  $BA:AC = KH:HL$ ; pročež  $\triangle ABC \sim \triangle HKL$ . Tedy též jehlan, jehož základnou  $\triangle ABC$  a temenem bod  $D$ , podoben jest jehlanu, jehož základnou  $\triangle HKL$  a temenem bod  $D$ . Avšak dokázáno bylo, že jehlan, jehož základnou  $\triangle HKL$  a temenem bod  $D$ , jest podoben jehlanu, jehož základnou  $\triangle AEG$  a temenem bod  $H$  [takže i jehlan, jehož základnou  $\triangle ABC$  a temenem  $D$ , podoben jest jehlanu, jehož základnou  $\triangle AEG$  a temenem  $H$ ]. Pročež oba jehlany  $AEGH$  i  $HKLD$  jsou podobny celému jehlanu  $ABCD$ .

A ježto  $BF = FC$ , rovnoběžník  $EBFG = 2 GFC$ . A poněvadž, když jsou dva hranoly stejné výšky a jeden má za základnu rovnoběžník, druhý pak trojúhelník, a rovnoběžník je dvakrát větší než trojúhelník, ty hranoly jsou stejné (XI. xxxix. a pozn.); tedy hranol omezený dvěma trojúhelníky  $BKF$ ,  $EHG$  a třemi rovnoběžníky  $EBFG$ ,  $EBKH$ ,  $HKFG$  rovná se hranolu omezenému dvěma trojúhelníky  $GFC$ ,  $HKL$  a třemi rovnoběžníky  $KFCL$ ,  $LCGH$ ,  $HKFG$ . I jest patrné, že i hranol, jehož základnou rovnoběžník  $EBFG$  a jí protilehlou přímkou  $HK$ , i ten, jehož základnou  $\triangle GFC$  a protilehlým  $\triangle HKL$ , jest větší než jeden z jehlanů, jejichžto základnami jsou  $\triangle AEG$ ,  $HKL$  a temeny body  $H$ ,  $D$ , ježto právě, když vedeme spojnice  $EF$ ,  $EK$ , hranol, jehož základnou rovnoběžník  $EBFG$  a protilehlou  $HK$ , větší jest než jehlan, jehož základnou  $\triangle EBF$  a temenem bod  $K$ . Avšak jehlan, jehož základnou  $\triangle EBF$  a temenem bod  $K$ , rovná se jehlanu, jehož základnou  $\triangle AEG$  a temenem bod  $H$ ; neboť je omezený shodné roviny. A tak i hranol, jehož základnou rovnoběžník  $EBFG$  a protilehlou přímkou  $HK$ , větší jest než jehlan, jehož základnou  $\triangle AEG$  a temenem bod  $H$ . Avšak hranol, jehož základnou rovnoběžník  $EBFG$  a protilehlou přímkou  $HK$ , rovná se hranolu, jehož základnou  $\triangle GFC$  a protilehlým  $\triangle HKL$ ; jehlan pak, jehož základnou  $\triangle AEG$  a temenem bod  $H$ , rovná se jehlanu, jehož základnou  $\triangle HKL$  a temenem bod  $D$ . Pročež řečené dva hranoly jsou větší než řečené dva jehlany, jejichžto základnami  $\triangle AEG$ ,  $HKL$  a temeny body  $H$ ,  $D$ .

Tedy celý jehlan, jehož základnou  $\triangle ABC$  a temenem bod  $D$ , dělí se ve dva jehlany navzájem stejné a ve dva stejné hranoly, a ty dva hranoly jsou větší než polovina jehlanu celého; což právě bylo dokázati.

#### IV.

Když jsou dva jehlany téže výšky, mající za základny trojúhelníky, a jeden i druhý se rozdělí ve dva jehlany stejné a celému podobné a ve dva stejné hranoly, základna jednoho jehlanu bude se míti k základně jehlanu druhého jako součet hranolů v jehlaně jednom k součtu hranolů stejného počtu v jehlaně druhém.

Mějme dva jehlany téže výšky, jež mají za základny  $\triangle ABC$ ,  $DEF$ , za temena pak body  $G$ ,  $H$ , a rozdělen buď jeden i druhý ve

dva jehlany stejné a celému podobné a ve dva stejné hranoly; pravím, že se má základna  $ABC$  k  $DEF$  jako součet hranolů v jehlaně  $ABCG$  k součtu hranolů stejného počtu v jehlaně  $DEFH$ .

Neboť, ježto  $BO = OC$ ,  $AL = LC$ , tedy  $LO \parallel AB$  a  $\sphericalangle ABC \sim \sphericalangle LOC$ . Z téže příčiny ovšem i  $\triangle DEF \sim \triangle RVF$ . A ježto  $BC = 2 CO$  a  $EF = 2 FV$ , tedy  $BC:CO = EF:FV$ . A sestrojeny jsou při  $BC$ ,  $CO$  podobné a podobně položené útvary přímkové  $ABC$ ,  $LOC$  a při  $EF$ ,  $FV$  podobné a podobně položené  $DEF$ ,  $RVF$ ; pročež  $\triangle ABC:LOC = DEF:RVF$ ; střídavě tedy  $ABC:DEF = LOC:RVF$  (VI. xxii.). Avšak jako se má  $\triangle LOC$  k  $RVF$ , tak hranol, jehož základnou  $\triangle LOC$  a

protilehlým  $PMN$ , k hranolu, jehož základnou  $\triangle RVF$  a protilehlým  $STU$  (viz násl. výt.); pročež také  $\triangle ABC$  má se k  $DEF$  jako hranol, jehož základnou  $\triangle LOC$  a protilehlým  $PMN$ , k hranolu, jehož základnou  $\triangle RVF$  a protilehlým  $STU$ . A jako se mají k sobě řečené hranoly, tak hranol, jehož základnou rovnoběžník  $KBOL$  a protilehlou přímkou  $PM$ , k hranolu, jehož základnou rovnoběžník  $QEVR$  a protilehlou přímkou  $ST$  (XI. xxxix. XII. iii.). Tedy také dva hranoly, ten, jehož základnou rovnoběžník  $KBOL$  a protilehlou přímkou  $PM$ , a ten, jehož základnou  $\triangle LOC$  a protilehlým  $PMN$ , mají se k hranolům, z nichž jednomu základnou  $QEVR$  a protilehlou přímkou  $ST$  a druhému základnou  $\triangle RVF$  a protilehlým  $STU$  (V. xii.). Pročež i základna  $ABC$  má se k  $DEF$  jako řečené dva hranoly k řečeným dvěma hranolům.


A podobně, když se rozdělí jehlany  $PMNG$ ,  $STUH$  každý ve dva hranoly a dva jehlany, bude se míti základna  $PMN$  k  $STU$  jako dva hranoly v jehlaně  $PMNG$  ke dvěma hranolům v jehlaně  $STUH$ . Avšak základna  $PMN:STU = ABC:DEF$ , neboť  $\triangle PMN = \triangle LOC$ ,  $STU = RVF$ . Tedy také jako  $ABC:DEF$ , tak ty čtyři hranoly k oněm čtyřem hranolům (V. xii.). Podobně pak, i když rozdělíme zbývající jehlany (při temenech) každý ve dva jehlany a ve dva hranoly, základna  $ABC$  bude se míti k základně  $DEF$ , jako součet hranolů v jehlaně  $ABCG$  k součtu hranolů stejného počtu v jehlaně  $DEFH$ ; což právě bylo dokázati.

Výtěžek<sup>7)</sup>.

Že však má se  $\triangle LOC$  k  $RVF$  jako hranol, jehož základnou  $\triangle LOC$  a protilehlým  $PMN$ , k hranolu, jehož základnou  $RVF$  a protilehlým  $STU$ , dlužno dokázati takto.

Nuže myslíme si v témž vyobr. z bodů  $G$ ,  $H$  na roviny  $ABC$ ,  $DEF$  spuštěné kolmice, právě stejné, jak patrné z toho, že ty jehlance

<sup>7)</sup> Sotva Eukleidův.




předem položeny za stejně vysoké. A ježto dvě přímky, t.  $GC$  a z  $G$  spuštěnou kolmicí, protínají rovnoběžné roviny  $ABC$ ,  $PMN$ , protínati je budou v týchž poměrech (XI. xvii.). I jest  $GC$  rovinou  $PMN$  v  $N$  rozpůlena, tedy též kolmice z  $G$  spuštěná na rovinu  $ABC$  bude rovinou  $PMN$  rozpůlena. Z téže příčiny ovšem i kolmice spuštěná z  $H$  na rovinu  $DEF$  bude rozpůlena rovinou  $STU$ . Také kolmice z bodů  $G$ ,  $H$  na roviny  $ABC$ ,  $DEF$  spuštěné jsou stejné; pročež stejné jsou i kolmice spuštěné z trojúhelníků  $PMN$ ,  $STU$  na roviny  $ABC$ ,  $DEF$ . Tedy hranoly, jimž jsou základnami  $\triangle LOC$ ,  $RVF$  a protějšími  $PMN$ ,  $STU$ , mají stejné výšky. A tak i rovnoběžnostěny z řečených hranolů sestrojené jsou stejně vysoké a mají se k sobě jako základny (XI. xxxii.). Pročež i řečené hranoly, jsouce poloviny<sup>\*)</sup>, mají se k sobě jako základna  $LOC$  k  $RVT$ ; což právě bylo dokázati.

## V.

Jehlany stejně vysoké, mající za základny trojúhelníky, mají se k sobě jako základny.

Mějme stejně vysoké jehlany, jež mají za základny  $\triangle ABC$ ,  $DEF$  a za temena body  $G$ ,  $H$  (vyobr. jako k poučce IV.); pravím že  $ABC:DEF = ABCG:DEFH$ .

Neboť nemá-li se  $ABC:DEF = ABCG:DEFH$ , bude se míti  $ABC$  k  $DEF$  jako jehlan  $ABCG$  k tělesu menšímu než je  $DEFH$  nebo k většímu. Měj se dříve jako k menšímu  $X$  (vyobr. zde), a rozdělme jehlan  $DEFH$  ve dva jehlany stejné a celému podobné a ve dva stejné hranoly; ty dva hranoly zajisté jsou větší než polovina celého jehlanu (XII. iii.). A jehlany vzniklé rozdělením opět podobně rozdělmež a to stále čiňmež, až zbudou z jehlanu  $DEFH$  nějaké jehlany, které jsou menší než rozdíl jehlanu  $DEFH$  a tělesa  $X$ . Zbývejtež, a buďte to třeba  $DQRS$  a  $STUH$ ; tedy zbývající hranoly v jehlaně  $DEFH$  jsou větší než těleso  $X$ . Rozdělmež i jehlan  $ABCG$  podobně a stejným počtem jako jehlan  $DEFH$ ; tedy základna



$ABC$  má se k  $DEF$  jako hranoly v jehlaně  $ABCG$  k hranolům v jehlaně  $DEFH$  (XII. iv.). Avšak též  $ABC:DEF = ABCG:X$ ; pročež také  $ABCG$  k  $X$  jako hranoly v jehlaně  $ABCG$  k hranolům v jehlaně  $DEFH$ ; tedy střídavě jehlan  $ABCG$  ke svým hranolům jako těleso  $X$  k hranolům v jehlaně  $DEFH$ . Jehlan však  $ABCG$  jest větší než jeho hranoly, pročež i těleso  $X$  je větší než hranoly v jehlaně  $DEFH$ . Avšak i menší; což právě jest nemožné. Tedy nemá se základna  $ABC$  k  $DEF$  jako jehlan  $ABCG$  k nějakému tělesu menšímu než je  $DEFH$ . Podobně zajisté dokážeme, že ani se nemá základna  $DEF$  k  $ABC$  jako jehlan  $DEFH$  k nějakému tělesu menšímu než jest  $ABCG$ .

Pravím již, že nemá se  $ABCG$  ani k žádnému tělesu většímu než je  $DEFH$  jako základna  $ABC$  k  $DEF$ .

Nuže, možno-li, měj se k většímu  $X$ ; obráceně tedy  $DEF:ABC =$

<sup>\*)</sup> Rozuměj: poloviny oněch rovnoběžnostěňů.


$X:ABCG$ . A jako se má  $X$  k jehlanu  $ABCG$ , tak jehlan  $DEFH$  k něčemu menšímu než jest  $ABCG$ , jak svrchu bylo dokázáno; pročež také  $DEF$  má se k  $ABC$  jako  $DEFH$  k něčemu menšímu než jest  $ABCG$ ; což právě dokázáno nesmyslným. Tedy nemá se  $ABC$  k  $DEF$  jako  $ABCG$  k nějakému většímu tělesu než je  $DEFH$ . Dokázáno pak bylo, že ani jako k menšímu. Pročež  $ABC:DEF = ABCG:DEFH$ ; což právě bylo dokázati.

## VI.

Jehlany stejně vysoké, i když mají za základny mnohoúhelníky, mají se k sobě jako základny.

Mějme stejně vysoké jehlany, jež mají za základny mnohoúhelníky  $ABCDE$ ,  $FGHKL$  a za temena body  $M$ ,  $N$ ; pravím, že  $ABCDEM:FGHKLN = ABCDE:FGHKL$ .

Nuže vedme spojnice  $AC$ ,  $AD$ ,  $FH$ ,  $FK$ . Ježto tedy jsou dva jehlany  $ABCM$ ,  $ACDM$ , jež mají za základny trojúhelníky a stejnou výšku, mají se k sobě jako základny (XII. v.); pročež  $ABC:ACD = ABCM:ACDM$ . A součtetně  $ABCD:ACD = ABCDM:ACDM$ . Avšak též  $ACD:ADE = ACDM:ADEM$ . Tedy stejnořadně  $ABCD:ADE = ABCDM:ADEM$ . A opět součtetně  $ABCDE:ADE = ABCDEM:ADEM$ . Podobně ovšem dokážeme, že též  $FGHKL:FGH = FGHKLN:FGHN$ . A ježto jsou dva jehlany  $ADEM$ ,  $FGHN$ , které mají za základny trojúhelníky a stejnou výšku, tedy  $ADE:FGH = ADEM:FGHN$ . Avšak  $ADE:ABCDE = ADEM:ABCDEM$ . Pročež stejnořadně  $ABCDE:FGH = ABCDEM:FGHN$ . Avšak zajisté i  $FGH:FGHKL = FGHN:FGHKLN$ . Tedy stejnořadně  $ABCDE:FGHKL = ABCDEM:FGHKLN$ ; což právě bylo dokázati.



## VII.

Každý hranol, jenž má za základnu trojúhelník, dělí se ve tři stejné jehlany, jež mají za základny trojúhelníky.

Mějme hranol, jehož základnou je  $\triangle ABC$  a protilehlým  $DEF$ ; pravím, že hranol  $ABCDEF$  dělí se ve tři stejné jehlany, jež mají za základny trojúhelníky.

Vedme spojnice  $BD$ ,  $EC$ ,  $CD$ . Ježto  $ABED$  jest rovnoběžník a úhlopříčkou jeho  $BD$ , tedy  $\triangle ABD = EBD$ ; pročež i jehlan, jehož základnou je  $\triangle ABD$  a temenem bod  $C$ , rovná se jehlanu, jehož základnou je  $\triangle DEB$  a temenem bod  $C$ . Avšak jehlan, jehož základnou je  $\triangle DEB$  a temenem bod  $C$ , je též jako jehlan, jehož základnou je  $\triangle EBC$  a temenem  $D$ , neboť jest omezen týmiž rovinami. Tedy též jehlan, jehož základnou  $\triangle ABD$  a temenem bod  $D$ , rovná se jehlanu,

jehož základnou  $\triangle EBC$  a temenem bod  $D$ . Dále, ježto  $FCBE$  jest rovnoběžník a úhlopříčkou jeho  $CE$ ,  $\triangle CEF = CBE$ . Proto též jehlan, jehož základnou  $\triangle BCE$  a temenem  $D$ , rovná se jehlanu, jehož základnou  $\triangle ECF$  a temenem  $D$ . Jehlan pak, jehož základnou  $\triangle BCE$  a temenem  $D$ , rovná se, jak dokázáno, jehlanu, jehož základnou  $\triangle ABD$  a temenem  $C$ ; tedy též jehlan, jehož základnou  $\triangle CEF$  a temenem  $D$ , roven jehlanu, jehož základnou  $\triangle ABD$  a temenem  $C$ ; dělí se tedy hranol  $ABCDEF$  ve tři stejné jehlany, jež mají za základny trojúhelníky.

A ježto jehlan, jehož základnou  $\triangle ABD$  a temenem bod  $C$ , je též jako jehlan, jehož základnou  $\triangle CAB$  a temenem  $D$ , neboť je omezuji tytéž roviny, a jehlan, jehož základnou  $\triangle ABD$  a temenem bod  $C$ , jest, jak dokázáno, třetinou hranolu, jehož základnou  $\triangle ABC$  a protilehlým  $DEF$ ; tedy jehlan, jehož základnou  $\triangle ABC$  a temenem bod  $D$ , je třetina hranolu, jenž má touž základnu, totiž  $ABC$ , a protilehlý  $\triangle DEF$ .


#### Důsledek.

Z toho zajisté patrné, že každý jehlan je třetina hranolu o téže základně a téže výšce<sup>9)</sup>; což právě bylo dokázati.

#### VIII.

Jehlany podobné, mající za základny trojúhelníky, mají se k sobě jako krychle stejnohých hran<sup>10)</sup>. Mějme podobné a podobně položené jehlany, jejichž základnami jsou  $\triangle ABC$ ,  $DEF$  a temeny body  $G$ ,  $H$ ; pravím, že  $ABCG : DEFH = BC^3 : EF^3$ .

Nuže doplníme rovnoběžnostěny  $BGML$ ,  $EHQP$ . A ježto jehlan  $ABCG \sim DEFH$ , tedy  $\sphericalangle ABC = DEF$ ,  $\sphericalangle GBC = HEF$  a  $\sphericalangle ABG = DEH$  a  $AB : DE = BC : EF = BG : EH$ . A ježto  $AB : DE = BC : EF$  a strany při stejných úhlech jsou úměrné, tedy rovnoběžník  $BM \sim EQ$ . Z téže příčiny ovšem i  $BN \sim ER$  a  $BK \sim EO$ . A tak tři  $MB$ ,  $BK$ ,  $BN$  jsou střídavě podobny třem  $EQ$ ,  $EO$ ,  $ER$ . Avšak tři  $MB$ ,  $BK$ ,  $BN$  shodují se s protějšími a také tři  $EQ$ ,  $EO$ ,  $ER$  jsou s protějšími shodné. Pročež tělesa  $BGML$ ,  $EHQP$  jsou omezena po-



<sup>9)</sup> Další čtyři řádky nepochybně cizí a konec kusý.

<sup>10)</sup> Eukl. dí: πλεῦθον, stran.

podobnými rovinami stejného počtu. Tedy těleso  $BGML \sim EHQP$ . Podobně pak rovnoběžnostěny mají se k sobě jako krychle stejnohých hran (XI. xxxiii.). Pročež  $BGML : EHQP = BC^3 : EF^3$ . Avšak  $BGML : EHQP = ABCG : DEFH$ , ježto jehlan jest šestina tělesa (rovnoběžnostěny), protože hranol<sup>11)</sup> jsa polovinou rovnoběžnostěny je třikrát větší než jehlan<sup>12)</sup> (XII. vii.). Tedy též  $ABCG : DEFH = BC^3 : EF^3$ ; což právě bylo dokázati.

#### Důsledek.


Z toho zajisté patrné, že podobné jehlany, i když mají za základny mnohoúhelníky, mají se k sobě jako krychle stejnohých hran. Neboť když se rozdělí v jehlany v nich obsažené, mající za základny trojúhelníky, tím, že se dělí podobné mnohoúhelníky základní v trojúhelníky podobné a počtem stejné i s celky stejnohých (VI. xx.), jako se má v jednom jeden jehlan, mající za základnu trojúhelník, k jednomu v druhém, majícímu za základnu trojúhelník, tak se bude míti též součet jehlanů v jednom, majících za základny trojúhelníky, k součtu jehlanů v druhém, jež mají za základny trojúhelníky, t. j. sám jehlan, jemuž základnou mnohoúhelník, k jehlanu, jemuž základnou mnohoúhelník. Jehlan však, jenž má za základnu trojúhelník, má se k jehlanu, jenž má za základnu trojúhelník, poměrem krychli stejnohých hran (XII. viii.); pročež i ten, jemuž základnou mnohoúhelník, má se k tomu, jenž má základnu podobnou, právě jako krychle hrany ke krychli hrany.

#### IX.

Ve stejných jehlanech základny tvaru trojúhelníkového mají se k sobě obráceným poměrem výšek; a ve kterých jehlanech základny tvaru trojúhelníkového mají se k sobě obráceným poměrem výšek, ty jsou stejné.

Nuže mějme jehlany, jimž základnami jsou  $\triangle ABC$ ,  $DEF$  a temeny body  $G$ ,  $H$ ; pravím, že základny jehlanův  $ABCG$ ,  $DEFH$  mají se k sobě obráceným poměrem výšek, a jako se má základna  $ABC$  k  $DEF$ , tak výška jehlanu  $DEFH$  k výšce jehlanu  $ABCG$ .

Nuže doplníme rovnoběžnostěny  $BGML$ ,  $EHQP$ . A ježto jehlan  $ABCG = DEFH$  a těleso  $BGML = 6 ABCG$  a těleso  $EHQP = 6 DEFH$  (XII. viii.); tedy těleso  $BGML = EHQP$ . Ve stejných pak rovnoběžnostěnech základny mají se k sobě obráceným poměrem výšek (XI. xxxiv.); proto má se základna



<sup>11)</sup> Jehož základnou je totiž trojúhelník.

<sup>12)</sup> Totiž ten, jenž má stejnou základnu i výšku.

$BM$  k  $EQ$  jako výška tělesa  $EHQP$  k výšce tělesa  $BGML$ . Avšak  $BM:EQ = \triangle ABC:DEF$ . Pročež má se i  $\triangle ABC$  k  $DEF$  jako výška tělesa  $EHQP$  k výšce tělesa  $BGML$ . Avšak výška tělesa  $EHQP$  je též jako výška jehlanu  $DEFH$ , a výška tělesa  $BGML$  je též jako výška jehlanu  $ABCG$ ; má se tedy základna  $ABC$  k  $DEF$  jako výška jehlanu  $DEFH$  k výšce jehlanu  $ABCG$ . Pročež základny jehlanů  $ABCG$ ,  $DEFH$  mají se k sobě obráceným poměrem výšek.

Avšak mějte se již základny jehlanů  $ABCG$ ,  $DEFH$  k sobě obráceným poměrem výšek, a jako základna  $ABC$  k  $DEF$ , tak měj se výška jehlanu  $DEFH$  k výšce jehlanu  $ABCG$ ; pravím, že jehlan  $ABCG = DEFH$ .


Neboť, vykonáme-li touž úpravu, ježto základna  $ABC$  má se k  $DEF$  jako výška jehlanu  $DEFH$  k výšce jehlanu  $ABCG$ , avšak  $ABC:DEF = BM:EQ$ , tedy též  $BM$  k  $EQ$  jako výška jehlanu  $DEFH$  k výšce jehlanu  $ABCG$ . Avšak výška jehlanu  $DEFH$  je též jako výška rovnoběžnostěnu  $EHQP$  a výška jehlanu  $ABCG$  je též jako výška rovnoběžnostěnu  $BGML$ ; má se tedy  $BM$  k  $EQ$  jako výška rovnoběžnostěnu  $EHQP$  k výšce rovnoběžnostěnu  $BGML$ . Ve kterých pak rovnoběžnostěnech základny mají se k sobě obráceným poměrem výšek, ty jsou si rovny; pročež rovnoběžnostěn  $BGML = EHQP$ . I jest  $ABCG = \frac{1}{6} BGML$  a  $DEFH = \frac{1}{6} EHQP$ ; tedy jehlan  $ABCG = DEFH$ .

Ve stejných tedy jehlanech základny — —

## X

Každý kužel je třetina válce, majícího touž základnu a stejnou výšku.

Nuže měj kužel touž základnu jako válec, totiž kruh  $ABCD$ , a stejnou výšku; pravím, že kužel je třetina válce, t. j. že válec je trojnásobek kužele.



Neboť není-li válec trojnásobek kužele, bude válec buď větší než trojnásobek kužele buď menší než trojnásobek. Budiž dříve větší než trojnásobek, a vpišme do kruhu  $ABCD$  čtverec  $ABCD$ ; čtverec  $ABCD$  zajisté větší jest než polovina kruhu  $ABCD$  (pozn. 2. 3.). I postavme na čtverci  $ABCD$  hranol stejně výšky jako válec. Postavený tedy hranol jest větší než polovina válce, poněvadž právě, když kolem kruhu  $ABCD$  opišeme čtverec, čtverec do kruhu  $ABCD$  vepsaný jest polovinou opsaného (pozn. 2. 3.); a na nich postavená

tělesa jsou rovnoběžnostěnné hranoly<sup>13)</sup> stejné výšky; rovnoběžnostěny pak o stejné výšce mají se k sobě jako základny (XI. xxxii.); pročež i hranol postavený na čtverci  $ABCD$  jest polovinou hranolu na čtverci

<sup>13)</sup> T. j. hranoly, jejichž stěny po dvou jsou rovnoběžné; zde jsou to arci právě rovnoběžnostěny.

kol kruhu  $ABCD$  opsaném; a válec jest menší než hranol postavený na čtverci kol kruhu  $ABCD$  opsaném; tedy hranol postavený na čtverci  $ABCD$ , stejně vysoký jako válec, jest větší než polovina válce<sup>14)</sup>. Rozpolmež oblouky  $AB$ ,  $BC$ ,  $CD$ .  $DA$  v bodech  $E$ ,  $F$ ,  $G$ ,  $H$  a vedme spojnice  $AE$ ,  $EB$ ,  $BF$ ,  $FC$ ,  $CG$ ,  $GD$ ,  $DH$ ,  $HA$ ; tedy též každý z trojúhelníkův  $AEB$ ,  $BFC$ ,  $CGD$ ,  $DHA$  jest větší než polovina příslušné úseče kruhu  $ABCD$ , jak jsme svrchu (XII. ii.) dokazovali. Postavme na  $\triangle AEB$ ,  $BFC$ ,  $CGD$ ,  $DHA$  hranoly stejné výšky jako válec; tedy též každý z postavených hranolů jest větší než polovina příslušného úseku válcového, ježto právě, když body  $E$ ,  $F$ ,  $G$ ,  $H$  vedeme rovnoběžky k  $AB$ ,  $BC$ ,  $CD$ ,  $DA$  a doplníme na  $AB$ ,  $BC$ ,  $CD$ ,  $DA$  rovnoběžníky a na nich postavíme rovnoběžnostěny stejné s válcem výšky, polovinou každého z nich jsou hranoly na  $\triangle AEB$ ,  $BFC$ ,  $CGD$ ,  $DHA$ ; a úseky válcové jsou menší než postavené rovnoběžnostěny; a tak i hranoly na  $AEB$ ,  $BFC$ ,  $CGD$ ,  $DHA$  jsou větší než poloviny příslušných úseků válcových. Rozpolujíce tedy zbývající oblouky a vodíce spojnice a na každém z trojúhelníkův stavějíc hranoly stejně vysoké, jako jest válec, a to stále činic, ostavíme nějaké úseky válcové, jež budou menší než rozdíl válce a trojnásobného kužele. Ostavmež, a buďte to ty, které jsou na  $AE$ ,  $EB$ ,  $BF$ ,  $FC$ ,  $CG$ ,  $GD$ ,  $DH$ ,  $HA$ <sup>15)</sup>; zbývající tedy hranol, jehož základnou mnohoúhelník  $AEBFCGDH$  a výška též jako válce, jest větší než trojnásobný kužel. Avšak hranol, jehož základnou mnohoúhelník  $AEBFCGDH$  a výška též jako válce, je třikrát větší než jehlan, jehož základnou mnohoúhelník  $AEBFCGDH$  a temeno totéž jako kužele (XII. vii. důsl.); pročež i jehlan, jehož základnou mnohoúhelník  $AEBFCGDH$  a temeno totéž jako kužele, jest větší než kužel, jemuž základnou kruh  $ABCD$ . Avšak i menší, neboť je v něm obsažen; což právě jest nemožné. Tedy válec není větší než trojnásobek kužele.

Pravím již, že válec není ani menší než trojnásobek kužele.

Nuže, možno-li, buď válec menší než trojnásobek kužele. Obráceně tedy kužel jest větší než třetina válce. Vpišme tedy do kruhu  $ABCD$  čtverec  $ABCD$ ; čtverec  $ABCD$  je tedy větší než polovina kruhu  $ABCD$ . A na čtverci  $ABCD$  postavme jehlan mající totéž temeno jako kužel; tož postavený jehlan jest větší než polovina kužele, jelikož právě, jak jsme svrchu dokazovali, když se kol kruhu opiše čtverec, bude čtverec  $ABCD$  polovinou čtverce kol kruhu opsaného; a když se na těch čtvercích postaví rovnoběžnostěny stejné výšky jako kužel, jež se zovou též hranoly<sup>16)</sup>, bude postavený na čtverci  $ABCD$  polovinou postaveného na čtverci opsaném kolem kruhu, neboť se mají k sobě jako základny (XI. xxxii.). Pročež tak tomu i s třetinami, tedy též jehlan, jemuž základnou čtverec  $ABCD$ , jest polovina jehlanu postaveného na čtverci kol kruhu opsaném. I jest jehlan postavený na čtverci kol kruhu opsaném větší než kužel, neboť ten jest v onom

<sup>14)</sup> Vnější hranol, větší patrně než válec, rovná se totiž dvojnásobnému hranolu vnitřnímu, tedy dva vnitřní jsou větší než válec, pročež jeden vnitřní jest větší než polovina válce.

<sup>15)</sup> Soudím, že m. řá  $AE$ ,  $EB$  — — třeba čísti  $\tau\acute{\alpha}$   $\epsilon\pi\iota$   $\tau\acute{\omega}\nu$   $AE$ ,  $EB$  — —, a dle toho jsem i přeložil.

<sup>16)</sup> Zde zajisté jsou to hranoly, jakož vůbec každý rovnoběžnostěn jest hranol, ale ovšem ne každý hranol rovnoběžnostěn.

obsažen. Pročež jehlan, jemuž základnou čtverec  $ABCD$  a temeno totéž jako kuželi, jest větší než polovina kužele (pozn. 2. 3.). Rozpolmež oblouky  $AB$ ,  $BC$ ,  $CD$ ,  $DA$  v bodech  $E$ ,  $F$ ,  $G$ ,  $H$  a vedme spojnice  $AE$ ,  $EB$ ,  $BF$ ,  $FC$ ,  $CG$ ,  $GD$ ,  $DH$ ,  $HA$ ; tedy též každý z trojúhelníkův  $AEB$ ,  $BFC$ ,  $CGD$ ,  $DHA$  jest větší než polovina příslušné úseče kruhu  $ABCD$ . A postavme na  $\triangle AEB$ ,  $BFC$ ,  $CGD$ ,  $DHA$  jehlany mající totéž temeno jako kužel; tedy též každý z postavených jehlanů z téhož důvodu větší jest než polovina příslušného úseku kuželového. Rozpolujce tedy zbývající oblouky a vodíce spojnice a stavějce na všech trojúhelnících jehlany, mající totéž temeno jako kužel, a to stále činíce ostavíme nějaké úseky kuželové, jež budou menší než rozdíl kužele a třetiny válce. Ostavmež, a buďte to ty, které jsou na  $AE$ ,  $EB$ ,  $BF$ ,  $FC$ ,  $CG$ ,  $GD$ ,  $DH$ ,  $HA$ ; tedy zbývající jehlan, jemuž základnou mnohoúhelník  $AEBFCGDH$  a temeno totéž jako kuželi, jest větší než třetina válce. Avšak jehlan, jemuž základnou mnohoúhelník  $AEBFCGDH$  a temeno totéž jako kuželi, je třetina hranolu, jenž má za základnu mnohoúhelník  $AEBFCGDH$  a touž výšku jako válec; pročež hranol, jemuž základnou mnohoúhelník  $AEBFCGDH$  a táž výška jako válci, jest větší než válec, jenž má za základnu kruh  $ABCD$ . Avšak i menší, neboť je v něm obsažen; což právě jest nemožné. Pročež válec není menší než trojnásobek kužele; tedy válec je trojnásobek kužele; a tak jest kužel třetina válce.

Tedy každý kužel je třetina válce, — —

#### XI.


Kužele a válce téže výšky mají se k sobě jako základny<sup>17)</sup>.

Touž výšku mějte kužele a válce, jimž jsou základnami kruhy  $ABCD$ ,  $EFGH$  a osami  $KL$ ,  $MN$ , a průměry základen  $AC$ ,  $EG$ ; pravím, že kužel  $AL:EN = ABCD:EFGH$ .

Neboť, není-li tomu tak, bude se míti kruh  $ABCD$  k  $EFGH$  jako kužel  $AL$  buď k nějakému tělesu menšímu než  $EN$  nebo k většímu.

Měj se dříve jako k menšímu  $O$ , a budiž  $EN - O = Y$ ; pročež  $EN = O + Y$ . Vpišme do kruhu  $EFGH$  čtverec  $EFGH$ ; tedy čtverec jest větší než polovina kruhu (XII. II. pozn. 2. 3.). Postavme na čtverci  $EFGH$  jehlan stejné s kuželem výšky; tedy postavený jehlan jest větší než polovina kužele, ježto právě, když kolem kruhu opišeme čtverec a na něm postavíme jehlan stejné s kuželem výšky, vepsaný jehlan jest polovinou opsaného, neboť se mají k sobě jako základny (XII. VI.); a

kužel jest menší než opsaný jehlan. Rozpolmež oblouky  $EF$ ,  $FG$ ,  $GH$ ,  $HE$  v bodech  $P$ ,  $Q$ ,  $R$ ,  $S$  a vedme spojnice  $HP$ ,  $PE$ ,  $EQ$ ,  $QF$ ,



<sup>17)</sup> T. j. kužele ke kuželům a válce k válcům.

$FR$ ,  $KG$ ,  $GS$ ,  $SH$ . [Každý tedy z trojúhelníkův  $HPE$ ,  $EQF$ ,  $FRG$ ,  $GSH$  jest větší než polovina příslušné úseče kruhové. Postavme na  $\triangle HPE$ ,  $EQF$ ,  $FRG$ ,  $GSH$  jehlany stejné výšky, jako má kužel; každý tedy z postavených jehlanů jest větší než polovina příslušného úseku kuželového. Rozpolujce zbývající oblouky a vodíce spojnice a stavějce na všech trojúhelnících jehlany téže výšky, jako má kužel, a to stále činíce ostavíme zajisté nějaké úseky kuželové, jež budou menší než těleso  $Y$ . Ostavmež, a buďte to ty, které jsou na  $HPE$ ,  $EQF$ ,  $FRG$ ,  $GSH$ ; pročež zbývající jehlan, jemuž základnou mnohoúhelník  $HPEQFRGS$  a výška táž jako kuželi, větší jest než těleso  $O$ . Vpišme též do kruhu  $ABCD$  mnohoúhelník  $DTAUBVCX$  mnohoúhelníku  $HPEQFRGS$  podobný a podobně položený a postavme na něm jehlan stejné výšky, jako má kužel  $AL$ . Ježto tedy  $AC^2:EG^2 = DTAUBVCX:HPEQFRGS$  a  $AC^2:EG^2 = \text{kruh } ABCD:EFGH$  (XII. II.); tedy též kruh  $ABCD:EFGH = DTAUBVCX:HPEQFRGS$ . Avšak kruh  $ABCD:EFGH = AL:O$ , a  $DTAUBVCX$  k  $HPEQFRGS$  jako jehlan, jehož základnou mnohoúhelník  $DTAUBVCX$  a temenem bod  $L$ , k jehlanu, jehož základnou  $HPEQFRGS$  a temenem bod  $N$ . Pročež i  $AL$  má se k  $O$  jako jehlan, jehož základnou  $DTAUBVCX$  a temenem  $L$ , k jehlanu, jehož základnou  $HPEQFRGS$  a temenem  $N$ ; tedy střídavě kužel  $AL$  k jehlanu v něm obsaženému jako těleso  $O$  k jehlanu v kuželi  $EN$ . Kužel  $AL$  však jest větší než jehlan v něm obsažený; pročež i těleso  $O$  jest větší než jehlan v kuželi  $EN$ . Avšak i menší; což právě jest nemožné. Tedy kruh  $ABCD$  nemá se ke kruhu  $EFGH$  jako kužel  $AL$  k nějakému tělesu menšímu než jest kužel  $EN$ . Podobně zajisté dokážeme, že ani se nemá kruh  $EFGH$  ke kruhu  $ABCD$  jako kužel  $EN$  k nějakému tělesu menšímu než jest  $AL$ .

Pravím již, že ani se nemá kruh  $ABCD$  k  $EFGH$  jako kužel  $AL$  k většímu nějakému tělesu než jest  $EN$ .

Nuže, možno-li, měj se jako k většímu  $O$ ; obráceně tedy kruh  $EFGH:ABCD = O:AL$ . Avšak  $O$  má se k  $AL$  jako  $EN$  k nějakému tělesu menšímu než jest  $AL$ <sup>18)</sup>; pročež také kruh  $EFGH$  k  $ABCD$  jako  $EN$  k nějakému tělesu menšímu než jest  $AL$ ; což právě bylo (svrchu) dokázáno nemožným. Tedy nemá se kruh  $ABCD$  k  $EFGH$  jako kužel  $AL$  k většímu nějakému tělesu než jest  $EN$ . Dokázáno pak bylo, že ani jako k menšímu; pročež kruh  $ABCD:EFGH = \text{kužel } AL:EN$ .

Avšak jako kužel ke kuželi, tak se má válec k válci; neboť tyto jsou každý třikrát větší než ony (XII. x.). Pročež jako kruh  $ABCD$  ke kruhu  $EFGH$ , tak se mají k sobě i válce stejně vysoké, postavené na nich.

Tedy kužele a válce téže výšky — —


#### XII.

Podobné kužele a válce<sup>17)</sup> mají se k sobě jako krychle z průměrů základen.

<sup>18)</sup> Bylo totiž připuštěno, že  $O > EN$ ; tedy čtvrtý člen nutně jest menší než druhý (V. XIV.).

Mějme podobné kužele a válce, jejichž základnami kruhy  $ABCD$ ,  $EFGH$  a průměry základů  $BD$ ,  $FH$ , osami pak kuželů i válců  $KL$ ,  $MN$ ; pravím, že kužel, jehož základnou kruh  $ABCD$  a temenem bod  $L$ , má se ke kuželi, jehož základnou  $EFGH$  a temenem  $N$ , jako  $BD^3$  k  $FH^3$ .

Neboť, nemá-li se  $ABCDL : EFGHN = BD^3 : FH^3$ , bude se míti, jako  $BD^3$  k  $FH^3$ , tak kužel  $ABCDL$  buďto k menšímu nějakému tělesu, než jest  $EFGHN$ , nebo k většímu. Měj se dříve k menšímu  $O$ , a vpišme do kruhu  $EFGH$  čtverec  $EFGH$ ; tedy čtverec  $EFGH$  jest větší než polovina kruhu  $EFGH$  (pozn. 2. 3.). A postavme na čtverci  $EFGH$  jehlan, mající s kuželem totéž temeno; tož jest postavený jehlan větší než polovina kužele (XII. x. v II. části). Rozpolme již oblouky  $EF$ ,  $FG$ ,  $GH$ ,  $HE$  v bodech  $P$ ,  $Q$ ,  $R$ ,  $S$  a vedme spojnice



$EP$ ,  $PF$ ,  $FQ$ ,  $QG$ ,  $GR$ ,  $RH$ ,  $HS$ ,  $SE$ . Tedy též každý z trojúhelníkův  $EPF$ ,  $FQG$ ,  $GRH$ ,  $HSE$  jest větší než polovina příslušné úseče kruhu  $EFGH$ . I postavme na  $\triangle EPF$ ,  $FQG$ ,  $GRH$ ,  $HSE$  jehlany téže výšky jako kužel; pročež i každý z postavených jehlanů větší jest než polovina příslušného úseku kuželového. Rozpolující tedy zbývající oblouky a vodíce spojnice a stavějíce na trojúhelnících jehlany téže výšky jako kužel a to stále činíce ostavíme nějaké úseky kuželové, jež budou menší než rozdíl kužele  $EFGHN$  a tělesa  $O$ .

Ostavmež, a buďte to ty, které jsou na  $EP$ ,  $PF$ ,  $FQ$ ,  $QG$ ,  $GR$ ,  $RH$ ,  $HS$ ,  $SE$ ; pročež zbývající jehlan, jehož základnou mnohoúhelník  $EPFQGRHS$  a temenem bod  $N$ , větší jest než těleso  $O$ . Vpišme také do kruhu  $ABCD$  mnohoúhelník  $ATBUCVDX$  podobný mnohoúhelníku  $EPFQGRHS$  a podobně položený a postavme na mnohoúhelníku  $ATBUCVDX$  jehlan, mající totéž temeno jako kužel, a jedním z trojúhelníkův omezujících jehlan, jehož základnou  $ATBUCVDX$  a temenem bod  $L$ , buďž  $LBT$ , z těch pak trojúhelníků, jež omezují jehlan, jehož základnou  $EPFQGRHS$  a temenem  $N$ , jedním buď  $NFP$ , a vedme spojnice  $KT$ ,  $MP$ . A ježto kužel  $ABCDL \sim EFGHN$ , tedy  $BD : FH = \text{osa } KL : MN$  (XI. vým. 24.) A  $BD : FH = BK : FM$ ; pročež i  $BK : FM = KL : MN$ . Také střídavě  $BK : KL = FM : MN$ . Také strany při stejných úhlech  $BKL$ ,  $FMN$  jsou úměrné; tedy  $\triangle BKL \sim \triangle FMN$  (VI. VI.). Ježto dále  $BK : KT = FM : MP$  a při stejných úhlech  $BKT$ ,  $FMP$  (ježto právě, jakým dílem jest  $\triangle BKT$  čtyř pravých kolem středu  $K$ , týmž dílem jest i  $\triangle FMP$  čtyř pravých kolem středu  $M$ ), ježto tedy při stejných úhlech strany jsou úměrné, tedy  $\triangle BKT \sim \triangle FMP$ . Dále, ježto bylo dokázáno, že  $BK : KL = FM : MN$  a  $BK = KT$ ,  $FM = MP$ , tedy  $TK : KL = PM : MN$ . A při stejných úhlech  $TKL$ ,  $PMN$  (neboť jsou právě)<sup>19)</sup> strany jsou úměrné; pročež  $\triangle LKT \sim \triangle NMP$ . A ježto pro podobnost trojúhelníkův  $LKB$ ,  $NMF$   $LB : BK = NF : FM$

a pro podobnost  $\triangle BKT$ ,  $FMP$ ,  $KB : BT = MF : FP$ , proto stejnořadně  $LB : BT = NF : FP$ . Dále, ježto pro podobnost  $\triangle LTK$ ,  $NPM$   $LT : TK = NP : PM$  a pro podobnost  $\triangle TKB$ ,  $PMF$   $KT : TB = MP : PF$ , tedy stejnořadně  $LT : TB = NP : PF$ . Bylo však dokázáno, že i  $TB : BL = PF : FN$ . Pročež stejnořadně  $TL : LB = PN : NF$ . Tedy v  $\triangle LTB$ ,  $NPF$  jsou strany úměrné; pročež  $\triangle LTB$ ,  $NPF$  jsou stejnoúhlé, a tím i podobné. Tedy též jehlan, jehož základnou  $\triangle BKT$  a temenem bod  $L$ , jest podoben jehlanu, jehož základnou  $\triangle FMP$  a temenem  $N$ ; neboť je omezují roviny podobné a počtem stejné (XI. vým. 9). Podobné však jehlany, mající za základny trojúhelníky, mají se k sobě jako krychle ze stejnoúhlých stran (XII. VIII.). Pročež jehlan  $BKTL : FMPN = BK^3 : FM^3$ . Podobně zajisté, spojující  $A$ ,  $X$ ,  $D$ ,  $V$ ,  $C$ ,  $U$  s  $K$  a  $E$ ,  $S$ ,  $H$ ,  $R$ ,  $G$ ,  $Q$  s  $M$  a stavíce na trojúhelnících jehlany, mající též temena jako kužele, dokážeme, že i každý ze stejnoúhlých jehlanů má se ke každému z jehlanů stejnoúhlých jako krychle ze stejnoúhlých stran  $BK^3$  k  $FM^3$ , t. j.  $BD^3$  k  $FH^3$ . A jako přední člen k zadnímu, tak se má součet předních k součtu zadních (V. XII.). Pročež také, jako se má jehlan  $BKTL$  k  $FMPN$ , tak celý jehlan, jehož základnou  $ATBUCVDX$  a temenem  $L$ , k celému jehlanu, jehož základnou  $EPFQGRHS$  a temenem  $N$ ; a tak i jehlan, jehož základnou  $ATBUCVDX$  a temenem  $L$ , má se k jehlanu, jehož základnou  $EPFQGRHS$  a temenem  $N$ , jako  $BD^3$  k  $FH^3$ . Připustili jsme však, že i kužel, jehož základnou kruh  $ABCD$  a temenem  $L$ , má se k tělesu  $O$  jako  $BD^3$  k  $FH^3$ ; tedy kužel, jehož základnou kruh  $ABCD$  a temenem  $L$ , má se k tělesu  $O$  jako jehlan, jehož základnou  $ATBUCVDX$  a temenem  $L$ , k jehlanu, jehož základnou  $EPFQGRHS$  a temenem  $N$ ; pročež střídavě kužel, jehož základnou kruh  $ABCD$  a temenem  $L$ , k jehlanu v něm obsaženému, jehož základnou  $ATBUCVDX$  a temenem  $L$ , jako  $O$  k jehlanu, jehož základnou  $EPFQGRHS$  a temenem  $N$ . Řečený však kužel jest větší než příslušný jehlan, neboť je v něm obsažen; proto větší jest i těleso  $O$  než jehlan, jehož základnou  $EPFQGRHS$  a temenem  $N$ . Avšak i menší; což právě jest nemožné. Tedy kužel, jehož základnou kruh  $ABCD$  a temenem  $L$ , nemá se k žádnému tělesu menšímu, než jest kužel, jehož základnou kruh  $EFGH$  a temenem  $N$ , tak jako  $BD^3$  k  $FH^3$ . Podobně zajisté dokážeme, že nemá se ani kužel  $EFGHN$  k žádnému tělesu menšímu, než jest kužel  $ABCDL$ , tak jako  $FH^3$  k  $BD^3$ .

Pravím již, že kužel  $ABCDL$  nemá se ani k žádnému většímu tělesu, než jest kužel  $EFGHN$ , jako  $BD^3$  k  $FH^3$ .

Nuže, možno-li, měj se k většímu  $O$ . Obráceně tedy  $O : ABCDL = FH^3 : BD^3$ . Jako však těleso  $O$  ke kuželi  $ABCDL$ , tak se má kužel  $EFGHN$  k nějakému tělesu menšímu než jest kužel  $ABCDL$  (pozn. 18.). Pročež i kužel  $EFGHN$  má se k nějakému tělesu menšímu, než jest  $ABCDL$ , jako  $FH^3$  k  $BD^3$ ; což právě se ukázalo nemožným. Tedy nemá se kužel  $ABCDL$  k žádnému většímu tělesu, než jest  $EFGHN$ , tak jako  $BD^3$  k  $FH^3$ . Bylo pak dokázáno, že ani k menšímu. Pročež  $ABCDL : EFGHN = BD^3 : FH^3$ .

<sup>19)</sup> Míni se tedy kužele kolmé.

Avšak jako kužel ke kuželi, tak se má válec k válci; neboť válec na téže základně jako kužel a stejně vysoký je třikrát větší než kužel. Proto též válec má se k válci jako  $BD^3$  k  $FH^3$ .

Tedy podobné kužele a válce — —

XIII.

Když se protne válec rovinou, s rovinami protějšími rovnoběžnou, bude se míti válec k válci jako osa k ose.

Nuže protněme válec  $AD$  rovinou  $GH$ , s protějšími rovinami  $AB$ ,  $CD$  rovnoběžnou, a rovina  $GH$  sбиhej se v bodě  $K$  s osou; pravím, že válec  $BG:GD = \text{osa } EK:KF$ .

Nuže prodlužmež osu  $EF$  na obě strany do bodů  $L$ ,  $M$ , a budiž  $EK = EN = NL$  (jakýkoli počet) a  $FK = FO = OM$  (jakýkoli počet), a myslíme si na ose  $LM$  válec  $PX$ , jehož základnami jsou kruhy  $PQ$ ,  $VX$ . A proložme body  $N$ ,  $O$  roviny rovnoběžné s  $AB$ ,  $CD$  i se základnami válce  $PX$ , a vznikne tím kruhy  $RS$ ,  $TU$  kolem středů  $N$ ,  $O$ . A ježto osy  $LN$ ,  $NE$ ,  $EK$  jsou stejné, tedy válce  $QR$ ,  $RB$ ,  $BG$  mají se k sobě jako základny (XII. xi)<sup>19</sup>). Základny však jsou stejné; pročež i válce  $QR$ ,  $RB$ ,  $BG$  jsou si rovny. Ježto tedy osy  $LN$ ,  $NE$ ,  $EK$  jsou stejné a též válce  $QR$ ,  $RB$ ,  $BG$  jsou si rovny a počet roven počtu, tedy kolikrát větší jest osa  $KL$  než  $EK$ , tolikrát i válec  $QG$  bude větší než  $GB$ . Z téže příčiny ovšem i kolikrát větší jest osa  $MK$  než  $KF$ , tolikrát větší jest i válec  $XG$  než  $GD$ . A jest-li  $KL = KM$ , bude též  $QG = GX$ , pakli osa osy větší, větší též válec válce, pakli menší, menší. Když jsou tedy čtyři veličiny, osy  $EK$ ,  $KF$  a válce  $BG$ ,

$GD$ , osa  $LK$  a válec  $QG$  jsou vzaty za stejné násobky osy  $EK$  a válce  $BG$ , osa pak  $KM$  a válec  $GX$  za stejné násobky osy  $KF$  a válce  $GD$ , a dokázáno jest, když osa  $KL > KM$ , že též válec  $QG > GX$ , a když osy stejné, stejné i válce, a když menší, menší<sup>20</sup>).



Tedy válec  $BG:GD = \text{osa } EK:KF$ ; což právě bylo dokázati.

XIV.

Kužele a válce na stejných základnách mají se k sobě jako výšky<sup>17</sup>).

Nuže buďte válce (kolmé)  $EB$ ,  $FD$  na stejných základnách, totiž na kruzích  $AB$ ,  $CD$ ; pravím, že  $EB:FD = GH:KL$ .

Nuže prodlužmež osu  $KL$  do bodu  $N$  a budiž  $LN = GH$ , a kolem osy  $LN$  myslíme si válec  $CM$ . Ježto tedy válce  $EB$ ,  $CM$  mají touž výšku, mají se k sobě jako základny



<sup>20</sup>) Rozuměj, že stejným poměrem.

(XII. xi). Základny však jsou stejné; pročež stejné jsou i válce  $EB$ ,  $CM$ . A ježto válec  $FM$  protat jest rovinou  $CD$ , s rovinami protějšími rovnoběžnou, válec  $CM:FD = \text{osa } LN:KL$  (XII. xiii.). Avšak válec  $CM = EB$  a osa  $LN = GH$ ; tedy válec  $EB:FD = \text{osa } GH:KL$ . Jako však se má válec  $EB$  k  $FD$ , tak kužel  $ABG$  k  $CDK$  (XII. x.). Pročež  $ABG:CDK = GH:KL = EB:FD$ ; což právě bylo dokázati.

XV.

Ve stejných kuželech a válcích základny mají se k sobě obráceným poměrem výšek; a ve kterých kuželech a válcích mají se k sobě základny obráceným poměrem výšek, ty jsou stejné.

Mějme stejné (obsahem) kužele a válce, jejichž základnami jsou kruhy  $ABCD$ ,  $FFGH$ , průměry pak jejich  $AC$ ,  $EG$  a osami  $KL$ ,  $MN^*$ ), jež jsou také výškami kuželů nebo válců, a doplňme válce  $AO$ ,  $EP$ ; pravím, že ve válcích  $AO$ ,  $EP$  základny mají se k sobě obráceným poměrem výšek, a to  $ABCD: EFGH = MN:KL$ .

Výška  $LK$  je zajisté s výškou  $MN$  buď stejná nebo nikoli. Budiž dříve stejná. Je však i válec  $AO = EP$ . A kužele i válce stejné výšky mají se k sobě jako základny; tedy též základna  $ABCD = EFGH$ . A tak jsou k sobě také v poměru obráceném,  $ABCD: EFGH = MN:KL$ .

Avšak již nebuď výška  $LK$  stejná s  $MN$ , nýbrž větší buď  $MN$ , a od výšky  $MN$  odřízneme  $QN$  stejnou s  $KL$  a v bodě  $Q$  protněme válec  $EP$  rovinou  $TUS^21)$  rovnoběžnou s rovinami kruhovými  $EFGH$ ,  $RP$ , a na základně  $EFGH$  do výšky  $NQ$  myslíme si válec  $ES$ . A ježto válec  $AO = EP$ , tedy  $AO:ES = EP:ES$ . Avšak  $AO:ES = ABCD:EFGH$ , neboť válce  $AO$ ,  $ES$  mají touž výšku (XII. xi.). A  $EP:ES = MN:QN$ , neboť válec  $EP$  jest protat rovinou rovnoběžnou s rovinami protějšími (XII. xiii.). Pročež  $ABCD:EFGH = MN:QN$ . Avšak  $QN = KL$ ; tedy  $ABCD:EFGH = MN:KL$ . Tedy ve válcích  $AO$ ,  $EP$  základny mají se k sobě obráceným poměrem výšek.

Avšak mějte se již základny válců k sobě obráceným poměrem výšek, takže  $ABCD:EFGH = MN:KL$ ; pravím, že válec  $AO = EP$ .


Neboť, vykonáme-li touž úpravu, ježto  $ABCD:EFGH = MN:KL$  a  $KL = QN$ , tedy  $ABCD:EFGH = MN:NQ$ . Avšak  $ABCD:EFGH = \text{válec } AO:ES$ , neboť mají touž výšku; a výška  $MN:QN = \text{válec } EP:ES$ ; pročež  $AO:ES = EP:ES$ . Tedy  $AO = EP$  (V. ix.). A právě tak tomu i s kuželi; což právě bylo dokázati.

XVI.

Dány-li dva kruhy kolem téhož středu (soustředné),

<sup>\*)</sup> Střed kruhu  $EFGH$  označ  $N$ , což nedopatřením vpuštěno.

<sup>21)</sup> Písmě  $T$  u Heiberga v obrazci vynecháno; doplnil jsem.






vpiš do kruhu větší mnohoúhelník stejnostranný i sudostranný, aby se nedotýkal kruhu menšího.

Danými dvěma kruhy kolem téhož středu  $K$  buďtež  $ABCD$ ,  $EFGH$ ; má se tedy do většího kruhu  $ABCD$  vepsati mnohoúhelník stejnostranný i sudostranný, aby se nedotýkal kruhu  $EFGH$ .


Nuže veďme středem  $K$  přímkou  $BKD$  a v bodě  $G$  vztyčme na  $BD$  kolmici  $GA$  a prodlužme ji do  $C$ ; tedy  $AC$  dotýká se kruhu  $EFGH$  (III. xvi. důsl.). Rozpolujíce tedy oblouk  $ABD$  i polovinu jeho a to stále činicí ostavíme oblouk menší než  $AD$ . Ostavmež, a buďiž to  $LD$ , a z  $L$  spusťme na  $BD$  kolmici  $LM$  a prodlužme ji do  $N$  a veďme spojnice  $LD$ ,  $DN$ ; tu jest  $LD = DN$  (III. III.). A ježto  $LN \parallel AC$ ,  $AC$  pak dotýká se kruhu  $EFGH$ , tedy  $LN$  kruhu  $EFGH$  se nedotýká; pročez mnohem více  $LD$ ,  $DN$  kruhu  $EFGH$  se nedotýkají. Když tedy zapustíme do kruhu  $ABCD$  spojitou řadou přímký stejné s  $LD$ , vepsán bude do kruhu  $ABCD$  mnohoúhelník stejnostranný i sudostranný, tak aby se nedotýkal menšího kruhu  $EFGH$ ; což právě bylo vykonati.



## XVII.

Dány-li dvě koule soustředné, vpiš do větší koule mnohostěn, aby se povrchu menší koule nedotýkal\*.)

Mysleme si dvě koule kolem téhož středu  $A$ ; má se tedy vepsati do větší koule mnohostěn, aby se povrchu menší koule nedotýkal.



Protněme koule středem nějakou rovinou; řezy zajisté budou kruhy, ježto právě tím, že průměr zůstával pevný a polokruh se otáčel, vznikala koule (XI. vým. 14.); a tak také, v jakékoli poloze si pomyslíme polokruh, rovina jím vedená bude činiti kruh. I jest na jevě, že také největší, ježto právě průměr kulový, kterýžto průměr, jak patrnó, náleží i polokruhu i kruhu, jest větší než jakékoli přímký do kruhu nebo koule zapuštěné. Mějme tedy ve větší kouli kruh  $BCDE$ , v menší pak kouli kruh  $FGH$ , a veďme v nich dva průměry na sobě

\*.) V obr. dole v levo od  $C$  m.  $A$  buďiž označení  $A'$ .

kolmé  $BD$ ,  $CE$ , a majíce dva kruhy soustředné  $BCDE$ ,  $FGH$  vpišme do kruhu většího  $BCDE$  mnohoúhelník stejnostranný i sudostranný, aby se nedotýkal menšího kruhu  $FGH$ , a stranami jeho ve čtverníku  $BE$  buďte  $BK$ ,  $KL$ ,  $LM$ ,  $ME$ , a spojnicí  $KA$  prodlužme do  $N$  a vztyčme v bodě  $A$  na rovině kruhu  $BCDE$  kolmici  $AO$ , a ta stýkej se s povrchem kulovým v  $O$ , a přímkami  $(AO)$ ,  $BD$ ,  $KN$  proložme roviny; budou zajisté z důvodu řečeného činiti na povrchu koule největší kruhy. Čiňtež, a polokruhy jejich na průměrech  $BD$ ,  $KN$  buďtež  $BOD$ ,  $KON$ . A ježto  $AO$  jest na rovině kruhu  $BCDE$  kolmo, tedy také všechny roviny kolmici  $OA$  proložené jsou kolmo na rovině kruhu  $BCDE$ ; a tak i polokruhy  $BOD$ ,  $KON$  jsou na rovině kruhu  $BCDE$  kolmo. A ježto polokruhy  $BED$ ,  $BOD$ ,  $KON$  jsou stejné (mají totiž stejné průměry  $BD$ ,  $KN$ ), také čtverníky  $BE$ ,  $BO$ ,  $KO$  jsou stejné. Kolik tedy je stran mnohoúhelníku ve čtverníku  $BE$ , tolik i ve čtverníku  $BO$  i v  $KO$  stejných s  $BK$ ,  $KL$ ,  $LM$ ,  $ME$ . Vpišme je, a buďte to  $BP$ ,  $PQ$ ,  $QR$ ,  $RO$ ,  $KS$ ,  $ST$ ,  $TU$ ,  $UO$ , a veďme spojnice  $SP$ ,  $TQ$ ,  $UR$  a z bodů  $P$ ,  $S$  na rovinu kruhu  $BCDE$  spusťme kolmice; dopadnou zajisté na společné průseky rovin  $BD$ ,  $KN$ , ježto právě též roviny  $BED$ ,  $KON$  jsou kolmo na rovině kruhu  $BCDE$ . Dopadejtež, a buďte to  $PV$ ,  $SX$ , a veďme spojnicí  $XV$ . A ježto v stejných polokruzích  $BOD$ ,  $KON$  odříznuty stejné tětivy  $BP$ ,  $KS$  a spusťeny kolmice  $PV$ ,  $SX$ , tedy  $PV = SX$  a  $BV = KX$ <sup>22)</sup>. Také však celá  $BA = KA$ ; pročez i zbývající  $VA = XA$ . Tedy  $BV : VA = KX : XA$ ; pročez  $XV \parallel KB$ . A ježto  $PV$  i  $SX$  jsou na rovině kruhu  $BCDE$  kolmo, jest  $PV \parallel SX$ . Bylo však dokázáno, že jsou i stejné; tedy  $XV$ ,  $SP$  jsou i stejné i rovnoběžné (I. xxxiii.). A ježto  $XV \parallel SP$ , avšak  $XV \parallel KB$ , tedy též  $SP \parallel KB$ . A protínají je  $BP$ ,  $KS$ ; pročez čtyřúhelník (čtyřstran)  $KBPS$  jest v jedné rovině, jelikož právě, když jsou dvě přímký rovnoběžné a na obou se vytknou nahodilé body, spojnice těch bodů jest v téže rovině jako rovnoběžky (XI. vii.). Z téže příčiny ovšem i čtyřúhelníky  $SPQT$ ,  $TQRU$  jsou každý v jedné rovině; jest pak v jedné rovině i  $\triangle URO$ . Když si tedy pomyslíme z bodů  $P$ ,  $S$ ,  $Q$ ,  $T$ ,  $R$ ,  $U$  do  $A$  vedené spojnice, sestaven bude jakýsi útvar mnohostěnný mezi oblouky  $BO$ ,  $KO$ , složený z jehlanů, jejichž základnami jsou čtyřúhelníky  $KBPS$ ,  $SPQT$ ,  $TQRU$  a  $\triangle URO$ , temenem pak bod  $A$ . Když pak také na každé z přímek  $KL$ ,  $LM$ ,  $ME$  jako právě na  $BK$  upravíme totéž a rovněž na ostatních třech čtvernicích, sestaven bude jakýsi útvar mnohostěnný, vepsaný do koule, složený z jehlanů, jejichž základnami jsou řečené čtyřúhelníky a  $\triangle URO$  i útvary stejno-lehlé, temenem pak bod  $A$ .

Pravím, že řečený mnohostěn se nedotýká povrchu koule menší, na níž jest kruh  $FGH$ .

Veďme z bodu  $A$  na rovinu čtyřúhelníku  $KBPS$  kolmici  $AY$ , a stýkej se s rovinou v bodě  $Y$ , a veďme spojnicí  $YB$ ,  $YK$ . A ježto  $AY \perp KBPS$ , tedy též na všech přímkách s ní se stýkajících a jsoucích v rovině čtyřúhelníku jest kolmo. Pročez  $AY \perp BY$ ,  $AY \perp KY$ . A ježto  $AB = AK$ , též  $AB^2 = AK^2$ . A  $AB^2 = AY^2 + YB^2$ , neboť  $\angle Y$  jest

<sup>22)</sup> Neboť  $\triangle BPV \cong \triangle KSX$  (I. xxvi.).

pravý; a  $AK^2 = AY^2 + YK^2$ . Pročež  $AY^2 + YB^2 = AY^2 + YK^2$ . Odečteme společně  $AY^2$ ; tedy zbývající  $BY^2 = YK^2$ ; proto  $BY = YK$ . Podobně zajisté dokážeme, že také spojnice bodu  $Y$  s  $P, S$  jsou stejné s  $BY, YK$ . Tedy kruh rýsovaný ze středu  $Y$  a rozpětím  $YB$  neb  $YK$  zasáhne i body  $P, S$ , a čtyřúhelník  $KBPS$  bude v kruhu. A ježto  $KB > XV$  a  $XV = SP$ , tedy  $KB > SP$ . Avšak  $KB = KS = BP$ ; pročež i  $KS > SP, BP > SP$ . A ježto čtyřúhelník  $KBPS$  jest v kruhu a  $KB, BP, KS$  jsou stejné,  $PS$  však menší a  $BY$  jest poloměrem kruhu, tedy  $KB^2 > 2BY^2$ <sup>23)</sup>. Vedme z  $K$  na  $BV$  kolmici  $KV$ <sup>24)</sup>. A ježto  $BD < 2DV$  a  $BD : DV = BD \times BV : DV \times BV$ ; narýsujeme-li z  $BV$  čtverec a doplníme-li na  $VD$  rovnoběžník, tedy též  $DB \times BV < 2DV \times VB$ . A vedeme-li spojnici  $KD$ , jest  $DB \times BV = BK^2$ <sup>25)</sup> a  $DV \times VB = KV^2$ ; pročež  $KB^2 < 2KV^2$ . Avšak  $KB^2 > 2BY^2$ , tedy  $KV^2 > BY^2$ . A ježto  $BA = KA$ , tedy  $BA^2 = KA^2$ . A  $BA^2 = BY^2 + YA^2$  a  $KA^2 = KV^2 + VA^2$ ; pročež  $BY^2 + YA^2 = KV^2 + VA^2$ , z čehož  $KV^2 > BY^2$ ; tedy zbývající  $VA^2 < YA^2$ . Pročež  $AY > AV$ ; tedy o mnoho větší jest  $AY$  než  $AG$ . I dosahuje  $AY$  jedné základny mnohostěnu,  $AG$  pak povrchu menší koule; a tak mnohostěn povrchu menší koule nebude se dotýkati.

Dány-li tedy dvě koule soustředné, do větší koule jest vepsán mnohostěn, takže se nedotýká povrchu koule menší; což právě bylo vykonati.

#### Důsledek.

Když pak se vpiše i do jiné koule mnohostěn podobný mnohostěnu v kouli  $BCDE$ , mnohostěn v kouli  $BCDE$  má se k mnohostěnu v kouli druhé jako krychle z průměru koule  $BCDE$  ke krychli z průměru koule druhé. Neboť rozdělí-li se ta tělesa v jehlany stejného počtu a stejnohlé, budou to jehlany podobné. Podobné jehlany mají se k sobě jako krychle stejnohlých hran (XII. VIII. důsl.); tedy jehlan, jehož základnou čtyřúhelník  $KBPS$  a temenem bod  $A$ , má se k stejnohlému jehlanu v kouli druhé jako krychle stejnohlé hrany ke krychli hrany stejnohlé, t. j. jako krychle poloměru  $AB$  té koule, jejímž středem jest  $A$ , ke krychli poloměru koule druhé. Podobně i každý jehlan v kouli, jejímž středem jest  $A$ , ke každému stejnohlému jehlanu v kouli druhé bude se míti tak, jako  $AB^3$  ke krychli poloměru koule druhé. A jako se má jeden člen přední k jednomu zadnímu, tak součet předních k součtu zadních; a tak celý mnohostěn v kouli, jejímž středem  $A$ , bude se míti k celému mnohostěnu v kouli druhé jako  $AB^3$  ke krychli poloměru koule druhé, t. j. jako krychle průměru  $BD$  ke krychli průměru koule druhé; což právě bylo dokázati.

<sup>23)</sup>  $KB$  je totiž delší než strana s čtverce vepsaného; a  $s^2 = 2r^2$  (zde  $2BY^2$ ); tedy  $KB^2 > 2BY^2$ .

<sup>24)</sup> V orig.  $KQ$ , avšak dopadne právě do  $V$ ; dle toho všude dále opraveno.

<sup>25)</sup>  $BK^2 = KV^2 + BV^2$ ,  $KV^2 = BV \times VD$ ; tedy  $BK^2 = BV \times VD + BV^2 = BV(VD + BV) = BV \times BD$ .

#### XVIII.


Koule mají se k sobě jako krychle vlastních průměrů.

Mysleme si kulemi  $ABC, DEF$ , průměry pak jejich  $BC, EF$ ; pravím, že  $ABC : DEF = BC^3 : EF^3$ .

Neboť, nemá-li se  $ABC : DEF = BC^3 : EF^3$ , bude se tedy míti koule  $ABC$  buď k nějaké kouli menší, než jest  $DEF$ , nebo k větší tak, jako  $BC^3$  k  $EF^3$ . Měj se dříve k menší  $GHK$ , a mysleme si  $DEF$  soustřednou s  $GHK$  a vpišme do větší koule  $DEF$  mnohostěn, tak aby se nedotýkal povrchu menší koule  $GHK$  (XII. XVII.), a vpišme rovněž do koule  $ABC$  mnohostěn mnohostěnu v kouli  $DEF$  podobný; tedy mnohostěn v  $ABC$  má se k mnohostěnu v  $DEF$  jako  $BC^3$  k  $EF^3$  (XII. XVII. důsl.). Avšak i koule  $ABC : GHK = BC^3 : EF^3$ ; pročež má se koule  $ABC$  ku  $GHK$  jako mnohostěn v  $ABC$  k mnohostěnu v  $DEF$ ; střídavě tedy koule  $ABC$  ke svému mnohostěnu jako koule  $GHK$  k mnohostěnu v  $DEF$ . Koule  $ABC$  však jest větší než vepsaný mnohostěn; pročež i koule  $GHK$  jest větší než mnohostěn v  $DEF$ . Avšak i menší, neboť jest v něm obsažena. Tedy koule  $ABC$  nemá se ke kouli menší, než jest  $DEF$ , jako  $BC^3$  k  $EF^3$ . Podobně zajisté dokážeme, že ani koule  $DEF$  nemá se ke kouli menší, než jest  $ABC$ , jako  $EF^3$  k  $BC^3$ .

Pravím již, že koule  $ABC$  nemá se ani ke kouli větší, než jest  $DEF$ , jako  $BC^3$  k  $EF^3$ .

Nuže, možno-li, měj se k větší  $LMN$ ; obráceně tedy  $LMN : ABC = EF^3 : BC^3$ . Jako však  $LMN$  k  $ABC$ , tak se má koule  $DEF$  k nějaké menší kouli, než jest  $ABC$ , ježto právě  $LMN > DEF$  (viz XII. XI. pozn. 18.) [jakož bylo svrchu dokázáno]. Pročež také se má koule  $DEF$  k nějaké menší kouli, než jest  $ABC$ , jako  $EF^3$  k  $BC^3$ ; což právě dokázáno bylo nemožným. Proto koule  $ABC$  nemá se k žádné kouli větší, než jest  $DEF$ , jako  $BC^3$  k  $EF^3$ . Dokázáno však, že ani k menší. Tedy  $ABC : DEF = BC^3 : EF^3$ ; což právě bylo dokázati.




#### Knih třináctá.

##### I.

Když se rozdělí příčka poměrem krajním a středním, čtverec z větší úsečky, zvětšené o polovici celé, rovná se pateronásobnému čtverci z polovice.

Nuže buď přímka  $AB$  rozdělena poměrem krajním a středním v bodě  $C$  a větší úsečkou buď  $AC$  a buď  $AC$  prodloužena v přímém směru o  $AD$  a buď  $AD = \frac{AB}{2}$ ; pravím, že



čtverec z  $CD = 5 DA^2$ .


Nuže sestrojme z  $AB$ ,  $DC$  čtverce  $AE$ ,  $DF$  a  $DF$  vylinkujeme a prodloužme  $FC$  do  $G$ . A ježto  $AB$  je v  $C$  rozdělena poměrem krajním a středním, jest  $AB \times BC = AC^2$ . I jest  $AB \times BC = CE$  a  $AC^2 = FH$ ; tedy  $CE = FH$ . A ježto  $BA = 2 AD$  a  $BA = KA$  a  $AD = AH$ , tedy též  $KA = 2 AH$ . Avšak  $KA : AH = CK : CH$ ; tedy  $Ch = 2 CH$ . Jest pak i  $LH + HC = 2 HC$  (I. XLIII.). Pročež  $KC = LH + HC$ . Dokázáno pak bylo, že také  $CE = HF$ ; tedy celý čtverec  $AE = MNO$ . A ježto  $BA = 2 AD$ , jest  $BA^2 = 4 AD^2$ , t. j.  $AE = 4 DH$ .

Avšak  $AE = MNO$ ; tedy též soudelník  $MNO = 4 DH$ . Tedy celý  $DF = 5 DH$  (n.  $AP$ ). I jest  $DF = DC^2$ ,  $AP$  pak  $= DA^2$ . Tedy  $CD^2 = 5 DA^2$ .

Když se tedy rozdělí přímka — —

## II.

Když je čtverec přímky pateronásobkem čtverce z úsečky její, rozdělí-li se řečená úsečka zdvojnásobena jsouc poměrem krajním a středním, větší úsečka (nová) je zbývající částí přímky počáteční.



Nuže buď  $AB^2 = 5 AC^2$  a  $CD = 2 AC$ ; pravím, že větší úsečkou přímky  $CD$ , když se rozděluje poměrem krajním a středním, jest  $BC$ .

Nuže narýsujeme z  $AB$  i z  $CD$  čtverec  $AE$ ,  $CG$  a vylinkujeme  $AF$  a vedme  $BE$ . A ježto  $BA^2 = 5 AC^2$ , jest  $AF = 5 AH$ . Tedy soudelník  $MNO = 4 AH$ . A ježto  $DC = 2 CA$ , tedy  $DC^2 = 4 CA^2$ , t. j.  $CG = 4 AH$ . Dokázáno pak bylo, že též soudelník  $MNO = 4 AH$ , tedy soudelník  $MNO = CG$ . A ježto  $DC = 2 CA$  a  $DC = CK$ ,  $AC = CH$ , tedy též  $KB = 2 BH$ . (VI. I.) Avšak též  $LH + HB = 2 BH$  (I. XLIII.), tedy  $KB = LH + HB$ . Bylo pak dokázáno, že též celý soudelník  $MNO$

je roven celému  $CG$ , tedy též zbývající  $HF = BG$ . I jest  $BG = CD \times DB$ , neboť  $CD = DG$ ; a  $HF = CB^2$ ; tedy  $CD \times DB = CB^2$ . Pročež  $DC : CB = CB : DB$ . Avšak  $DB > CB$ ; tedy také  $CB > BD$  (V. XIV.). Tedy větší úsečkou přímky  $CD$ , když se dělí poměrem krajním a středním, jest  $BC$ .

Výtěšek.<sup>1)</sup>

Je pak  $2 AC > BC$ , takto třeba dokázati.

Nuže, není-li tomu tak, budiž, možno-li,  $BC = 2 AC$ . Tedy  $BC^2 = 4 CA^2$ . Podmínkou však jest, že  $BA^2 = 5 CA^2$ ; tedy  $BA^2 = BC^2 + CA^2$ , což právě nemožno (II. IV.). Tedy není  $CB = 2 AC$ . Podobně ovšem dokážeme, že ani menší než  $CB$  není dvakrát větší než  $CA$ ; neboť to je mnohem nemožnější.


Tedy  $2 AC > BC$ ; což právě bylo dokázati.

## III.

Když se rozdělí přímka poměrem krajním a středním, čtverec menší úsečky zvětšené o polovici úsečky větší rovná se pateronásobnému čtverci z polovice úsečky větší.

Nuže rozdělme nějakou přímku  $AB$  v bodě  $C$  poměrem krajním a středním a větší úsečkou buď  $AC$  a buď  $AC$  v  $D$  rozpůlena; pravím že  $BD^2 = 5 DC^2$ .

Nuže narýsujeme z  $AB$  čtverec  $AE$  a dvojitě vylinkujeme. Ježto  $AC = 2 DC$ , tedy  $AC^2 = 4 DC^2$ , t. j.  $RS = 4 FG$ . A ježto  $AB \times BC = AC^2$  a  $AB \times BC = CE$ , tedy  $CE = RS$ . Avšak  $RS = 4 FG$ , tedy též  $CE = 4 FG$ . Ježto dále  $AD = DC$ , též  $HK = KF$ . Pročež také  $GF = HL$ . Tedy  $GK = KL$ , t. j.  $MN = NE$ , pročež také  $MF = FE$ . Avšak  $MF = CG$ , tedy též  $CG = FE$ . Společným přičteme  $CN$ ; tedy soudelník  $OPQ = CE$ . Avšak dokázáno, že  $CE = 4 GF$ ; tedy též soudelník  $OPQ = 4 FG$ . Pročež  $OPQ + FG = 5 FG$ . Avšak  $OPQ + FG = DN$ . I jest  $DN = DB^2$  a  $FG = DC^2$ ; tedy  $DB^2 = 5 DC^2$ ; což právě bylo dokázati.




## IV.

Když se přímka rozdělí poměrem krajním a středním, součet čtverců z celé a z úsečky menší je třikrát větší nežli čtverec úsečky větší.

Mějme přímku  $AB$  a rozdělme ji poměrem krajním a středním v  $C$  a větší úsečkou buď  $AC$ ; pravím, že  $AB^2 + BC^2 = 3 CA^2$ .

Nuže narýsujeme z  $AB$  čtverec  $ADEB$  a útvar vylinkujeme.

<sup>1)</sup> Pochybného původu.




Ježto tedy  $AB$  jest rozdělena v  $C$  poměrem krajním a středním a větší úsečkou jest  $AC$ , tedy  $AB \times BC = AC^2$ . I jest  $AB \times BC = AK$ ,  $AC^2 = HG$ , tedy  $AK = HG$ . A ježto  $AF = FE$  (I. XLIII.), společným přičteme  $CK$ ; tedy celý  $AK$  rovná se celému  $CE$ ; tedy  $AK + CE = 2AK$ . Avšak  $AK + CE = LMN + CK$ ; tedy  $LMN + CK = 2AK$ . Avšak bylo zajiště dokázáno, že též  $AK = HG$ , tedy  $LMN + CK + HG = 3HG$ . I jest soudelník  $LMN + CK + HG = AE + CK$ , což právě jsou čtverce z  $AB$  a  $BC$ ,  $GH$  pak čtverec z  $AC$ . Tedy  $AB^2 + BC^2 = 3AC^2$ ; což právě bylo dokázati.

## V.

Když se přímka rozdělí poměrem krajním a středním a připojí se k ní rovná úsečce větší, celá přímka rozdělena jest poměrem krajním a středním, a větší úsečkou jest přímka počáteční.

Nuže buď přímka  $AB$  rozdělena poměrem krajním a středním v bodě  $C$  a větší úsečkou buď  $AC$  a buď  $AD = AC$ ; pravím, že přímka  $DB$  jest v  $A$  rozdělena poměrem krajním a středním a větší úsečkou že je přímka počáteční  $AB$ .



Nuže narýsujeme z  $AB$  čtverec  $AE$  a útvar vylinkujeme. A ježto  $AB$  je v  $C$  rozdělena poměrem krajním a středním, tedy jest  $AB \times BC = AC^2$ . I jest  $AB \times$

$BC = CE$ ,  $AC^2 = CH$ ; tedy  $CE = CH$ . Avšak  $CE = HE$  a  $CH = DH$ , tedy též  $DH = EH$ . Pročež celé  $DK = AE$ . I jest  $DK = BD \times DA$ , neboť  $AD = DL$ ;  $AE$  pak  $= AB^2$ ; tedy  $BD \times DA = AB^2$ . Pročež  $DB : BA = BA : AD$ . Avšak  $DB > BA$ , tedy též  $BA > AD$ .

Tedy  $DB$  jest v  $A$  rozdělena poměrem krajním a středním a větší úsečkou jest  $AB$ ; což právě bylo dokázati<sup>2)</sup>.

## VI.


Když se přímka změrná rozdělí poměrem krajním a středním, každá z úseček je nezměrná, nazývaná úsečnicí.

Přímkou změrnou buď  $AB$  a buď rozdělena v  $C$  poměrem krajním a středním, a větší úsečkou buď  $AC$ ; pravím, že  $AC$  i  $CB$  jest nezměrná, nazývaná úsečnicí.

Nuže prodlužme  $BA$  a buď  $AD = \frac{BA}{2}$ . Ježto tedy přímka  $AB$

<sup>2)</sup> Buď  $a = b + c$ , a též  $a : b = b : c$ ;  $b : a = (a - b) : b$ , z toho  $(b + a) : a = a : b$ .

rozdělena je v  $C$  poměrem krajním a středním a k úsečce větší  $AC$  připojena  $AD$ , jsouc  $\frac{AB}{2}$ , tedy  $CD^2 = 5DA^2$  (XIII. I.). Tedy  $CD^2$  má se k  $DA^2$  jako číslo k číslu; jest tedy  $CD^2$  s  $DA^2$  souměřitelné.  $DA^2$  však je změrné, neboť  $DA$  je změrná, jsouc polovicí změrné přímky  $AB$ , tedy též  $CD^2$  je změrné; pročež i  $CD$  je změrná (X. VI. a vým. 3. 4.). A ježto  $CD^2$  nemá se k  $DA^2$  jako číslo čtvereční k číslu čtverečnímu, tedy  $CD$  je s  $DA$  dle délky nesouměřitelná (X. IX.); pročež  $CD$ ,  $DA$  jsou změrné, jen dle dvojmoči souměřitelné. Tedy  $AC$  jest úsečnice (X. LXXIII.).



Dále, ježto  $AB$  je rozdělena poměrem krajním a středním a větší úsečkou jest  $AC$ , tedy  $AB \times BC = AC^2$ . Tedy čtverec úsečnice  $AC$  přistavený ke změrné  $AB$  šířkou činí  $BC$ . Čtverec úsečnice však, ke změrné přistavený, šířkou činí úsečnici první (X. XCVII.). Tedy  $CB$  jest úsečnice první. Bylo pak dokázáno, že též  $CA$  jest úsečnice.


Když se tedy přímka změrná rozdělí — — —

## VII.

Když jsou v stejnostranném pětiúhelníku tři úhly buď pořadem buď mimo pořad sobě rovny, pětiúhelník bude stejnoúhlý.

Nuže buďte v pětiúhelníku stejnostranném  $ABCDE$  nejprve pořadem tři úhly  $A$ ,  $B$ ,  $C$  sobě rovny; pravím, že pětiúhelník  $ABCDE$  je stejnoúhlý.

Nuže vedme spojnice  $AD$ ,  $BE$ ,  $FD$ . A ježto  $CB = BA = AE$  a  $\sphericalangle CBA = BAE$ , tedy základna  $AC = BE$  a  $\triangle ABC = ABE$  i ostatní úhly rovny budou úhlům ostatním, proti nimž leží stejné strany,  $\sphericalangle BCA = BEA$ ,  $\sphericalangle ABE = CAB$ , pročež i strana  $AF = BF$ . Bylo pak dokázáno, že též celá  $AC = BE$ ; tedy též zbývající  $FC = FE$ . Jest pak i  $CD = DE$ ; tedy  $FC$ ,  $CD$  jsou stejné s  $FE$ ,  $ED$  a základnou jejich společnou  $FD$ ; tedy  $\sphericalangle FCD = FED$ . Bylo pak dokázáno, že též  $\sphericalangle BCA = AEB$ , pročež i celý  $\sphericalangle BCD = AED$ . Avšak jest podmínkou, že  $\sphericalangle BCD = A = B$ ; tedy též  $\sphericalangle AED = A = B$ . Podobně ovšem dokážeme, že též  $\sphericalangle CDE = A$  i  $B$  i  $C$ ; tedy pětiúhelník  $ABCDE$  jest stejnoúhlý.



Avšak již nebudtež úhly po řadě stejné, nýbrž stejné buďte při bodech  $A$ ,  $C$ ,  $D$ ; pravím, že i takto pětiúhelník  $ABCDE$  je stejnoúhlý.


Nuže vedme spojnice  $BD$ . A ježto strany  $BA$ ,  $AE = BC$ ,  $CD$  a svírají stejné úhly, tedy základna  $BE = BD$  a  $\triangle ABE = BCD$ , i ostatní úhly rovny budou ostatním úhlům, proti nimž leží stejné strany; tedy  $\sphericalangle AEB = CDB$ . Jest pak i  $\sphericalangle BED = BDE$ , ježto i strana  $BE = BD$ . Pročež i celý  $\sphericalangle AED = CDE$ . Avšak jest podmínkou, že  $\sphericalangle CDE = A$ ,  $C$ ; tedy též  $\sphericalangle AED = A$ ,  $C$ . Z téže příčiny ovšem i  $\sphericalangle ABC = A$ ,

C, D. Tedy pětiúhelník  $ABCDE$  je stejnoúhlý; což právě bylo dokázati.

## VIII.

Když jsou v pětiúhelníku stejnostranném a stejnoúhlém proti dvěma sousedním úhlům úhlopříčky, protínají se navzájem poměrem krajním a středním, a větší jejich úsečky rovnají se stranám pětiúhelníku.

Nuže buďte v pětiúhelníku stejnostranném a stejnoúhlém po řadě proti dvěma úhlům  $A, B$  úhlopříčky  $AC, BE$  navzájem se protínající v bodě  $H$ ; pravím, že jedna i druhá rozdělena je v bodě  $H$  poměrem krajním a středním a větší jejich úsečky že se rovnají stranám pětiúhelníku.



Nuže opišme kolem pětiúhelníku  $ABCDE$  kruh  $ABCDE$ . A ježto dvě strany  $EA, AB$  rovnají se dvěma stranám  $AB, BC$  a svírají stejné úhly, tedy základna  $BE = AC$  a  $\triangle ABE = \triangle ABC$  i ostatní úhly budou jednotlivě rovny ostatním úhlům, proti nimž leží stejné strany. Tedy  $\sphericalangle BAC = \sphericalangle ABE$ ; pročež  $\sphericalangle AHE = 2BAH$ . Jest pak i  $\sphericalangle EAC =$

$2BAC$ , ježto zajisté i oblouk  $EDC = 2CB$ ; tedy  $\sphericalangle HAE = \sphericalangle AHE$ ; pročež i přímka  $HE = EA$ , t.  $AB$ . A ježto  $BA = AE$ , též  $\sphericalangle ABE = \sphericalangle AEB$ . Avšak dokázáno, že  $\sphericalangle ABE = \sphericalangle BAH$ ; tedy též  $\sphericalangle BEA = \sphericalangle BAH$ . A společným úhlem obou trojúhelníků  $ABE, ABH$  jest  $\sphericalangle ABE$ ; tedy zbývající  $\sphericalangle BAE = \sphericalangle AHB$ ; pročež  $\triangle ABE$  je s  $\triangle ABH$  stejnoúhlý: tedy  $EB : BA = AB : BH$ . Avšak  $BA = EH$ , tedy  $BE : EH = EH : HB$ .  $BE$  však  $> EH$ , tedy též  $EH > HB$ .  $BE$  tedy je rozdělena v  $H$  poměrem krajním a středním, a větší úsečka  $HE$  rovná se straně pětiúhelníku. Podobně ovšem dokážeme, že též  $AC$  je v  $H$  rozdělena poměrem krajním a středním a že větší úsečka její  $CH$  rovná se straně pětiúhelníku, což právě bylo dokázati.


## IX.

Když se sečtou strana šestiúhelníku a strana desetiúhelníku, do téhož kruhu vepsaných, celá přímka jest rozdělena poměrem krajním a středním a její úsečkou větší je strana šestiúhelníku.

Mějme kruh  $ABC$  a útvarů do kruhu  $ABC$  vepsaných, a to desetiúhelníku buď stranou  $BC$ , šestiúhelníku pak  $CD$ , a číňte přímku; pravím, že celá přímka  $BD$  je rozdělena poměrem krajním a středním a větší úsečkou její že je  $CD$ .

Nuže vezměme za střed kruhu bod  $E$  a vedme spojnice  $EB, EC, ED$  a prodlužme  $BE$  do  $A$ . Ježto stranou desetiúhelníku stejno-

stranného jest  $BC$ , tedy oblouk  $ACB$  je pětikrát větší než oblouk  $BC$ , pročež obl.  $AC = 4$  obl.  $CB$ . A jako se má obl.  $AC$  k obl.  $CB$ , tak  $\sphericalangle AEC$  k  $\sphericalangle CEB$ ; tedy  $\sphericalangle AEC = 4 \sphericalangle CEB$ . A ježto  $\sphericalangle EBC = \sphericalangle ECB$ , tedy  $\sphericalangle AEC = 2 \sphericalangle ECB$ . A ježto  $EC = CD$ , neboť jedna i druhá z nich rovná se straně šestiúhelníku do kruhu  $ABC$  vepsaného; též  $\sphericalangle CED = \sphericalangle CDE$ . Tedy  $\sphericalangle ECB = 2 \sphericalangle EDC$ . Avšak dokázáno, že  $\sphericalangle AEC = 2 \sphericalangle ECB$ , tedy  $\sphericalangle AEC = 4 \sphericalangle EDC$ . Dokázáno pak, že též  $\sphericalangle AEC = 4 \sphericalangle BEC$ ; pročež  $\sphericalangle EDC = \sphericalangle BEC$ . Oběma však trojúhelníkům,  $BEC$  i  $BED$ , společný jest  $\sphericalangle EBD$ ; pročež i zbývající  $\sphericalangle BED = \sphericalangle ECB$ ; tedy  $\triangle EBD$  je s  $\triangle EBC$  stejnoúhlý. Proto  $DB : BE = EB : BC$ . Avšak  $EB = CD$ . Pročež  $BD : DC = DC : CB$ . Avšak  $BD > DC$ ; tedy též  $DC > CB$ . Tedy přímka  $BD$  jest rozdělena poměrem krajním a středním, a větší úsečkou její jest  $DC$ ; což právě bylo dokázati.




## X.

Když se do kruhu vpiše pětiúhelník stejnostranný, čtverec strany toho pětiúhelníku rovná se čtvercům strany šestiúhelníku a desetiúhelníku, vepsaných do téhož kruhu.

Kruhem budiž  $ABCDE$ , a vpišme do kruhu  $ABCDE$  stejnostranný pětiúhelník  $ABCDE$ ; pravím, že čtverec strany pětiúhelníku  $ABCDE$  rovná se čtvercům strany šestiúhelníku a desetiúhelníku, vepsaných do kruhu  $ABCDE$ .

Nuže vezměme za střed kruhu bod  $F$  a prodlužme spojnicí  $AF$  do bodu  $G$  a vedme spojnicí  $FB$  a z  $F$  vedme na  $AB$  kolmici  $FH$  a prodlužme ji do  $K$  a vedme spojnicí  $AK, KB$  a opět vedme z bodu  $F$  na  $AK$  kolmici  $FL$  a prodlužme ji do  $M$  i spojme  $K$  s  $N$ . A ježto obl.  $ABCG = AEDG$ , z čehož  $ABC = AED$ , tedy zbývající obl.  $CG = GD$ .  $CD$  však náleží pětiúhelníku; pročež  $CG$  desetiúhelníku. A ježto  $FA = FB$  a  $FH$  jest kolmice, tedy též  $\sphericalangle AFK = \sphericalangle KFB$ . A tak i obl.  $AK = KB$ ; protož obl.  $AB = 2BK$ ; tedy přímka  $AK$  je strana desetiúhelníku. Z téže příčiny ovšem též obl.  $AK = 2KM$ . A ježto obl.  $AB = 2BK$  a obl.  $CD = AB$ , tedy též obl.  $CD = 2BK$ . Jest pak i obl.  $CD = 2CG$ ; pročež i obl.  $CG = BK$ . Avšak obl.  $BK = 2KM$ , ježto i  $KA$ <sup>3)</sup>; tedy  $CG = 2KM$ . Avšak zajisté i obl.  $CB = 2BK$ ,



<sup>3)</sup> Rozuměj: obl.  $KA = 2KM$ .

neboť obl.  $CB =$  obl.  $BA$ . Proto též celý obl.  $GB = 2 BM$ ; a tak i  $\sphericalangle GFB = 2 BFM$  (VI. xxxiii.). Také však  $\sphericalangle GFB = 2 FAB$ , neboť  $\sphericalangle FAB = ABF$ . Tedy též  $\sphericalangle BFN = FAB^4$ . Avšak  $\sphericalangle ABF$  je společný oběma  $\triangle ABF$  a  $\triangle BFN$ , tedy zbývající  $\sphericalangle AFB = BNF$ ; pročež  $\triangle ABF$  je s  $\triangle BFN$  stejnoúhlý. Tedy strana  $AB:BF = BF:BN$ ; pročež  $AB \times BN = BF^2$ . Dále, ježto  $AL = LK$ , společnou však jest kolmice  $LN$ , tedy základna  $KN = AN$ , pročež i  $\sphericalangle LKN = LAN$ . Avšak  $\sphericalangle LAN = KBN$ ; tedy též  $\sphericalangle LKN = KBN$ . A  $\sphericalangle A$  je společný trojúhelníkům  $AKB$ ,  $AKN$ . Zbývající tedy  $\sphericalangle AKB = KNA$ ; pročež trojúhelník  $KBA$  je s  $\triangle KNA$  stejnoúhlý. Tedy strana  $BA:AK = AK:AN$ . Proto  $BA \times AN = AK^2$ . Bylo však dokázáno, že též  $AB \times BN = BF^2$ ; tedy  $AB \times BN + BA \times AN = BA^2 = BF^2 + AK^2$  (II. II.). I jest  $BA$  strana pětiúhelníku,  $BF$  šestiúhelníku,  $AK$  desetiúhelníku.


Tedy čtverec strany pětiúhelníku — —

### XI.

Když se do kruhu, jehož průměr je změrný, vpiše stejnostranný pětiúhelník, strana toho pětiúhelníku jest nezměrná, řečená menší.

Nuže do kruhu  $ABCDE$ , jehož průměr je změrný, vpišme stejnostranný pětiúhelník  $ABCDE$ ; pravím, že strana toho pětiúhelníku jest nezměrná, řečená menší.

Nuže vezměme za střed kruhu bod  $F$  a vedme spojnice  $AF$ ,  $FB$  a prodlužme je do bodů  $G$ ,  $H^*$ ) a spojme  $A$  s  $C$ , a budiž  $FK = \frac{1}{2} AF$ .  $AF$  pak je změrná, pročež změrná jest i  $FK$ . Jest pak i  $BF$  změrná, pročež celá  $BK$  je změrná. A ježto obl.  $ACG = ADG$ , z čehož  $ABC = AED$ , tedy zbývající  $CG = GD$ . A když spojíme  $A$  s  $D$ , shledáváme, že úhly při  $L$  jsou pravé a  $CD = 2 CL$ . Z téže příčiny ovšem i úhly při  $M$  jsou pravé a  $AC = 2 CM$ . Ježto tedy  $\sphericalangle ALC = AMF$  a  $\sphericalangle LAC$  je společný trojúhelníkům  $AMF$ ,  $ACL$ , proto zbývající  $\sphericalangle ACL = MFA$ ; tedy  $\triangle ACL$  je s  $\triangle AMF$  stejnoúhlý; pročež  $LC:CA = MF:FA$ ; a vezmou-li se přední členy dvojnásobně,  $2 LC:CA = 2 MF:FA$ . Avšak  $2 MF:FA = MF:\frac{1}{2}FA$ ; pročež také  $2 LC:CA = MF:\frac{1}{2}FA$ . A vezme-li zadních členů polovinu, tedy  $2 LC:\frac{1}{2}CA = MF:\frac{1}{2}FA$ . I jest  $2 LC = DC$ ,  $\frac{1}{2}CA = CM$  a  $\frac{1}{2}FA = FK$ ; pročež  $DC:CM = MF:FK$ . Také součtně  $(DC + CM):CM = MK:FK$ ; tedy též  $(DC + CM)^2:CM^2 = MK^2:KF^2$ . A ježto větší úsečka úhlopříčky při sousedních stranách pětiúhelníku, jako jest  $AC$ , jest-li rozdělena poměrem krajním a středním, je stejná se stranou pětiúhelníku, t. j. s  $DC$  (XIII.



<sup>4)</sup> Neboť  $\sphericalangle BFN$  je též jako  $\sphericalangle BFM$ .

<sup>5)</sup> Styčný bod  $H$  tětiv  $AH$ ,  $BH$  má býti až na obvodě kruhu.

VIII.) a čtverec větší úsečky, zvětšené o polovinu celé, rovná se pateronásobnému čtverci z poloviny (XIII. I.) a polovinou celé  $AC$  jest  $CM$ , tedy  $(DC + CM)^2 = 5 CM^2$ . Avšak dokázáno bylo, že  $(DC + CM)^2:CM^2 = MK^2:KF^2$ ; proto  $MK^2 = 5 KF^2$ . A  $KF^2$  je změrné, neboť průměr je změrný; tedy změrné jest i  $MK^2$ ; pročež  $MK$  je změrná. A ježto  $BF = 4 FK$ , tedy  $BK = 5 KF$ ; pročež  $BK^2 = 25 KF^2$ . Avšak  $MK^2 = 5 KF^2$ ; tedy  $BK^2 = 5 KM^2$ ; proto nemá se  $BK^2$  ke  $KM^2$  jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému; tedy  $BK$  není s  $KM$  dle délky souměřitelná. A každá z nich je změrná. Pročež  $BK$ ,  $KM$  jsou změrné, jen ve dvojmoci souměřitelné. Když pak se od změrné odečte změrná, jen ve dvojmoci s celou souměřitelná, zbývající jest nezměrná, t. úsečnice; tedy  $MB$  jest úsečnice a příslušnou k ní  $MK$ . Pravím již, že také čtvrtá. Nuže, oč  $BK^2 > KM^2$ , tomu rovnaj se  $N^2$ ; pročež  $BK^2 = KM^2 + N^2$ . A ježto  $KF$  je s  $FB$  souměřitelná, také součtně  $KB$  jest souměřitelná s  $FB$ . Avšak  $BF$  jest souměřitelná s  $BH$ ; tedy též  $BK$  jest souměřitelná s  $BH$ . A ježto  $BK^2 = 5 KM^2$ , tedy  $BK^2:KM^2 = 5:1$ . Pročež zvrtně (V. vým. 16.)  $BK^2:N^2 = 5:4$ , nikoli jako čtvercové číslo k číslu čtvercovému; tedy  $BK$  je s  $N$  nesouměřitelná (X. ix.). Pročež  $BK^2 > KM^2$  o čtverec přímky s  $BK$  nesouměřitelné. Ježto tedy celá  $BK$  jest ve dvojmoci větší než příslušná  $KM$  o čtverec přímky s  $BK$  nesouměřitelné a celá  $BK$  jest souměřitelná s danou změrnou  $BH$ , tedy jest  $MB$  úsečnice čtvrtá (X. vým. třetích č. 4.). Pravoúhelník pak objímáný změrnou a úsečnicí čtvrtou jest nezměrný, a přímka ve dvojmoci jemu rovná jest nezměrná, i slove menší (X. xciv.). Avšak  $HB \times BM = AB^2$ , ježto vedením spojnice  $AH^5$ ) stává se  $\triangle ABH$  stejnoúhlým s  $\triangle ABM$  a  $HB:BA = AB:BM$ .


Tedy v pětiúhelníku strana  $AB$  jest nezměrná, řečená menší; což právě bylo dokázati.

### XII.

Když se vpiše do kruhu trojúhelník stejnostranný, čtverec strany tohoto trojúhelníku je třikrát větší nežli čtverec kruhového poloměru.

Kruhem budiž  $ABC$ , a do něho vpišme stejnostranný  $\triangle ABC$ ; pravím, že čtverec jedné strany trojúhelníku  $ABC$  je třikrát větší nežli čtverec poloměru kruhu  $ABC$ .

Nuže za střed kruhu  $ABC$  vezměme  $D$  a spojnici  $AD$  prodlužme do  $E$  a spojme  $B$  s  $E$ . A ježto  $\triangle ABC$  je stejnostranný, tedy obl.  $BEC$  je třetina obvodu kruhu  $ABC$ . Pročež obl.  $BE$  jest šestina kružnice; náleží tedy přímka  $BE$  šestiúhelníku, pročež je stejná s poloměrem  $DE$ . A ježto  $AE = 2 DE$ , jest  $AE^2 = 4 DE^2$ , t. j.  $4 BE^2$ . Avšak  $AE^2 = AB^2 + BE^2$ ; tedy  $AB^2 + BE^2 = 4 BE^2$ . Pročež odečtením  $AB^2 = 3 BE^2$ . Avšak  $BE = DE$ ; a tak  $AB^2 = 3 DE^2$ .



<sup>5)</sup> V obr. jsem přidal.

Tedy čtverec strany toho trojúhelníku rovná se trojnásobnému čtverci (kruhového) poloměru; což právě bylo dokázati.

## XIII.

Sestroj jehlan a opiš danou kulí a dokaž, že čtverec kulového průměru jest půldruhákrát větší nežli čtverec jehlanové strany (hrany).

Průměrem dané koule budiž  $AB$  a buď rozdělen v bodě  $C$  tak, aby bylo  $AC = 2CB$ ; a narýsujme na  $AB$  polokruh  $ADB$  a zřídme v bodě  $C$  na  $AB$  kolmici  $CD$  a vedme spojnicí  $DA$ ; mějme též kruh  $EFG$  poloměru stejného s  $DC$  a v pišme do kruhu  $EFG$  stejnostranný  $\triangle EFG$  a za střed kruhu vezměme  $H$  a vedme spojnice  $EH$ ,  $HF$ ,  $HG$ ; i vztýčme v bodě  $H$  na rovině kruhu  $EFG$  kolmici  $HK$  a odřízneme od  $HK$  úsečku  $HK$  stejnou s  $AC$  a vedme spojnice  $KE$ ,  $KF$ ,  $KG$ <sup>6)</sup>. A ježto  $HK$  jest na rovině kruhu  $EFG$  kolmo, tedy také se všemi přímkami s ní se stýkajícími a jsoucimi v rovině kruhu  $EFG$  bude činiti úhly pravé. Stýkají však se s ní  $HE$ ,  $HF$ ,  $HG$ ; pročež  $HK$  jest na  $HE$ ,  $HF$ ,  $HG$  kolmo. A ježto  $HK = AC$  a  $HE = CD$  a svírají pravé úhly, tedy základna  $KE = DA$ . Z téže příčiny ovšem i  $KF = DA$  i  $KG = DA$ ; tedy  $KE = KF = KG$ . A ježto  $AC = 2CB$ , tedy  $AB =$

$3BC$ . Avšak  $AB:BC = AD^2:DC^2$ , jakož ihned potom bude dokázáno (výť.). Pročež  $AD^2 = 3DC^2$ . Jest pak i  $FE^2 = 3EH^2$  (XIII. XII.) a  $DC = EH$ ; tedy  $DA = EF$ . Avšak bylo dokázáno, že  $DA = KE = KF = KG$ ; pročež  $EF$ ,  $FG$ ,  $GE$  jsou stejné s  $KE$ ,  $KF$ ,  $KG$ . Tedy čtyři trojúhelníky  $EFG$ ,  $KEF$ ,  $KFG$ ,  $KEG$  jsou stejnostranné. Pročež jehlan sestaven je ze čtyř stejnostranných trojúhelníkův a základnou jeho jest  $\triangle EFG$  a temenem bod  $K$ .

Má se ovšem též opsati danou kulí a dokázati, že čtverec kulového průměru jest půldruhákrát větší nežli čtverec strany jehlanové.

Nuže prodlužme přímkou  $KH$  přímým směrem, aby vznikla  $HL$ , a budiž  $HL = CB$ . A ježto  $AC:CD = CD:CB$  a  $AC = KH$ ,  $CD = HE$  a  $CB = HL$ , tedy  $KH:HE = EH:HL$ ; pročež  $KH \times HL = EH^2$ . A  $\sphericalangle KHE$  i  $\sphericalangle EHL$  jsou pravé; tedy polokruh rýsovaný na  $KL$  půjde i bodem  $E$  [ježto právě spojením  $E$  s  $L$  tvoří se pravý  $\sphericalangle LEK$  tím, že vzniká  $\triangle ELK$  s  $\triangle ELH$ ,  $\triangle EHK$  stejnoúhlý<sup>7)</sup>]. Když pak se kolem pevné osy  $KL$  polokruh otočí, až se opět vrátí do téhož postavení, odkud se počal otáčeti, bude procházeti i body  $F$ ,  $G$ , a spojnicemi  $FL$ ,  $LG$  podobně také vznikají při  $F$ ,  $G$  úhly pravé; i bude jehlan danou kulí opsán. Neboť průměr kulový  $KL$  je stejný s průměrem  $AB$  koule dané, ježto právě za pravdu vzato, že  $KH = AC$  a  $CB = HL$ .

<sup>6)</sup> Tuto část vyobr. učinil jsem trochu zřetelnější.

<sup>7)</sup> Slova v závorkách nejspíše cizí.


Pravím, již, že čtverec kulového průměru jest půldruhákrát větší nežli čtverec strany jehlanové.

Neboť, ježto  $AC = 2CB$ , tedy  $AB = 3BC$ ; pročež zvrtně  $BA = \frac{2}{3}AC$ . A  $BA:AC = BA^2:AD^2$  [ježto právě, spojíme-li  $D$  s  $B$ ,  $BA:AD = DA:AC$  pro podobnost  $\triangle DAB$  a  $\triangle DAC$  a proto, že první veličina má se ke třetí jako čtverec z první ke čtverci z druhé (V. vým. 9. pozn. 4.)<sup>7)</sup>]. Tedy též  $AB^2 = \frac{2}{3}AD^2$ <sup>8)</sup> A  $BA$  jest průměr dané koule,  $AD$  pak rovná se straně toho jehlanu.

Tedy čtverec průměru kulového jest půldruhákrát větší nežli čtverec strany jehlanové; což právě bylo dokázati.

## Výtěžek.


Má se dokázati, že  $AB:BC = AD^2:DC^2$ . Mějme nárys polokruhu a vedme spojnicí  $DB$  a sestrojme z  $AC$  čtverec  $EC$  a doplňme rovnoběžník  $FB$ . Ježto tedy proto, že  $\triangle DAB$  je stejnoúhlý s  $\triangle DAC$ ,  $BA:AD = DA:AC$ , tedy  $BA \times AC = AD^2$ . A poněvadž  $AB:BC = EB:BF$  a  $EB = BA \times AC$ , neboť  $EA = AC$ , a  $BF = AC \times CB$ , tedy  $AB:BC = BA \times AC:AC \times CB$ . I jest  $BA \times AC = AD^2$ <sup>9)</sup> a  $AC \times CB = DC^2$ , neboť kolmice  $DC$  je střední úměrnou úseček základny  $AC$ ,  $CB$ , jelikož  $\sphericalangle ADB$  jest pravý. Pročež  $AB:BC = AD^2:DC^2$ ; což právě bylo dokázati.



## XIV.

Sestroj osmistěn a opiš kulí, jako již dříve, a dokaž, že čtverec kulového průměru je dvakrát větší nežli čtverec strany osmistěnové.

Za průměr dané koule mějmež  $AB$  a rozpolme jej v  $C$  a narýsujme na  $AB$  polokruh  $ADB$  a vztýčme v  $C$  na  $AB$  kolmici  $CD$  a vedme spojnicí  $DB$  i mějme čtyřúhelník  $EFGH$ , aby každá strana jeho byla stejná s  $DB$ , a vedme spojnice  $HF$ ,  $EG$  a postavme v bodě  $K$  na rovině čtverce  $EFGH$  kolmici  $KL$  a prodlužme ji na druhou stranu roviny, aby vznikla  $KM$ , a od každé z přímek  $KL$ ,  $KM$  odřízneme úsečky  $KL$ ,  $KM$  rovné některé z přímek  $EK$ ,  $FK$ ,  $GK$ .  $HK$  a vedme spojnice  $LE$ ,  $LF$ ,  $LG$ ,  $LH$ ,  $ME$ ,  $MF$ ,  $MG$ ,  $MH$ . A ježto  $KE = KH$  a  $\sphericalangle EKH = R$



<sup>8)</sup> Neboť  $BA:AC = 3:2 = BA^2:AD^2$ , z toho  $2BA^2 = 3AD^2$ ,  $BA^2 = \frac{3}{2}AD^2$ .

<sup>9)</sup> Neboť  $\triangle ABD \sim \triangle ACD$ .

tedy  $HE^2 = 2EK^2$ . Dále, ježto  $LK = KE$  a  $\sphericalangle LKE = R$ , tedy  $EL^2 = 2EK^2$ . Bylo pak dokázáno, že též  $HE = 2EK^2$ ; pročež  $LE^2 = EH^2$ ; proto  $LE = EH$ . Z téže příčiny ovšem i  $LH = HE$ ; tedy  $\triangle LEH$  je stejnostranný. Podobně zajisté dokážeme, že též každý z ostatních trojúhelníků, jejichž základnami jsou strany čtyřúhelníku  $EFGH$  a vrcholy body  $L, M$ , je stejnostranný; sestaven je tedy osmistěn, omezený osmi stejnostrannými trojúhelníky.


Má se ovšem také opsati danou kulí a dokázati, že čtverec kulového průměru je dvakrát větší nežli čtverec strany osmistěnové.

Ježto tedy tři přímky  $LK, KM, KE$  jsou navzájem stejné, tedy polokruh rýsovaný na  $LM$  půjde též bodem  $E$ . A z téže příčiny, když se polokruh ten otočí kolem pevné osy  $LM$ , až se vrátí do téhož postavení, odkud se počal otáčeti, bude procházeti též body  $F, G, H$ , a osmistěn bude opsán kulí. Pravím již, že také danou. Neboť, ježto  $LK = KM$  a společnou  $KE$  a svírají pravé úhly<sup>10)</sup>, tedy základna  $LE = EM$ . A ježto  $\sphericalangle LEM = R$ , neboť je v polokruhu<sup>11)</sup>, tedy  $LM^2 = 2LE^2$ . Dále, ježto  $AC = CB$ , jest  $AB = 2BC$ . A  $AB : BC = AB^2 : BD^2$  (VI. VIII. V. vým. 9.); tedy  $AB^2 = 2BD^2$ . Bylo však dokázáno, že též  $LM^2 = 2LE^2$ . Také  $DB^2 = LE^2$ , neboť  $EH (=EL)$  vzali jsme za stejnou s  $DB$ . Tedy též  $AB^2 = LM^2$ ; pročež  $AB = LM$ . I jest  $AB$  průměr dané koule; a tak  $LM$  se rovná průměru koule dané.

Tedy osmistěn jest opsán danou kulí; a spolu dokázáno jest, že čtverec průměru kulového je dvakrát větší nežli čtverec osmistěnové strany; což právě bylo dokázati.

## XV.

Sestroj krychli a opiš kulí, jako prve jehlan, a dokaž, že čtverec průměru kulového je třikrát větší nežli čtverec krychlové strany.



jest krychle  $FN$ , omezena šesti stejnými čtyřúhelníky (čtverci). Má se ovšem též opsati danou kulí a dokázati, že čtverec průměru kulového je třikrát větší nežli čtverec krychlové strany (hrany).

Nuže vedme spojnice  $KG, EG$ . A ježto  $\sphericalangle KEG = R$ , protože i  $KE$

<sup>10)</sup> Totiž se společnou  $KE$ , t. j.  $\sphericalangle LKE = EKM = R$ .

<sup>11)</sup> obvodový (III. xx.).


jest na rovině  $EG$  i, jak patrně, na přímce  $EG$  kolmo, tedy polokruh rýsovaný na  $KG$  půjde též bodem  $E$ . Dále ježto  $GF$  jest kolmo na  $FL$  i  $FE$ , také tedy na rovině  $FK$  jest  $GF$  kolmo; a tak, když spojíme též  $F$  s  $K$ , kolmo bude  $GF$  i na  $FK$ ; a z té příčiny opět polokruh na  $GK$  rýsovaný půjde i bodem  $F$ . Podobně půjde též ostatními body (rohy) té krychle. Když se tedy polokruh otočí kolem pevné osy  $KG$ , až se vrátí do téhož postavení, odkud počal se otáčeti, krychle bude opsána kulí. Pravím ovšem, že také danou. Poněvadž totiž  $GF = FE$  a  $\sphericalangle F = R$ , tedy  $EG^2 = 2EF^2$ . Avšak  $EF^2 = EK^2$ ; pročež  $EG^2 = 2EK^2$ ; a tak  $GE^2 + EK^2$  (t. j.  $GK^2$ ) =  $3EK^2$ . A ježto  $AB = 3BC$  a  $AB : BC = AB^2 : BD^2$  (VI. VIII. V. vým. 9.), tedy  $AB^2 = 3BD^2$ . Bylo však dokázáno, že též  $GK^2 = 3KE^2$ . A  $KE$  vzata za stejnou s  $DB$ ; pročež také  $KG = AB$ . I jest  $AB$  průměr dané koule; proto i  $KG$  se rovná průměru koule dané.

Tedy danou kulí jest krychle opsána; a spolu dokázáno jest, že čtverec kulového průměru je třikrát větší nežli čtverec krychlové strany; což právě bylo dokázati.

## XVI.

Sestroj dvacetistěn a opiš kulí, jako již svrchu jmenované obrazce, a dokaž, že strana dvacetistěnu jest nezměrná, řečená menší.

Za průměr dané koule mějmež  $AB$  a rozdělme jej v  $C$  tak, aby byla  $AC = 4CB$ , a narýsujme na  $AB$  polokruh  $ADB$  a vztyčme na  $AB$  v  $C$  kolmici  $CD$  a vedme spojnicí  $DB$  a mimo to mějme kruh  $EFGHK$ , jehož poloměrem budiž  $DB$ , a do kruhu  $EFGHK$  vpišme pětiúhelník stejnostranný a stejnoúhlý  $EFGHK$  a v bodech  $L, M, N, O, P$  rozpolmež oblouky  $EF, FG, GH, HK, KE$  a vedme spojnice  $LM, MN, NO, OP, PL, EP$ . Tedy pětiúhelník  $LMNOP$  je stejnostranný a přímka  $EP$  náleží desetiúhelníku<sup>12)</sup>. I vztyčme v bodech  $E, F, G, H, K$  na rovině kruhové kolmice  $EQ, FR, GS, HT, KU$ , stejné s poloměrem kruhu  $EFGHK$ , a vedme spojnice  $QR, RS, ST, TU, UQ, QL, LR, RM, MS, SN, NT, TO, OU, UP, PQ$ . A ježto  $EQ$  i  $KU$  jsou na téže rovině kolmo, tedy  $EQ \parallel KU$ . Jsou pak i stejné; přímky však, spojující stejné rovnoběžky na téže straně, jsou stejné a rovnoběžné (I. xxxiii.). Pročež  $QU$  je s  $EK$  stejná i rovnoběžná.  $EK$  však náleží stejnostrannému pětiúhelníku; tedy rovněž  $QU$  náleží stejnostrannému pětiúhelníku, vepsanému do kruhu  $EFGHK$ . Z téže příčiny zajisté i každá z přímek



<sup>12)</sup> Je stranou desetiúhelníku pravidelného.



$QR, RS, ST, TU$  náleží stejnostrannému pětiúhelníku, vepsanému v kruh  $EFGHK$ ; pročež pětiúhelník  $QRSTU$  je stejnostranný. A ježto  $QE$  náleží šestiúhelníku.  $EP$  pak desetiúhelníku a  $\sphericalangle QEP = R$ , tedy  $QP$  je strana pětiúhelníku; neboť čtverec strany pětiúhelníkové rovná se součtu čtverců ze stran šestiúhelníku a desetiúhelníku, vepsaných do téhož kruhu (XIII. x.). Z téže příčiny ovšem i  $PU$  je strana pětiúhelníku. Rovněž pak i  $QU$  náleží pětiúhelníku. Pročež  $\triangle QPU$  je stejnostranný. Z téže příčiny ovšem i trojúhelníky  $QLR, RMS, SNT, TOU$  jsou stejnostranné. A ježto bylo dokázáno, že  $QL$  i  $QP$  náleží pětiúhelníku a též  $LP$  je strana pětiúhelníku, tedy  $\triangle QLP$  je stejnostranný. Z téže příčiny zajisté i všechny trojúhelníky  $LRM, MSN, NTO, OUP$  jsou stejnostranné. Vezměme za střed kruhu  $EFGHK$  bod  $V$  a v bodě  $V$  vztyčme na rovině kruhové kolmici  $VZ$  a prodlužme ji na druhou stranu o  $VY$  a odřízněme stranu šestiúhelníkovou  $VX$  a desetiúhelníkové  $VY, XZ$  i vedme spojnice  $QZ, QX, UZ, EV, LV, LY, YM$ . A ježto  $VX, QE$  jsou na rovině kruhové kolmo, tedy  $VX \parallel QE$ . Jsou pak i stejné; pročež i  $EV, QX$  jsou stejné a rovnoběžné.  $EV$  však náleží šestiúhelníku; tedy též  $QX$  je strana šestiúhelníku. A ježto  $QX$  náleží šestiúhelníku a  $XZ$  desetiúhelníku a  $\sphericalangle QXZ = R$ , tedy  $QZ$  je strana pětiúhelníku. Z téže příčiny ovšem také  $UZ$  náleží pětiúhelníku, ježto právě, když vedeme spojnice  $VK, XU$ , budou stejné a protější, a  $VK$  jsouc poloměrem náleží šestiúhelníku; pročež  $XU$  je strana šestiúhelníku.  $XZ$  pak náleží desetiúhelníku a  $\sphericalangle UXZ = R$ ; tedy  $UZ$  jest strana pětiúhelníku. Jest pak i  $QU$  strana pětiúhelníku; pročež  $\triangle QUZ$  je stejnostranný. Z téže příčiny ovšem i ostatní trojúhelníky, jejichž základnami jsou přímký  $QR, RS, ST, TU$ , vrcholem pak bod  $Z$ , jsou stejnostranné. Dále, ježto  $VL$  náleží šestiúhelníku a  $VY$  desetiúhelníku a  $\sphericalangle LVY = R$ , tedy  $LY$  je strana pětiúhelníku. Z téže příčiny ovšem, když vedeme spojnici  $MV$ , jež je stranou šestiúhelníku, shledáváme, že též  $MY$  náleží pětiúhelníku. Jest pak i  $LM$  strana pětiúhelníku; pročež  $\triangle LMY$  je stejnostranný. Podobně zajisté se dokáže, že též ostatní trojúhelníky, jejichž základnami jsou  $MN, NO, OP, PL$  a vrcholem bod  $Y$ , jsou stejnostranné. Tedy sestroyen jest dvacetistěn, omezený dvaceti stejnostrannými trojúhelníky.

Má se ovšem též opsati danou kulí a dokázati, že strana (hrana) dvacetistěnu jest nezměrná, řečená menší.

Poněvadž je totiž  $VX$  strana šestiúhelníku a  $XZ$  desetiúhelníku, tedy  $VZ$  je v  $X$  rozdělena poměrem krajním a středním a větší úsečkou její jest  $VX$  (XIII. ix.); pročež  $ZV:VX = VX:VZ$ . Avšak  $VX = VE$  a  $XZ = VY$ ; tedy  $ZV:VE = EV:VY$ . A  $\sphericalangle ZVE = R = EVY$ . Když tedy vedeme spojnici  $EZ$ , bude  $\sphericalangle YEZ = R$  pro podobnost trojúhelníkův  $YEZ$  a  $VEZ$  (VI. viii.). Z téže příčiny zajisté, ježto  $ZV:VX = VX:XZ$  a  $ZV = YX, VX = XV$ <sup>13)</sup>, tedy  $YX:XQ = QX:XZ$ . A proto, když opět vedeme spojnici  $QY$ , bude  $\sphericalangle při Q = R$ ; pročež polokruh na  $YZ$  rýsovaný půjde i bodem  $Q$ . A když polokruh, otoče se kolem pevné osy  $YZ$ , vrátí se opět do téhož postavení, odkud počal se otá-

<sup>13)</sup> Strany pravidel šestiúhelníku.

četi, protínati bude i  $Q$  i ostatní body (rohy) dvacetistěnu, a dvacetistěn opsán bude kulí. Pravím ovšem, že také danou. Nuže rozpolme  $VX$  v  $A'$ . A ježto přímka  $VZ$  rozdělena je v  $X$  poměrem krajním a středním a menší její úsečkou je  $ZX$ , tedy  $A'Z^2 = 5A'Y^2$ . Také  $ZY = 2A'Z$  a  $VX = 2A'X$ ; pročež  $ZY^2 = 5XV^2$ . A ježto  $AC = 4CB$ , tedy  $AB = 5BC$ . Též  $AB:BC = AB^2:BD^2$  (VI. viii. V. vým. 9.); pročež  $AB^2 = 5BD^2$ . Bylo však dokázáno, že též  $ZY^2 = 5VX^2$ . A  $DB = VX$ ; neboť ta i ona rovná se poloměru kruhu  $EFGHK$ ; tedy též  $AB = YZ$ . I jest  $AB$  průměr dané koule; pročež také  $YZ$  rovná se průměru koule dané. Tedy dvacetistěnu opsán jest kulí danou.

Pravím již, že strana dvacetistěnu jest nezměrná, řečená menší. Neboť, ježto průměr koule je změrný a čtverec jeho rovná se pateronásobnému čtverci z poloměru kruhu  $EFGHK$ , tedy též poloměr kruhu  $EFGHK$  je změrný, pročež změrný jest i jeho průměr. Když pak se do kruhu, jehož průměr je změrný, vpíše stejnostranný pětiúhelník, strana pětiúhelníku jest nezměrná, řečená menší (XIII. xi.; viz X. xlii). Avšak strana pětiúhelníku  $EFGHK$  je hranou dvacetistěnu. Tedy hrana dvacetistěnu jest nezměrná, řečená menší<sup>14)</sup>.


#### Důsledek.

Z toho zajisté patrné, že čtverec kulového průměru se rovná pateronásobnému čtverci z poloměru kruhu, v němž narýsován dvacetistěn, a že průměr té koule se skládá ze strany šestiúhelníku a dvou stran desetiúhelníku, vepsaných do téhož kruhu. Což právě bylo dokázati.

#### XVII.


Sestav dvanáctistěn a opiš kulí, jako již svrchu jmenované obrazce, a dokaž, že strana (hrana) dvanáctistěnu jest nezměrná, řečená úsečnice.

Mějme z krychle svrchu řečené (XIII. xv.) dvě roviny  $ABCD, CBEF$ , jež jsou na sobě kolmo, a přímký  $AB, BC, CD, DA, EF, EB, FC$  rozpolme v bodech  $G, H, K, L, M, N, O$  a vedme spojnice  $GK, HL, MH, NO$  a každou z přímek  $NP, PO, HQ$ , rozdělime v bodech  $R, S, T$  poměrem krajním a středním, a většími úsečkami jejich buďtež  $PR, PS, TQ$ , a postavme v bodech  $R, S, T$  na rovinách krychlových na vnější strany té krychle kolmice  $RU, SV, TX$ , a ty buďte stejné s  $RP, PS, TQ$ , a vedme spojnice  $UB, BX, XC, CV, VU$ . Pravím, že  $UBXC$  jest pětiúhelník stejnostranný i v jediné rovině a spolu stejnoúhlý. Nuže vedme spojnice  $RB, SB, VB$ . A ježto přímka  $NP$  rozdělena v  $R$  poměrem kraj-



<sup>14)</sup> Obr. druhý ve vydání Heibergově vy-padá takto:

ním a středním a větší úsečkou jest  $RP$ ,  $PN^2 + NR^2 = 3RP^2$  (XIII. iv.). A  $PN = NB$ ,  $PR = RU$ , pročež  $BN^2 + NR^2 = 3RU^2$ . Avšak  $BN^2 + NR^2 = BR^2$ ; tedy  $BR^2 = 3RU^2$ . A tak  $BR^2 + RU^2 = 4RU^2$ . Je však  $BR^2 + RU^2 = BU^2$ ; pročež  $BU^2 = 4UR^2$ ; tedy  $BU = 2RU$ . Avšak též  $VU = 2UR$ , poněvadž právě též  $SR = 2PR$  (t. j.  $2RU$ ); tedy  $BU = UV$ . Podobně zajistě dokážeme, že také  $BX$ ,  $XC$ ,  $CV$  jsou jednotlivě s  $BU$  i  $VU$  stejné. Tedy pětiúhelník  $BUVCX$  je stejnostranný. Pravím ovšem, že je též v jediné rovině. Nuže vedme z  $P$  na vnější stranu krychle s  $RU$  i s  $SV$  rovnoběžku  $PY$  a spojnice  $YH$ ,  $HX$ ; pravím, že  $YHX$  je přímka. Neboť, ježto  $HQ$  jest rozdělena v  $T$  poměrem



krajním a středním a větší její úsečkou jest  $QT$ , tedy  $HQ : QT = QT : TH$ . Avšak  $HQ = HP$  a  $QT = TX = PY$ ; pročež  $HP : PY = XT : TH$ . A  $HP \parallel TX$ , neboť obě jsou na rovině  $BD$  kolmo; a  $TH = PY$ , neboť obě jsou kolmo na rovině  $BF$ . Když pak se dva trojúhelníky sestaví při jednom úhlu tak, jako  $YPH$ ,  $HTX$ , a mají po dvou stranách úměrných, takže stejnohlé strany jejich jsou také rovnoběžné, zbývající strany budou činiti přímku (VI. xxxii.); tedy  $YH$  čini s  $HX$  přímku. Každá však přímka jest v jediné rovině; tedy pětiúhelník  $UBXCV$  jest v jediné rovině.

Pravím ovšem, že je také stejnoúhlý.

Poněvadž totiž přímka  $NP$  jest rozdělena v  $R$  poměrem krajním a středním a větší úsečkou jest  $PR$ <sup>15)</sup> a  $PR = PS$ <sup>15)</sup>, tedy  $NS$  jest rozdělena v  $P$  poměrem krajním a středním a větší úsečkou jest  $NP$  (XIII. v.). Pročež  $NS^2 + SP^2 = 3NP^2$  (XIII. iv.). Avšak  $NP = NB$  a  $PS = SV$ ; tedy  $NS^2 + SV^2 = 3NB^2$ ; a tak  $VS^2 + SN^2 + NB^2 = 4NB^2$ . Avšak  $SN^2 + NB^2 = SB^2$ ; pročež  $BS^2 + SV^2$  (t. j.  $BV^2$ , neboť  $\sphericalangle VSB = R$ )  $= 4NB^2$ ; tedy  $BV = 2NB$ . Také však  $BC = 2BN$ , pročež  $BV = BC$ . A ježto dvě přímky  $BU$ ,  $UV$  jsou střídavě stejné se dvěma  $BX$ ,  $XC$  i základna  $BV = BC$ , tedy  $\sphericalangle BUV = BXC$ . Podobně zajistě dokážeme, že též  $\sphericalangle UVC = BXC$ ; pročež  $\sphericalangle BXC$ ,  $BUV$ ,  $UVC$  navzájem jsou si rovny. Když pak jsou v pětiúhelníku stejnostranném tři úhly navzájem stejné, ten pětiúhelník bude stejnoúhlý (XIII. vii.); tedy pětiúhelník  $BUVCX$  je stejnoúhlý. Bylo však dokázáno, že také stejnostranný; pročež pětiúhelník  $BUVCX$  je stejnostranný i stejnoúhlý, a sestojen jest na jedné straně (hraně) krychlové  $BC$ . Když tedy na každé z dvanácti hran krychlových upravíme totéž, sestaven bude jakýsi útvar tělesový, omezený dvanácti stejnostrannými a stejnoúhlými pětiúhelníky, jenž slove dvanáctistěn.

Má se tedy též opsati danou kulí a dokázati, že hrana toho dvanáctistěnu jest nezměrná, řečená úsečnice.

Nuže prodlužme  $YP$  do  $Z$ ; stýká se tedy  $PZ$  s průměrem (úhlo-

<sup>15)</sup> Následující úměra zbytečná a nepochybně cizí.

příčkovým) té krychle a ty navzájem se půlí; to bylo totiž v předposlední poučce knihy jedenácté dokázáno (XI xxxviii.). Stýkejte se v  $Z$ ; pročež  $Z$  je střed koule, objímající krychli, a  $ZP$  jest polovina krychlové hrany. Vedme tedy spojnicí  $UZ$ . A ježto přímka  $NS$  rozdělena jest v  $P$  poměrem krajním a středním a její větší úsečkou jest  $NP$ , tedy  $NS^2 + SP^2 = 3NP^2$ . A  $NS = YZ$ , ježto právě též  $NP = PZ$  a  $YP = PS$ . Avšak zajistě i  $PS = YU$ , ježto také  $PS = RP$ ; pročež  $ZY^2 + YU^2 = 3NP^2$ . A  $ZY^2 + YU^2 = UZ^2$ ; tedy  $UZ^2 = 3NP^2$ . Také však čtverec z poloměru koule, objímající krychli, je třikrát větší nežli čtverec z poloviční krychlové hrany; neboť svrchu jsme ukázali, jak sestrojiti krychli a opsati kulí a dokázati, že čtverec z průměru kulového jest třikrát větší nežli čtverec hrany krychlové (XIII. xv.). A jak tomu se čtverci z celků, tak se čtverci z polovin. I jest  $NP$  polovina krychlové hrany; tedy  $UZ$  je stejná s poloměrem koule, objímající krychli. A  $Z$  je střed koule, která objímá krychli; pročež bod  $U$  jest na obvodě kulovém. Podobně zajistě dokážeme, že též ostatní úhly (tělesové, t. j. rohy) dvanáctistěnu jsou na obvodě kulovém; tedy dvanáctistěn jest opsán danou kulí.

Pravím již, že hrana dvanáctistěnu jest nezměrná, řečená úsečnice.

Neboť, ježto  $NP$  jest rozdělena poměrem krajním a středním a větší úsečkou jest  $RP$  a ježto  $PO$  jest rozdělena poměrem krajním a středním a větší úsečkou jest  $PS$ , když se tedy rozdělí celá  $NO$  poměrem krajním a středním, větší úsečkou jest  $RS$ . A tak, ježto  $NP : PR = PR : RN$ , tak i dvojnásobky, neboť díly mají se k sobě stejným poměrem jako násobky, tedy  $NO : RS = RS : (NR + SO)$ . Avšak  $NO > RS$ ; pročež také  $RS > (NR + SO)$ ; tedy  $NO$  rozdělena jest poměrem krajním a středním a větší její úsečkou jest  $RS$ . Avšak  $RS = UV$ ; když se tedy  $NO$  rozdělí poměrem krajním a středním, větší úsečkou jest  $UV$ . A ježto průměr té koule je změrný a čtverec jeho je třikrát větší nežli čtverec hrany krychlové; tedy  $NO$ , jsouc rovna hraně krychlové, je změrná. Když pak se přímka změrná rozdělí poměrem krajním a středním, ta i ona úsečka jest nezměrná úsečnice (XIII. vi. X. lxxiii.). Pročež  $UV$ , jsouc hranou dvanáctistěnu, jest nezměrná úsečnice<sup>16)</sup>.


Důsledek.

Z toho zajistě patrnó, že když se hrana krychlová rozdělí poměrem krajním a středním, větší úsečka jest hranou dvanáctistěnu; což právě bylo dokázati.

XVIII.

Urči hrany těch pěti útvarův a navzájem přirovnej.

Průměrem koule dané budiž  $AB$ , a rozdělme jej v  $C$  tak, aby byla  $AC = CB$ , a v  $D$  tak, aby byla  $AD = 2DB$ , a




<sup>16)</sup> Dvanáctistěn s řečenou krychlí vypadal by takto:

na  $AB$  narýsujeme polokruh  $AEB$  a v bodech  $C, D$  vztyčíme na  $AB$  kolmice  $CE, DF$  a vedme spojnice  $AF, FB, EB$ . A ježto  $AD = 2DB$ , tedy  $AB = 3BD$ . Pročež zvrtně  $BA = \frac{3}{2}AD$ . A  $BA:AD = BA^2:AF^2$  (V. vým. 9. pozn.); tedy  $\triangle AFB$  je s  $\triangle AFD$  stejnoúhlý; pročež  $BA^2 = \frac{3}{2}AF^2$ . Jest pak i čtverec kulového průměru půldruhokrát větší nežli čtverec hrany jehlanové (XIII. XIII.). A průměrem kulovým jest  $AB$ ;  $AF$  tedy se rovná hraně jehlanové<sup>17)</sup>.

Dále, ježto  $AD = 2DB$ , tedy  $AB = 3BD$ . Avšak  $AB:BD = AB^2:BF^2$  (VI. VIII. V. vým. 9. pozn.); pročež  $AB^2 = 3BF^2$ . Jest pak i čtverec průměru kulového třikrát větší nežli čtverec hrany krychlové (XIII. xv.) A průměrem kulovým jest  $AB$ ; tedy  $BF$  jest hrana krychlová.

A ježto  $AC = CB$ , tedy  $AB = 2BC$ . Avšak  $AB:BC = AB^2:BE^2$ ; pročež  $AB^2 = 2BE^2$ . A čtverec průměru kulového je také dvakrát větší nežli čtverec hrany osmistěnové (XIII. xiv.). I jest  $AB$  průměrem dané koule; tedy  $BE$  jest hrana osmistěnová.

Vztyčíme již v bodě  $A$  na přímkce  $AB$  kolmici  $AG$ , a budiž  $AG = AB$ , a vedme spojnic  $GC$  a z  $H$  spustíme na  $AB$  kolmici  $HK$ . A ježto  $GA = 2AC$  (neboť  $GA = AB$ ) a  $GA:AC = HK:KC$ , tedy  $HK = 2KC$ . Proto  $HK^2 = 4KC^2$ ; tedy  $HK^2 + KC^2 (= HC^2) = 5KC^2$ . Avšak  $HC = CB$ ; pročež  $BC^2 = 5KC^2$ . A ježto  $AB = 2CB$ , z čehož  $AD = 2DB$ , tedy zbývající  $BD = 2DC$ . Pročež  $BC = 3CD$ ; tedy  $BC^2 = 9CD^2$ . Avšak  $BC^2 = 5CK^2$ ; pročež  $CK^2 > CD^2$ ; tedy  $CK > CD$ . Dejme tomu, že  $CK = CL$ , a vztyčíme v  $L$  na  $AB$  kolmici  $LM$  a vedme spojnic  $MB$ . A ježto  $BC^2 = 5CK^2$  a  $AB = 2BC$  i  $KL = 2CK$ , tedy  $AB^2 = 5KL^2$ . Jest pak i čtverec průměru kulového roven pateronásobnému



čtverci kruhového poloměru, na němž narýsován dvacetistěn (XIII. xvi. důsl.). A průměrem kulovým jest  $AB$ ; pročež  $KL$  jest poloměrem kruhu, na němž narýsován dvacetistěn; tedy  $KL$  je stranou šestiúhelníku (pravid.) v řečeném kruhu. A ježto průměr kulový se skládá ze strany šestiúhelníku a ze dvou stran desetiúhelníku, vepsaných v řečený kruh (XIII. xvi. důsl.), a průměrem kulovým jest  $AB$ , stranou pak šestiúhelníkovou  $KL$  a  $AK = LB$ , tedy  $AK, LB$  jsou stranami desetiúhelníku, vepsaného v kruh, na němž narýsován dvacetistěn. A ježto  $LB$  přísluší desetiúhelníku a  $ML$  šestiúhelníku (neboť  $ML = KL$ , ježto též  $ML = HK$ , poněvadž jsou od středu stejně vzdáleny, a  $HK = 2KC = KL$ ), tedy  $MB$  přísluší pětiúhelníku (XIII. x.). Strana pak pětiúhelníková je hranou dvacetistěnovou (XIII. xvi.); pročež  $MB$  přísluší dvacetistěnu.

A ježto  $FB$  jest hranou krychlovou, rozdělíme ji v  $N$  poměrem

<sup>17)</sup> Rozumí se: hraně jehlanu pravidelného, do koule vepsaného.

<sup>18)</sup> Obě jsou poloměry.

krajním a středním, a větší úsečkou budiž  $NB$ ; tedy  $NB$  jest hranou dvanáctistěnovou (XIII. xvii. důsl.).

A ježto bylo dokázáno, že čtverec kulového průměru jest půldruhokrát větší než  $AF^2$ , čtverec to hrany jehlanové, a dvakrát větší nežli  $BE^2$  hrany osmistěnové a třikrát větší nežli  $FB^2$  hrany krychlové, jakých dílů má tedy ve dvojmoci průměr kulový šest, takové hrana jehlanová ve dvojmoci čtyři, osmistěnová tři a krychlová dva. Pročež hrana jehlanová ve dvojmoci rovná se čtyřem třetinám hrany osmistěnové nebo dvojnásobku hrany krychlové (ve dvojmoci), hrana pak osmistěnová rovná se ve dvojmoci půldruhanásobně hraně krychlové. Tedy řečené hrany těch tří útvarů, míním totiž jehlanu a osmistěnu a krychle, mají se k sobě poměry změrnými. Ostatní pak dvě, míním totiž dvacetistěnovou a dvanáctistěnovou, ani k sobě ani k oněm jmenovaným nemají se poměry změrnými; jsou totiž nezměrné, ona totiž nezměrná menší, tato úsečnice (XIII. xvi. xvii.).

Že hrana dvacetistěnová  $MB$  jest větší než dvanáctistěnová  $NB$ , dokážeme takto.

Poněvadž totiž  $\triangle FDB$  je s  $\triangle FAB$  stejnoúhlý,  $DB:BF = BF:BA$ . [A ježto tři přímkky jsou úměrné, první má se ke třetí jako čtverec z první ke čtverci z druhé]; pročež  $DB:BA = DB^2:BF^2$ . Tedy obráceně  $AB:BD = FB^2:BD^2$ . Avšak  $AB = 3BD$ , pročež  $FB^2 = 3BD^2$ . Také však  $AD^2 = 4DB^2$ , neboť  $AD = 2DB$ ; tedy  $AD^2 > FB^2$ ; pročež  $AD > FB$ ; a tak  $AL$  jest mnohem větší než  $FB$ . A když se  $AL$  rozdělí poměrem krajním a středním, větší úsečkou jest  $KL$ , ježto právě  $LK$  náleží šestiúhelníku,  $KA$  však desetiúhelníku (XIII. ix.); když pak  $FB$  rozdělíme poměrem krajním a středním, větší úsečkou jest  $NB$ ; tedy  $KL > NB$ . A  $KL = LM$ ; pročež  $LM > NB$ . Tedy  $MB$ , jsouc hranou dvacetistěnovou, jest o mnoho větší než hrana dvanáctistěnová  $NB$ ; což právě bylo dokázati.

Pravím ještě, že kromě řečených pěti útvarův nesestrojíš útvaru jiného, jenž by byl omezen stejnými úhelníky stejnostrannými a stejnoúhlými.

Ze dvou trojúhelníkův anebo vůbec rovin zajisté úhel tělesový se nesestrojí (XI. vým. 11.). Ze tří pak trojúhelníkův úhel jehlanový, ze čtyř osmistěnový a z pěti dvacetistěnový; ze šesti však trojúhelníkův stejnostranných a stejnoúhlých, při jednom bodě sestavených, úhel tělesový nevznikne; poněvadž totiž úhel stejnostranného trojúhelníku rovná se dvěma třetinám pravého, těch šest bude rovno čtyřem pravým; což právě nemožné, neboť každý úhel tělesový svírají úhly (rovinné) součtem menší nežli čtyři pravé (XI. xxi.). Z téže příčiny ovšem nemožno úhlu tělesového sestrojiti ani z více úhlů rovinných nežli ze šesti<sup>19)</sup>. Třemi pak čtverci omezen jest úhel krychlový; čtyřmi však to nemožno, neboť opět to budou čtyři pravé. Pětiúhelníky stejnostrannými a stejnoúhlými, a to třemi, omezen dvanáctistěnový; čtyřmi však to nemožno; poněvadž totiž úhel stejnostranného (a stejnoúhlého) pětiúhelníku rovná se pravému a pětina,

<sup>19)</sup> Totiž z úhlů trojúhelníkův pravidelných; tedy ani ze šesti ani z více nežli šesti.


ty čtyři úhly budou čtyř pravých větší; což právě nemožné. Ani za-  
jistě jinými útvary mnohoúhlymi nebude omezen úhel tělesový pro-  
touz nemožnost.

Tedy kromě řečených pěti útvarův nesestrojíš jiného útvaru tě-  
lesového, omezeného úhelníky stejnostrannými a stejnoúhlými; což  
právě bylo dokázati.

#### Výtěžek.

Že pak úhel pětiúhelníku stejnostranného a stejno-  
úhlého rovná se pravému a pětina, dokázati třeba  
takto.

Nuže budiž pětiúhelníkem stejnostranným a stejnoúhlým  $ABCDE$ ,




a opišme kolem něho kružnici  $ABCDE$   
a za střed její vezměme  $F$ , i vedme spoj-  
nice  $FA, FB, FC, FD, FE$ . Ty zajisté  
rozpolují úhly v pětiúhelníku při  $A, B,$   
 $C, D, E$ . A ježto pět úhlů při  $F$  rovná  
se čtyřem pravým a jsou stejné, tedy  
jeden z nich, na př.  $AFB$ , rovná se pra-  
vému bez pětiny; pročež zbývající  
(v  $\triangle AFB$ ) součet  $\sphericalangle FAB + \sphericalangle ABF$  rovná  
se pravému a pětina. Avšak  $\sphericalangle FAB =$   
 $\sphericalangle FBC$ ; tedy celý úhel pětiúhelníkový  $ABC$   
jest roven pravému a pětina; což právě  
bylo dokázati.

### Jiné důkazy a doplňky

ke kn. X.

#### I. Jinak.

Mějme dvě nestejně veličiny  $AB, C$ ; a ježto  $C$  jest menší, násob-  
bením bude někdy větší než  $AB$ . Budiž jako  $FM$ , a tato budiž rozdě-  
lena v díly stejné s  $C$ , totiž  $MH, HG, GF$ , a odřízněmež od  $AB$  část  
větší než jest polovina, t.  $BE$ , a od  $EA$  větší než polovinu, t.  $ED$ , a  
to stále činmež, až se části v  $FM$  počtem  
vyrovnají částem v  $AB$ . Budtež to  $BE,$   
 $ED, DA$ , a budiž  $DA = KL = LN = NO$ ,  
a to tak, aby se díly v  $KO$  počtem vy-  
rovnaly dílům veličiny  $FM$ .



A ježto  $BE > \frac{1}{2}BA$  a  $BE > EA$ ,  
tedy jest  $BE$  mnohem větší než  $DA$ .


Avšak  $DA = ON$ , tedy  $BE > NO$ . Ježto

dále  $ED > \frac{1}{2}EA$ , bude  $ED > DA$ . Avšak  $DA = NL$ , pročež  $ED > NL$ .  
Tedy celá  $DB > OL$ . Avšak  $DA = LK$ ; tedy celá  $BA > OK$ . Avšak  
 $BA < MF$ ; pročež  $MF$  jest mnohem větší než  $OK$ . A ježto  $ON = NL =$   
 $LK$  a  $MH = HG = GF$  a počet dílů v  $MF$  se rovná počtu dílů v  $OK$ ,

tedy  $KL:FG = KO:FM$ ; ale  $FM > KO$ ; pročež i  $GF > LK$ . A  $FG =$   
 $C$  a  $KL = AD$ , tedy  $C > AD$ ; což právě bylo dokázati.


#### VI. Jinak.

Nuže mějte se k sobě dvě veličiny  $A, B$  jako číslo  $C$  k číslu  $D$ ;  
pravím, že jsou ty veličiny souměřitelné.  
Neboť kolik je v  $C$  jednotek, v tolikéž dílů  
buď rozdělena  $A$  a jednomu z nich se  
rovná  $E$ ; tedy  $1:C = E:A$  (V. xv.). Také  
však  $C:D = A:B$ , tedy stejnořadně (V. xxii.)  
 $1:D = E:B$ . A jednotka jest také měrou  
čísla  $D$ ; tedy rovněž  $E$  jest měrou veličiny  
 $B$ . Je však i  $E$  měrou veličiny  $A$ , ježto i jednotka čísla  $C$ ; pročež  $E$   
jest měrou veličiny  $A$  i  $B$ ; tedy jsou  $A, B$  souměřitelné a společnou  
jejich měrou jest  $E$ ; což právě bylo dokázati.



#### IX. Jinak.

Poněvadž totiž  $A$  je s  $B$  souměřitelná, mají se k sobě jako číslo  
k číslu. Mějtež se jako  $C$  k  $D$ , a  $C$  samo sebou znásobeno jsouc dej  
 $E$  a  $D$  znásobeno číslem  $C$  dej  $F$  a  $D$  samo  
sebou znásobeno jsouc dej  $G$ . Ježto tedy  
 $C \times C = E$  a  $C \times D = F$ , tedy  $C:D$  (t. j.  
 $A:B) = E:F$  (VII. xvii.). Avšak  $A:B = A^2:$   
 $A \times B$ , pročež  $A^2:A \times B = E:F$ . Ježto  
dále  $D \times D = G$  a  $C \times D \times F$ , tedy  $C:D$   
(t. j.  $A:B) = F:G$ . Avšak  $A:B = A \times B:$   
 $B^2$ ; pročež  $A \times B:B^2 = F:G$ . Avšak mělo  
se  $A^2:A \times B = E:F$ ; tedy stejnořadně  $A^2:$   
 $B^2 = E:G$ . Jsou pak  $E$  i  $G$  čtverce, neboť  
 $E = C^2$  a  $G = D^2$ ; pročež se má  $A^2$  k  $B^2$   
jako číslo čtvercové k číslu čtvercovému;  
což právě bylo dokázati.



Avšak měj se již  $A^2$  k  $B^2$  jako číslo  
čtvercové  $E$  k číslu čtvercovému  $G$ ; pravím, že jest  $A$  s  $B$  souměřitelná.

Nuže budiž  $C$  stranou čtverce  $E$  a  $D$  čtverce  $G$  a budiž  $C \times D =$   
 $F$ ; tedy  $E, F, G$  jsou po řadě úměrné dle poměru  $C:D$  (VIII. xi.).  
A ježto  $A^2:A \times B = A \times B:B^2$  a  $E:F = F:G$ ; tedy  $A^2:A \times B =$   
 $E:F$ . A  $A \times B:B^2 = F:G$ ; avšak  $A^2:A \times B = A:B$ . Pročež  $A, B$   
jsou souměřitelné, neboť se mají k sobě jako číslo  $E$  k číslu  $F$ , t. j.  
jako  $C:D$ ; neboť  $C:D = E:F$ ; jest totiž  $C \times C = E$  a  $C \times D = F$ .  
Pročež  $C:D = E:F$ .

#### X.

Tedy k dané přímce změrné, která jest, jak jsme pravili, mě-  
řítkem, na př.  $A$ , nalezena jest souměřitelná ve dvojmoci přímka  $D$ ,  
totiž změrná, jen ve dvojmoci souměřitelná, nezměrná pak  $E$ . Neboť

nezměrnými vůbec nazývá ty, které jsou se změrnou i dle délky i dle dvojmoci nesouměřitelné.

## XIII.

K výtěžku této poučky důkaz z nemožnosti opaku.

Když jsou dvě veličiny a jedna je s touž (třetí) veličinou souměřitelná, druhá však nesouměřitelná, budou ty veličiny nesouměřitelné.

Nuže buďte dvě veličiny  $A$ ,  $B^*$ ), jiná pak  $C$ , a budiž  $A$  s  $C$  souměřitelná,  $B$  však s  $C$  nesouměřitelná; pravím, že též  $A$  je s  $B$  nesouměřitelná.

Neboť jest-li  $A$  s  $B$  souměřitelná, rovněž pak  $C$  s  $A$ , tedy též  $C$  je s  $B$  souměřitelná (X. XII); což proti podmínce.

## XVIII.

Změrnými totiž nazývá přímky s danou změrnou buďto dle délky i dle dvojmoci souměřitelné neb i jen dle dvojmoci. Jsou však i jiné přímky, jež jsou dle délky sice s danou změrnou nesouměřitelné, jen dle dvojmoci však souměřitelné, a proto se opět nazývají změrnými a vespolek souměřitelnými, jelikož jsou změrné, avšak vespolek souměřitelnými patrně buďto dle délky i dle dvojmoci nebo jen dle dvojmoci. A jestliže dle délky, i ty samy se zovou změrnými, dle délky souměřitelnými, při čemž se vyrozumívá, že i dle dvojmoci; pakli jen dle dvojmoci jsou vespolek souměřitelné, i ty se takto zovou změrnými, jen dle dvojmoci souměřitelnými. Že pak přímky změrné jsou souměřitelné, vysvítá z tohoto: ježto jsou totiž změrné přímky s danou změrnou souměřitelné, veličiny pak s touž veličinou souměřitelné jsou i vespolek souměřitelné, tedy změrné jsou souměřitelné.

## XX.

*Výtěžek.*

Přímka ve dvojmoci rovná ploše (čtverci) nezměrné jest nezměrná.

Nuže budiž  $A^2$  rovna ploše nezměrné\*); pravím že  $A$  jest nezměrná.

Neboť jest-li  $A$  změrná, bude i čtverec její změrný (tak totiž stanoveno ve výměrech); není však; tedy  $A$  jest nezměrná, což právě bylo dokázati.

## XXIII.

*Důsledek.*

Jsou pak dále i jiné přímky, jež jsou dle délky sice se střední nesouměřitelné a jen ve dvojmoci souměřitelné, a opět se zovou střední, protože jsou se střední ve dvojmoci souměřitelné a souměřitelné vespolek, jelikož jsou střední, avšak vespolek souměřitelné jsou buď dle délky a patrně i ve dvojmoci nebo jen ve dvojmoci. A jestliže dle délky, slovou i tyto střední, dle délky souměřitelné, a spolu se rozumí,

\*) Vyobr. zbytečné; vynechal jsem.

že i ve dvojmoci; pakli jsou jen ve dvojmoci souměřitelné, slovou i tak střední, jen ve dvojmoci souměřitelné.

Že pak přímky střední jsou souměřitelné, třeba dokázati takto. Ježto přímky střední jsou s nějakou střední souměřitelné a veličiny s týmž souměřitelné jsou i vespolek souměřitelné, jsou tedy přímky střední souměřitelné.


## XXVII.

*Výtěžek.*

Dána-li dvě čísla jakéhokoli poměru a nějaké číslo jiné (třetí), dlužno učiniti, aby se mělo číslo k číslu, jako třetí k nějakému jinému.

Danými dvěma čísly jakéhokoli poměru buďtež  $AB$ ,  $CD$ , jiným pak nějakým  $CE$ ; dlužno vykonati, což uloženo.

Nuže narýsujme z  $DC$ ,  $CE$  pravoúhlý rovnoběžník  $DE$  a k  $AB$  přistavme stejný s  $DE$  rovnoběžník  $BF$  o šířce  $AF$ . Ježto tedy rovnoběžník  $DE = BF$  a jsou i stejnoúhlé, strany pak stejných a stejnoúhlých rovnoběžníků při stejných úhlech jsou k sobě v poměru obráceném (VI. XIV.), tedy  $AB:CD = CE:AF$ ; což právě bylo dokázati.




## XXIX.

*Výtěžek.*

Dána-li dvě čísla a přímka, dlužno učiniti, aby se mělo číslo k číslu jako čtverec z oné přímky ke čtverci z nějaké jiné.

Danými dvěma čísly buďtež  $A$ ,  $B$ , přímku pak  $C$ ; i dlužno vykonati, což uloženo. Nuže učiněmež, aby se mělo  $A:B = C:D$  a vezměmež  $E$  za střední úměrnou přímek  $C$ ,  $D$ . Ježto tedy  $A:B = C:D$  a  $C:D = C^2:E^2$  (V. vým. 9.), tedy  $A:B = C^2:E^2$ .




## XXXI.

*Výtěžek.*

Když jsou dvě přímky nějakého poměru, bude se míti přímka ku přímce jako pravoúhelník z obou ke čtverci z kratší.\*)

\*) V řec. textu ελαχίστης (nejmenší, nejkratší). Tento úkol i další dokážeme pouhým násobením zcela krátce.




Nuže buďte dvěma přímkami nějakého poměru  $AB, BC$ ; pravím, že  $AB:BC = AB \times BC:BC^2$ .

Nuže narýsujme z  $BC$  čtverec  $BDEC$  a doplňme rovnoběžník  $AD$ . Patrně zajisté, že  $AB:BC = AD:BE$ . I jest  $AD = AB \times BC$ , neboť  $BC = BD$ , a  $BE = BC^2$ . Tedy  $AB:BC = AB \times BC:BC^2$ ; což právě bylo dokázati.

## XXXII.

## Výtěžek.

Když jsou tři přímky nějakého poměru, bude se míti první ke třetí jako pravouhelník z první (nejdelší) a prostřední k pravouhelníku z prostřední a nejkratší.



Třemi přímkami nějakého poměru buďtež  $AB, BC, CD$ ; pravím, že  $AB:CD = AB \times BC:BC \times CD$ .

Nuže vedme z bodu  $A$  na  $AB$  kolmici  $AE$  a budiž  $AE = BC$ , a bodem  $E$  vedme k  $AD$  rovnoběžku  $EK$  a body  $B, C, D$  vedme k  $AE$  rovnoběžky  $FB, CH, DK$ . A ježto  $AB:BC = AF:BH$  a  $BC:CD = BH:CK$ , stejnořadně tedy  $AB:CD = AF:CK$ . I jest  $AF = AB \times BC$ , neboť  $AE = BC$ , a  $CK = BC \times CD$ , neboť  $BC = CH$ .

Když jsou tedy tři přímky — —

(Dále obsahují doplňky ke kn. X. ještě 16 čísel a scholion. Z toho uvádím jen tyto vysvětlivky.

K poučce XXXVI. se praví, že zove onu přímku dvoučástnicí ( $\eta \acute{\epsilon} \kappa \delta \upsilon \omicron \nu \omicron \mu \acute{\alpha} \tau \omega \nu$ ), ježto se skládá ze dvou částí změrných a veličinu změrnou nazývá  $\delta \nu \omicron \mu \alpha$  (v překladě část).

K poučce XXXVII. připomenuto, že přímku nazval dvoustřednicí první, ježto obě části objímají útvar změrný a veličina změrná má přednost.

K XXXVIII. Přímku nazval dvoustřednicí druhou, ježto obě části její objímají útvar střední a střední jest za změrným.

K XXXIX. Přímku nazval nezměrnou větší, ježto změrný součet  $AB^2 + BC^2$  jest větší než střední součin  $2 AB \times BC$ .

Podobně se vykládají i některé jiné názvy přímek nezměrných, které z pouček samých a z příslušných důkazů snadno vysvětliti.)

## 1. XI. xxii.


## Jinak.

Danými třemi úhly rovinnými buďtež  $\angle ABC, \angle DEF, \angle GHK$ , z nichž dva buďte větší než zbývající, jakkoli střídány jsou, a svírejtež je

stejná ramena  $AB, BC, DE, EF, GH, HK$ , a vedme spojnice  $AC, DF, GK$ . Pravím, že možno je z přímek stejných s  $AC, DF, GK$  sestaviti trojúhelník, t. j. opět, že dvě jsou delší než zbývající, jakkoli střídány jsou.

Jsou-li tedy opět úhly při bodech  $B, E, H$  stejné, stejné budou též  $\angle AC, \angle DF, \angle GK$ , a dvě budou větší než zbývající. Pakli ne, buďtež úhly při bodech  $B, E, H$  nesteré, a to  $\angle B > \angle E$  a  $\angle B > \angle H$ ; pročež bude i přímka  $AC > DF$  a též  $AC > GK$ . I jest patrné, že  $(AC + DF) > GK$ ,  $(AC + GK) > DF$ . Pravím, že také  $(DF + GK) > AC$ .

Sestavme na přímce  $AB$  a v bodě na ní  $B$   $\angle ABL$ , stejný s  $\angle GHK$ , a  $BL$  rovnaj se jedné z přímek  $AB, BC, DE, EF, GH, HK$ , a vedme spojnice  $AL, LC$ . A ježto dvě strany  $AB, BL$  jsou jednotlivě stejné s  $GH, HK$  a svírají stejné úhly, tedy základna  $AL = GK$ . A ježto úhly při bodech  $E, H$  jsou větší součtem než  $\angle ABC$ , z nichž  $\angle GHK = \angle ABL$ , proto zbývající  $\angle E > \angle LBC$ . A ježto dvě strany  $LB, BC$  jsou jednotlivě stejné s  $DE, EF$  i  $\angle DEF > \angle LBC$ , tedy základna  $DF > LC$ . Bylo pak dokázáno, že  $GK = AL$ ; pročež  $(DF + GK) > (AL + LC)$ ; avšak  $(AL + LC) > AC$ ; tedy  $DF + GK$  jest o mnoho větší než  $AC$ . A tak z přímek  $AC, DF, GK$  dvě jsou větší než zbývající, jakkoli střídány jsou; možno tedy z přímek stejných s  $AC, DF, GK$  sestaviti trojúhelník; což právě bylo dokázati.




## 2. XI. xxiii.

Avšak buď již střed kruhu na jedné ze stran toho trojúhelníku

totiž na  $MN^*$ ). a buď jím  $O$ , a vedme spojnicí  $OM$ . Pravím opět, že  $AB > LO$ . Neboť není-li tomu tak, buďto  $AB = LO$  nebo  $AB < LO$ . Buďte dříve stejné. Dvě tedy  $AB, BC$ , t. j.  $DE, EF$ , jsou s  $MO, OL$ , t. j. s  $MN$ , stejné. Avšak dáno jest, že  $MN = DF$ ; pročež také  $DE + EF = DF$ ; což právě jest nemožné. Tedy není  $AB$  stejná s  $LO$ . Podobně zajisté ani menší než  $LO$ , neboť tu jest ještě větší nemožnost. Proto  $AB > LO$ . A když podobně postavíme na rovinu kruhu kolmici  $OR$ , aby bylo  $OR^2 = AB^2 - LO^2$ , úloha (strojná) bude vykonána.


Avšak buď již střed kruhu vně trojúhelníku  $LMN$  a buď jím  $O$



\*) Ta ovšem musí býti nejdelší.

a vedme spojnice  $LO$ ,  $MO$ . Pravím ovšem i takto, že  $AB > LO$ . Neboť není-li tomu tak, buďto  $AB = LO$  nebo  $AB < LO$ . Buďte dříve stejné. Dvě tedy  $AB$ ,  $BC$  jsou jednotlivě stejné s  $MO$ ,  $OL$  i základna  $AC = ML$ ; tedy  $\sphericalangle ABC = \sphericalangle MOL$ . Z téže příčiny ovšem i  $\sphericalangle GHK = \sphericalangle LON$ . Pročež celý  $\sphericalangle MON = \sphericalangle ABC + \sphericalangle GHK$ . Avšak  $(\sphericalangle ABC + \sphericalangle GHK) > \sphericalangle DEF$ . Tedy též  $\sphericalangle MON > \sphericalangle DEF$ . A ježto dvě ramena  $DE$ ,  $EF$  jsou stejná s  $MO$ ,  $ON$  i základna  $DF = MN$ , tedy  $\sphericalangle MON$  je stejný s  $\sphericalangle DEF$ . Ukázalo se však že také větší; což právě nesrovnalé. Není tedy  $AB = LO$ . Ihned pak dokážeme, že ani menší. Tedy jest větší. A když na rovině kruhu opět vztýčíme kolmici  $OR$ , tak aby bylo  $OR^2 = AB^2 - LO^2$ , úloha bude vykonána.


Pravím tedy, že ani není  $AB < LO$ . Nuže, možno-li, budiž. A dejme tomu, že  $AB = OP$  a  $BC = OQ$ , a vedme spojnici  $PQ$ .



A ježto  $AB = BC$ , též  $OP = OQ$ . A tak i zbývající  $PL = QM$ . Tedy  $LM \parallel QP$  a  $\triangle LMO$  je s  $\triangle QOP$  stejnoúhlý. Protož  $OL : LM = OP : PQ$  a střídavě  $LO : OP = LM : PQ$ . Avšak  $LO > OP$ ; tedy též  $LM > PQ$ . Avšak  $LM = AC$ ; pročež také  $AC > PQ$ . Ježto tedy dvě  $AB$ ,  $BC$  jsou jednotlivě stejné s  $PO$ ,  $OQ$  i základna  $AC > PQ$ , tož  $\sphericalangle ABC > \sphericalangle POQ$ . Podobně zajisté, i když se vezme  $OU$  za stejnou s  $OP$  neb  $OQ$  a když vedeme spojnici  $PU$ , dokážeme, že též  $\sphericalangle GHK > \sphericalangle POU$ . Sestavme již na přímce  $LO$  a v bodě na ní  $O$   $\sphericalangle LOS = \sphericalangle ABC$  a  $\sphericalangle LOT = \sphericalangle GHK$ , a budiž  $OS = PG = OT$ , a vedme spojnice  $PS$ ,  $PT$ ,  $ST$ . A poněvadž dvě  $AB$ ,  $BC$  jsou stejné s  $PO$ ,  $OS$  a  $\sphericalangle ABC = \sphericalangle POS$ , tedy základna  $AC$  (t. j.  $LM$ )  $= PS$ . Z téže příčiny ovšem i  $LN = PT$ . A ježto dvě  $ML$ ,  $LN$  jsou stejné s  $SP$ ,  $PT$  a  $\sphericalangle MLN > \sphericalangle SPT$ , tedy základna  $MN > ST$ . Avšak  $MN = DF$ ; pročež i  $DF > ST$ . Ježto tedy dvě  $DE$ ,  $EF$  jsou stejné s  $SO$ ,  $OT$  i základna  $DF > ST$ , proto  $\sphericalangle DEF > \sphericalangle SOT$ . Avšak  $\sphericalangle SOT > (\sphericalangle ABC + \sphericalangle GHK)$ ; pročež  $\sphericalangle DEF > (\sphericalangle ABC + \sphericalangle GHK)$ . Avšak  $\sphericalangle DEF$  je též menší; což právě nemožné.

3. Obecně XI. xxxviii.

Když jest rovina na rovině kolmo a z některého bodu v jedné rovině vede se na druhou rovinu kolmice, vedená kolmice padne na společnou průsečnici rovin.



Nuže budiž rovina  $CD$  na rovině  $AB$  kolmo a společnou jejich průsečnicí budiž  $AD$ , i vytkněme na rovině  $CD$  nahodilý bod  $E$ ; pravím, že kolmice vedená z  $E$  na rovinu  $AB$  padne na  $AD$ .

Nuže nebuď tak, nýbrž, možno-li. dopadej mimo jako  $EF$  a stýkej se s rovinou  $AB$  v bodě  $F$ , a z  $F$

vedme na  $DA$  v rovině  $AB$  kolmici  $FG$ , kterážto i na rovině  $CD$  jest kolmo, a vedme spojnici  $EG$ . Ježto tedy  $FG$  jest kolmo na rovině  $CD$  a sbíhá se s ní  $EG$ , jsouc v rovině  $CD$ , tedy  $\sphericalangle FGE = R$ . Avšak též  $EF$  jest na rovině  $AB$  kolmo; pročež  $\sphericalangle EFG = R$ . Tedy v  $\triangle EFG$  jsou dva úhly pravé; což právě nemožné. Pročež kolmice vedená z bodu  $E$  na rovinu  $AB$  nepadne mimo  $DA$ . Tedy dopadne na  $DA$ ; což právě bylo dokázati.

#### 4. XII. iv.

A ježto ty dva hranoly v jehlaně  $ABCG$  jsou si rovny, avšak zajisté i ony dva hranoly v jehlaně  $DEFH$  jsou si rovny, tedy hranol, jemuž základnou rovnoběžník  $BKLO$  a protilehlou přímka  $MP$ , má se k hranolu, jemuž základnou  $\triangle LOC$  a protilehlým  $\triangle PMN$ , jako hranol, jehož základnou  $QERV$  a protilehlou  $ST$ , k hranolu, jehož základnou  $\triangle RVF$  a protilehlým  $\triangle STU$ . Pročež součetně  $(KBOLMP + LOCMP) : LOCMP = (QEVRS + RVFSU) : RVFSU$ . Tedy střídavě  $(KBOLMP + LOCMP) : (QEVRS + RVFSU) = LOCMP : RVFSU$ . Bylo však dokázáno, že  $LOCMP : RVFSU = LOC : RVF = ABC : DEF$ . Pročež také  $\triangle ABC$  má se k  $DEF$  jako dva hranoly v jehlaně  $ABCG$  ke dvěma hranolům v jehlaně  $DEFH$ . Podobně pak, i když rozdělíme zbývající jehlany, na př.  $MNPG$ ,  $STUH$ , týmž způsobem, dva hranoly v jehlaně  $MNPG$  budou se míti ke dvěma hranolům v jehlaně  $STUH$  jako základna  $MNP$  k základně  $STU$ . Avšak  $MNP : STU = ABC : DEF$ . A jako se má tedy základna  $ABC$  k  $DEF$ , tak i dva hranoly v jehlaně  $ABCG$  ke dvěma hranolům v jehlaně  $DEFH$  i dva hranoly v  $MNPG$  ke dvěma hranolům v jehlaně  $STUH$  i ty čtyři k těm čtyřem. A totéž se dokáže o hranolech, které vzniknou rozdělením jehlanův  $AKLP$  a  $DQRS$  a vůbec o všech stejného počtu; což právě bylo dokázati.

#### 5. XII. xvii.

Možno zajisté i případněji dokázati, že  $AY > AG$ . Zřídme v  $G$  na  $AG$  kolmici  $GA'$  a vedme spojnici  $AA'$ . Rozpolujíce tedy obl.  $EB$  a rovněž polovinu jeho a to stále činíce ostavíme nějaký oblouk, který jest menší než oblouk kruhu  $BCDE$  příslušný k těživě stejné s  $GA'$ . Ostavmež, a budiž to obl.  $KB$ . Tedy tětíva  $KB < GA'$ . A ježto čtyřúhelník  $BKSP$  jest v kruhu\*) a  $PB$ ,  $BK$ ,  $KS$  jsou stejné a  $PS$  jest menší,  $\sphericalangle BYK$  jest tupý\*\*). Proto strana  $KB > BY$ . Avšak  $GA' > KB$ ; tedy o mnoho jest  $GA' > BY$ ; pročež i  $A'G^2 > BY^2$ . A ježto  $AA' = AB$ , také  $A'A^2 = AB^2$ . Avšak  $A'A^2 = AG^2 + A'G^2$  a  $AB^2 = BY^2 + YA^2$ ; tedy  $AG^2 + A'G^2 = BY^2 + YA^2$ . z čehož  $BY^2 > A'G^2$ ; pročež zbývající  $YA^2 > AG^2$ ; tedy  $AY > AG$  †).

\*) T. v kruhu opsaném kolem toho čtyřúhelníku.


\*\*\*) Ve čtyřúh.  $BKPS$ , jehož strana  $PS$  jest menší než ostatní,  $\sphericalangle (K + B) < 2R$ , tedy součet polovin  $\sphericalangle (BKY + KBY) < R$ ; pročež  $\sphericalangle BYK > R$ .

†) Následuje přidavek ke XIII. VI., místy nejasný a chybný.

## 6. XIII. v.

Jinak.

Když se přímka rozdělí poměrem krajním a středním, celá s větší úsečkou bude se míti k celé jako celá k úsečce větší.



Nuže buď nějaká přímka  $AB$  rozdělena v  $C$  poměrem krajním a středním a větší úsečkou budiž  $AC$ ; pravím, že  $(BA + AC) : AB = AB : AC$ .  
Nuže dejme tomu, že  $AC = AD$ ; pravím, že  $BD : BA = BA : AC$ . Neboť ježto  $AB$  jest rozdělena v  $C$  poměrem krajním a středním a větší úsečkou jest  $AC$ , tedy  $BA : AC = AC : CB$ . Avšak  $AC = DA$ ; pročež  $BA : AD = AC : CB$ ; obráceně tedy  $DA : AB = BC : CA$ ; a tak součtetně  $DB : BA = BA : AC$ . Avšak  $DA = AC$ ; tedy  $(BA + AC) : AB = BA : AC$ . A ježto bylo dokázáno, že  $DB : BA = BA : AC$  a  $CA = DA$ , tedy  $DB : BA = BA : AD$ . A tak i  $DB$  jest rozdělena v  $A$  poměrem krajním a středním a větší úsečkou jest přímka počáteční  $AB$ ; což právě bylo dokázati.

## 7. XIII. I–V.

Co jest analyse (rozbor) a co synthese (soubor).

Analýse jest dokazování věci vyšetřované, jakoby již byla uznávána, sousledky k nějaké pravdě uznávané vedoucími.

Synthese pak dokazování věci uznávané sousledky k nějaké pravdě uznávané vedoucími.\*)

Analýse a synthese poučky I. bez vyobrazení (pomocného).  
Analýse. Nuže rozdělme nějakou přímku  $AB$ \*\*\*) poměrem krajním a středním v  $C$ , a větší úsečkou budiž  $AC$  a budiž  $AD = \frac{1}{2} AB$ ; pravím, že  $CD^2 = 5 AD^2$ .

Neboť, ježto  $CD^2 = 5 AD^2$  a  $CD^2 = CA^2 + AD^2 + 2 CA \times AD$ , tedy  $CA^2 + AD^2 + 2 CA \times AD = 5 AD^2$ ; pročež odečtením  $AC^2 + 2 CA \times AD = 4 AD^2$ . Avšak  $2 CA \times AD = BA \times AC$ , neboť  $BA = 2 AD$ ; a  $CA^2 = AB \times BC$ , neboť  $AB$  jest rozdělena poměrem krajním a středním; tedy  $BA \times AC + AB \times BC = 4 AD^2$ . Avšak  $BA \times AC + AB \times BC = AB^2$ . Pročež  $AB^2 = 4 AD^2$ . A je tomu tak skutečně, neboť  $AB = 2 AD$ .

Synthese. Ježto tedy  $AB^2 = 4 AD^2$  a  $BA^2 = BA \times AC + AB \times BC$ , tedy  $BA \times AC + AB \times BC = 4 AD^2$ . Avšak  $BA \times AC = 2 DA \times AC$  a  $AB \times BC = AC^2$ ; pročež  $AC^2 + 2 DA \times AC = 4 AD^2$ . A tak  $DA^2 + AC^2 + 2 DA \times AC = 5 DA^2$ . Avšak  $DA^2 + AC^2 + 2 DA \times AC = CD^2$ . Tedy  $CD^2 = 5 AD^2$ ; což právě bylo dokázati.

\*) Smysl je tento: analýse, vycházejíc od pravdy, jež se má dokázati, a předem jí připouštějíc, vede k nějaké pravdě vůbec uznávané; synthese, vycházejíc od podmínek daných, vede ku pravdě, jež se má dokázati.

\*\*) Sem patří druhá část vyobr. předešlého.

## Analýse a synthese poučky II. bez\* vyobrazení.

Analýse. Nuže budiž nějaká přímka  $CD$  (vyobr. k poučce I.) ve dvojmoji rovna pateronásobnému čtverci své úsečky  $DA$  a budiž  $AB = 2 DA$ ; pravím, že  $AB$  jest rozdělena v bodě  $C$  poměrem krajním a středním a že větší úsečkou jest  $AC$ , kterážto jest zbývající částí přímky počáteční.

Ježto  $AB$  jest rozdělena v  $C$  poměrem krajním a středním a větší úsečkou jest  $AC$ , tedy  $AB \times BC = AC^2$ . Také však  $BA \times AC = 2 DA \times AC$ , neboť  $BA = 2 AD$ ; pročež  $AB \times BC + BA \times AC$  (což právě jest  $AB^2 = 2 DA \times AC + AC^2$ ). Avšak  $AB^2 = 4 DA^2$ ; tedy též  $2 DA \times AC + AC^2 = 4 AD^2$ ; a tak  $DA^2 + AC^2 + 2 DA \times AC$  (což jest  $CD^2 = 5 DA^2$ ). A je tomu tak skutečně.

Synthese. Ježto tedy  $CD^2 = 5 DA^2$  a  $CD^2 = DA^2 + AC^2 + 2 DA \times AC$ , tedy  $DA^2 + AC^2 + 2 DA \times AC = 5 DA^2$ . Odečtením  $2 DA \times AC + AC^2 = 4 AD^2$ ; jest pak také  $AB^2 = 4 AD^2$ ; pročež  $2 DA \times AC$  (t. j.  $BA \times AC$ )  $+ AC^2 = AB^2$ . Avšak  $AB^2 = AB \times BC + AB \times AC$ ; tedy  $BA \times AC + AB \times BC = BA \times AC + AC^2$ . A odečtením veličiny společné  $BA \times AC$  zbývající tedy  $AB \times BC = AC^2$ . Pročež  $AB : AC = AC : BC$ . Avšak  $BA > AC$ , tedy též  $AC > CB$ ; a tak  $AB$  rozdělena je v  $C$  poměrem krajním a středním a větší úsečkou jest  $AC$ ; což právě bylo dokázati.

## Analýse a synthese poučky III.

Analýse. Nuže budiž přímka  $AB$ \*) rozdělena v bodě  $C$  poměrem krajním a středním a větší úsečkou budiž  $AC$  a  $CD$  polovinou úsečky  $AC$ ; pravím, že  $BD^2 = 5 CD^2$ .

Ježto je totiž  $BD^2 = 5 CD^2$  a  $DB^2 = AB \times BC + DC^2$  (II. VI), tedy  $AB \times BC + DC^2 = 5 DC^2$ ; odečtením  $AB \times BC = 4 DC^2$ . Avšak  $AB \times BC = AC^2$ , neboť  $AB$  jest rozdělena v  $C$  poměrem krajním a středním; pročež  $AC^2 = 4 DC^2$ . A tak tomu skutečně, neboť  $AC = 2 DC$ .

Synthese. Ježto  $AC = 2 DC$ ,  $AC^2 = 4 DC^2$ , avšak  $AC^2 = AB \times BC$ ; pročež  $AB \times BC = 4 DC^2$ . Tedy součtetně  $AB \times BC + DC^2$  (t. j.  $DB^2 = 5 DC^2$ ; což právě bylo dokázati.

## Analýse a synthese poučky IV.

Analýse. Nuže budiž přímka  $AB$  rozdělena v  $C$  poměrem krajním a středním a větší úsečkou budiž  $AC$  (vyobr. jako k poučce I. — bez  $AD$ ); pravím, že  $AB^2 + BC^2 = 3 AC^2$ .

Neboť, ježto  $AB^2 + BC^2 = 3 AC^2$ , avšak  $AB^2 + BC^2 = 2 AB \times BC + AC^2$  (II. VII), tedy  $2 AB \times BC + AC^2 = 3 AC^2$ ; pročež odečtením  $2 AB \times BC = 2 AC^2$ ; a tak  $AB \times BC = AC^2$ . A skutečně tomu tak, neboť  $AB$  jest rozdělena v  $C$  poměrem krajním a středním.

Synthese. Ježto  $AB$  jest rozdělena v  $C$  poměrem krajním a středním a větší úsečkou jest  $AC$ , tedy  $AB \times BC = AC^2$ , pročež  $2 AB \times BC = 2 AC^2$ ; přičítáním tedy  $2 AB \times BC + AC^2 = 3 AC^2$ . Avšak  $2 AB \times BC + AC^2 = AB^2 + BC^2$ ; proto  $AB^2 + BC^2 = 3 AC^2$ ; což právě bylo dokázati.

\*) Sem patří třetí část vyobr. předešlého.



## Analyse a synthese poučky v.

Analyse. Nuže budiž nějaká přímka  $AB$  rozdělena v  $C$  poměrem krajním a středním a větší úsečkou budiž  $AC$  a budiž  $AD = AC$  (vyobr. jako k doplňku 6.); pravím, že  $DB$  jest rozdělena v  $A$  poměrem krajním a středním a že větší úsečkou jest  $AB$ .

Ježto je totiž  $DB$  rozdělena v  $A$  poměrem krajním a středním a větší úsečkou jest  $AB$ , tedy  $DB:BA = BA:AD$ . Avšak  $AD = AC$ ; pročež  $DB:BA = AB:AC$ ; tedy zvrtně  $BD:DA = AB:BC$ ; a tak odčteně  $BA:AD = AC:BC$ . Avšak  $AD = AC$ ; tedy  $BA:AC = AC:CB$ . A tak tomu skutečně, neboť  $AB$  jest rozdělena v  $C$  poměrem krajním a středním.

Synthese. Ježto  $AB$  jest rozdělena v  $C$  poměrem krajním a středním, tedy  $BA:AC = AC:CB$ . Avšak  $AC = AD$ ; pročež  $BA:AD = AC:CB$ ; součteně  $BD:DA = AB:BC$ ; zvrtně  $DB:BA = BA:AC$ . Avšak  $AC = AD$ ; tedy  $DB:BA = BA:AD$ . A tak  $DB$  jest rozdělena v  $A$  poměrem krajním a středním a větší úsečkou jest  $AB$ ; což právě bylo dokázati.

## 8. XIII. xvii.

Nuže buď změrná přímka  $AB$  rozdělena v  $C$  poměrem krajním a středním a větší úsečkou budiž  $AC$ . Mimo to pak budiž  $AD = \frac{1}{2} AB$  (vyobr. jako k analýsi poučky i.). Tedy též  $AD$  je změrná. A ježto  $CD^2 = 5 DA^2$  (XIII. i.), tedy  $CD, DA$  jsou změrné, jen ve dvojnásobku souměřitelné. Pročež  $AC$  jest úsečnice (X. LXXIII).  $AB$  však je změrná. Čtverec\*) pak z úsečnice, přistaven jsa ku přímce změrné, šířkou činí úsečnici (X. xcvi.); tedy  $BC$  jest úsečnice. Pročež  $AC$  i  $CB$  jsou úsečnice; což právě bylo dokázati. A příslušnou k  $AC$  jest  $AD$ , k  $CB$  pak  $CD$ .

## 9. XIII. xviii.

Jiný důkaz, že  $MB > NB$ .

Ježto je totiž  $AD = 2 DB$ , tedy  $AB = 3 BD$ . Též  $AB:BD = AB^2:BF^2$ , protože  $\triangle FAB$  je s  $FDB$  stejnoúhlý. Pročež  $AB^2 = 3 BF^2$ . Bylo pak dokázáno, že  $AB^2 = 5 KL^2$  (XIII. xviii.). Tedy  $5 KL^2 = 3 BF^2$ . Avšak  $3 BF^2 > 6 NB^2$ . Proto též  $5 KL^2 > 6 NB^2$ . A tak i  $KL^2 > NB^2$ . Pročež  $KL > NB$ . Avšak  $KL = LM$ . Tedy  $LM > NB$ . Pročež  $MB$  jest mnohem větší než  $BN$ ; což právě bylo dokázati. Že však  $3 FB^2 > 6 NB^2$ , dokážeme takto; poněvadž totiž  $BN > NF$ , tedy  $FB \times BN > BF \times FN$ . Pročež  $(FB \times BN + BF \times FN) > 2 BF \times FN$ . Avšak  $FB \times BN + BF \times FN = FB^2$  a  $BF \times FN = NL^2$ . Tedy  $FB^2 > 2 NB^2$ . A tak i  $3 FB^2 > 6 NB^2$ ; což právě bylo dokázati\*\*).

\*) Třebas i ve způsobě obdélníku.

\*\*\*) Ve vyd. Heibergově za touto částí následuje ještě druhý přídavek (appendix). Obsahuje jiné výklady od XI. XXXVI. do konce a celé kn. XII. kromě poučky VI.; je však pln chyb opisovačských a bez obrazcův. Z té příčiny jsem tohoto přídavku nepřeložil.

## Chyby fiskové.

Str. 33. XIII. ř. 2. místo čtverec čti *čtverce*.

- > 35. II. místo vezmou, vezměme čti *vytknou, vytkněme*; a tak v této části častěji, pokud se hodí sloveso vytknouti místo vzíti.
- > 69. vým. 10. na konci místo úměrou čti *úměru*.
- > 69. pozn. 4. místo  $a:b = a:c$  čti  $a:b = b:c$ .
- > 69. pozn. 8. čti  $(a+b):b = (c+d):d$ .



EUKLEIDOVY ZÁKLADY.



EUKLEIDOVY  
ZÁKLADY

(ELEMENTA).

řídil.

FRANTIŠEK SERVIT.