



Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin

Bazální krytosemenné

Petr Bureš




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost




INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Bazální krytosemenné rostliny



Bazální krytosemenné




Parafyletický
„taxon“

Jeho linie sesterské ke
zbytku odvozenějších
krytosemenných –
– k jednoděložným
– i k dvouděložným

Bazální krytosemenné



27 nejprimitivnějších čeledí původně řazených k dvouděložným



Magnoliopsida**Liliopsida****Rosopsida**

	<i>Bazální krytosemenné</i>	<i>Jednoděložné</i>	<i>Dvouděložné</i>
pyl	monokolpátní	monokolpátní	trikolpátní
okvěti	často nerozlišené	často nerozlišené	většinou rozlišené
čepel listů	jednoduchá, celistvá	jednoduchá, celistvá	jednoduchá i členěná
žilnatina listová	často jednoduše zpeřená	obloukovitě souběžná nebo rovnoběžná	dlanitá nebo složitě zpeřená
dělohy	2 (vzácně 1)	1	2
stonkové cévní svazky	eustélé, vzácně ataktostélé	ataktostélé	eustélé
řapík listů	ano	často bez	ano
hlavní kořen	vytrvává	zaniká, nahrazen adventivními	vytrvává
habitus	dřeviny nebo vodní byliny	většinou byliny	byliny i dřeviny
četnost květů	polymerické nebo trimerické	trimerické	tetra- a pentamerické
xylem	homo i heteroxylární	většinou heteroxylární	heteroxylární
perforace trachejí	schodovitá	jednoduchá	jednoduchá
souměrnost květů	většinou aktinomorfni	aktinomorfni i zygomorfni	aktinomorfni i zygomorfni
květy	acyklické nebo spirocyklické	cyklické	cyklické
rozšíření	tropy	různé	různé





primitivnější zástupci - xylem bez trachejí
(*Amborellaceae*, *Magnoliaceae* a
Nymphaeaceae, vzácněji *Lauraceae* a
Piperaceae);
pokud mají tracheje, tak s primitivní
terminální **schodovitou perforací**



listy většinou jednoduché celistvé; střídavě postavené, pouze u *Magnoliaceae* s palisty, jinak bez nich



monokolpátní pyl – průduchy mají jedinou štěrbinu nebo otvor



květní části

- neustálený větší počet,
- většinou ve spirále
- nesrostlé
- obaly nerozlišené



Jen nejodvozenější (*Aristolochiales*)
srostlé a zygomorfní
s ustáleným počtem
s obaly rozlišenými



někdy
přechody
mezi květními
částmi –
nejčastěji
mezi petaly a
tyčinkami,


častá je
přítomnost
sterilních
tyčinek –
staminodií



Gyneceum - u původních apokarpní, u pokročilejších cénokarpní,


plodolisty se uzavírají až během ontogeneze

nejprimitivnější konce zralých plodolistů uzavřeny jen slepením hustého porostu žláznatých trichomů lemujících okraje zpočátku pouze konduplikátně svinutých plodolistů



Zárodečný vak má často jen 4 jádra

Čtyřjaderný zárodečný vak typu *Nuphar/Schizandra* typický pro bazální krytosemenné




Nejběžnější typ osmijaderného zárodečného vaku (typ *Polygonum*)


vajíčka často s malým embryem,
silně vyvinutým perispermem a silným
obalem (embryo : semeno = 0,05–0,1)

**(D) Basal angiosperms:
Nymphaeaceae**


Nuphar luteum



**(E) Angiosperms:
Basal Eudicots
Ranunculaceae**




**(F) Angiosperms:
Core Eudicots**





častým typem opylení je kantarogamie (opylení brouky) nebo jiná entomogamie

(brouci divergovali dříve než ostatní hlavní hmyzí opylovači)



trias jura křída



druhohory

s entomogamním opylením úzce souvisí **termogenní květy**

- jsou schopné metabolicky se ohřívat nebo udržovat optimální teplotu a uvolňovat tak látky lákající hmyz

- mimo bazální krytosemenné mají tuto schopnost cykasy a vzácně je i v krytosemenných čeledích *Nelumbonaceae* (bazální dvouděložné) *Cyclothaceae*, *Araceae* a *Arecaceae* (jednoděložné).



3 nejbazálnější větve
krytosemenných tvoří řády:

1. *Amborellales*

2. *Nymphaeales*

3. *Austrobaileyales*

celkem k nim patří jen
pět čeledí označovaných

„ANITA“

Amborellaceae,

Nymphaeaceae,

Ilicaceae (= Schisandraceae),

Trimeniaceae,

Austrobaileyaceae



**1. řád *Amborellales*
s jedinou čeledí
Amborellaceae – amborelovité**



Amborellaceae – amborelovité

Monotypická čeleď s jediným
druhem *Amborella*
trichopoda,

vlhké stinné horské lesy



endemickým
na **Nové**
Kaledonii.

Dvoudomý keř
6–8 m vysoký.




Growth habit of *Amborella trichopoda* Baill. from Mt. Aoupinie, Province Nord, New Caledonia



Official Publication of the Botanical Society of America, Inc.

Sesterský taxon všech ostatních krytosemenných. Oddělil se již počátkem druhohor – v triasu – před 230 miliony let




- Listy**
- jednoduché, kožovité
 - s celistvým, zvlňeným až laločnatým okrajem
 - střídavé, bez palistů
 - se zpeřenou žilnatinou



Xylem



bez trachejí



dřeňové paprsky multiseriální




dvůrkaté dvojtečky

Květy

- jednopohlavné, drobné,
- v latách


Amborella trichopoda – samčí květenství






B


Samčí květ – několik okvětních lístků ve šroubovici Tyčinek mnoho s plochými, lístkovitými, jednožilnými nitkami srostlými bázemi s okvětními lístky a široké konektivy.



A




B



C

Amborella trichopoda – samčí květy




Samičí květ



Okvětí několik lístků ve šroubovici

Staminodia

ukazují svojí přítomností na původní oboupohlavnost






Gyneceum apokarpní, plodolistů nejčastěji 5




Plodolist

- neuzavřený
- s čnělkovým kanálem
- s mohutným bliznovým kartáčkem
- s jedním dvouobalým anatropním vajíčkem s velkým nucellem



Unikátní zárodečný vak má 9 buněk ! Liší se tím od zbývajících bazálních krytosemenných

Od nejběžnějšího
Polygonum typu se liší
tím, že má o jednu
synergidu víc





Plod peckovice



© P. P. Lowry II, 1997


B

Semena - velký endosperm
malý perisperm
malé embryo se 2 dělohami



2. řád *Nymphaeales*


se 3 čeleděmi – významná je *Nymphaeaceae*, leknínovitě



Vodní, ve dně kořenující rostliny


Nymphaeaceae – leknínovité

4/48 po celém světě, s výjimkou
nejsušších a nejchladnějších
oblastí



Leknínovité jsou sesterskou linií
ke všem kvetoucím rostlinám
kromě amborely, podle
molekulárních hodin se oddělily
před ca. 210 miliony let v triasu.

Dlouho u nich neexistovaly
fosilní důkazy starší než z křídy



Publikovány r. 2002 Jamesem Kirklandem a spol. z vrstev **spodní jury** (> **175 Mya**) na lokalitě St. George ve státě Utah v USA v obskurním časopise Utah Geological Survey Notes v článku o stopách dinosaurů


UTAH GEOLOGICAL SURVEY
SURVEY NOTES
Volume 34, Number 3
September 2002



4 SURVEY NOTES

The St. George Dinosaur Tracksite


by James I. Kirkland (UGS), Martin Lockley (University of Colorado at Denver), and Andrew R. Milner (City of St. George)




Fossil traces from the Johnson farm dinosaur tracksite. A) *Eubrontes* track cast on underside of main sandstone; note the long trace of the underside of claw or middle toe indicating the animal slipped in the mud. B) *Eubrontes* track cast on underside of main sandstone. C) Detail of *Eubrontes* track cast on underside of main sandstone showing skin impression. D) Underside of main sandstone showing mud cracks, fillings, and scour that removed part of *Eubrontes* track cast (large arrow). Note *Grallator* (small arrow) on scour surface indicating multiple episodes of track formation and preservation. E) Salt casts and mud-crack fillings on underside of main sandstone. F) Casts of *Grallator* swim tracks (arrows) on underside of main sandstone. G) Abundant *Grallator* track casts on parting surface 4 inches above base of main sandstone; arrow points to *Eubrontes*. H) Small tracks on same parting surface as shown in G. I) Symmetrical ripple marks overlying layer with abundant *Grallator* tracks at top of main sandstone. J) Track of running or swimming *Grallator* at top of main sandstone. K) Tiny dinosaur track at top of main sandstone. L) Unusual lily-like plant fossil at top of main sandstone.

Otisky listů silně připomínají recentní druh *Nuphar polysepala*

Také blízce příbuznou čeleď *Hydatellaceae* patřící do řádu stejného řádu **Nymphaeales** lze zřejmě doložit už ze **střední jury (> 164 Mya)**



Recentní *Hydatellaceae* *Hydatella australis*



Čínská provincie
Vnitřní Mongolsko




Trithuria submersa



Listy - celistvé,

- zpravidla větší velikosti,
- extrémně dlouze řapíkaté,
- splývají na hladině,
- mají vzduchové dutiny




Stonek = tlustý oddenek v bahně





Řapíky listů –
aerenchym,
cévní svazky
ataktostélicky
rozmístěné,


Xylem bez
trachejí





V aerenchymu četné
astroklereidy =
idioblasty vyplněné
krystalickým
šřavelanem
vápenatým



V pletivech alkaloidy



Květy velké, jednotlivé na dlouhých stopkách s aerenchymem
vyrůstajících přímo
z oddenku,
zpravidla
oboupohlavné,
spirocyklické,
aktinomorfní,
vonné, většinou
heterochlamydní





Obal květu:
4–6 sepalů
mnoho spirálně
uspořádaných
petalů



www.ulsamer.at

Tyčinky mnoho (40–80), spirálně uspořádaných;
přechody mezi petaly a tyčinkami,



Pestík = 5–35, apokarpní, plodolisty s mnoha (10–100) vajíčky s laminární placentací. Plodolisty často obrostlé květním lůžkem a pestík se proto jeví jako cénokarpní (pseudocoenokarpní)
Opylení hmyzem



Nymphaea sp.
Nymphaeaceae
© G. D. Carr




Plod měchýřek (v souplodí
mnohoměchýřek - multifolliculus)

Zárodečný vak

- 4 jaderný

Endosperm

- diploidní



Semena


- s dominantním perispermem (= zbytek nucellu),
- s malým endospermem (kontrast proti amborele)

Embryo


- drobné
- často s 1 dělohou



Nymphaea – semeno – příčný řez



Nuphar – semeno – příčný řez



V ČR rostou ve stojatých vodách 4 druhy.

Rod leknín má květy heterochlamydeické, semena s míškem. Leknín bělostný (*Nymphaea candida*) – vzácný a ohrožený původní druh, leknín bílý (*N. alba*) – často vysazovaný v různých barevných formách květu.



Stulík žlutý (*Nuphar luteum*) –
vzácný a ohrožený druh,



Nuphar polysepalum
Nymphaeaceae
© G. D. Carr

Nuphar polysepalum
Nymphaeaceae
© G. D. Carr



stulík malý
(*Nuphar pumila*)
– vzácně roste v
jižních Čechách
a na jihozápadní
Moravě.

Dužnatý plod stulíku se zachovalým bliznovým terčem
(pseudocénokarpní - spojený květním lůžkem)



V jižní Americe *Victoria cruziana* nebo *V. amazonica* (= *V. regia*).

Ohromné listy, které díky pevnosti a mohutně vyvinutému aerenchymu unesou na vodě i malé dítě.

Viktorii královskou objevil náš botanik a cestovatel Tadeáš Haenke 1801 v poříčí Amazonky.



COPYRIGHT J.R. MANHART



magnoliidy

„Čtvrtá bazální“ větev
krytosemenných

Má už složitější
fylogenetickou strukturu,
zahrnující 20 čeledí,
patřících k pěti řádům:

- (1) *Canellales*,
- (2) *Chloranthales*,
- (3) *Laurales*
- (4) *Magnoliales*
- (5) *Piperales*




3. řád *Magnoliales* šácholánokvěté



dříve považované za nejprimitivnější větev krytosemenných



All branches have greater than 80% support.



There are direct links from all terminal taxa and all internal nodes to the relevant page of the characterizations.

Řád *Magnoliales* – šácholanotvaré dřeviny tropů a subtropů, nejdůležitější je čeleď *Magnoliaceae*

Magnoliaceae – šácholanovité 2/227



dřeviny vlhkých lesů
tropů a subtropů Ameriky
a JV Asie

České jméno šácholán pochází od tvaru
soplodí připomínající šišku = šách.





Listy střídavé, jednoduché, celistvé, řapíkaté, opatřené objímavými palisty (záhy opadavými).

Tvar listů může být vzácně čtyřlaločný (*Liriodendron*), u fosliních i dvoulaločný.



souplodí
měchýřků




*Archaeanthus
linnenbergeri* ze
stř. křídly

Dřevo má tracheje s primitivní schodovitou perforací.



Liriodendron tulipifera, podélný řez tracheou

Květy velké, jednotlivé, homochlamydní, většinou oboupohlavné, polymerické, acyklické nebo spirocyklické



Tyčinky

četné, spirálně uspořádané, hypogynické s páskovitými nitkami



Gyneceum apokarpní
z mnoha plodolistů (často
s difúzní bliznou) spirálně
uspořádaných



Vyklenuté květní lůžko






Opylení kantarogamie nebo jiná entomogamie



Karpely
Semena


nesou dvě nebo více vajíček.
s bohatým endospermem a malým embryem.



Plody nejčastěji měchýřky
nebo nažky v šišticovitém
souplodí



Magnolia grandiflora



Nejbohatší rod *Magnolia* - 80–120 druhů, klimaticky nejotužilejší – zasahují až po sever Japonska, u nás rostly v třetihorách,



okrasné stromky

východoasijská *Magnolia liliiflora* (šácholan vejčitý)

severoamerická *Magnolia grandiflora* (šácholan velkokvětý)

popř. hybridní *Magnolia x soulangeana*




*Magnolia
liliiflora*



*Magnolia
x soulangeana*

Rod *Liriodendron* má jen dva druhy: *Liriodendron chinense* domácí v Číně a *L. tulipifera* domácí v USA.




4. řád *Piperales* pepřovníkovité



4. Řád *Piperales*


dřeviny, liány nebo byliny
převážně tropického a
subtropického rozšíření,
častěji zejména na jižní
polokouli.



4. Řád *Piperales* – ze 4 čeledí jsou důležité:

Piperaceae

Aristolochiaceae



Piperaceae – pepřovníkovité


5-8/3000, byliny, keře a liány





pantropické rozšíření,
zejména v oblastech deštných
pralesů

cévní svazky – sklony k rozptýlenosti – **ataktostélii**

tracheje s jednoduchou i
schodovitou perforací




pletiva – prostoupená **sekretoními buňkami**
s ostře palčivými silicemi



listy

jednoduché, většinou střídavé, obvykle s
palisty.


květy **drobné**,
většinou **oboupohlavné**, v **hustých**
klasech nebo **hroznech**,
v paždí listenů



opylení – vítr nebo hmyz

- P chybí
- A obvykle 2 nebo 3+3
- G obvykle (3)
obvykle s jediným vajíčkem / G





Piper Cubeba.
Vertical section of fruit
(mag.).



Piper nigrum.
Fruit cut vertically (mag.).

plod bobule,
obvykle
jednosemenná

malé přímé
embryo

menší
endosperm


velký
perisperm



Pepřovník černý (*Piper nigrum*) – liánovitý keř z JV Asie, černý a bílý pepř = sušené bobule se slupkou nebo bez



Válcovité jehnědy až 15 cm dlouhé.





Pepřovník betelový (*Piper betle*)

Malajci žvýkán s arekovými semeny a vápnem vypáleným z ulit měkkýšů. Stimulans při fyzické práci; tvoří červené sliny, jsou vyplivovány, takže místa žvýkání bývají dobře patrná. Zuby od betelu černají.



Jihoamerické pepřovníky – např. *Piper geniculatum*, *P. caudatum* aj. využívány indiány k výrobě šípového nervového jedu **kurare**



Phyllobates terribilis





Peperomia argyreia

Druhy rodu pepřinec (*Peperomia*) se pěstují v domácnostech pro listy (bez palistů) s okrasnou kresbou,


Peperomia obtusifolia






***Aristolochiaceae* – podražcovité**

9/490, nejodvozenější čeleď v rámci bazálních krytosemenných (především symetrií květů, srůsty květních částí a žilnatinou listů), kromě dřevin a lián často i **vytrvalé byliny** vyskytující se od tropů a subtropů celého světa až po temperátní zónu.

U nás zastoupeny oba druhově nejbohatší rody čeledi *Asarum* a *Aristolochia*.




dřevo heteroxylární;
 tracheje s **jednoduchou** perforací
 pletiva se siličnými buňkami,
 s éterickými oleji, terpenoidy a alkaloidy
 široké mezisvazkové kambium tvoří široké parenchymatické
 paprsky mezi xylemem spojující trvale centrální dřev s
 primární kůrou – tato struktura dodává zdřevnatělému
 lánovitému stonku elasticitu



listy

zpravidla jednoduché, střídavé, řapíkaté, bez palistů, mají **dlanitou žilnatinu** a často srdčitou bázi čepele.








květy

homochlamydní, oboupohlavné, **cyklické**, **trojčetné**, **syntepalní**, aktinomorfni nebo **zygomorfni**, srostlé v esovitou trubku, často jednotlivé





Aristolochia **6 tyčinek**
 přirostlých k čnělce
 tvořících sloupek =
 gynostemium



Asarum **6+6 tyčinek** volných s
 mohutným konektivem


gyneceum
semeník
placentace

cénokarpní většinou ze 6 plodolistů, synkarpní
spodní
axilární, vajíček mnoho





plod většinou tobolka
semeno s bohatým olejnatým
endospermem a drobným
embryem.



semeno



přehrádečná
tobolka




Aristolochia galeata

Květy se liší u rodů:

Aristolochia: P(3) A6, G(6) spodní

Asarum: P(3+3) A6+6, G(6) spodní



Asarum europaeum pensum kopytník evropský


plazivý oddenek,
stálezelené kožovité ledvinité listy,
listnaté lesy a křoviny
kvete v březnu a dubnu.

České jméno od tvaru listové čepele,
připomínající koňské kopyto.

Vědecké jméno *Asarum* má různé etymologické
výklady (řec. asaron = bez větví, řec. asé =
hnus, ošklivost, řec. aséros = koberec atd.).



Rozemnuté listy voní kafrem. **Jedovatý**, ale využíváný jako léčivka. Peprvou až kafrovou chuť a zápach způsobuje silice tvořená z 30–35% jedovatým **asaronem**, ten působí místně dráždivě, po vstřebání ochrnuje cévy a CNS.



Po požití zvracení a silný průjem, podráždění ledvin, slabost, rozšíření zorniček, posléze smrt v kolapsu.

Sušený a na prášek utlučený - přísada do šňupavého tabáku.



Nenápadné přizemní květy často skryté pod spadaným listím slouží jako úkryt hmyzu nebo někdy i slimáků – kteří mohou přenášet pyl – **moluskogamie**.



slimák !

Podlouhlá semena mají
olejnaté masíčko,

Masíčko je potravou pro
mravence, kteří semena
přenášejí a rostlinu tak
rozšiřují – **myrmekochorie**.



Mnohé druhy podražců se pěstují pro bizarní tvary a zbarvení okvěť; u brazilské *A. gigantea* dosahují květy až 30 cm v průměru. Jako léčivky se užívají evropský *Aristolochia clematitis* a severoamerický *A. serpentaria*, používaný dříve taky jako prostředek proti uštknutí chřestýšem.




Aristolochia serpentaria



Aristolochia gigantea

Mnohé druhy podražců se pěstují pro bizarní tvary a zbarvení okvěť




Aristolochia fimbriata

- Nápadné květy podražců jsou protogynické
- do květů se zralými pestíky je vpuštěn hmyz obalený pylem
 - kvůli chlupům nemůže ven
 - po dozrání prašníků uzavírací chlupy odpadnou a hmyz obalený pylem může ven a do dalších květů



Legend:

- li - limb
- fa - fauces
- an - annulus
- tu - tube
- sy - syrinx
- ut - utricle
- gy - gynostemium
- ov - ovary



Jinou koevoluční pozoruhodností mezi hmyzem a podražci – je motýl *Battus philenor*, jehož housenky jsou plné jedu z arizonského *Aristolochia watsonii* a svojí varovně červenou barvou na to upozorňuje i své případné predátory



Aristolochia littoralis
Aristolochiaceae
G. K. Linney



Aristolochia littoralis
Aristolochiaceae
© G. D. Carr



Aristolochia elegans




Dutchman's Pipe Vine
(*Aristolochia elegans*)
Jack Scheper
© 2002 FloridaData.com



Aristolochia grandiflora



Aristolochia tricaudata



Aristolochia rotunda — její květy „voní“ jako exkrementy ploščic, které nabodávají jejich floem – to láká mouchy rodu *Trachysiphonella*, které se živí exkrementy ploščic do květů, v nichž jsou lapeny a slouží jako opylovači



středoamerická *Aristolochia arborea*

imituje plodnice dřevokazných hub – drobný houbožravý hmyz obalený pylem a přilákaný houby imitující vůní je opylí, navíc naklade do květů i vajíčka a larvy se pak obalí pylem z později dozrálých prašníků a po opuštění „pastí“ poslouží jako nová generace opylovačů



V současném pojetí je do čel. *Aristolochiaceae* řazena i podčeď *Hydnoroideae* (dříve samostatná čeď) bizarních kořenových parazitických rostlin s masitým okvětím

