


Adaptace prvků k parazitismu

- Strukturální
- Biologické
- Fyziologické
- Biochemické
- Ekologické
- Molekulární



Možnosti studia parazitologie

Bakalářský stupeň:

Obecná parazitologie (Gelnar + Šimková)

Speciální parazitologie (Řehulková)

Základy humánní parazitologie (Gelnar)

Magisterský stupeň (povinně volitelné)

Biologie parazitických protozoí (Koudela)

Biologie parazitických helmintů (Kašný)

Biologie parazitických členovců (Valigurová)

Lékařská parazitologie a diagnostika (Ditrich)

Magisterský stupeň + DSP (volitelné)

Parazito-hostitelské interakce (Horák)

Patologie parazitismu (Dyková)

Imunologie parazitismu (Salát)

Ekologie parazitů (Vetešníková-Šimková)

Další související přednášky:

Evoluční ekologie (Vetešníková-Šimková)

Histologie (Hodová)


Mikroskopická (Zoologická) technika
(Seifertová)

Mikroskopické zobrazovací techniky
(Mašová)


Biostatistika (Jarkovský)

Adaptace prvků k parazitismu

- Strukturální
- Biologické
- Fyziologické
- Biochemické
- Ekologické
- Molekulární



Tvarová různorodost prvoků



Historie mikroskopické technika




ANTONIUS A LEEUWENHOEK.
*Regiae Societatis Londinensis
membrum.*

I Verkelye pinx.


A de Blou fec.

Obr. 2 Antonius van Leeuwenhoek, zakladatel vědecké mikroskopie.




b

Historie mikroskopické techniky




Kentův systém protozoí - 1882




Obr. 31 Kentův systém protozoí (z Kenta: Manual of the Infusoria, Vol. I, Londýn 1882).

Konvergence při evoluci prvoků



Obr. 32 Konvergence při evoluci schránek u nepříbuzných skupin. **a + b** *Codonella cratera* (nálevník), **c + d** *Diffugia* (kryténka) (z Foissnera a Hausmanna: Mikrokosmos 76: 258, 1987. Zvětš. a 1 500x, b 700x, c 450x, d 220x).

Evoluce klasifikačních systémů



Obr. 33 „Distance matrix tree“ sestavený z úplných sekvencí malých podjednotek rRNA, překrývající se s částí sekvenčních dat tří různých nálevníků (ze Schlegela: Europ. J. Protistol. 27: 207, 1991).

Evoluce protozoí - současnost






Figure 4.11 Phylogeny of the eukaryotes according to Adl et al.¹

The tree is based largely on ultrastructural features and shows proposed relationships between various groups. Archaeplastida includes algae and green plants; other groups (e.g. Jakobida) may be free living and thus not mentioned in the text. Note that according to this phylogeny, amebas with lobose pseudopods (e.g. *Entamoeba* sp.) are not necessarily the closest relatives of those amebas with complex skeletons and often branching pseudopods (e.g. the foraminiferans).


Redrawn from the *J. Eukaryotic Microbiology*, volume 52, issue 5 cover illustrating the classification of Adl et al. 2006. The new higher level classification of eukaryotes with emphasis on the taxonomy of protists. *J. Euk. Microbiol.* 52:399–451.

Trypanosomatidea




Obr. 56 Trypanosomatidea:
 a krevní formy *Trypanosoma brucei* mezi erytrocyty.
 b *Trypanosoma fallisi*.
 c schéma ultrastruktury *T. congolense*. d kinetoplast (kp) u *Blastocerithidia triatomae*. e rozprostřené kroužky kDNA kinetoplastu *Crithidia fasciculata*.
 n = jádro, um = undulující membrána (b z Martina a Dessera: J. Protozool. 37: 199, 1990, c převzato z Vickermana, d laskavostí H. Mehlhorna, Bochum, e z Pérez-Morga a Eglunda: J. Cell Biol. 123: 1969, 1993). Zvětš. a 1 000x, b 1 100x, c 8 000x, d 40 000x, e 80 000x.

Diplomonadea - Giardia




Obr. 44 Diplomonadea: **a** *Giardia* (= *Lamblia*) se dvěma jádry (n) a osmi bičíky (f). **b** adhezivní disk u *Giardia* (a z Grella: Unterreich Protozoa, Einzeller oder Urtiere. In: Lehrbuch der Speziellen Zoologie, 4. vyd., ed. H.-E. Gruner, Stuttgart 1980; b, laskavostí D. V. Holbertona, Hull). Zvětš. a 3 000x, b 7 000x.

Gregarinea – (a) pár gamontů spojených v syzigii, (b) typy epimeritu a (c) epimerit a protomerit a deutomerit





Obr. 89 Gregarinea: a pár gamontů spojených v syzigii. b různé typy epimeritů. c typická podoba epimeritu (epm), protomeritu (prm) a deutomeritu (dem) a schéma intracelulárně přichyceného epimeritu (b + c převzato z Légera). Zvětš. a 100x.

Apicomplexa - sporozoit




Obr. 84 Apicomplexa: **a** sporozoit. ac = apikální komplex, min = mikronemy, rho = rostrie.
b mikropór v příčném (vlevo) a podélném průřezu (vpravo). pm = plazmatická membrána, ims = systém vnitřních membrán (alveoly) (převzato z Scholtysecka a Mehlhorna).

Apicomplexa - oocysty




Obr. 82 Apicomplexa:
a oocysty *Eimeria stiedai*.
b oocysta druhu r. *Eimeria* z rekta gekona. **c** schéma oocysty. n = jádro,
oc = stěna oocysty,
rb = světlolomné tělíska,
rbo = zbytkové tělíska
oocysty, rbs = zbytkové
tělíska sporocysty,
spc = sporocysta,
spz = sporozoit.
(b laskavostí B. Bannerta,
Berlín). Zvětš. a 300x,
b 1 600x.

Schéma apikálního komplexu




Obr. 85 Apicomplexa:
konoidová oblast sporozoit.
a konoidový komplex
na celkovém preparátu.
b schéma: co = konoid
s mikrotubuly a s nimi
sdruženými strukturami,
pm = plazmatická membrána,
ims = membrány
alveolů, pr = pólový
prstenec s mikrotubuly
z něj vycházejícími (mt),
pcr = prekonoidální
prstence. **c, d** apikální
komplex při průniku do
buňky, v pohledu svrchu
a na průřezu. rho = roptrie
(a z Nicholse et al.:
J. Protozool. 34: 217,
1987; b-d převzato
z Scholtysecka
a Mehlhorna).
Zvětš. a 35 000x.

Schéma průniku sporozoita do hostitelské buňky






Obr. 94 Haematozoea: Haemosporida, schematické znázornění změn v merozoitu *Plasmodium knowlesi* při průniku do hostitelské buňky. mj = pohyblivý buněčný spoj posouvající se zpět po invadujícím sporozoitu; n = jádro, rho = roptria v různých stadiích vyprazdňování, sc = buněčný povlak (převzato z Bannistera).

Sporozoit pronikající do buňky




Obr. 86 Apicomplexa: sporozoit *Toxoplasma gondii* při invazi hostitelské buňky (z Nicholse a O'Conno-
ra: Lab. Invest. 44: 324, 1981). Zvětš. 20 000x.

Mikrosporidia – průnik do hostitelské buňky



Ciliata – schématická stavba



Buněčná a strukturální organizace





Schéma živočišné buňky



Jádro a cytoplasma

- Plasmatická membrána
 - Pellicula
 - Alveoli – dutinky, záhyby
 - Glykocalyx – glykoproteinový povrchový povlak
 - Pelliculárni mikrotubuly – záhyby, membrány,
 - Undulující membrány
 - Základní prvek dalších buněčných struktur

Plasmatická membrána - modifikace





Figure 4.3 Plasma membranes and their modifications in protozoa.


(a) Epicytic folds of a gregarine parasite of damselflies. These folds extend along the body as ridges. (b) Membranes of *Ichthyophthirius multifiliis*, a parasite of fishes; the dark elongate bodies perpendicular to the membranes are mucocysts (AS, alveolar sac; OLM, outer limiting membrane; OAM, outer alveolar membrane; IAM, inner alveolar membrane; MC, mucocyst).

Plasmatická membrána - stavba




Obrázek 8.6 – Podrobná struktura plazmatické membrány živočišné buňky, příčný řez. Viz obrázek 7.29 – detaile ECM.

Jádro a jeho obal




Ribozomy




Obrázek 7.10 – Ribozomy. (a) Tato elektronová mikrofotografie části pankreatické buňky ukazuje mnoho ribozomů, volných (v cytosolu) i vázaných (na endoplazmatické retikulum). Vázané ribozomy pankreatické buňky vytváří množství sekrečních proteinů, včetně hormonu inzulínu a trávicích enzymů. Vázané ribozomy také tvoří proteiny, určené pro začlenění do membrán nebo vnitřních částí jiných organel. Volné ribozomy vytváří především takové proteiny, které zůstávají rozpuštěné v cytosolu. Vázané a volné ribozomy jsou identické a mohou přeskakovat mezi těmito dvěma úlohami. (b) Zjednodušené schéma ribozomu znázorňuje jeho dvě podjednotky.

Endoplasmatické retikulum




Golgiho aparát





Golgiho aparát (dictyosom)

- Dobře vyvinut u některých bičíkovců majících parabasální tělíska spojená s kinetosomem, basálními tělíska nebo bičíky
- Dictyosom hraje u protozoí různou roli, např. může být zdrojem skeletárních destiček u některých améb a polárního filamentu u microsporidií.

Lyzozomy



(a) Lyzozomy bílé krvinky




(b) Lyzozom v činnosti

Obrázek 7.13 – Lyzozomy. (a) V této potkaní bílé krvince jsou lyzozomy velmi tmavé díky specifické barvičce, která reaguje s jedním z trávicích produktů lyzozomu. Tento typ bílé krvinky tráví bakterie a viry a rozkládá je v lyzozomech (TEM).

(b) V cytoplazmě této bílé krvinky autofagický lyzozom pohltil dvě poškozené organelly, mitochondrii a peroxizom (TEM).

Mitochondrie



Obrázek 7.17 – Mitochondrie, místa buněčného dýchání. Na kresbě a mikrofotografii (TEM) jsou zřejmě dvě mitochondriální membrány. Kristy představují záhyby vnitřní membrány. Výsekové schéma ukazuje dva kompartmenty ohraničené membránami, meziembránový prostor a mitochondriální matrix.

Mitochondrie

- Enzymy oxidativní fosforylace a cyklus ATP
- Často mají tubulární struktury – cristae
- Výrazné mitochondrie u některých bičíkovců

Mikrotělíska - microbodies

- Obvykle jsou sférická a mají densesní granulární matrix
- U většiny živočichů a rostlin obsahují oxidásy a katalásy
- Oxidásy redukují kyslík na peroxid vodíku a katalásy se podílejí na dekompozici peroxidu vodíku na vodu a kyslík.






Mikrotělíska - microbodies

- **Peroxisomy** – mikrotělíska mající biochemickou aktivitu - peroxisomy u mnoha aerobních protozoí
- U některých anaerobních protozoí jsou tzv. **hydrogenosomy** – produkují molekulární hydrogen – (Trichomonas)
- Mikrotělíska rovněž enzymy glyoxylátového cyklu – syntéza uhlovodíků z tuků
- **Glykosomy** – mikrotělíska u Kinetoplastida – glykolytické enzymy

Mikrotělíska - microbodies

- **Extrusomy** – organely plasmatického původu vznikající v dictyosomech
 - **Toxosomy** – obranné mechanismy, vylučování toxických látek
 - **Kinetocysty** – podílejí na příjmu potravy
 - **Haplocysty** – podílejí se na paralyzování potravy
 - **Trichocysty** – mechanická rezistence vůči predátorům
 - **Mucocysty** – u nálevníků . Ochrana před osmotickým šokem (*Ichthyophthirius multifiliis*)

Cytoskelet



Struktura a funkce cytoskeletu

Vlastnost	Mikrotubuly	Mikrofilamenta (aktinová filamenta)	Intermediární filamenta
Struktura	Duté trubice, stěna se skládá ze 13 sloupců tubulinových molekul	Dvě zdvojená vlákna aktinu	Vláknité bílkoviny svinuté do silnějších lan
Průměr	25 nm s 15nm průsvitem	7 nm	8–12 nm
Bílkovinné podjednotky	Tubulin skládající se z α -tubulinu a β -tubulinu	Aktin	Jeden z několika různých proteinů skupiny keratinů, závisí na buněčném typu
Hlavní funkce	Zachování buněčného tvaru (komprese odolávající „nosník“) Buněčný pohyb (v řasinkách nebo bičících) Chromozomální pohyb při buněčném dělení Pohyb organel	Zachování buněčného tvaru (tlak přenášející složky) Změny buněčného tvaru Svalový stah Proudění cytoplazmy Buněčný pohyb (v pseudopodiích) Buněčné dělení (vznik rýhovací štěrbiny)	Zachování buněčného tvaru mechanického tlaku Ukotvení jádra a některých dalších organel Jaderný skelet

Lokomoční organely

Tři typy lokomočních organel

- Pseudopodia
 - Bičíky (flagella)
 - Řasinky (ciliate)
-
- Undulipodia – flagella + cilie

Panožky -pseudopodia

- Améby – dočasné struktury pohybu a příjmu potravy
 - Lobopodie
 - Filopodie
 - Rhizopodie
 - Axopodie
- Améby limax (Limax)

Améby - panožky





Figure 2.1 *Entamoeba histolytica* trophozoite (a) and cyst (b). It can be difficult or impossible to distinguish the chromatoidal bodies in the cysts using light microscopy and their nuclear structure may be lost after prolonged storage. Source: Chandler and Read, 1961


Bičíky - flagella

- Štíhlé, dlouhé – **centrální axonema** – centrální pár mikrotubulů
- Na obvodu **9 párů mikrobutulů**
- Axonema začíná v kinetosomu (centrální tělíska)
- **Periflagelární kapsa**
- **Mastigont** – systém označující spojení mezi bičíkem, kinetosomem a souvisejícími organelami
- **Heterokont** – bičíkovec se dvěma (a více) funkčními typy bičíků


Struktura bičíku nebo řasinky



Stavba bičíku – mikroskopický řez



(a)



(b)

Figure 4.4 Flagella (undulipodia).

(a) General structure of a cilium or flagellum, showing a section through the axoneme within the cell membrane and a section through the kinetosome. The nine pairs of microtubules plus the central pair make up the axoneme. The central pair ends at about the level of the cell surface in a basal plate. Peripheral microtubules continue beneath the cell surface to compose two of each of the triplets in the kinetosome (or basal body, level y). (b) Electron micrograph of a section through several flagella, corresponding to level x in (a); da, dynein arm; pm, peripheral microtubules; rs, radial spoke.

Giardia - pohyb tekutiny




FIGURE 6.4 Ventral view of *Giardia* showing the movement of fluid through the action of the flagella. [Redrawn from Holberton, 1973. © The Company of Biologists.]

Systém mastigont u bičíkovců





Figure 4.5 Complex mastigont system as seen in trichomonad flagellates (see also chapter 6).


(a) Anterior end of *Tritrichomonas foetus* from cattle. (b) Anterior end of *Tritrichomonas mobilensis*, a flagellate from squirrel monkeys. (c) Interpretive drawing, showing typical mastigont structures seen in trichomonads. (d) Three-dimensional view of the pelta, a curved sheet of microtubules that extends posteriorly to become the axostyle (see also Fig. 6.12). C, costa; Co, comb; G, Golgi body; H, hydrogenosomes; IKB, infrakinetosomal body; Kaf, kinetosomes of anterior flagella; Krf, kinetosome of recurrent flagellum; Pf, parabasal filament; PI, pelta; sf, sigmoidal filament; Rf, recurrent flagellum; SKB, suprakinetosomal body; UM, undulating membrane.

Archamoebae – systém karyomastigontu



Obr. 38 Archamoebae:
systém karyomastigontu
u *Mastigina* (a), funkční
a morfologické vztahy mezi
kinetosomem a jádrem (b).
n = jádro, mt = mikrotubuly
(podle Brugerollea).
Zvětš. a 350x.

Bičíkovci - heterokont



Řasinky - cylie

- Cílie jsou strukturálně analogické bičíkům – mají kinetosom, centrální axonemu a 9 periferálních dvojic mikrotubulů
- 2 základní typy ciliatury
 - Somatická ciliatura (kinetie – řady)
 - Orální ciliatura (různé uspořádání – systematika)

Ciliophora - nálevníci





Figure 10.5 Examples of rumen ciliates.
(a) *Entoldinium caudatum*; (b) *Ophryoscolex purkinjei*.

Ciliatura nálevníka



Obr. 97 Ciliophora: útvary na ventrální straně idealizovaného nálevníka. cci = kaudální řasinka, cor = kortikální oblast s alveoly, mitochondriemi a síti filamentů, cp = cytoprokt neboli cytopyge, cy = cytostom, opk = orální polykinetidy tvořící tři polykinety, pak = parorální kineta (= membrána), pcv = pór kontraktilní vakuoly, pek = periorální kinety, sdk = somatická dikinetida, smk = somatická monokinetida (převzato z Lynna).

Diagram struktury ciliárního komplexu





Figure 4.6 A diagram of the structure of a ciliate cortex (*Dexiotricha media*), reconstructed from electron micrographs, illustrating the relationships between the various elements of the ciliate cortex.

A, alveolar sac; Bb, basal filamentous bundle of fibers; Kd, kinetodesmata; M, mucocyst; Mi, sausage-shaped mitochondrion; P_c, post-ciliary microtubular ribbons; PS, parasomal sac; RM, single microtubule running through a pellicular ridge; T, transverse microtubule ribbon; TF, transverse fiber. The anterior end of the cell is to the upper left.

From R. K. Peck, "Cortical ultrastructure of the scuticociliates *Dexiotricha media* and *Dexiotricha colpidiopsis* (Hymenostomata)," in *J. Protozool.* 24:122–134, 1977. Copyright © 1977. The Society of Protozoologists. Reprinted by permission.

Rekonstrukce pelikulárních struktur



Obr. 52 Hemimastigophorea:


a *Hemimastix amphikineta*.
b trojrozměrná rekonstrukce pelikulárních a subpelikulárních struktur střední části těla *H. amphikineta*. **c** schéma příčného řezu *H. amphikineta*, kde je vidět značná podobnost s kortikální stavbou buňky euglen.

ep = epiplazma, mt = mikrotubuly, pm = plazmatická membrána (z Foissnera et al.: Europ. J. Protistol 23: 361, 1988). Zvětš. a 2 200x.



Potrava a metabolismus prvoků

- **Heterotrofní** – mnoho symbiotických zástupců – evoluce parazitismu
- **Cytostom** - organela pro příjem potravy – Ciliata
- **Cytophyge** – buněčná řit
- Příjem potravy:
 - **Fagocytóza**
 - **Pinocytóza**
 - **Endocytóza**

Ciliata – schématická stavba





Fagotyzóza





(a) **Fagocytóza.** Pseudopodie obklopí částici a zabalí ji do vakuoly. Mikrofotografie ukazuje měňavku pohlcující bakterii (TEM).

Pinocytóza



(b) Pinocytóza. Kapky extracelulární tekutiny jsou začleňovány do buňky v malých měchýrcích. Mikrofotografie ukazuje pinocytární vezikuly, formující se (šipky) v buňce, jež vystýlá malou krevní cévku (TEM).


Receptory zprostředkovaná endocytóza



(c) **Receptory zprostředkovaná endocytóza.** Povlečené jamky vytváří váčky, kde se specifické molekuly (ligandy) váží na receptory na buněčném povrchu. Všimněte si, že uvnitř váčků se nachází relativně více navázaných molekul (fialová), přestože jsou přítomny i molekuly jiné (zelená). Mikrofotografie ukazuje dvě postupná stadia endocytózy zprostředkované receptory (TEM).

Tvorba potravní vakuoly

Balantidium coli



Rozmnožování prvků