


Arthropoda



A

Rozmanist členovců

- Nejpočetnější skupina (80% živočichů)
- Závažní cizopasníci člověka a hosp. zvířat
- Široká škála parazitismu
- Ektoparaziti
- Endoparaziti (500druhů)
- Paraziti
- Parazitoidi
- Kleptoparaziti
- Forezie
- Hyperparaziti
- Sociální paraziti
- Otrokářství

Členovci - formy parazitismu

- Paraziti
 - Parazitoidi
 - Kleptoparaziti
 - Forezie
 - Sociální paraziti
 - Otrokářství
-
- Paraziti
 - Trvalí (**permanentní**) -vši, kloši – sají opakovaně na tomtéž hostiteli po celý žC
 - - Dočasní (**temporární**)
- komáři, ovádi, ploštice, flebotomové - sají relativně krátce - **mikroparaziti**

Formy parazitismu - parazitoidi

- **Parazitoid** – strategie blízká predaci
– zabíjí svého hostitele na konci vývoje – vyžírá orgány a tkáně – živá konzerva – velikost srovnatelná.
- **Hostitelé** jsou všechna vývojová stádia hmyzu i dalších bezobratlých – např. housenky motýlů, larvy blanokřídlých, pavouci.
- **Nevyměšují** – slepé střevo – defekace až po ukončení vývoje v H
- **Hyperparazitismus** – parazitace larev blanokřídlých - parazitoidů
- Nejčastěji **Hymenoptera** – 50tis a **Diptera** – 15tis druhů, ale i brouci, motýli, sitokřídlí – odhad až 25% hmyzu.
- Zástupci **Hymenoptera** – lumci (Ichneumonidae), lumčíci (Braconidae), vejřitky (Proctotrupoidea), mšicomary (Aphiidae), vejcomary (Scelionidae), chalcidky (Chalcidoidea)
- Hlavně **Apocrita** – štíhlý pas – adaptace na vpich vajíček do H
- **Primitivní vosy** (Scoliidae, Tiphidae, Mutilidae) – kladélko – žahavý orgán – ochromení H – pak kladení vajíčka.
- **Hrabalky** (Pompiloidea) svého H zahrabou do podzemního hnízda,


Kleptoparazitismus a forézie

- **Kleptoparaziti** – ujídají svému hostiteli od úst – snižují tak množství přijaté potravy
- Jiné využití hostitele – **forézie** – hostitel slouží jako přepravní prostředek
- **Braula coeca** – kleptomanická a foretická moucha
- okrádá různé hmyzí a pavoučí predátory
- Drobni kleptoparaziti – často malí roztoči – tiplíci – vykrádají pavoučí sítě
- Okrádaní jsou často např. listorozí brouci – hovníválové – parazitují jim na kuličkách larvy much (Sphaeroceridae) – kulička jim slouží jako místo vývoje potomstva

Sociální parazitismus a otrokářství

- Nejčastěji **Hymenoptera**
- **Parazitické druhy** jsou závislé na členech kolonie sociálního hmyzu – Formicidae, Myrmicidae a včely.
- **Sociální parazitismus** vznikl několikrát na sobě nezávisle – různé strategie a sociální organizace jak u parazitoidů tak u hostitelů.
- Dva typy – (1) **složená hnízda** a (2) **smíšené kolonie**
- **(1) složená hnízda** - nepříbuzné druhy – P krade potravu a žere potomstvo H v mraveništi a nebo 2 druhy žijí společně - jeden ovládá druhý a je jím krmén regurgitovanou potravou
- (2) **smíšené kolonie**:
 - dočasný sociální parazitismus (DSP)
 - Otrokářství (dulosis)
 - Stálý parazitismus (inkvilinismus) bez otrokářství
- **DSP** – oplozená královna pronikne do kolonie H – maskuje se - zabije původní královnu – produkuje potomky a nahradí původní druh
- **Otrokářství** – využití pro práci – mravenci – nájezdy do hnízd - kradou larvy a kukly. Otrokáři často nejsou schopni získávat potravu – adaptace – čelisti zabíjející bránící se dělnice.
- **Inquilinismus** - nejčastější strategie u mravenců – P královnu nezabíjí, ale využívá celou strukturu a organizaci kolonie pro svůj prospěch. P produkuje pouze sexuální kastu a případně vojáky.
- Smíšení kolonií – fylogenetická příbuznost partnerů – hypotézy vzniku
- Hnízdní parazitismu i u včel – cca 15% druhů – včela naklade vajíčka do hnízda jiného druhu – larva zlikviduje vejce či larvu H. Parazitická včela je často podobná svému H.

Hypotetická fylogeneze členovců



PICTORIAL KEY TO MAJOR CLASSES AND ORDERS OF ADULT ARTHROPODS OF PUBLIC HEALTH IMPORTANCE

Harry D. Pratt and Chester J. Stojanovich





FIGURE 1.1 Representatives of the major groups of arthropods.

Rozmanitost členovců



Rozmanitost členovců - blechy
















FIGURE 7.6 Common fleas: *Ctenocephalides felis* female (A) and male (B); *Pulex irritans* female (C) and male (D); *Xenopsylla cheopis* female (E) and male (F); *Tunga penetrans* male (G) and female (H); *Echidnophaga gallinacea* female (I) and male (J); *Oropsylla montana* female (K) and male (L); *Nosopsyllus fasciatus* female (M) and male (N); *Ceratophyllus gallinae* female (O) and male (P).

Rozmanitost medicínsky významných roztočů


A – Ornithonyssus bacoti

B – Ornithonyssus bursa


C – Gantheria sp

D – Dermatophagoides
farinea

E - Zygribatula



Externí anatomie hmyzu



Morfologie a anatomie členovců

- Kutikula – exoskelet (polysacharid chitin)
- Crustacea + uhličitan vápenatý
- Segmentace těla
- Článkované končetiny
- Hlava, hrud', zadeček
- Tagmatizace – splývání článků - cephalothorax
- Exoskelet – tergum, sternum a dvě boční části
- 5-6 dílné končetiny (coxa, trochanter, femur, patella, tibia, tarsus) na konci drápký

Stavba kutikuly hmyzu




Fig. 3.56. Diagrammatic representation of a typical insect cuticle. *BL*, Basal lamina; *CE*, cement layer; *CU*, cuticulin; *EC*, epicuticle; *EN*, endocuticle; *EP*, epidermis;

EX, exocuticle; *GC*, gland cell; *GD*, gland ductus; *HM*, hemocyte; *OE*, oenocyte; *P*, pore canal; *PO*, polyphenol layer; *W*, wax layer

Stavba kutikuly klíštěte




Fig. 3.52. Diagrammatic representation of the acarine cuticle. *N*, Nucleus; *P*, pore canal

Řez kutikulou klíštěte




Fig. 3.51A, B. Transmission electron micrographs of the cuticle of acarids. **A** Ixodid tick (*Ixodes ricinus*) ($\times 2.000$). **B** Mite (*Bdellonyssus* sp.), which contains a second stage larva (in cross section) of the rodent filarial worm *Li-*

tomosoides carinii ($\times 1.700$). *BC*, Body cavity; *CU*, cuticle; *D*, digested blood; *HY*, hypodermis; *IN*, intestinal branch; *LA*, nematode larva; *MU*, muscle strand; *N*, nucleus; *P*, pore channels; *T*, tracheole



Morfologie a anatomie členovců

- Vylučovací soustava – metanefridie a malpighické trubice – vychlípenina střeva
- Oběhová soustava – otevřená (hemolymfa)
- Dýchací soustava – vzdušnice – tracheální žábry a vzdušné vaky
- Nervová soustava – žebříčková – cephalizace
- Gonochoristé - sexuální dimorfismus
- Smyslové orgány – oculi compositi – složené oči (facety) + jednoduché oči (ocelli, omatidia) - u parazitů oči i chybí
- Trávicí soustava – trubicovitá
 - Stomodeum – proboscis – ústní dutina, hltan, jícen, žaludek, vole – esofageální diverticulum
 - Proctodeum (zadní střevo) – pylorus (ústí zde MT – 2 až 6), konečník rectum či rektální ampule.


Stomodeum a proctodeum – ektodermální původ – chitin

Mezenteron – střední střevo – bez chitinu – resorbce a trávení přijaté potravy


Muscuatura a pohyb křídel



Ústní ústroji – adaptace k parazitismu




Morfologie ústního ústrojí roztočů




Morfologie ústního ústrojí roztočů


Mesostigmata



Trombiculidae





Hlava a ústní ústrojí mouchy





Ústní ústrojí ploštice *versus* komár

Rhodnius



Anopheles



DIPTERA

hlava komára
samice (A)
samec (B)

AT – tykadlo


EY - složené oko

LB – labium nesoucí bodací ústrojí

LE – noha

PT – protothorax

SC - šupinky



Ústní ústrojí hmyzu

A, B – *Calliphora erythrocephala*

C, E – *Simulium damnosum*

D – *Triatoma infestans*

AT – antény

EY – složené oči

H - haustellum

LA – labellum

PR – proboscis

S – slinný vývod




Fig. 3.85 A–E. Mouthparts of insects (scanning electron micrographs). **A, B** *Calliphora erythrocephala*; note the salivary ductules on the labella (**A** $\times 150$, **B** $\times 200$). **C, E** *Simulium damnosum*; heads of a male (**C**) and a female (**E**) adult; note that the compound eye of males includes two types of omma-

tidia ($\times 50$). **D** *Triatoma infestans*; note that the mouthparts are included in a protrusible proboscis (rostrum) ($\times 20$). **AT**, Antenna; **EY**, compound eye; **H**, haustellum; **LA**, labellum; **PR**, proboscis; **S**, salivary ductule

DIPTERA

Glossina morsitans SEM (A)

Chrysops sp. SEM (B)

AR – arista

AT – tykadla

CA – hlava



EY – složené oči

LA – labium (pysk)

LG – noha

PT – protothorax

ST – bodací část ústního ústrojí



DIPTERA

Lipoptena cervi (A)



Stomoxys calcitrans (B)

AR – arista

AT – tykadlo

EY – složené oko

ST – styletová sací část ústního ústrojí



ANOPLURA

Pthirus pubis (A)

Haematopinus suis (B)

H. suis – sací ústrojí zatažené do ústní dutiny (C)

Vajičko s víčkem – *Pediculus humanus capitidis* (D)

AB – zadeček

AT – tykadlo

CA – hlava

CL – hák

EG – vajíčko

H – lidský vlas

M – ústní otvor

O – víčko

SE – seta

TH - hrud'




Schéma nervové soustavy






Schéma mozku hmyzu - cephalizace



Příjem potravy a trávení

- Extracelulární trávení – hydrolytické enzymy jsou sekretovány do lumenu mesenteronu – mikrovili
- Epitel mezenteronu produkuje peritrofickou matrix a absorbuje vodu, ionty a živiny
- Intracelulární trávení u roztočů
- Mezeteron – množství záhybů – epitel bez mikrovili ale tvoří jej trávicí buňky – pohlcují potravu – ve střevě mininum proteáz – vhodné pro přenos patogenů
- Peritrofická membrána (matrix) u většiny hmyzu – obaluje potravu – fyzikální bariéra vůči mikroorganismům

Zažívací soustava hmyzu



Zažívací trakt a mozek roztoče




Fig. 3.83. Diagrammatic representation of the alimentary tract and the brain of a mite (*Caminella*, Gamasida). (After Ainscough 1960)

Funkce peritrofické membrány

obaluje přijatou potravu
chrání před přímým kontaktem s krví
fyzikální bariéra vůči mikroorganismům
prostorové oddělení částí procesu trávení
je složena z polysacharidu chitinu a z proteinů (peritrofiny)

- **Diskontinuální matrix**
- U komárů a jiných nemarocera
- Syntetizuje se kontinuálně a ze všech buněk mezenteronu
- Pouze několik hodin po nasátí krve
- Po strávení krve se rozpadá
- **Kontinuální matrix**
- U glosin a brachycera
- Produkují specializované buňky v přední části mezenteronu

Schéma intimálního traktu hmyzu




Fig. 3.84. Diagrammatic representation of the intestinal tract of insects (after Weber). *AN*, Anus; *CR*, crop; *ES*, esophagus; *HG*, hindgut; *M*, mouth; *MG*, midgut; *MP*,

ghian tubes; *PM*, peritrophic membrane; *PR*, proventriculus; *RE*, rectum; *SD*, salivary duct; *SG*, salivary gland; *VC*, valvula cardiaca; *VP*, valvula pylorica

Tvorba peritrofické membrány




Fig. 3.39. Diagrammatic representation of the cardia of those insects in which only a short zone of specialized cells at the beginning of the midgut is able to produce a tubelike peritrophic membrane, which may consist of several layers (after Peters 1976). *CU*, Cuticle; *EP*, epithelial cell; *ES*, esophagus; *MG*, midgut; *MV*, microvilli; *N*, nucleus; *PM*, peritrophic membrane; *PR*, proventriculus

Formování peritrofické membrány




Fig. 3.38. In adult female mosquitoes different amounts of peritrophic membrane are formed in the two parts of the midgut. A small amount is secreted by the cells of the anterior region (AMG) and transported to the junction of the ante-


rior and posterior midgut, whereas large amounts are produced by the posterior midgut (PMG) to envelop each blood meal (BM_1 , BM_2 , first and second blood meals; HG, hindgut. (After Peters 1976)

Pohlavní soustava hmyzu


- **Samičí soustava**
 - Ovaria složená z ovariol – rourkovitá, obalená membránou propria
 - Germanium – vznik a růst vajíček
 - Vitelarium – produkce žloutku
 - Hmyz je oviparní, larviparní nebo pupiparní
- **Samčí soustava**
 - Varlata – rourkovité folikuly – vznik spermíí
 - Spermidukty- do nichž ústí přídatné žlázy
 - Chámomet – spojení SpD – ductus ejaculatorius
 - Kopulační orgán – phalus penis

Pohlavní soustava hmyzu

Samičí soustava



Samčí soustava



Gonotrofický cyklus


- **Stupeň trávení krve**

1. střevo bez krve
2. střední střevo plné násáté krve
3. krev jasně červená, zabírá 4 až 4,5 zadečkových článků
4. krev tmavě červená
- 5 až 6. krev ve střevě černá
7. krev strávená, střevo prázdné

- **Fáze vývoje folikula**

1. Tvoří se folikulární epitel – diferenciace oocytu a trofocytu
2. V plazmě oocytu se tvoří žloutková zrna
3. V plazmě oocytu je shluk žloutkových zrn – žloutek se zvětšuje – oocyt – polovina folikulu
 - 4a Oocyt – až 75% folikulu
 - 4b Oocyt více než 75% folikulu
5. Zralé vajíčko

Základní typy vývoje hmyzu



Střeček - vývoj










Fig. 1.86


Diptera – vývojová stádia

5 <i>Muscidae</i>	4 <i>Phlebotomidae</i>	3 <i>Ceratopogonidae</i>	2 <i>Glossinidae</i>	1 <i>Simuliidae</i>	Families
EGGS	LARVAE	PUPAE	ADULTS		
 <p>Diagram illustrating the life cycle of <i>Muscidae</i> (Family 5). The process starts with an oval egg, followed by a segmented larva, a pupa with visible internal structures, and finally an adult fly.</p>	 <p>Diagram illustrating the life cycle of <i>Phlebotomidae</i> (Family 4). The process starts with an oval egg, followed by a segmented larva, a pupa with visible internal structures, and finally an adult fly.</p>	 <p>Diagram illustrating the life cycle of <i>Ceratopogonidae</i> (Family 3). The process starts with an oval egg, followed by a segmented larva, a pupa with visible internal structures, and finally an adult fly.</p>	 <p>Diagram illustrating the life cycle of <i>Glossinidae</i> (Family 2). The process starts with an oval egg, followed by a pupa labeled "Not free", and finally an adult fly.</p>	 <p>Diagram illustrating the life cycle of <i>Simuliidae</i> (Family 1). The process starts with an oval egg, followed by a segmented larva, a pupa with visible internal structures, and finally an adult fly.</p>	

Anopheles versus *Aedes* a *Culex*




Vývojová stádia klíštěte rodu Ixodes




Vývojová stádia zástupců Acarina

GENUS	FEMALES	EGGS	LARVAE	NYMPHS I	NYMPHS II	♀ ADULTS	♂
1 <i>Psoroptes</i>							
2 <i>Chorioptes</i>							
3 <i>Sarcop巒</i>							
4 <i>Demodex</i>							


Jedno-hostitelský životní cyklus




Dvoj-hostitelský životní cyklus







Troj-hostitelský životní cyklus




Multi-hostitelský životní cyklus






Stavba rozmnožovací soustavy roztočů


Gamasida a Actinedida




Ixodida - Argasidae




Gamasida - Uropodidae




Acaridida – Acarididae



Gamasida - Parasitidae



Actinedida - Erythraeidae



Vývojová stádia klíštáka rodu Argas




Fig. 1.79. Developmental stages in the life cycle of *Argas* spp. (see Table 1.28), which need about 3–36 months to mature (depending on the temperature). Except for larvae,

which suck blood for 3–10 days, all stages feed several times but only for a short period each time (e.g., adults for a few minutes)

Zástupci roztočů






Fig. 3.53 A-C. External morphology of mites A *Pterygosoma* p. from skin of reptiles (SEM \times 85). B *Caparinia tripilis* from skin of hedgehog) in copulation (light micrograph \times


90). C *Demodec folliculorum* from hair follicles of man (SEM \times 600). LE, Legs; PP, pedipalps; SE, setae; SL, stumpy legs

Anoplura versus Mallophaga


ANOPLURA




① EGG




② LARVA I



③ LARVA II



④ LARVA III







⑤ ADULT

MALLOPHAGA



Fig. 1.82



Cimicidae versus Reduviidae






Fig. 1.83 Legend see page 137



A ADULT ♀

B EGGS: *Ctenocephalides* *Pulex*





D PUPA






PULEX IRRITANS


C LARVA







Morfologie hlavy







TUNGA PENETRANS







Fig. 3.48 A-E. Diagrammatic representation of ixodid ticks (e.g., *Dermacentor* sp.). A, B Unfed male and female, C Ventral side, D Section through mouthparts, E Tarsus in dorsal view. AN, Anus; CH, chelicera; CL, claw; CS, sheath of chelicera; CX, coxa; E, esophagus; EM, pulvillus; FE, fesnotum; GN, gnathosoma (capitulum); GO, genital opening; H, hypostom; PP, pedipalpus; SA, salivary duct; SC, scutum; STI, stigma; TA, tarsus









Fig. 3.54 A-F. Diagrammatic representation of the mouthparts and the cuticular hairs in different mite species. *AN*, Anus; *CH*, chelicera; *PP*, pedipalpus


Morfologie ústního ústrojí orthopterního typu

Reduviidae




Anticoagulants - Apyrase, Nitrophorin, Lipocalin
Vasodilators - Nitrosyl heme proteins
Immunomodulator - ?
Anesthetic ?

Cimicidae



Anticoagulants - Apyrase
Vasodilators - Nitrosyl heme proteins
Immunomodulator - ?
Anesthetic ?

Morfologie ústního ústrojí Simuliidae




Anticoagulants - Simulidin



Vasodilators - SVEP

Immunomodulator- Simulidin


Anesthetic ?



Morfologie ústního ústrojí Ceratopogonidae



Morfologie ústního ústrojí Psychodidae




Lutzomyia

Anticoagulants - Apyrase
Vasodilators - Maxadilan,
5'- nucleotidase/ phosphodiesterase,
Hyaluronidase.
Immunomodulator - Maxadilan
Anesthetic - Adenosine deaminase (ADA)

Phlebotomus


Anticoagulants - Apyrase
Vasodilators - adenosine and 5'-AMP, hyaluronidase
Immunomodulator - ?
Anesthetic - ?

Morfologie ústního ústrojí Sarcoptes scabiei





Scabies mite female
burrowing and ovipositing
in the epiderm

Anticoagulants - ?
Vasodilators - ?
Immunomodulator- ?
Anesthetic ?




Morfologie klíštěte

mesostigmata astigmata




Ontogeneze klíšťat




Morfologie klíšťat Ixodidae

Ixodes



Ornithodoros (A,C,D) Argas (B)



Srovnání scutum a dorsální gnathosomy

- Ixodes
- Haemaphysalis
- Amblyomma
- Dermacentor
- Rhipicephalus
- Boophilus

