


# PTÁCI


1.část





# AVES

Původ: bipední theropodní plazi s prodlouženou přední končetinou a 3 prstou nohou

3prstá stopa theropoda i u Červeného Kostelce (HK) - 90. léta 20. st.




# System ptáku




# System ptáků

-zatím stále velmi nestabilní



# PTÁCI

- opeření, přední končetiny-  
křídla, kostrční žláza
- pneumatizace kostí,  
heterocélní obratle
- bipední pohyb (palec  
dozadu, ostatní prsty  
dopředu)
- srůsty kostí, srůsty na lebce,  
zobák (ramfotéka)
- srůst klíčních kostí (furcula)
- zvětšení koncového mozku,  
zdokonalení oka a ucha
- malé plíce se vzdušnými  
vaky, endotermie
- vejce s vápenitou skořápkou,  
péče o mláďata



Obr. 116 Kostra holuba domácího. 1 – lebka (*cranium*), 2 – volné krční obratle (*vertebrae cervicales*), 3 – *humerus*, 4 – *ulna*, 5 – *radius*, 6 – *scapula*, 7 – *vertebrocostale*, 8 – *processus uncinati*, 9 – *femur*, 10 – *synsacrum* (jeho součástí je kost stydká, ostatní složky neoznačeny), 11 – volné ocasní obratle (*vertebrae caudales*), 12 – *pygostyl*, 13 – *ulnare*, 14 – *clavícula* (*furcula*), 15 – *carpometacarpus*, 16 – první prst křídla, 17 – *metacarpus* třetího prstu, 18 – *procoracoid*, 19 – *crista sterni*, 20 – *sternum*, 21 – třetí prst křídla, 22 – druhý prst křídla, 23 – *sternocostale*, 24 – *fibula*, 25 – *tibiotarsus*, 26 – *tarsometatarsus*, 27 – první prst nohy s vlastním *metatarsus*, 28 – druhý, 29 – třetí, 30 – čtvrtý prst nohy (jen články), 31 – *pubis*.

# Avifauna ČR


- dnes známo asi 10 000 druhů (druhá nejpočetnější „třída“)
- u nás 403 druhů ptáků (k 12.12.2018)
- u nás asi 200 hnízdících druhů
- Česká společnost ornitologická  
([www.birdlife.cz](http://www.birdlife.cz))



# Létaví - Neognathae

## Řád: HRABAVÍ (*Galliformes*)

- zavalití ptáci, pozemní (ale spí na větvích)
- noha anizodaktylní (kráčivá), silná – hrabavá, silné tupé drápy, často ostruha
- krátký zobák, na hlavě časté kožené výrůstky
- pohlaví často odlišně zbarvená (samci větší)
- někdy polygamie (ritualizace toku)
- hnízdí většinou na zemi, nidifugní ml.
- všežraví; u nás 6 hnízdících druhů





# Č: Tetřevovití – *Tetraonidae*

- lesní kurové, husté opeření, běhák opeřený až po prsty, mimo tok solitérní

Meyers



Tetřev hlušec (*Tetrao urogallus*)



Tetřívěk obecný (*Lyrurus tetrix*)

Jeřábek lesní (*Bonasa bonasia*)



# Č: Bažantovití - *Phasianidae*

- kurové otevřené krajiny (synantropní), běhák lysý, někdy prodloužená ocasní pera



Bažant obecný  
(*Phasianus colchicus*)






Koroptev polní (*Perdix perdix*)



Křepelka polní (*Coturnix coturnix*)

# Řád: VRUBOZOBÍ (*Anseriformes*)

- středně velcí až velcí ptáci, krátký plochý zobák (rohovité lamely k cezení potravy), dlouhý krk
- plovací noha – přední 3 prsty s plovací blánou
- vodní
- dobří letci (úzká špičatá křídla) – tah
- častý pohlavní dimorfismus (samci pestří, samice sedí na vejcích)
- během pelichání neschopní letu
- nidifugní ml., potravou rostliny, bezobratlí, ryby
- u nás asi 46 druhů (15-19 hnízdí)



# Č:Kachnovití - Anatidae

Labuť velká (*Cygnus olor*)



Labuť zpěvná (*Cygnus cygnus*)



Husa velká (*Anser anser*)



Husa polní (*Anser fabalis*)



Husa běločelá (*Anser albifrons*)



Husice liščí (*Tadorna tadorna*)



© Francois Bourgeot



© Francois Bour

## Kachna divoká (*Anas platyrhynchos*)



Kopřivka obecná (*Anas strepera*)



Lžičák pestrý (*Anas clypeata*)



Čírka obecná (*Anas crecca*)



Čírka modrá (*Anas querquedula*)



Zrzohlávka rudozobá  
(*Netta rufina*)



Polák velký (*Aythya ferina*)



© lubomir hlasek  
www.hlasek.com  
Aythya fuligula d149

Polák chocholačka (*Aythya fuligula*)



Hohol severní (*Bucephala clangula*)




Morčák velký (*Mergus merganser*)



# Řád: TRUBKONOSÍ (*Procellariiformes*)

- mořští ptáci, rourkovité nozdry, hákovitý zobák (na konci)
- dlouhá štíhlá křídla (nejdelší loketní část)
- plovací noha (3 prsty s plovací blánou)
- často koloniální (útesy, ostrovy), nidikolní ml., masožraví
- u nás zjištěny 3 druhy



Buřňáček malý  
(*Hydrobates pelagicus*)




Buřňák lední (*Fulmarus glacialis*)



Buřňák šedý (*Calonectris diomedea*)

# Řád: POTÁPLICE (*Gaviiformes*)

- velcí potápiví ptáci, husté opeření, dlouhý špičatý zobák, masožravci
- plovací noha – tři prsty s plovací blánou, umístěná hodně vzadu
- rychlí letci – přistávají na prsa
- severská jezera, dvě vejce, seminidifugní ml.
- u nás 4 druhy (zimní hosté)





Potáplice malá (*Gavia stellata*)



Potáplice severní (*Gavia arctica*)

# Řád: POTÁPKY (*Podicipediformes*)

- potápiví ptáci, husté opeření
- nohy hodně vzadu na těle, 4 prsty lemované plovací blánou
- špičatý zobák – masožraví (bezobratlí, ryby), polykání peří
- ritualizace toku, některé druhy koloniální
- plovoucí hnízda, seminidifugní ml.
- u nás 5 druhů (4 hnízdí)



# Č: Potápkovití – *Podicipedidae*

Potápka malá (*Tachybaptus ruficollis*)



Potápka roháč (*Podiceps cristatus*)

Potápka černokrká (*Podiceps nigricollis*)




Potápka rudokrká  
(*Podiceps grisegena*)

# Řád: PLAMEŇÁCI (*Phoenicopteriformes*)

- velcí vodní ptáci, dlouhé nohy a krk
- silný zobák s filtrovacími lamelami – potravou plankton
- přední prsty s plovací blánou, palec redukován
- v letu natažený krk, relativně krátká křídla
- kolonie – slaná i sladká jezera
- hnízda z hlíny na zemi, nidikolní ml.
- u nás vzácně 1 druh

Č: Plameňákovití - Phoenicopteridae



Plameňák růžový (*Phoenicopterus ruber*)

# Řád: ČÁPI (*Ciconiiformes*)

- dříve mezi brodivými
- štíhlí vodní ptáci, dlouhý zobák, krk a nohy
- brodivá noha (dlouhá noha s dobře vyvinutým palcem, s částečnou plovací blánou na předních prstech)
- dlouhý silný zobák – lov drobných obratlovců
- hnízda na stromech či antropogenních substrátech, někdy kolonie, nidikolní ml.
- tažní na dlouhé vzdálenosti, v letu natažený krk
- u nás 2 hnízdící druhy



# Č: Čápvití – *Ciconiidae*



Čáp bílý (*Ciconia ciconia*)




Čáp černý (*Ciconia nigra*)





# Řád: BRODIVÍ a PELIKÁNI (*Pelecaniformes*)

- větší vodní ptáci, veslovací noha (4 prsty spojené plovací blánou) nebo brodivá noha (dlouhá noha s dobře vyvinutým palcem bez nebo s náznakem plovacích blan)
- roztažitelný krční vak (rybožraví), různé modifikace zobáku (včetně pro lov bezobratlých)
- nidikolní ml., hnízda na stromech či v rákosinách, kolonie
- u nás 13 druhů (6-8 hnízdí)



# Č: Pelikánovití – *Pelecanidae*

- dlouhý zploštělý zobák, velký krční vak, dlouhá široká křídla (plachtění), pobřeží a vnitrozemské mokřady – kolonie (hnízda na zemi)

Pelikán bílý (*Pelecanus onocrotalus*)



# Č: Volavkovití – *Ardeidae*

- prsty bez plovacích blan, krk v letu esovitě prohnutý, smíšené kolonie



Bukač velký  
(*Botaurus stellaris*)



Bukáček malý  
(*Ixobrychus minutus*)



Kvakoš noční  
(*Nycticorax nycticorax*)



Volavka popelavá  
(*Ardea cinerea*)



Volavka bílá  
(*Ardea alba*)



# Č: Ibisovití – *Threskiornithidae*

- výrazně modifikované zobáky, v letu natažený krk, u kořene prstů plovací blána

Ibis hnědý (*Plegadis falcinellus*)





Kolpík bílý  
(*Platalea leucorodia*)



# Řád: VESLONOŽÍ (*Suliformes*)

- větší vodní ptáci, veslovací noha (4 prsty spojené plovací blánou)
- rybožraví – různé techniky lovu
- nidikolní ml., kolonie na stromech, skalách apod.
- u nás 4 druhy (1 hnízdí)



# Č: Kormoránovití – *Phalacrocoracidae*





- na konci zobáku hák, dlouhý ocas a krk, tmavé zbarvení, dobří plavci (potápění), nemastné peří, kolonie na stromech či skalách



Kormorán velký (*Phalacrocorax carbo*)

# Řád: DRAVCI (*Accipitriformes*)


- denní predátoři či mrchožrouti (vývržky)
- skvělý zrak, ostře zahnutý silný zobák, nozdry v lysém ozobí
- nohy se zahnutými drápy – spáry
- výborní letci – široká křídla s prstíky (plachtění, obratní letci)
- samice větší, velká hnízda (stromy, skály), nidikolní ml.
- u nás 27 druhů (hnízdí 13)





# Č: Orlovcovití – *Pandionidae*

- velký rybožravý dravec, vratiprst (4. prst obratelný dozadu)



Orlovec říční (*Pandion haliaetus*)

# Č: Jestřábovití – *Accipitridae*



Včelojed lesní  
(*Pernis apivorus*)



Káně lesní  
(*Buteo buteo*)



Káně rousná  
(*Buteo lagopus*)

Luňák červený (*Milvus milvus*)



Luňák hnědý (*Milvus migrans*)

Moták pochop (*Circus aeruginosus*)




Moták pilich (*Circus cyaneus*)



Moták lužní (*Circus pygargus*)



# Jestřáb lesní (*Accipiter gentilis*)



# Krahujec obecný (*Accipiter nisus*)



Orel mořský  
(*Haliaeetus albicilla*)



Orel skalní (*Aquila chrysaetos*)







Orel královský  
(*Aquila heliaca*)



Orel křiklavý (*Aquila pomarina*)

# Řád: KRÁTKOKŘÍDLÍ (*Gruiformes*)

- různorodá skupina, málo společných znaků
- anizodaktylní noha (palec vysoko postavený či chybí) – běhavá, brodivá či lemovaná
- hnízdí na zemi či v rákosinách, nidifugní ml.
- většinou býložravci či všežravci
- u nás 8 druhů (hnízdí 7)



# Č: Jeřábovití – *Gruidae*

- velcí, podobní brodivým (dlouhé nohy a krk - v letu natažený), lysá barevná místa na hlavě, dobří letci, samci nápadné ruční letky (přesahují ocas)

- rovinaté mokřady, ritualizovaný tok, všežravci



Jeřáb popelavý  
(*Grus grus*)



# Č: Chřástalovití – *Rallidae*

- malí až středně velcí, často skrytí, v blízkosti vod
- tělo zploštělé ze stran, často dlouhé nohy s dlouhými prsty (lyska lemované)
- kožní štítek na čele – lysky, při pelichání neschopní letu
- všežravci, hnízda v rákosinách či na loukách



Chřástal polní  
(*Crex crex*)



Chřástal vodní  
(*Rallus aquaticus*)

Lyska černá (*Fulica atra*)



Slípka zelenonohá (*Gallinula chloropus*)

# Řád: DROPI – Otidiformes

## Č: Dropovití – Otididae










- velcí pozemní ptáci, nejtěžší evropský létající pták (až 20 kg!)
- zcela chybí palec, 3 prsty se zploštělými drápy, bez kostrční žlázy
- ritualizovaný tok, samci větší, hnízdo na zemi, nidifugní ml., všežravci



Drop velký (*Otis tarda*)

# Řád: BAHŇÁCI (=DLOUHOKŘÍDLÍ) (*Charadriiformes*)

- různorodá skupina, většinou vázáni na vodu
- většinou plovací noha (redukce palce), blána často též redukována
- masožravci (hlavně bezobratlí) – různě modifikované zobáky
- dlouhá špičatá křídla – výborní letci, nejdelší tahy
- hnízdo většinou na zemi, nidifugní (sluky, kulíci a spol.)/ nidikolní ml. (racci, rybáci)
- u nás 84 druhů (hnízdí 16-17)



## Č: Tenkozobcovití – *Recurvirostridae*

- dlouhé štíhlé nohy, na prstech částečně plovací blána, někdy kolonie, 4 vejce



Pisila čáponohá  
(*Himantopus himantopus*)



Tenkozobec opačný  
(*Recurvirostra avosetta*)



Dytík úhorní (*Burhinus oedicephalus*)

## Č: Dytíkovití – *Burhinidae*

- středně velcí ptáci, velká hlava s velkýma žlutýma očima, na prstech částečně plovací blána  
- otevřená krajina (step), noční aktivita, 2 vejce



# Č: Kulíkovití – *Charadriidae*

- menší ptáci, krátký zobák, krátký krk, velké oči, palec silně redukován či chybí, kratší nohy, 4 vejce
- otevřená krajina, nejčastěji mělčiny a břehy vod



Kulík říční  
(*Charadrius dubius*)



Čejka chocholatá (*Vanellus vanellus*)



Kulík hnědý  
(*Charadrius morinellus*)

# Č: Slukovití – *Scolopacidae*

- malí až velcí ptáci, dlouhý zobák a nohy, palec částečně vyvinut
- otevřené i lesní biotopy, hnízdo na zemi či na stromech, 4 vejce



Sluka lesní  
(*Scolopax rusticola*)



Bekasina otavní  
(*Gallinago gallinago*)



# Břehouš černoocasý (*Limosa limosa*)



# Koliha velká (*Numenius arquata*)

Vodouš kropenatý (*Tringa ochropus*)



Vodouš bahenní (*Tringa glareola*)



Pisík obecný (*Actitis hypoleucos*)

Vodouš rudonohý (*Tringa totanus*)



# JESPÁCI – rod *Calidris* (u nás 11 druhů)



Jespák obecný (*Calidris alpina*)



Jespák bojovný  
(*Philomachus pugnax*)



Jespák malý (*Calidris minuta*)



# Č: Rackoví – *Laridae*

- většinou světlé zbarvení, plovací noha (3 prsty s plovací blánou)
- výborní letci a plavci, silný hákový zobák – všežravci, mrchožrouti
- kolonie, mokřady a moře



Racek bouřní (*Larus canus*)



Racek bělohlavý (*Larus cachinnans*)



Racek chechtavý (*Chroicocephalus ridibundus*)

# Č: Rybákovití – *Sternidae*

- štíhlí ptáci, vidličnatě ukončený ocas, krátké nohy, úzká křídla – výborní letci
- úzký špičatý zobák, lov ryb, většinou světlí s tmavým temenem
- kolonie, mokřady a moře

Rybák černý  
(*Chlidonias niger*)




Rybák obecný (*Sterna hirundo*)



# Řád: MĚKKOZOBÍ (*Columbiformes*)

- zavalití ptáci, dlouhá špičatá křídla – dobří letci
- měkké lysé ozobí (v něm nozdry), kráčivé nohy (anizodaktylní)
- umí pít vodu sáním, drobivé prachové peří
- mělká hnízda z větviček či dutiny, nidikolní ml. (krmí výměškem volete)
- hlavně rostlinná potrava
- u nás 5 druhů (všechny hnízdí)



# Č: Holubovití – *Columbidae*

Holub hřivnáč (*Columba palumbus*)



Holub domácí (*Columba livia* fa. *domestica*)



Holub doupňák (*Columba oenas*)


# Hrdlička zahradní (*Streptopelia decaocto*)



# Hrdlička divoká (*Streptopelia turtur*)

# Řád: KUKAČKY (*Cuculiformes*)

- úzký špičatý zobák, dlouhá špičatá křídla, dlouhý ocas
- vratiprst, potravou hmyz, nidikolní ml.
- hnízdní parazitismus (jen u některých druhů), netvoří páry
- u nás 1 druh





Č: Kukačkovití – Cuculidae  
Kukačka obecná (*Cuculus canorus*)





# Řád: LELKOVÉ (*Caprimulgiformes*)

- noční, skrytě žijící ptáci, kryptické zbarvení a chování
- plochá hlava, zobák krátký široký s vibrisy, velké oči
- krátké nohy, dlouhá špičatá křídla, měkké peří, let připomíná netopýry
- loví hmyz v letu, hnízdo na zemi, nidikolní ml.



# Č: Lelkovití – Caprimulgidae

## Lelek lesní (*Caprimulgus europaeus*)



Jens E




(c) Mark Piaz



# Řád: SVIŠŤOUNI (*Apodiformes*)

- extrémní letoví specialisti s mohutnou létací svalovinou, dlouhá ruční část křídla s dlouhými letkami, slabé nohy, potravu získávají v letu, nidikolní ml.
- u nás 2 druhy (1 hnízdí)



## Č: Rorýsovití – *Apodidae*

- dlouhá srpovitá křídla, krátký vidličnatý ocas, velmi krátké nohy s drápy – závěsné (pamprodaktylní – všechny 4 prsty dopředu)
- krátký rozeklaný zobák – lov hmyzu v letu
- v letu kopulují i spí, kolonie (skály, budovy)

# Č: Rorýsovití – Apodidae

## Rorýs obecný (*Apus apus*)

