


# Teplota a termální fyziologie

Teplota je zásadní faktor pro biochemické děje. Aktivační energie roste a reakce se zrychlují.


Rozmezí teplot na Zemi je –80 st.C. po teploty nad 100 st.C.

Podstatné je také časové kolísání teplot.


# Výměna tepla mezi organismem a prostředím.



## Různé kombinace ve vztahu teplota těla a prostředí



**Figure 13.6 Thermal strategies** Most animals can be classified as homeotherm or poikilotherm, or alternately, ectotherm or endotherm. This figure illustrates the many species whose thermal strategies combine elements of multiple strategies. For example, monotremes are less homeothermic and less endothermic than other mammals.




Termoregulace jako evoluční krok k volným nikám.  
Tkáně jsou neustále v optimální teplotě.

Jen velcí si mohou dovolit termoregulovat.

Behaviorální termoregulace je ale dostupná i malým.

Až 20x větší energetická náročnost homiotermů při dané hmotnosti.



# Teplota a metabolismus u poikilo a homiotermů.






Fig. 6.17 Relationship between ambient temperature and metabolic



# Vlivy teploty

Mění se aktivita enzymů, vlastnosti membrán (gel x tekutost). Protože zejména slabé vazby jsou teplotou ovlivněny, mění se vlastnosti proteinů a lipidů. H můstky a van der W. síly s teplotou slábnou, hydrofobní interakce (vazby) sílí. Záleží tedy na relativní důležitosti a zastoupení vazeb.

- Enzymy mají svá teplotní optima.



**Figure 4.1** The effect of temperature on a protein splitting enzyme (protease) from the ascidian *Halocynthia*. The enzyme effect seems to have a temperature optimum, but this optimum is lower the longer the duration of the experiment. This is explained in the text. [Berrill 1929]


## Adaptace, Aklimace

*Evoluční adaptace:* *Thermobia* (šupinušky, Apterygota) jsou aktivní v rozmezí 12 - 50 °C. *Grylloblatta*, cvrčkovec, který žije ve vysokých horách Severní Ameriky je aktivní při teplotě -2.5 - 11.5 °C, teplotu 20 °C. již nesnese.


*Rychlá adaptace - aklimace:* I u jedince může dojít ke změně odolnosti vůči abnormalním.. šváb adaptovaný na teplotu 36°C upadá do stavu strnulosti (chladový šok) při snížení teploty na 9.5°C. Byl-li však chován alespoň 24 hod při teplotě 15 °C., pak dojde ke chladovému šoku až při 2°C.

# Adaptace, Aklimace

Optimum má širší nebo užší hranice.




Aklimace je přizpůsobení se dlouhodobému působení určité teploty.  
Rychlé změny vedou k větším výkyvům v metabolismu.



# Aklimace - Jak udržet buněčné děje v chodu.


- A. Kontrola fluidity membrán
- Délka řetězce
- Saturace
- Fosfolipidová třída  
(fosfatidilcholin x fosfatidylethanolamin)
- Cholesterol – udržuje fluiditu za nízkých T
- B. Syntéza ochranných látek (teplota i chlad)
- C. Změny spektra enzymů a/nebo syntéza homologů
- D. Změny izoforem proteinů (např. svalového myosinu)



**Figure 13.12 Phospholipid properties and membrane fluidity** Cells change the fluidity of membranes by altering the composition of membrane phospholipids.

# Aklimace - Jak udržet buněčné děje v chodu.

- S časem trvání experimentu se jejich mhomologická stavba přizpůsobuje.



**Figure 4.1** The effect of temperature on a protein splitting enzyme (protease) from the ascidian *Halocynthia*. The enzyme effect seems to have a temperature optimum, but this optimum is lower the longer the duration of the experiment. This is explained in the text. [Berrill 1929]

## Poikilotermie

Jako každá konformní strategie je lacinější, pro malé živočichy jediná možná. I za cenu snížené výkonnosti.

# Poikilotermie - teplo

## Heat shock proteiny – chaperony opravují denaturované bílkoviny





Figure 13.15 Heat shock response

# Poikilotermie - chlad


- A) Zmrznutí tolerující – nukleační l. (kontrolované zmrznutí)
- B) Zmrznutí netolerující – kryoprotektivní l. (glyceroly) a tzv. antifrízy (zabraňují krystalům ledu růst).

Intracellulárně led nesmí vzniknout nikdy.


Ale i tvorba extraceluárního ledu vystavuje buňky osmotickému stresu.



## Homoiotermie, ale pod vlivem rytmů




Obr. 108. Teplota tela zdravého člověka počas dňa.




# Homiotermie – fyzikální regulace

Není nutné prohřívat všechny tkáně, naopak se výhodně regulovat tepelné ztráty.





# Protiproudá výměna

Dokáže oddělit teplé a studené tkáně.



# Protiproudá výměna

Dokáže oddělit teplé a studené tkáně.




# Protiproudá výměna

Dokáže oddělit teplé a studené tkáně.


U člověka dvě sady žil – podle teploty blíže nebo dále povrchu.

With this arrangement of blood vessels, blood loses heat steadily to the environment as it flows in and out of the limb, and the temperature of the blood steadily declines.

(a) Blood flow without countercurrent heat exchange




(b) Blood flow with countercurrent heat exchange



When the arteries and veins are close together, allowing countercurrent heat exchange to occur, some of the heat lost from the arterial blood enters the venous blood. The temperature of the venous blood thus rises as the blood travels toward the body.


# Protiproudá výměna

Mozek musí mít  
stálou teplotu.




# Homiotermie – chemická regulace


Třesová a  
netřesová  
termogeneze




Elektromyografické záznamy třesové aktivity, ukažující průběh "výbuchů", u morčete (a), krys (b) a myši (c).  
(Spaan, Kleissmann 1970)



# Homiotermie - hnědá tuková tkáň



Obr. 6-5. Mikrofotografie multiloculární tukové tkáně s charakteristickými buňkami obsahujícími centrálně uložené kulovité jádro a tukové kapénky. x 1000.



Obr. 6-6. Nákres multiloculární tukové buňky. Povšimněme si jádra, uloženého ve středu, mnohočetných tukových kapének a velkého počtu mitochondrií. Napravo dole je sympatické nervové zakončení.

Hnědý tuk zejména u mláďat  
savců.






FIGURE 10.24.



Uncoupling protein – odpojuje tvorbu ATP od průchodu H<sup>+</sup> iontů. Všechna energie se mění na teplo.





# Netřesová termogeneze u aklimovaných, hibernátorů a mláďat. S věkem může vymizet.



(a) Temperatures of thorax and abdomen

I hmyz termoreguluje.  
Thorax je choustivější  
než abdomen



# Klidová stádia – „uteč“ strategie


Hibernace – zimní spánek

Estivace – letní klidové stádium


Torpor – noční ztuhnutí

# Klidová stádia

Hibernace se vyplatí nejvíce menším savcům.



Z hibernace je potřeba se občas probudit. Heterotermové termoregulují i při hibernaci.



Hypotermie se vyplatí jen při nízké teplotě.

