

Fylogeneze a diverzita obratlovců – cvičení

Savci 3

šelmy (Carnivora) lichokopytníci (Perissodactyla) sudokopytníci (Cetartiodactyla)

Tomáš Bartonička



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY




OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ


Laurasiotheria



Obr. 162 Fylogenetické vztahy uvnitř skupiny Laurasiatheria. Podle Springera et al. (2004).

ŠELMY


- masožraví (všežraví – medvědi), loví
- mohutný chrup, úplný, 28-48 zubů
- bystré smysly, dokonalé pohybové schopnosti, rozvinuté duševní vlastnosti
- nemají slepé střevo a klíční kost
- odrazová vrstva v cévnatce (tapetum cellulosum)
- šelmy 2 skupiny (Feliformia, chybí M3; Caniformia; dříve Fissipedia, Pinnipedia)
- pozemní: téměř po celém světě, nepůvodní v Austrálii
- jednoduchý žaludek, krátké střevo
- prstochodci, vzácně ploskochodci (medvěd), drápy!
- 16 druhů, 5 čeledí, 1 vyhuben



- | | | | |
|---|-----------|---|----------|
|  | Molars |  | Canine |
|  | Premolars |  | Incisors |

lebka

- největší špičáky, mají úplný sekodontní chrup (různé druhy zubů), kdy v chrupu přítomny trháky, vyvinutý mléčný chrup
- trháky (v dolní čelisti 1. stolička, M1; v horní čelisti poslední praemolár, P4)
- mohutná lebka



P4

M1


Feliformia

čeleď: kočkovití (*Felidae*)

- zkrácené rostrum, kulatá hlava, velké oči, chybí M3, snížený počet zubů max.30
- prstochodci, zatažitelné ostré drápy
- přední nohy 5, zadní 4 prsty

• 3 1 3 1
3 1 2 1

- rys ostrovid (*Lynx lynx*)
- kočka divoká (*Felis silvestris*)



čeleď: kočkovití (*Felidae*)

– rys ostrovid (*Lynx lynx*)



Podélný pruh na zádech, skvrny,
okrsek 10-25 km²,
srnčí



M₁ trojvrcholová,
dva P



Současné rozšíření rysa ostrovida



Šumava, Beskydy, ...Krkonoše, Brdy

čeleď: kočkovití (*Felidae*)

– kočka divoká (*Felis silvestris*)

P¹-P³ = 3 P, mezera mezi C a P, šedivé,
příčně pruhovaná
krátký a tupý ocas, držení dolů!, menší hlava




Foto: Národní Park Šumava



Nationalpark
Bayerischer Wald




Národní Park
Šumava



Obr. 130: Srovnání lebky kočky divoké (a) a kočky domácí (b)

Rozměry (v mm)	kočka divoká	kočka domácí
šířka týlního otvoru	13,7–16,8	11,5–14,5
šířka mozkovny	43,0–48,4	38,2–46,7
délka C_1	10,0–16,4	7,2–12,2
P^3-P^4	15,9–20,0	13,0–17,2
délka M_1	7,4–9,8	5,7–8,0
P_3-M_1	19,4–24,0	16,4–20,5

2016




CHKO Bílé Karpaty,
Beskydy, Český les,
Šumava


Caniformia

- čeleď: medvědovití (*Ursidae*)
 - zavalité tělo, zakrnělý ocas,
 - bunodontní moláry, trháky jen slabě zvýrazněny
 - omnivorní
 - ploskochodci
 - bez mimických výrazů
 - medvěd hnědý (*Ursus arctos*)

Beskydy



medvěd hnědý (*Ursus arctos*)



chybí trháky, dlouhé tvrdé patro,
ploché bubínkové výdutě,
alveolární výběžek,
silný hřeben



čeled': lasicovití – kunovití (*Mustelidae*)

- naše nejmenší šelmy
- prstochodci, na zadní končetině 5 prstů
- mírně protažená lebka, dlouhé tvrdé patro až za zuby, dobře vyvinuté trháky
- pachové žlázy
- utajená březost

jezevec lesní (*Meles meles*)

vydra říční (*Lutra lutra*)

kuna lesní (*Martes martes*)

kuna skalní (*Martes foina*)

norek evropský (*Mustela lutreola*)

norek americký (*Mustela vison*)

tchoř tmavý (*Mustela putorius*)

tchoř stepní (*Mustela eversmanii*)

lasice kolčava (*Mustela nivalis*)

lasice hranostaj (*Mustela erminea*)

jezevec lesní (*Meles meles*)



Hibernace, M_1 4 hrbolky, sagitální hřeben, trháky nevýrazné

vydra říční (*Lutra lutra*)



50mm



Nízký sagit. hřeben, trojúhelníkový podočnicový otvor, široká M₁


norek americký, mink
(*Neovison vison*)


Mlut - Izolované populace přežívají ve Španělsku (500-1000 jedinců), Francii (několik set jedinců) a na Balkáně v deltě Dunaje (několik tisíc jedinců). IUCN největší populace přežívají pravděpodobně v severovýchodních oblastech západního Ruska.

norek evropský
(*Mustela lutreola*)
vyhynulý od pol. 19.století




norek evropský






Obr. 140: Lebka a určovací znaky tchoře tmavého (a) a t. stepního (b)



Obr. 141: Lebka a určovací znaky norka amerického (a) a n. evropského (b)



Obr. 142: Lebka a určovací znaky hranostaje (a) a kolčavy (b)

Rozměry (v mm)	kolčava	hranostaj
LaI	6,0–10,0	9,4–13,1
výška lebky	10,0–17,0	15,2–20,0
AMd	6,5–12,0	10,5–13,9
délka M ₁	3,3–5,7	4,0–6,7
C ¹ –M ¹	7,0–11,0	9,8–12,3


čeleď: kunovití (*Mustelidae*)

kuna lesní (*Martes martes*)



Uši lemování, srst mezi polštářky





Obr. 139: Lebka a určovací znaky kuni skalní (a) a k. lesní (b)


kuna skalní (*Martes foina*)



na polštářkách chybí srst, kratší ocas

tchoř tmavý (*Mustela putorius*)

není utajená březost, menší lebka, světlá podsada



V České republice se v důsledku úbytku vhodných biotopů (vlhká a podmáčená území) vyskytuje už jen vzácně.

tchoř stepní (*Mustela eversmanii*)

Světlý ocas při kořeni jinak také tmavý, tmavé nohy, srst písková, nevýrazná maska

AlkaWildlife




Obr. 2. Mapa recentních (2009–2014) nálezů tchoře stepního.



lasice kolčava (*Mustela nivalis*)

hranostaj (*Mustela erminea*)





*Obr. 142: Lebka
a určovací znaky
hranostaje (a)
a kolčavy (b)*

Rozměry (v mm)	kolčava	hranostaj
Lal	6,0–10,0	9,4–13,1
výška lebky	10,0–17,0	15,2–20,0
AMd	6,5–12,0	10,5–13,9
délka M ₁	3,3–5,7	4,0–6,7
C ¹ –M ¹	7,0–11,0	9,8–12,3

čeleď: psovití (*Canidae*)


- přední končetina - palec postaven výše a zakrnělý, zadní končetina - 4 prsty
- ve stopě drápy
- ve smečce
- protažené rostrum, patro končí na zadní hranici řady zubů
- 3 1 4 2
3 1 4 3



čeleď: psovití (*Canidae*)

- vlk (*Canis lupus*)
- pes domácí (*C. lupus f. familiaris*)
- liška obecná (*Vulpes vulpes*)
- psík mývalovitý, mývalovec kuní (*Nyctereutes procyonoides*)
- šakal obecný (*Canis aureus*)

vlk (*Canis lupus*)




Obr. 131: Srovnání lebky vlka obecného (a) a německého ovčáckého psa (b)





Profimedia.cz

Výskyt vlka obecného v sezóně 2017/2018
(1.5.2017-30.4.2018)



Zdroje dat © 2018 Hnutí DUHA¹, ČZU & OWAD², Association for Nature „Wolf“ (Poland)³, AOPK ČR, NP Šumava a NP BayerischerWald⁴
Mapový podklad: Open Database License (ODbL). Indexy u teritorií značí autorství subjektu

liška obecná (*Vulpes vulpes*)



psík mývalovitý (*Nyctereutes procyonoides*)



váha 4–10kg


délka těla 50–70 cm, ocas 13–25 cm


mláďata 1 x ročně, jaro

5–8 (2–19) mláďat ve vrhu


žije převážně v párech

3 M





Obr. 133: Lebka lišky obecné




Obr. 134: Lebka psíka mývalovitého

šakal obecný (*Canis aureus*)



Obr. 132: Lebka šakala obecného



Uherské Hradiště (2006), Brno (2009), Benešovsko (střední Čechy, 2011), Novojičínsko (2014)

čeleď: medvídkovití (Procyonidae)

mýval severní (*Procyon lotor*)


váha 2-10 kg, délka těla 40-60 cm

1x ročně 3-7 mláďat

pečuje o ně samice

samotář

3 1 4 2 / 3 1 4 2 (2M)



Cetartiodactyla

Sudokopytníci (Artiodactyla)

- došlapují na poslední článek prstů (3. a 4.) opatřené kopyty, absence 1. prstu, 2. a 5. prst slabší
- redukce klíční kosti
- protáhlá lebka s velkou mozkovnou
- býložraví

- nepřežvýkavci (*Nonruminantia*)

- čeleď: prasatovití (*Suidae*)

- řezáky s kořeny, stále rostoucí špičáky (kly) bez kořenů (klektáky a páráky), bunodontní stoličky, otevřené očné, sagitální hřeben

3 1 4 3

3 1 4 3

prase divoké (*Sus scrofa*)



prase divoké (*Sus scrofa*) - samec



prase divoké (*Sus scrofa*) - samice




- přežvýkavci (*Ruminantia*)
- býložravci, chybí horní řezáky i špičáky (kromě jelena), tvar řezných hran na molárech a praemolárech - dvojité půlměsíce, selenodontní, diastema

žaludek vs nonruminantia

2 čeledi jelenovití a turovití


rohý a parohý, očné



Obr. 146: Chrup (stoličky) přežvýkavců: jelenovití (a), turovití (b)

jelenovití


turovití





SROVNÁNÍ ROHU A PAROHU

© Biomach



přežvýkavci (*Ruminantia*)

čeleď: jelenovití (*Cervidae*)

– samci (samice pouze u losa a soba) kostěné výrůstky (parohy), na špici nejmladší, ob rok nebo ob 2 shoz

- los (*Alces alces*)
- jelen evropský (*Cervus elaphus*)
- srnec (*Capreolus capreolus*)
- daněk evropský (*Dama dama*)
- sika (*Cervus nippon*)
- jelenec běloocasý (*Odocoileus virginianus*)

čeleď: jelenovití (*Cervidae*)

jelen evropský (*Cervus elaphus*)

- dolní špičáky přiléhají řezákům, podobné



čeleď: jelenovití (*Cervidae*)

srnec obecný (*Capreolus capreolus*)




čeleď: jelenovití (*Cervidae*)

jelen sika (*Cervus nippon*)

Poddruhy japonský, Dybowského


na přelomu 19. a 20. století uměle vysazen
i v Čechách, původem z Asie, hybridní s
j.evropským



čeleď: jelenovití (*Cervidae*)

los evropský (*Alces alces*)

jelenec běloocasý (*Odocoileus virginianus*)



čeleď: jelenovití (*Cervidae*)

daněk evropský (*Dama dama*)



Středomoří, chovy, volně až po
2.sv.v.

přežvýkavci (*Ruminantia*)

čeleď: turovití (*Bovidae*)

- nemají parohy, na čelních kostech rohové kosti na ně rohovitě rohy, trvalé, u obou pohlaví, nejstarší na špici
 - kamzík horský (*Rupicapra rupicapra*)
 - muflon (*Ovis aries musimon*)
 - zubr (*Bison bonasus*) – ve stř. Evropě spíš nebyl
 - koza bezoárová (*Capra aegagrus*) – jen oborový chov Pálava

čeled': turovití (*Bovidae*)


- pratus (*Bos primigenius*)



čeleď: turovití (*Bovidae*)

kamzík horský (*Rupicapra rupicapra*)


chybí slzné jamky, krátké kořeny stoliček



čeleď: turovití (*Bovidae*)

ovce domácí (*Ovis musimon f. aries* ??)

muflon (*O. aries musimon*)





Obr. 155: Uspořádání týlní oblasti u kozy (a) i ovce (b) a lebka muflona s dolními řezáky (c)



© Jiří Bohdal
www.naturfoto.cz

koza bezoárová
(*Capra aegagrus*)

Lichokopytníci (*Perissodactyla*)

osa prochází 3. prstem, rohovité pouzdro - kopyto

býložravci

úplný chrup, špičáky (chybí u hříbat), řezáky i v horní čelisti, mezi špičáky a praemoláry diastema

semihypselodontní chrup - lofodontní moláry

korunky s hrboly splynutými v příčné meandrovitě stočené záhyby

čeleď: koňovití (*Equidae*)

tarpan lesní (*Equus ferus*)

kůň Převalského (*Equus przewalskii*)




Tarpan lesní (*Equus ferus*)

evropský divoký kůň obýval stepi a lesy východní Evropy.

lov pro maso a vybíjen kvůli ochraně úrody a domácích koní.

Poslední tarpan uhynul 1887 v zoologické zahradě v Moskvě, poslední volně žijící tarpan na Ukrajině roku 1879.



Konik polsky je nejčistší potomek lesního tarpana. V Polsku se lesní tarpan vyskytoval nejdéle a dochovalo se zde plemeno jemu nejpodobnější.



kůň Převalského (*Equus przewalskii*) neboli kertak je údajně jediný do současnosti přeživší divoce žijící druh koně.

na přelomu 60. a 70. let 20. století vyhuben, v ZOO Praha od roku 1921

– čeleď: koňovití (*Equidae*)

kůň domácí (*Equus przewalski f. caballus*)

