

# Genetické poradenství v reprodukční genetice

## Příčiny infertility a možnosti řešení

*MUDr. Rastislav Beharka*

*Oddělení lékařské genetiky, FN Brno*


*Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie, LF MU*





MASARYKOVA UNIVERZITA  
LÉKAŘSKÁ FAKULTA

# Úvod

- Člověk patří mezi **gonochoristy**, tedy druhy u kterých je pohlaví odděleno
- Muži – samčí pohlavní orgány – produkují spermie
- Ženy – samičí pohlavní orgány – produkují vajíčka (oocyty)
- V procesu oplození dochází k splynutí pohl. buněk spermie a oocyty a vzniká zygota, ze které se vyvine nový jedinec
- Pohlaví jedince je jednoznačně určeno již momentem oplození oocyty spermií. Rozhodující je kombinace pohlavních chromozomů v zygotě.
- Žena má karyotyp 46,XX a muž 46,XY.
- Očekávaný poměr narozených chlapců ku narozeným dívkám je 1:1, statistický poměr je 1,08:1 ve prospěch chlapců.
- Hlavní roli při pohlavní diferenciaci má gen **SRY (Sex region of chromosome Y)**, který zapříčiní rozvoj varlat z nediferencovaných pohlavních žláz embrya
- **TDF gen - testes determining factor** – semenné tubuly a
- Leydigovy buňky – stimulace z placenty choriogonadotropním hormonem



# Hormony a pohlavní diferenciaci



**Testosteron** – je mužský pohlavní hormon (v malé míře produkován u žen), který je produkován v **Leidygových buňkách** varlete. Reguluje mnoho fyziologických procesů: **androgenní efekt** - správný vývoj zevních a vnitřních pohl. orgánů muže, tvorbu sekundárních pohlavních znaků (ochlupení, hloubka hlasu), tvorbu spermií,


**anabolický efekt** – na metabolismus proteinů ve svalech (zvyšuje tvorbu bílkovin ve svalech a snižuje jejich odbourávání) metabolismus kostí (brání rozvoji osteoporózy), ovlivňuje mužskou psychiku (stres, agresivitu).

**AntiMüllerovský hormon** (AMH, MIH Müller inhibiční hormon) je produkován v **Serotoliho buňkách** varlete. AMH způsobí zánik **paramezonefrických (Müllerových)** vývodů, ze kterých se u žen vyvíjí vejcovody, děloha a horní část vagíny.

**Mezonefrické (Wolfovy)** vývody dávají u mužského pohlaví za vznik chámovodům a semenným vácům, u žen zanikají.

# Ženské vnitřní pohlavní orgány

## Organa genitalia feminina interna



**Vaječníky (ovaria)** – párové pohlavní žlázy oploštělého tvaru, velikosti 5x3x1,5cm (největší velikost je mezi 20 – 30 rokem poté se pomalu zmenšuje), v pánevní lokalizaci, zavěšené na dvojitěm listu pobříšnice (**mesovariu**). Na povrchu ovaria se nachází zarodeční epitel (jednovrstvový, kubický; nemá nic společného se zárodečnou funkcí) a pod ním je společná vrstva z tuhého vaziva (**tunica albuginea ovarii**). Dále nacházíme kůru (**cortex ovarii**), ve které se nacházení **folikuly** v různém stupni vývoje. Dřeň (**medula ovarii**) se nachází v střední části ovaria a je tvořena pletení krevních a mízních cév, nervů a snopců hladké svaloviny.

Z původních 2-3 mil. oocytů dochází v pubertě k poklesu na **300000**

V čase pohlavní zralosti dozraje cca **400-450** oocytů

Hlavní funkce: tvorba gamet, ženských pohlavních hormonů (estrogeny, progesteron).

**Vejcovody (tubae uterinae)** – jsou párové nálevkovité trubice (dlouhé 10-15cm) z hladké svaloviny jsou fixována pomocí mezosalpinxu = mesovarium

Funkce: zajišťují transport vajíčka směrem k děloze

# Vznik oocytů

Vajíčka (**oocyty**) jsou ženské pohlavní buňky. Jejich vývoj začíná již v prenatálním období. Vlastní produkce zralých vajíček je potom omezena na "plodné období ženy", které trvá od puberty až do přechodu (menopauzy). I zde je zapotřebí příslušná stimulace pohlavními hormony.

Prekurzorovou buňkou v prenatálním období je **oogonie**. Ty se mohou mitoticky dělit a jejich přeměnou také vznikají diploidní **primární oocyty**. Okolo primárních oocytů se formuje jednovrstevný obal z folikulárních buněk. Tento útvar označujeme jako **primordiální folikul**.

Ještě v prenatálním období vstupují primární oocyty do prvního meiotického dělení. To však nedokončí, neboť je zastaveno již v průběhu profáze. V tomto stádiu (**diktyotenní stádium**) primární oocyty zůstávají až do puberty, kdy teprve vývoj pokračuje (viz dále).

V této souvislosti si je třeba uvědomit, že toto diktyotenní stádium může trvat třeba i přes **40 let**, neboť meióza pokračuje až před ovulací příslušného vajíčka. Po celou tuto dobu je v buňce přítomen cytoskeletární mitotický aparát (dělicí vřeténko), který je zodpovědný za bezchybný rozestup chromozomů. Jelikož během této dlouhé doby na něj může působit řada nepříznivých vlivů, existuje riziko, že tento aparát nesplní zcela svůj úkol a dojde k chybnému rozestupu chromozomů (**nondisjunkci**). Čím je ona doba delší, tím je toto riziko vyšší - **proto je u matek nad 35 let obecně vyšší riziko vzniku chromozomových aberací**.


# Vznik oocytů

Z původních zhruba **2-3 milionů!** primárních oocytů jich velká většina zaniká a do puberty jich zbude zhruba **300 tisíc**. Z nich pouze okolo **450** vajíček je skutečně uvolněno (při ovulaci) v průběhu plodného období ženy.

V pubertě se nejprve zvětšují jak primární oocyty, tak okolní folikulární buňky. Okolo primárního ocytu se taktéž objevuje vrstva glykoproteinové hmoty (**zona pellucida**). Vzniklý útvar se nazývá **primární folikul**, folikul s vícevrstevným obalem folikulárních buněk a dutinkou se potom nazývá **sekundární folikul**. Vrcholem vývoje folikulu je **Graafův folikul**, který je opět větší, vyplněný velkou dutinou s tekutinou. Vajíčko je na jedné straně spojeno s vrstvou folikulárních buněk (granulózní buňky), které tvoří obal folikulu (jako tzv. membrana granulosa). Nad vrstvou těchto buněk jsou potom buňky thekální.

Těsně před ovulací je dokončeno první meiotické dělení. Vzniká sekundární oocyt a první pólové tělísko. Při ovulaci dojde k prasknutí Graafova folikulu a k uvolnění ocytu. Ten je zachycen (či "nasát") vejcovodem, kterým putuje směrem k děloze. Po ovulaci vstupuje sekundární oocyt do profáze druhého meiotického dělení, které ale opět prozatím nedokončí. Teprve při oplození vajíčka spermií je dokončeno druhé meiotické dělení, které dá za vznik druhému pólovému tělísku a zralému ocytu, tedy již vlastně oplozenému ocytu.

Primární oocyt je diploidní, sekundární oocyt je haploidní se zdvojenými chromatidami a teprve výsledný oocyt je haploidní s polovinou genetické informace. Pólová tělíška v drtivé většině případů beze zbytku zanikají (slouží pouze pro eliminaci chromozomů během meiózy); první pólové tělísko také může projít druhým meiotickým dělením a dát vzniku dvěma haploidním buňkám, které ale stejně zaniknou.




# Ovariální cyklus

Jde o cyklické změny probíhající v ovariu ženy v závislosti na hladině pohlavních hormonů. Je úzce spojen s menstruačním cyklem, kdy hormony produkované cyklicky v ovariu přímo ovlivňují děložní sliznici.

**Folikulární fáze** - trvá prvních 14 dní cyklu. Během ní pod vlivem především FSH dochází k růstu náhodně vybraného folikulu vzniká Graafův folikul a vysoké produkci estrogenů. Ke konci této fáze se k FSH přidává i LH a napomáhá tak dozrání folikulu a především ovulaci.

**Ovulační fáze** - nastává zhruba 14. den ovariálního cyklu. Graafův folikul praská a vajíčko je uvolněno do břišní dutiny, kde je vzápětí zachyceno vejcovodem, kterým dále putuje směrem k děloze.

**Luteální fáze** - nastupuje po ovulaci, kdy dochází k přeměně ovariálních folikulárních buněk (prasklého folikulu) v tzv. žluté tělísko (corpus luteum), To začne produkovat velké množství progesteronu. Pokud však nedojde k oplození vajíčka, potom do 28. dne cyklu tělísko zaniká a vznikne tzv. bílé tělísko (corpus albicans). Produkce progesteronu tak rapidně klesne.



# Ženské vnitřní pohlavní orgány

## Organa genitalia feminina interna

**Děloha (uterus)** – je nepárový dutý orgán hruškovitého tvaru, 8cm dlouhá, 4cm široká a 2,5cm silná ( rozeznáváme na ní tělo – **corpus uteri**, úžinu děložní – **isthmus uteri** a hrdlo děložní - **cervix uteri** ). V průběhu gravidity se zvětšuje až 10x a zvýší hmotnost až 20x.

Dutina děložní – **cavitas uteri** – ústí do ní shora ze dvou rohů děložních vejcovody. Vespod v oblasti děložního hrdla ústí děloha do pochvy a její zaoblený úsek který vyčnívá do pochvy označujeme jako děložní čípek – **portio vaginalis cervicis**.

Na stavbě děložní stěny se podílejí 3 vrstvy:

**Endometrium** – děložní sliznice s jednovrstevným cylindrickým epitelem a četnými žlázkami. Nasedá na podslizniční vazivo. Na sliznici probíhají cyklické změny vzhledem k fázím menstruačního cyklu.

**Myometrium** – je tvořena několika vrstvami různě uspořádané hladké svaloviny. Během těhotenství dokáží svalové buňky svou délku až zdesetinásobit. Svalovina se pod kontrolou hormonů (**oxytocin**) během porodu kontrahuje a vypuzuje plod.

**Perimetrium** – tenká vrstva vaziva s pobřišnicí pokrývá dělohu



**Parametria** – vazivové provazce, spojující dělohu s dalšími útvary v pánvi.

Na fixaci se podílejí i svaly pánevního dna ( zdvihač pánevního dna - **m. levator ani** a svaly hráze – **mm. perinei**).

**Blastocysta** – se za fyziologických podmínek uchytí v děložní sliznici a v děloze probíhá prenatální vývoj lidského jedince až do doby porodu.




# Histologická stavba děložní stěny




# Ženské vnitřní pohlavní orgány

## Organa genitalia feminina interna



# Ženské vnitřní a zevní pohlavní orgány

## Organa genitalia feminina interna et externa



**Pochva (vagina)** – je nepárová trubice, sloužící jako ženský kopulační orgán a porodní cesta. Je dlouhá 8 cm a 3cm široká., vystlána mnohvrstevným dlaždicovým epitelem. Na horním konci se připíná k děložnímu hrdlu tak, že stěny pak tvoří klenbu poševní (**fornix vaginae**), na dolním konci ústí jako štěrbina poševní do předsíně poševní na povrch těla. Těsně před vyústěním do předsíně se nachází hymen (slizniční řasa variabilního rozsahu – narušena při prvním pohl. styku a rozrušena při prvním porodu).

**Předsíň a štěrbina poševní (vestibulum et ostium vaginae)**

**Velké stydké pysky (labia majora pudendi)**

**Malé stydké pysky (labia minora pudendi)**

**Velké a malé vestibulární žlázy (glandulae vestibulares majores et minores)**

**Předsíňová topořivá tělesa (bulbi vestibuli)**

**Poštěváček (clitoris)**

# Menstruační cyklus

Jako menstruační cyklus označujeme cyklické změny děložní sliznice. Tyto změny jsou přísně závislé na hladině různých pohlavních hormonů (a tedy i na ovariačním cyklu). Délka cyklu je zhruba 21 - 35 dní, hodnoty se mohou individuálně lišit (průměrně jde o 28 dní). Menstruační cyklus začíná v pubertě (průměrný věk **menarché** 12,5 roku) a končí v období **menopauzy** (mezi 45 a 55 rokem).

Má následující fáze:


**Proliferační fáze** - trvá přibližně od 5. do 14. dne a navazuje na předchozí menstruační fázi.

Probíhá pod stimulací estrogenu. Dochází k obnově děložní sliznice, růstu slizničního epitelu a k vývoji děložních žlázek.

**Ovulační fáze** - navazuje na proliferační fázi a trvá od 15. do 28. (27.) dne cyklu. Během ní dochází vlivem progesteronu (produkovaného žlutým tělískem) k bohaté sekreci děložních žlázek. Děložní sliznice je nyní bohatě prosycena živinami a připravena přijmout oplozené vajíčko.


**Ischemická fáze** - probíhá 28. den cyklu, kdy vlivem poklesu hladiny progesteronu (žluté tělísko zaniká) dochází ke kontrakci arterií děložní sliznice, která tak přestane být zásobena krví (ischémie).

**Menstruační fáze** - trvá v průměru 5 dní a navazuje na ischemickou fázi. Během ní se odlučují nedostatečně krví zásobené buňky sliznice a spolu s určitým množstvím krve opouští organismus ženy.




# Diagnostika: hysteroskopie

Hysteroskopie znamená „prohlížení děložní dutiny“ pomocí hysteroskopu (optický nástroj). Během hysteroskopie lékař zhodnotí tvar dutiny děložní, ústí vejcovodů, děložní sliznici a zároveň lze odebrat vzorek sliznice pro histologické vyšetření.




# Diagnostika - laparoskopie




Laparoskopie je velmi šetrná operační technika sloužící k diagnostice a léčbě onemocnění břišních nebo pánevních orgánů. Operatér provede jen několik drobných řezů jimiž je do břišní dutiny zavedena kamera a jednotlivé operační nástroje. Operační pole sleduje lékař a ostatní personál na monitoru. Předností této metody je šetrný přístup a zkrácení doby rekonvalescence.



# Patologie uterus, ovaria



Laparoskopie dg.:  
srůsty, endometriosa






# Mužské vnitřní pohlavní orgány

## Organa genitalia masculina interna

**Varle (testis)** je mužská párová pohlavní žláza 4x3x2,5cm. Má lehce větší velikost a hmotnost než vaječník. Jeho funkcí je tvorba spermií a syntéza mužských pohlavních hormonů (testosteron). Na povrchu varlete je vrstva z tuhého vaziva (tunica albuginea testis), uvnitř je prostor vazivem rozdělen na malé lalůčky, kterými prochází řada stočených kanálků, kde probíhá vlastní tvorba spermií. Kanálky se spojují do větších kanálů, které vyúsťují do nadvarlete. Varlata se zakládají během vývoje jedince v dutině břišní, odkud teprve potom sestupují do šourku, kde jsou definitivně uložena. Stav, kdy jsou varlata neseoustuplá, označujeme jako kryptorchismus.

**Nadvarle (epididymis)** je protáhlý párový orgán umístěný "nad varletem". Po jeho délce můžeme rozlišit 3 části, označované jako hlava, tělo a ocas nadvarlete (caput, et cauda epididymidis). Do nadvarlete přicházejí spermie z varlete, aby zde dozrály a získaly schopnost pohybu. Pokud nejsou nahromaděné spermie odvedeny do chámovodu při ejakulaci, po určité době se rozpadnou a resorbují.



# Mužské vnitřní pohlavní orgány

## Organa genitalia masculina interna

**Chámovody (ductus deferentes)** Chámovod je párová svalová trubice navazující na koncovou část (ohon) nadvarlete. Je dlouhá 40cm a 3mm široká. Odvádí spermie z šourku skrze tříselný kanál (canalis inguinalis) do dutiny břišní, kde ústí do močové trubice (viz níže). Až do průchodu tříselným kanálem běží spolu s chámovodem nervy, cévy (krevní i mízní) a svalová tkáň (musculus cremaster) v útvaru zvaném provazec semenný (funiculus spermaticus).


**Měchýřkové žlázy (glandulae vesiculosae)** Měchýřkové žlázy jsou párové žlázy umístěné za prostatou na zadní straně močového měchýře (ústí do chámovodů, těsně před jejich vyústěním do močové trubice). Jsou dlouhé asi 5 cm. Tvoří alkalický sekret bohatý na bílkoviny a fruktosu (objemově se podílí zhruba na 1/2 až 3/4 celkového objemu ejakulátu!), který se mísí se sekretem nadvarlete se spermii. Tímto smísením vzniklou substanci již označujeme jako ejakulát.

**Předstojná žláza (prostata)** Nepárová předstojná žláza je uložena těsně pod močovým měchýřem. Předstojnou žlázou prochází močová trubice (urethra), do které ještě v těle žlázy vyústí oba chámovody. Vlastní žlásky jsou umístěny v robustním svalově-vazivovém těle orgánu. Prostata obohacuje ejakulát o několik dalších látek (sekret předstojné žlázy tvoří asi 1/4 objemu ejakulátu).

**Močová trubice (urethra masculina)** Na rozdíl od ženy, slouží močová trubice (respektive její část od vyústění chámovodů) u muže jako pohlavní cesta. Močová trubice začíná na spodku močového měchýře, prochází prostatou, skrze svalovinu dna pánevního a zanořuje se do nepárového topořivého tělesa penisu, na jehož konci ústí (viz níže).

# Mužské vnitřní pohlavní orgány

## Organa genitalia masculina interna



# Mužské zevní pohlavní orgány


## Organa genitalia masculina externa



**Pyj (penis)** je mužský kopulační orgán. Prochází jím močová trubice, která je vývodnou trubicí pohlavních i močových cest. Rozměry penisu mají velkou individuální variabilitu.

Na stavbě penisu se podílejí 3 topořivá tělesa, cévy, nervy a močová trubice; celý orgán je krytý tenkou kůží na řídkém a pohyblivém podkožním vazivu. Topořivá tělesa - horní je párové, dolní je nepárové (v něm probíhá močová trubice) jsou tvořena houbovitou erektilní tkání. Při sexuálních podnětech dojde vlivem parasymptiku k zaplnění této tkáně krví - dochází k erekci - penis se vzpřimuje a prodlužuje.

Na konci je penis cylindrovitě rozšířený v útvar zvaný žalud (glans penis), který kryje volná kožní řasa - předkožka (preputium).






**Šourek (scrotum)** Šourek je nepárový kožní vak, zavěšený v oblasti pod sponou stydkou. Funkcí šourku


je dosáhnout optimální teploty pro tvorbu spermií (pod 35 °C). Kůže je silně pigmentována a vybavena tuhými chlupy. Pod kůží je vrstvička hladké svaloviny, která se může kontrahovat a přitáhnout tak šourek směrem k tělu (zvýšení teploty při zajišťování termoregulace). Uvnitř je prostor šourku rozdělen vazivovou přepážkou na dvě části - v každé části se nachází jedno varle.

# Patologie mužského pohlavního systému

## Varikokéla, CBAVD, Hypospádie, Kryptorchismus



# Vznik spermií



**Spermie** jsou mužské pohlavní buňky. Vznikají ve varlatech a to od puberty po celý zbytek života. Pro správný vývoj spermií je zapotřebí jak dostatečná stimulace pohlavními hormony (testosteronem), tak nižší teplota (která je docílena umístěním varlat v šourku). Důležitá je taky funkce **Sertoliho buněk**, které zajišťují správné prostředí pro vývoj spermií (zajišťují ochranu prekurzorových buněk či jejich výživu).

Na začátku vývojové řady spermie stojí **spermatogonie**. Ty fungují jako kmenové buňky, neboť se mitoticky dělí jednak aby doplnily své stavy (zachování spermatogonií pro neustálou spermatogenezi) a jednak jejich přeměnou vznikají **primární spermatocyty**. Primární spermatocyty jsou stále diploidní. Vstupují však již do prvního meiotického dělení, na jehož konci vzniknou 2 **sekundární spermatocyty**. Ty jsou již haploidní, ovšem stále mají zdvojené chromatidy. Záhy však navazuje druhé meiotické dělení, při kterém z každého sekundárního spermatocytu vznikají 2 **spermatidy**. Z každého primárního spermatocytu tedy vznikají celkem 4 spermatidy. Spermatidy jsou již plně haploidní a dále se nedělí.

Spermatidy potom prochází procesem zvaným **spermiogeneze**, kdy dochází ke kondenzaci jádra, vytvoření bičíku a ztrátě většiny cytoplazmy a některých organel. Vytváří se také **akrosomový váček**, obsahující několik hydrolytických enzymů, které usnadňují průnik spermie k vajíčku. Nezralé spermie jsou uvolněny do semenotvorných kanálků, odkud putují do nadvarlete, kde definitivně dozrávají. Zralé spermie jsou díky svému bičíku plně pohyblivé.

# Oplození vajíčka



Do klenby poševní je při ejakulaci dopraveno průměrně 2-6ml ejakulátu, který obsahuje i přes 600 miliónů spermií. K oplození vajíčka je nutná pouze jedna spermie; přesto musí ejakulát obsahovat alespoň nad 15 miliónů spermií na 1 ml ejakulátu, jinak je pravděpodobnost oplození vajíčka velmi malá. Ejakulát reaguje zásaditě, což alespoň částečně kompenzuje kyselé prostředí, které je normálně ve vagině (a které spermie negativně ovlivňuje). Spermie jsou pohyblivé buňky s bičíkem a svého cíle - vajíčka - musí dosáhnout samy. Nejčastějším místem oplození vajíčka je ampulární část vejcovodu. Ovšem je nutné si uvědomit, že vajíčko lze oplodnit pouze do 12 hodin po ovulaci. Spermie naopak jsou schopné v těle ženy přežít a vajíčko oplodnit zhruba po dva dny.

Během cesty k vajíčku prochází spermie tzv. **kapacitací**, při které se "odjišťují" proteolytické enzymatické prostředky spermie, které jsou nutné v tzv. **akrosomální reakci**, kdy se spermie pomocí těchto proteolytických enzymů "provrtává" skrze buňky obklopující vajíčko.


Jakmile první spermie pronikne do vajíčka, dojde k tzv. **zonální reakci**, kdy se změní vlastnosti obalu vajíčka a další spermie tak již dovnitř nemohou proniknout.

# Oplození oocyty

Vajíčko, do kterého pronikla spermie dokončí druhé meiotické dělení a posléze duplikuje svůj genetický materiál. Tento genetický materiál ženské gamety tvoří ženské prvojádro.

Spermie ztrácí veškerou cytoplazmu a organely (mitochondrie spermie se nestanou součástí vajíčka, proto veškeré mitochondrie a tím pádem i mitochondriální DNA dostává potomek pouze po matce) mimo svého jádra. DNA spermie se rovněž zdvojí a vytvoří mužské prvojádro.

Pokud si to zrekapitulujeme - tak každá gameta (spermie i vajíčko) je haploidní, tj. má přesně polovinu genetického materiálu. Po oplození vajíčka spermií je dosaženo standardního množství genetického materiálu (dvě sady - diploidní buňka). Pokud ovšem spermie i vajíčko při vzniku prvojader svou DNA zdvojí, potom je v oplozeném vajíčku dvojnásobné množství genetické informace, stejně jako v každé buňce před mitózou. A to je právě to, na co se oplozené vajíčko, tedy zygota chystá. Dojde ke vzniku dělicího vřeténka a zdvojené chromozomy mužského i ženského prvojádra jsou rozděleny a zygota se tak poprvé dělí na dvě dceřiné buňky, které již mají standardní - diploidní množství genetické informace; polovinu ze spermie (od otce) a polovinu z vajíčka (od matky).





# Neploďnost – infertilita


**Infertilita** – je stav, kdy se páru nedaří více než rok počít dítě přirozenou cestou

Přibližně 15% párů je nechtěně bezdětných. Příčiny neploďnosti jsou nejčastěji gynekologické nebo andrologické, dále se vyskytují příčiny hormonální, imunologické, hematologické (především u žen s opakovanými potraty) a genetické. Genetická abnormalita se vyskytuje u cca 15% infertilních mužů a cca u 7% infertilních žen.



# Reprodukční medicína - definice

Reprodukční medicína je jedním z podoborů gynekologie-porodnictví. Využívá nejen znalostí svého základního oboru, ale i klinické embryologie, andrologie, urologie, mikrobiologie, imunologie, sexuologie, psychologie, ale hlavně lékařské genetiky. Odvětvím lékařské genetiky, které je integrováno s reprodukční medicínou, je reprodukční genetiky. Úkolem reprodukční genetiky je přispět k objasnění etiologie reprodukčních poruch, genetická prevence a cílem je snaha umožnit rodinám mít nepostižené dítě.



# Důvody ke genetickému vyšetření jsou nejčastěji

- Vrozená vada nebo choroba s možnou dědičnou složkou v rodině.
- Narození dítěte s vrozenou vadou.
- Neplodnost, opakované spontánní potraty, porod mrtvého dítěte
- Plánování těhotenství po onkologické léčbě
- Opakovaný nebo časný výskyt onkologických chorob určitého ty rodině
- Příbuzenský sňatek
- V těhotenství :
  - o matek ve věku nad 35 let, otců nad 45 let
  - o s pozitivním výsledkem ultrazvukového nebo biochemického vyšetření (screeningu)
  - o s rizikem opakování dědičné vady, která se již v rodině vyskytla
  - o vystavená vnějším vlivům: lékům, ionizačnímu záření (Rentgen) a infekčním onemocněním

# Genetické poradenství v reprodukční genetice

- Interdisciplinární spolupráce
- Preventivní medicína
- Nedirektivní přístup
- Maximální množství informací o rodině/pacientovi
- Informovaný souhlas rodiny-pacienta
- Vyšetřovací postup volí rodina/pacient
- Reprodukční genetiky se týkají :
  - infertilita
  - opakované samovolné potraty
  - mrtvě narozené děti

# Indikace ke genetickému vyšetření

Nevysvětlitelná porucha infertility, opakované spontánní potraty, předčasné porody, mrtvorozenost

Porucha menstruačního cyklu – amenorea, oligomenorea

Porucha spermiogeneze – azoospermie, oligospermie, CBAVD

Dárci gamet

Chromosomální aberace v rodině

Postižení genetickou chorobou, vrozenou vadou nebo mentální retardací v osobní nebo rodinné anamnéze

Profesionální nebo léčebná (radioterapie, chemoterapie) mutagenní zátěž

# Genetická konzultace

Základním vyšetřením je genetická konzultace, spočívající v podrobném genealogickém rozboru, obvykle do třetí generace. Při ní se zjišťují příčiny poruch reprodukce, genetická rizika pro potomky, indikují se další vyšetření, např. vyšetření karyotypu partnerů (vyšetření cytogenetické či molekulárně cytogenetické), v indikovaných případech molekulárně genetické vyšetření apod. Tato vyšetření přispívají ke strategii použití metod asistované reprodukce a případně k typu cílené prenatální diagnostiky.


Poruchy reprodukce mohou být součástí chorob či syndromů děděných monogenně. Dědičnost může být autosomálně dominantní (AD), autosomálně recesivní (AR), gonosomálně recesivní (GR), mitochondriální nebo multifaktoriální.

# Postupy primární genetické prevence

- Genetické poradenství (retrospektivní či prospektivní) – specializovaná konzultace a genealogická studie partnerů, případně zařazení specializovaných laboratorních vyšetření, která mohou potvrdit či vyloučit některá podezření na genetickou zátěž v rodině
- Prevence spontánních a indukovaných mutací prostřednictvím zdravého životního stylu a plánovaného rodičovství v optimálním reprodukčním věku
- Očkování proti rubeole
- Prekoncepční a perikoncepční péče
- Prevence rozštěpových vad doporučením podávání kyseliny listové v dávce 0,8 mg/d, 3 měsíce před koncepcí a do konce 12 týdne gravidity
- Konzultace ošetřujícího lékaře o aktuálním zdravotním stavu partnerů vzhledem k plánovanému rodičovství, především tam, kde je, nebo byla v minulosti dlouhodobá farmakoterapie pro chronická onemocnění (diabetes, epilepsie, psychosa, hypertenze, Crohnova choroba, asthma bronchiale...)
- Vyšetření získaných chromosomových aberací u osob, který jsou v kontaktu se škodlivinami pracovního prostředí, nebo v souvislosti s terapií (cehnikálie, záření, chemoterapie, radioterapie, imunosuprese)
- Dotazy na kontracepci, sterilizaci, adopci, dárcovství gamet

# Postupy sekundární genetické prevence

- Prospektivní genetické poradenství, genetická konzultace
- Preimplantační genetická diagnostika
- Prenatální screening vrozeých vývojových vad a chromosomálních aberací (soubor pravidelných ultrazvukových vyšetření a biochemický screening)
- Cílená invazivní a neinvazivní prenatální genetická diagnostika k včasné detekci postižení plodu
- Prenatální terapie
- Předčasné ukončení těhotenství dle přání rodiny a dle platných zákonných možností
- Postnatální screening
- Zábřana klinické manifestace onemocnění
- Presymptomatický screening
- Postnatální péče a terapie
- Retrospektivní genetické poradenství





# Genetická konzultace a vyšetření

Genetická konzultace je indikovaná u všech infertilních párů před započítím programu asistované reprodukce.

Postup konzultace:


- osobní anamnézy vč. gynekologické a andrologické, kontakt s toxiny
- rodinná anamnéza – sestavení rodokmenu = genealogie (příbuzenské sňatky, zaměření na nemoci s možnou genetickou souvislostí, VVV, PMR, infertilitu, potraty...)

U všech skupin je indikováno cytogenetické vyšetření, a to vždy u obou partnerů (i když příčina se jeví pouze u jednoho z partnerů). U opakovaných spontánních potratů, předčasných porodů, u opakovaného selhání implantace při IVF (in vitro fertilizace) je indikováno vyšetření Leidenské mutace a mutace genu pro protrombin. U poruch spermiogeneze (azoospermie, těžká oligospermie, obvykle pod 5mil. spermií v 1 ml), kromě karyotypu, je indikováno vyšetření mutace v genu pro cystickou fibrózu (CFTR gen) a mikrodelece Y chromosomu v oblasti AZF. U dárců gamet vyšetřujeme kromě karyotypu i mutace v CFTR genu.

Součástí reprodukční genetiky je i preimplantační genetická diagnostika a prenatální diagnostika v I. a II. trimestru.

# Myotonická dystrofie

dědičnost AD, výskyt 1 : 8000. Je podmíněná expanzí DNA trinukleotidových opakování (zmnožení CTG tripletů) na dlouhém raménku chromosomu 19. Nejvýznamnější jsou neuromuskulární příznaky. Poruchy spermiogeneze jsou různého stupně. Progrese onemocnění nastává obvykle ve 3. a 4. decenniu, ale může se projevit i u novorozenců.



# Youngův syndrom

Youngův syndrom (anglicky Young 's syndrome, azoospermia sinopulmonary infections, sinusitis-infertility syndrome, Barry-Perkins-Young syndrome) je onemocnění, které je obecně charakterizováno zahuštěním epididymálního sekretu (sekretu z nadvarlete) při normálních vývodných cestách s následnou obstrukční azoospermií. Tato choroba je typická svojí koincidencí s obtížemi dýchacího ústrojí. Youngův syndrom je tedy tvořen klasickou triádou chronické sinusitidy, bronchiektáziemi a obstrukční azoospermií. Vlastní příčinou je zde abnormální aktivita buněčných cilií se zahuštěním mukózní sekrece.

Léčba: léčba infekcí dýchacích cest (antibiotika resp. virostatika, mukolytika, antipyretika, expektorancia, inhalační terapie, bronchodilatancia), dechová fyzikální léčba, polohové drenáže, ev. chirurgické řešení obstrukční sterility.

# Kartagenerův syndrom

syndrom poruchy motility cilií – dědičnost AR, výskyt 1 : 10 000–16 000, typicky bronchiektázie, chronická sinusitida, často situs inversus viscerum, nepohyblivost spermií.

Jediná řasinka – bičík – se také nachází na každé mužské pohlavní buňce – spermii. Díky ní se spermie pohybuje a může se tak dostat k ženské pohlavní buňce – vajíčku, což je samotná podstata oplodnění.

Pokud je funkce bičíku nedostatečná, není spermie schopna normálního pohybu. To je podstatou neplodnosti u mužů s Kartagenerovým syndromem.

U žen se buňky pokryté řasinkami v pohlavních cestách také nacházejí, a to ve vejcovodech (tudý putuje vajíčko po uvolnění z vaječníku směrem k děloze), nicméně plodnost u žen je tímto narušena mnohem méně než u mužů, což dokazuje, že pro posun vajíčka nejsou řasinky ve vejcovodech až tak důležité.

Léčba mužské neplodnosti spočívá ve využití metod asistované reprodukce, a to konkrétně metody intracytoplasmatické injekce spermie do vajíčka (ICSI).

# Bardetův-Biedlův syndrom

– dědičnost AR, výskyt 1 : 160 000. Hlavními projevy jsou mentální retardace, obezita, polydaktylie, retinopatie, hypogenitalismus – malý genitál, nesestouplá testes, hypospadie, u ženského pohlaví amenorea. Pro mentální retardaci se v centrech asistované reprodukce s jedinci s tímto syndromem nesetkáme.

# Spinální a bulbární muskulární atrofie – Kennedyho syndrom

– dědičnost XR. Muskulární atrofie spojená se sexuální dysfunkcí a v 50 % s gynekomastií. Postihuje pouze muže.

Bulbospinální svalová atrofie (Kennedyho nemoc) je vzácné degenerativní pomalu progredující onemocnění postihující převážně spinální a bulbární periferní motoneuron. Genetickým podkladem je expanze CAG tripletů na prvním exonu androgenového receptorového genu X chromozomu. Obvyklá velikost repeatů CAG je 11–15, u BSMA je to 40–62. Gen je umístěn na X chromozomu v lokusu Xp12-21. Protein adrogenového receptoru je liganddependentní jaderný transkripční faktor a má význam pro růst dendritů a přežití buněk, jeho ligandem je testosteron. Degenerace proteinu adrogenového receptoru se zřejmě podílí na neurodegeneraci. Jde o onemocnění s gonozomálně recesivní dědičností, projevuje se u mužů. V rozvinutém stadiu onemocnění je charakteristický klinický obraz – svalové atrofie, slabost a fascikulace, zvláště v bulbární oblasti (jazyk, mimické svaly), na končetinách svalů proximálních. Dalšími příznaky jsou gynekomastie a tremor rukou a svalové bolesti. Onemocnění bývá diagnostikováno v 4.–5. dekádě, kdy je klinický obraz plně rozvinut, první známky onemocnění (gynekomastie, únavnost) se objevují již o 1–2 dekády dříve. Elektrofyzilogické vyšetření nachází obraz chronické neurogenní léze s obrovskými potenciály v jehlové EMG, dále pak četné fascikulace.

# Syndrom rezistence k androgenům

XR, výskyt 1 : 10 000 (celkem) – 60 000 (kompletní testikulární feminizace).

Syndromy rezistence na androgeny jsou poruchou lokalizovanou na některém místě genu pro androgenní receptor, jež se projevuje u osob s karyotypem 46,XY, které mají varlata založená oboustranně, mají regresi Müllerova vývodu a normální nebo zvýšenou sekreci testosteronu. V různém stupni je u nich porušen sexuální vývoj a objevují se známky hypogonadismu, nedostatečné virilizace a zpravidla neplodnost.

Klinický obraz je velmi pestrý, genotypičtí muži mohou mít klinický obraz v širokém rozmezí od fenotypických žen až k téměř normálním mužům, kteří jsou jen nedostatečně virilizováni nebo jsou infertilní. Rozmanitému klinickému obrazu odpovídá i velký počet dosud rozpoznaných genových mutací, kterých je dosud popsáno asi 600.




Figure 11.10 A woman with an XY chromosome pattern but insensitivity to androgens. Two undescended testes produce testosterone and other androgens, to which the body is insensitive. The testes and adrenal glands also produce estrogens that are responsible for the pubertal changes. (Source: Federman, 1967)

# Kongenitální adrenální hyperplazie (CAH)

– zahrnuje nejméně 5 enzymových defektů, dědičnost AR, výskyt 1 : 5000–20 000. V 95% deficit 21-hydroxylázy (adrenogenitální syndrom -vrozená porucha tvorby enzymu 21-hydroxylázy, důsledkem je porucha biosyntézy kortisolu - adrenálního steroidního hormonu v nadledvinách hyperplazie kůry nadledvinek; v důsledku poruchy syntézy hladiny adrenokortikotropního hormonu – ACTH ).

U žen je maskulinizace genitálu (již prenatálně), u mužského pohlaví pseudopubertas praecox, ale malá varlata, – silné ochlupení brady a hrudi, nádory varlat. Dobře léčení muži nemají obvykle fertilizační problémy.





Figure 21.2 External genitalia of a female infant, age 3 months. Note the enlargement of the clitoris from the abnormal androgen excess. The labia show the effects of the androgen excess.



# Syndrom polycystických ovarí (PCOS)

PCOS by měl být diagnostikován tehdy, jsou-li splněna dvě z následujících tří kritérií:

- 1) oligomenorhea a/nebo anovulace
- 2) klinické nebo biochemické známky hyperandrogenismu
- 3) sonografický nálezn polycystických ovaríí.
- 4) Převládá názor, že se jedná o polygenní přenos, řízeným alelami na autosomálním lokusu, vyloučen není ani přenos pomocí genů na chromosomu X



# Kallmannův syndrom

heterogenní skupina – dědičnost obvykle XR, ale i AD, výskyt 1 : 10 000 u mužů, 1 : 50 000 u žen –

- eunuchoidní habitus
- typicky anosmie - porucha funkce čichového smyslu, anosmie nebo hyposmie
- hypogonadismus - nedostatečný vývoj a porucha funkce pohlavních žláz
- deficit gonadotropinů
- u postiženého jedince tedy nenastupuje typická puberta
- retence varlat - porucha sestupu varlat u chlapců
- mikropenis
- abnormality pubického ochlupení (řídké či zcela chybí)
- u dívek není menstruace
- nevyvíjí se prsní tkáň
- často také hluchota, rozštěpové vady (např. obličeje), barvoslepost
- porucha vývoje ledvin
- u některých pacientů mentální retardace
- osteoporóza (pro nedostatek pohlavních hormonů)



# Kallmannův syndrom

Zodpovědný lokus byl nejprve lokalizován do oblasti krátkého raménka chromozomu X - přesněji: Xp22.3, gen: ADMLX, který se označuje jako KAL<sub>1</sub> (OMIM: 308700).

Z rodokmenových studií jasné, že Kallmannův syndrom je geneticky heterogenní chorobou, neboť řada případů vykazovala i jiný, než X-vázaný typ dědičnosti.

Jedním z alternativních genů, je například gen FGFR<sub>1</sub> (nazývaný též KAL<sub>2</sub>) lokalizovaný na úseku 8p11.2-p11.1 (OMIM: 147950). Jelikož jde o gen z nepohlavního chromozomu (chromozomu 8), postihuje tato forma nejen chlapce, ale i dívky. Klinický obraz jedinců s mutací v KAL<sub>2</sub> genu je obdobný jako v případě mutace KAL<sub>1</sub> genu, nicméně závažnost klinických příznaků je u osob s mutací v KAL<sub>1</sub> genu větší. Pro doplnění je třeba uvést, že genů, které způsobují klinický obraz Kallmannova syndromu, již bylo lokalizováno mnohem více - například KAL<sub>3</sub>, KAL<sub>4</sub>, KAL<sub>5</sub> a KAL<sub>6</sub> (OMIM: 147950).

U jednoho pacienta s Kallmannovým syndromem byla nalezena chromozomální přestavba mezi chromozomy 10 a 12. Translokace mezi určitými chromozomy bývají často balancované (bez ztráty genetické informace) a nemají pro své nositele žádné negativní následky. Ovšem v tomto případě byla nalezena v oblasti přestavby narušení genu WDR11. Produkt genu WDR11 interaguje s transkripčním faktorem EMX<sub>1</sub>, který je důležitou součástí vývojových procesů, které dávají za vznik jak neuronům čichové dráhy, tak i neuronům hypotalamo-hypofyzárního komplexu (hypotalamo hypofyzární komplex pomocí speciálních hormonů reguluje funkci pohlavních žláz). V konečném důsledku tedy narušení funkce genu WDR11 vede k příznakům Kallmannova syndromu - tedy k hypogonadizmu a anosmii. V tomto případě to byla chromozomální přestavba, která přivedla vědce na stopu dalšího genu.

# Praderův-Williho syndrom

– v 70 % mikrolece chromosomu 15 paternálního původu či mikroduplikace, unipaternální maternální disomie chromosomu 15, výskyt 1 : 10 000–20 000. Je malý vzrůst, obezita, psychomotorická retardace, hypogonadismus, u mužského pohlaví mikropenis, často kryptorchismus, u ženského pohlaví chybění malých a nedostatečný vývin velkých stydkých pysků. Pro mentální retardaci se s ním v centru asistované reprodukce neseťkáme.



# Chromosomální aberace a neplodnost

K neplodnosti nebo snížené plodnosti vedou často chromosomální aberace autosomů nebo gonosomů (heterochromosomů). Mohou být numerické nebo strukturální.

Numerické aberace autosomů jsou například Downův syndrom, Patauův syndrom, Edwardsův syndrom. V centrech asistované reprodukce se s nimi neseznamujeme.

Balancované reciproké translokace a Robertsonské translokace mohou být spojeny s poruchami fertility. K Robertsonským translokacím dochází mezi akrocentrickými chromosomy 13, 14, 15, 21 a 22. Nejčastěji jde o centrickou translokaci 13. a 14. chromosomu nebo 14. a 21. chromosomu. Nositelé Robertsonských nebo reciprokových translokací mají riziko, že jejich gamety ponesou nebalancovanou chromosomální translokaci, která může způsobovat spontánní aborty či plody s mnohočetnými vývojovými vadami a mentální retardací. Nositelé vzácné translokace der(21;21) – nemohou mít zdravého potomka – doporučuje se dárcovství gamet.

Další vrozené chromosomální aberace mohou být tzv. marker chromosomy, ring chromosomy a další aberace.

# Turnerův syndrom


– výskyt asi 1 : 2500. Nejčastěji jde o klasický karyotyp 45, X. Může jít i o jiné chromosomální abnormality, např. inverzi X chromosomu, delecii raménka X chromosomu. Tyto ženy jsou malého vzrůstu, mají primární amenoreu a další známky typické pro tento syndrom (pterygium colli, ve 40 % vrozené vady ledvin, v 15 % vrozené srdeční vady).

## Mozaika 45, X/46, XY

- způsobuje smíšenou gonadální dysgenezi. Genotyp může být jak mužský, tak ženský. Většinou se u těchto jedinců vyskytuje sterilita
- Cave: gonadoblastom

## Syndrom 47, XXX


- výskyt asi 1 : 1000–1500 žen. Ženy jsou obvykle vyššího vzrůstu. Menarche může nastupovat později, často je oligomenorea. Může být i sterilita, ale některé ženy s tímto syndromem mají normální plodnost.



# Klinefelterův syndrom

XXY aneuploidie je nejčastější poruchou pohlavních chromozómů s prevalencí 1:500 mužů obecné populace. V literatuře je uváděn rozptyl incidence KS 1 – 2 % narozených chlapců.

V kojeneckém věku lze aneuploidií gonozomů odhalit cytogenetickým vyšetřením chlapců s hypospadií, mikropeniselem nebo kryptorchismem. V batolecím období, je někdy u chlapců pozorováno vývojové zpoždění, a to zejména v expresi jazykových dovedností. U dětí mladšího školního věku lze na KS myslet při řečových, behaviorálních a sociálních problémech dítěte. U starších dětí a adolescentů vedou k diagnostice této gonozomální aneuploidie různé endokrinní poruchy, opožděný pubertální vývoj, eunuchoidní habitus, gynekomastie, nebo malá varlata. U dospělých se diagnóza stanovuje nejčastěji v rámci vyšetřování neplodnosti nebo nálezu maligního nádoru prsu.



# AZF – azoospermia faktor

Důležitou roli v mužské infertilitě hraje Y chromosom. Y chromosom obsahuje geny, které zodpovídají za vývoj jedince mužským směrem, za vývoj mužských gonád a za spermiogenezi. Na krátkém raménku Y chromosomu (Yp11.3) se nachází testis determinující faktor – SRY, který zodpovídá za diferenciaci gonád. Na dlouhém raménku Y chromosomu je mnoho genů a genových rodin, které zodpovídají za spermatogenezi (Yq11.23), tzv. azoospermia faktor – AZF. Na chromozomu Y mohou být velké delece, které obsahují oblast AZF region, vedoucí k azoospermii. Důležité jsou mikrodelece Yq (oblast AZF) chromosomu, detekovatelné pouze na molekulárně genetické úrovni. Oblast AZF se dělí na úseky AZFa, AZFb, AZFc. Delece oblasti AZFa a kompletní delece oblasti AZFb způsobují azoospermii a mají špatnou prognózu, pokud jde o nalezení spermií, a to i operačními metodami. Parciální delece AZFc mají variabilní fenotyp, obvykle těžkou oligozoospermii. Mikrodelece AZF oblasti vznikají obvykle de novo. Prostřednictvím metod asistované reprodukce se tyto mikrodelece mohou přenášet na potomky mužského pohlaví a způsobovat i jim poruchy spermatogeneze.




# AZF – azoospermia faktor

Od roku 2014 EAA a EMQN doporučují rozšířenou analýzu poskytující charakterizaci a dimenzování zjištěných mikrolecí AZF regionu pomocí samostatného definovaného souboru markerů. Další charakterizace / dimenzování mikrolecí regionu AZF je užitečná pro zjištění pravděpodobnosti získání funkčních spermií u pacientů s parciálními mikrolecemi v porovnání s pacienty vykazující kompletní delecí jednoho nebo více z AZF oblastí. Například, gr / gr mikrolece, což je AZFc subdelece, je obvykle spojena s mírnějším fenotypem než u jedinců s klasickou plnou AZFc (b2/b4) mikrolecí.

# AZF – azoospermia faktor

## Original definition of the 3 AZF loci in Yq11

(Vogt et al. 1996 in Human Molecular Genetics vol5, 933-943)



# Cystická fibróza

*CFTR gen, 7 chromosom (250kb), 2017 mutací*


*Muži: **CBAVD-Congenital bilateral absence of the vas deferens***

*Porucha vývoje chámovodů, nadvarlete a semenných váčků*

*95% mužů s CBAVD jsou neplodní. Zvýšená viskozita v pohlavních cestách muže zapříčiňuje obstrukční azoospermii. Obstrukční azoospermie může být zcela izolovaným příznakem*

*Nejčastější mutace asociované s CBAVD: 5T varianta v intronu 8, R117H*

*Ženy: snížení plodnosti pro větší viskozitu cervikálního hlenu, častá primární, nebo sekundární amenorhea v důsledku poruch výživy a plicních změn.*



# Metody asistované reprodukce




# IUI – intrauterinní inseminace

znamená zavedení spermií tenkým plastovým katétrem přes hrdlo děložní do dutiny děložní.


Provádí se v případě, že spermiogram vykazuje patologické hodnoty (v ejakulátu je malé množství spermií, spermie mají sníženou pohyblivost), nebo v případě negativního poskoitálního testu (vyšší neprostupnosti hlenu děložního hrdla). Podmínkou je alespoň jeden prostupný vejcovod.

Pokud dochází u ženy k ovulaci, lze inseminaci provést v naturálním cyklu, to je bez hormonální stimulace, při poruchách ovulace užíváte před IUI stimulační léky, nejčastěji klomifencitrát (Clostilbegyt, Clomhexal, Serophene,...)



# Odběr vajíček (oocytů)


- hormonální stimulace vyvolá ve vaječnících tvorbu a zrání vajíček (v tzv. folikulech)
- V příslušnou dobu, která se stanoví pomocí jednoho či více hormonálních a ultrazvukových vyšetření, se z vaječníků odsaje obsah folikulů, v němž se pak v laboratoři vyhledávají oocyty.
- Odběr folikulární tekutiny probíhá v krátkodobé narkóze pomocí ultrazvukové sondy transvaginálně.



# Odběr spermií


## PESA - Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration

©1999 Cornell Med. Ctr. Dept. of Urology.  
All Rights Reserved.



# Odběr spermií


MESA – microsurgical epididymal sperm aspiration






# Odběr spermií

## TFNA - Testicular Fine Needle Aspiration





# Odběr spermií

## PercBiopsy - Percutaneous biopsy of the testis




# Odběr spermii

## TESE - Testicular sperm extraction




# Odběr spermií Microsurgical testis biopsy




## Microsurgical Testis Biopsy



Sertoli Cell-only



Normal tubules with hypospermatogenesis



# IVF – in vitro fertilizace


## Postup:

Hormonální léčba stimulující dozrání několika vajíček

- – podání antagonisty gonadotropiny uvolňujícího hormonu (GnRH) potlačí aktivitu všech ostatních hormonů
- – poté jsou podány gonadotropiny, které stimulují růst folikulů a vyvolají ovulaci

## Sledování průběhu léčby:

- měření růstu folikulů (transvaginálním UZ)
- Individuální dávkování léků (prevence nežádoucích účinků- hyperstimulační syndrom)



# IVF

## Odběr oocytů a spermií prováděný tentýž den

– odběr oocytů obvykle v krátkodobé narkóze, trvá asi 10 až 20 minut, pod kontrolou transvaginálního UZ (32 – 36 hodin po poslední hormon. injekci)


## Oplození (fertilizace)

- příprava vajíček, spermií a společná kultivace do druhého dne
- prohlédnutí oplozených vajíček pod mikroskopem

## Embryotransfer (ET) – obvykle 2-3 dny po oplození (v případě PGD transfer 5-6den)

- transvaginální transfer 1- 2 embryí
- umístění embryí do dělohy
- zbylá embrya jsou zamražena - **kryokonzervace**

Těhotenský test, sledování průběhu těhotenství, možnost AMC



# Další metody asistované reprodukce

## ***Mikromanipulace – intracytoplazmatická injekce spermií (ICSI)***


Technika, při které je pomocí speciálního přístroje (mikromanipulátoru) vpravena jediná spermie přímo do cytoplazmy vajíčka. Užívá se v případě nedostatečných parametrů spermiogramu partnera (nízká koncentrace a pohyblivost spermií), při získání spermií chirurgickým odběrem z varlete, při opakovaném selhání oplození v předchozích cyklech, u imunologického faktoru a v některých dalších indikovaných případech.

## ***Prodloužená kultivace embrya***

Ve speciálním médiu je možné kultivovat některá embrya do nejvyššího stádia vývoje, kterého lze v laboratoři dosáhnout (do tzv. blastocysty). Kultivace do tohoto stádia trvá přibližně 5 – 6 dní. Prodloužená kultivace umožňuje delší sledování vývoje embryí a vybrat nej kvalitnější embrya pro transfer. Sníží se tak pravděpodobnost zavedení embryí s omezenou schopností buněčného dělení. Embrya jsou transferována do lépe připravené děložní sliznice a mají vyšší šanci na uchycení.

## ***Asistovaný hatching (AH)***

Princip metody spočívá v šetrném otevření obalu embrya (zona pellucida) laserem. Cílem je zvýšit úspěšnost uchycení (implantaci) embryí v děloze. Indikací k AH je věk pacientky nad 35 let, opakované nedosažení těhotenství po transferu kvalitních embryí nebo také zvýšená hladina FSH u pacientky. AH může pacientce doporučit embryolog v případě zjištění opticky silnějšího obalu embrya.



# Děkuji za pozornost

[rbeharka@fnbrno.cz](mailto:rbeharka@fnbrno.cz)