



Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin

Mechorosty

Petr Bureš



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Mechorosty

hlevíky

játrovky

mechy



Hornworts



Liverworts




Mosses

3 oddělení

játrovky (*Marchantiophyta*)
hlevíky (*Anthocerophyta*)
mechy (*Bryophyta*)

Tři samostatné větve v sesterské pozici ke zbytku vyšších rostlin




470 miliónů let

Cantino & al. • Phylogenetic nomenclature of Tracheophyta

TAXON 56 (3) • August 2007: 822–846

Druhová diverzita mechorostů – v kontextu ostatních linií vyšších rostlin = 16 240 druhů (~ 5,5 %)

Podíl mechorostů na druhové diverzitě vyšších rostlin




Počty popsaných druhů

mechorosty	16 240
plavuně	1 260
monilofyty	11 000
nahosemenné	1 020
krytosemenné	268 600

Druhová diverzita mechorostů – v kontextu ostatních linií vyšších rostlin = 16 240 druhů (~ 5,5 %)

Podíl mechorostů na druhové diverzitě vyšších rostlin




Počty popsaných druhů

mechorosty	16 240
plavuně	1 260
monilofyty	11 000
nahosemenné	1 020
krytosemenné	268 600

Druhová diverzita mechorostů – v kontextu ostatních linií vyšších rostlin = 16 240 druhů (~ 5,5 %)

Podíl mechorostů na druhové diverzitě vyšších rostlin




Počty popsaných druhů

mechorosty	16 240
plavuně	1 260
monilofyty	11 000
nahosemenné	1 020
krytosemenné	268 600

Druhová diverzita mechorostů – v kontextu ostatních linií vyšších rostlin = 16 240 druhů (~ 5,5 %)

Podíl mechorostů na druhové diverzitě vyšších rostlin




Počty popsaných druhů

mechorosty	16 240
plavuně	1 260
monilofyty	11 000
nahosemenné	1 020
krytosemenné	268 600

Druhová diverzita mechorostů – v kontextu ostatních linií vyšších rostlin = 16 240 druhů (~ 5,5 %)

Podíl mechorostů na druhové diverzitě vyšších rostlin




Počty popsaných druhů

mechorosty	16 240
plavuně	1 260
monilofyty	11 000
nahosemenné	1 020
krytosemenné	268 600



Rodozměna heteromorfická - gametofyt převládá



Gametofyt: zelený, existenčně samostatný, žije dlouhou dobu, diferencuje se z jediné terminální buňky, ne z meristému

Gametofyt mechorostů

několik mm až několik cm

max. ~50 cm – ploník; až 1 m JV-asijská *Dawsonia superba*



Lepidozia sp.



Buxbaumia aphylla



Gametofyt mechorostů

bez nebo s jednoduchými vodivými pletivy




Anatomickou jednoduchost kompenzují pospolitým růstem, při němž se vzájemně podpírají a brání se vysychání

Sporofyt mechorostů





nevětvený s 1 sporangiem,

nezelený, výživou na gametofytu závislý – hotové fotosyntetické metabolity dostává transportním pletivem = placentou



© J. P. Braselton

Archegonia (zárodečníky) - vznikají z 1 iniciální pokožkové buňky periklinálním dělením




- lahvovitého tvaru
- s 1 oosférou,
- jednovrstevný obal
- s buňkami
 - kanálkovými
 - krčkovými
 - břišními

Obal gametangií je terestrializací podmíněnou adaptací – mechorosty ji sdílejí s ostatními vyššími rostlinami, které mají archegonia stejné stavby

„Lákání“ spermatozoidů



- ústí krčku archegonia se hygroskopicky otevře (jako průduch)
- voda vnikne do krčku a způsobí prasknutí kanálkových buněk
- uvolní se pektinový sliz s enzymy
- enzymy slizu chemotakticky přitahují



spermatozoidy do krčku

Antheridia (pelatky) – **kulovitá** nebo **elipsoidní**,

- **stopkatá** nebo **ponořená**
- tvoří mnoho **spermatozoidů**



Za deště či rosy buňky obalu antheridia zeslizovatí – spermatozoidy vyplaveny ven

Spermatozoidy - stavba


2 bičíky – nasedají na hlavičce (apikálně)

spirální tvar: 1–1,5 otočky, 10–100 µm dlouhé – jako u parožnaték


většina těla = jádro

„páteřní“ výztuha = podélný svazek mikrotubulů


<https://www.youtube.com/watch?v=ExhZAZYBa0>




parožnatky



hlevíky



játrovky



mechy

Pohyb spermatozoidů – bičíky a rotací těla v tenkém vodním filmu vytvořeném deštěm nebo kondenzací vody na povrchu mechorostů



*Bazzania
trilobata*

Pohyb spermatozoidů – bičíky a rotací těla v tenkém vodním filmu vytvořeném deštěm nebo kondenzací vody na povrchu mechorostů



*Bazzania
trilobata*

Mobilita omezená (několik cm)

Entomogamie mechů ? --- experimentálně potvrzeno, že

- víc sporofytů tvoří mechy vystavené chvostoskokům (Collembola)
- archegonia *Ceratodon purpureus* (rohozub nachový) a *Bryum argenteum* (prutník stříbřitý) specificky přitahují chvostokoky = aktivní přenos spermatozoidů k archegoniím

Půdní chvostoskok *Folsomia candida* na mechu rohozubu nachovém *Ceratodon purpureus*



Modelové
druhy půdních
chvostoskoků
Sinella curviseta a
Folsomia candida
použité v
experimentu
portlanských vědců

Cronberg N, Natcheva R & Hedlund K. 2006. Microarthropods mediate sperm transfer in mosses. *Science* 313: 1255-1255.

Pohlavní dimorfismus játrovek, mechů a hlevíků

Přibližně 70 % játrovek, 60 % mechů a 40 % hlevíků je dvoudomých

Sexuální dimorfismus vers. typy rozmnožování:

Jednodomé druhy – tvoří sporofyty častěji (vyšší pravděpodobnost oplození) než dvoudomé druhy.

Dvoudomé druhy – tvoří častěji nepohlavní gemy než jednodomé.

Sexuální vers. morfologický dimorfismus „Female advantage“ u mechrostů:

Dvoudomé druhy – často mají samčí rostlinky menších rozměrů, populace samičích rostlin početnější než populace samčích.

Jednodomé druhy – větévky s archegonii rostou rychleji a jsou větší než ty s antheridii.

U mechů i játrovek – opakovaně zjištěny příbuzné dvojice druhů: monoploidní dvoudomý druh + diploidní jednodomý druh (čili dvoudomost vývojově původní znak, jednodomost naopak odvozený)

V životním cyklu mechorosty odkázány na vodu: vyhledávají proto vlhké prostředí



Mechorosty rostou na vlhké obnažené půdě



... v přízemním (mechovém) patru luční vegetace





... na
rašeliništích



... v lesích, na pařezech a kmenech stromů.





... na vlhkých skalách



... na
prameništích a
podél potoků



na povrchu listů



játrovka *Radula compacta* rostoucí na listu kapradiny rodu *Blechnum*
(Blue Mountains)

Splachnum



*Ricciocarpus
natans*



Mechorosty – obecné znaky

na hladině stojatých vod

pod hladinou stojatých vod – játrovka trhutka
plovoucí *Riccia fluitans*



dokonce i v proudící vodě




mech pramenička *Fontinalis antipyretica*

Vazbou na chlad a vlhko
vymezují mechorosty
geograficky a výškově vegetaci
v jejíž skladbě dominují



boreální pásmo –
tajga

Vazbou na chlad a vlhko
vymezují mechorosty
geograficky a výškově vegetaci
v jejíž skladbě dominují



arktická
klimatická zóna

tundra


Vazbou na chlad a vlhko
vymezují mechrosty
geograficky a výškově vegetaci
v jejíž skladbě dominují



Vegetace alpínského stupně

ve vysokohořích
nad horní hranicí
lesa připomínající
tundru

Aongstroemia julacea – v Himálaji až do 6500 m n.m.



Poikilohydrie



Poikilohydrie (nedotažená terestrializace ?)

Vazba mechorostů na vlhké prostředí je podmíněná neschopností regulovat vnitřní obsah vody pomocí průduchů / absencí kořenů

Obsah vody v gametofytech je tak víceméně řízen stavem prostředí

K vyschnutí i k obnovení metabolických funkcí po provlhčení dochází v řádu hodin



Poikilohydrie (nedotažená terestrializace ?)

Vazba mechorostů na vlhké prostředí je podmíněná neschopností regulovat vnitřní obsah vody pomocí průduchů / absencí kořenů

Obsah vody v gametofytech je tak víceméně řízen stavem prostředí

K vyschnutí i k obnovení metabolických funkcí po provlhčení dochází v řádu hodin



Ostatní vyšší rostliny, pokud je u nich vyschnutí slučitelné se životem, vyžadují desítky hodin


Poikilohydrie (nedotažená terestrializace ?)

Vazba mechiorostů na vlhké prostředí je podmíněná neschopností regulovat vnitřní obsah vody pomocí průduchů / absencí kořenů

Obsah vody v gametofytech je tak víceméně řízen stavem prostředí

K vyschnutí i k obnovení metabolických funkcí po provlhčení dochází v řádu hodin

Lze oživit dokonce i vysušené mechy 20 let uložené v herbáři !



Journal of Bryology

Desiccated *Syntrichia ruralis* shoots regenerate after 20 years in the herbarium

Lloyd R. Stark¹, Joshua L. Greenwood¹, John C. Brinda²

¹School of Life Sciences, University of Nevada, Las Vegas, NV, USA, ²Missouri Botanical Garden, St. Louis, MO, USA



Traduje se, že mechorosty skoro nic nežere – není to pravda



játrovky žerou
brouci rodu
Byrrhus
(vyklenutec)



roztoči rodu
Eustigmaeus
sají obsah z
buněk játrovek



různé mechy
žere ploštice
Acalypta nigrina

mechy žerou larvy některých tiplic
(*Tipula oropezoides*, *T. williamsoniana* –
na snímku klade samička vajíčka do
mechu)



tobolky mechů
zobou kuřata
bělokura
sněžného
Lagopus lagopus



vodní mechy
žerou larvy
chrostíků rodu
Zelandopsyche




Evoluční neúspěch mechorostů? (v souboji s cévnatými rostlinami)

S rostoucí zeměpisnou šířkou se poměr druhové diverzity cévnatých rostlin ku druhové diverzitě mechorostů začíná obracet.

Přestože mechorosty makroevoluční boj s cévnatými rostlinami na mnoha stanovištích „prohrávají“, existují oblasti, kde je tomu právě naopak – např. Antarktida

Mechy dokážou přežít podmínky extrémních mrazů i extrémních světelných podmínek.

K povrchu přitisklá strategie poikilohydriků zde vítězí a cévnaté rostliny nejenže mechy nevytlačily, ale nakonec jím samy i jinde vytvořily řadu mikrostanovišť, které mechorosty ochotně kolonizovaly a úspěšně ovládly




Oddělení *Marchantiophyta* (játrovky)





Nemají regulovatelné průduchy na sporofytu jako mechy a hlevíky


Na gametofytu však mohou mít trvale otevřené otvory



Gametofyt foliózní nebo frondózní



Bazzania



Conocephalum
Marchantia



Fáze protonematu redukovaná na několik buněk




Fig. 1.8 A-G. Stages in the germination of spore in *Marchantia* sp. A. First division of the spore. B. Germ-rhizoid formation. C-F. Early stages of thallus development. G. A row of marginal cells makes its appearance towards the apex.
(A-E, After Inoue, 1960; F, G. After O'Hanlon, 1926).


Olejová tělíska

– unikátní organely – obsahují éterické terpenoidní oleje
 (na povrchu ohraničené lipoproteinovou membránou jako skutečné organely)

- vznikla z endoplazmatického retikula
- obrana proti herbivorům
- antimikrobiální účinky
- využití ve farmakologii




Lunulariová kyselina
 – růstový regulátor (inhibitor) jatrovek




Rhizoidy

- hyalinní, jednobuněčné
- na středním žebřu laloků u frondózních,
- na lodyžce poblíž lístků u foliózních
- mohou mít mykorrhizu



Metzgeria




Terminální buňka gametofytu

u frondózních
dvouboká



buňky odděluje do

do dvou směrů




u foliózních
trojboká (tetraedrická),

do tří směrů



Tobolka

kulovitá nebo elipsoidní, zpravidla tmavě pigmentovaná



bez columelly (vnitřního sloupku),



otvírá se obvykle čtyřmi chlopněmi či nepravidelným rozrušením stěn.



Celý sporofyt se vydívá v ochranném obalu archegonia (chráněný proti vyschnutí).

Když spory dozrají - archegoniální obal praskne - buňky štětu se prudce prodlouží, aniž by se dělily. Po jednom až dvou dnech usychá.

Oproti mechům i hlevíkům žije sporofyt sporofyt játrovek mnohem kratší dobu a je na gametofytu nejvíce závislý, nemá žádnou kutikulární ochranu ani vodivé systémy nebo průduchy.

V tobolkách kromě spor také **elatery** (mrštníky) = sterilní buňky se spirálovitě ztlustlou stěnou, jsou schopné prudkých rotačních hygroskopických pohybů vymršťujících spory ze sporangia.



Plagiochila ovalifolia

Na rozdíl od mechů, které podle počasí uvolňují pomocí peristomu spory z tobolek několik dní, vypráší tak játrovky celý obsah tobolek během několika minut.

Pellia epiphylla elatery po vyprášení výtrusnice





Figure 5.8 *Marchantia polymorpha*. Longitudinal section of sporophyte rupturing the calyptra. Note the parallel alignment of the elaters. (After Parihar. 1967. *Bryophyta*. Central Book Depot, Allahabad.)

Vnitřní klasifikace a zástupci játrovek.


ca 350 rodů / 5 000 druhů




1. tř. *Haplomitriopsida*

– malá skupina (3 / 18),
sesterská ostatním jatrovkám,
hlavně JV Asie,
v Evropě jen *Haplomitrium hookeri*
v ČR v Krkonoše a Hrubý Jeseník


Spermatozoidy s velkým bazálním těliskem a tlustým jádrem





hlevíky





játrovky



mechy





Endomykorrhiza nikoli s glomeromykoty
jako ostatní játrovky, ale s mukoromykoty




Stélka foliozní (*Haplomitrium*) nebo frondozní (*Treubia*)

protáhlá tobolka



epidermální buňky produkují sliz



Haplomitrium



horizontální oddenky bez rhizoidů






vícevrstevné obaly archegonií

gametangia roztroušeně po lodyžce



fyloidy
uspořádány
spirálovitě, jako
u mechů



vodivé buňky – hydroidy - jak v oddenku
tak v lodyžce - perforovaně napojené;
otvory odvozené od plazmodezmat

2. tř. *Marchantiopsida* – gametofytní stélka frondózní s komplexní stavbou



Marchantia polymorpha – porostnice mnohotvárná – roste na obnažené půdě v lesích i na loukách, často i ve venkovních květináčích a ve sklenících.

Nápadná zejména v plodném stavu s receptakuly.



Z didaktického hlediska vděčný objekt – snadno dostupná – nabízí k demonstraci řadu znaků játrovek


Frondózní stélka komplexní = diferencovaná na **kompartenty**
(vzduchové dutiny - jeví se na stélce jako políčka) kryté epidermis. Uprostřed „políček“ **dýchací otvor**




Svrchní epidermis gametofytu kryta tenkou **kutikulou**

Hydrofobní kutikula, „ostré“ okraje a malý průměr otvorů brání průniku kapalné vody do stélky


Otvory ale umožňují transpiraci i příjem CO₂



V komůrkách pod otvory – fotosyntetizující filamenta – **pseudomezofyl** tvořený buňkami s množstvím chloroplastů – obdoba chlorenchymu listů jiných rostlin




Pod vrstvou fotosyntetizujících filament – je
vícevrstevný parenchym se zásobním
škroblem



Pod vrstvou fotosyntetizujících filament – je **vícevrstevný parenchym** se zásobním škroblem



Některé buňky parenchymu obsahují **jednotlivá olejová tělíska**



Pod vrstvou fotosyntetizujících filament – je **vícevrstevný parenchym** se zásobním škroblem



Některé buňky parenchymu obsahují **jednotlivá olejová tělíska**

Na spodní epidermis kromě jednobuněčných rhizoidů i příčné bezbarvé **mnohobuněčné šupiny**





Rhizoidy dvojího typu:

1. hladkostěnné – kolmo ke stélce ve svazečcích – fixace k substrátu





Rhizoidy dvojího typu:


1. hladkostěnné – kolmo ke stélce ve svazečcích – fixace k substrátu




2. tuberkulátní – šikmo až rovnoběžně se stélkou
– vyrůstají ze centrálních buněk obklopených „růžicí“ buněk
sousedních – příjem roztoků –



Antheridia ponořena na svrchní straně laločnatě miskovitých antheridioforů – zadržujících kapku vody do níž se uvolní spermatozoidy a skápnou s ní na zem



Antheridia ponořena na svrchní straně laločnatě miskovitých antheridioforů – zadržujících kapku vody do níž se uvolní spermatozoidy a skápnou s ní na zem



V jednom antheridiu vzniká přes 200 000 spermatozoidů !

Antheridia plavuní a kapradin tvoří desítky až stovky spermatozoidů


JSE Journal of Systematics
and Evolution

Research Article

Do motile spermatozoids limit the effectiveness of sexual reproduction in bryophytes? Not in the liverwort *Marchantia polymorpha*



Silvia Pressel and Jeffrey G. Duckett*

Antheridia ponořena na svrchní straně laločnatě miskovitých antheridioforů – zadržujících kapku vody do níž se uvolní spermatozoidy a skápnou s ní na zem



Buňky otvorů antheridií mají hydrofilní povrch.

Tím se liší od dýchacích otvorů, jejichž buňky nají povrch hydrofobní.



V jednom antheridiu vzniká přes 200 000 spermatozoidů !

Antheridia plavuní a kapradin tvoří desítky až stovky spermatozoidů




JSE Journal of Systematics
and Evolution

Research Article

Do motile spermatozoids limit the effectiveness of sexual reproduction in bryophytes? Not in the liverwort *Marchantia polymorpha*


Silvia Pressel and Jeffrey G. Duckett*

Antheridia ponořena na svrchní straně laločnatě miskovitých antheridioforů – zadržujících kapku vody do níž se uvolní spermatozoidy a skápnou s ní na zem



Buňky otvoru antheridií mají hydrofilní povrch.


Tím se liší od dýchacích otvorů, jejichž buňky nají povrch hydrofobní.



V jednom antheridiu vzniká přes 200 000 spermatozoidů !



Antheridia plavají a kapradin tvoří desítky až stovky spermatozoidů

Antheridia ponořena na svrchní straně laločnatě miskovitých antheridioforů – zadržujících kapku vody do níž se uvolní spermatozoidy a skápnou s ní na zem



Marchantia však podobně jako ostatní příbuzné rody dokáže natlakováný obsah antheridia prudkým otevřením otvoru „vystříknout“ sprejovitým způsobem do vzdálenosti 2-15 cm!

Aerosol se spermatozoidy pak může být „uchopen“ větrem a nesen i na více než 50 cm.



JSE Journal of Systematics
and Evolution


Research Article

Do motile spermatozoids limit the effectiveness of sexual reproduction in bryophytes? Not in the liverwort *Marchantia polymorpha*

Silvia Pressel and Jeffrey G. Duckett



doi: 10.1111/jse.12528

Antheridia ponořena na svrchní straně laločnatě miskovitých antheridioforů – zadržujících kapku vody do níž se uvolní spermatozoidy a skápnou s ní na zem



Marchantia však podobně jako ostatní příbuzné rody dokáže natlakováný obsah antheridia prudkým otevřením otvoru „vystříknout“ sprejovitým způsobem do vzdálenosti 2-15 cm!

Aerosol se spermatozoidy pak může být „uchopen“ větrem a nesen i na více než 50 cm.





O pohyb spermatozoidů mají zásluhu také svazky rhizoidů, které vodne propojují okraj „misky“ se žlábkem ze stopce antheridioforu.

JSE Journal of Systematics
and Evolution
Research Article

doi: 10.1111/jse.12528
Do motile spermatozoids limit the effectiveness of sexual reproduction in bryophytes? Not in the liverwort *Marchantia polymorpha*

Silvia Pressel and Jeffrey G. Duckett

Antheridia ponořena na svrchní straně laločnatě miskovitých antheridioforů – zadržujících kapku vody do níž se uvolní spermatozoidy a skápnou s ní na zem





O pohyb spermatozoidů mají zásluhu také svazky rhizoidů, které vodně propojují okraj „misky“ se žlábkem ze stopce antheridioforu.

JSE
Journal of Systematics
and Evolution
Research Article




doi: 10.1111/jse.12528
Do motile spermatozoids limit the effectiveness of sexual reproduction in bryophytes? Not in the liverwort *Marchantia polymorpha*
Silvia Pressel and Jeffrey G. Duckett*

archegonia přisedlá na spodní straně „děštníkovitých“ receptakulí



archegoniofor „zadržuje“ vodu, kterou se pravděpodobně plní podélné žlábky ve stopce = trasy pro pohyb spermatozoidů


podélný žlábek
? sycený vodou
sloužící k pohybu
spermatozoidů k
archegoniím




příčný řez stopkou archegonioforu

Do žlábků vrůstají i svazky rhizoidů vyrůstajících z místa, kde je stopka vethnuta do „střechy deštníku“. Ty mohou spermatozoidům při vzestupném pohybu sloužit jako opora při vzestupném pohybu?


Marchantia polymorpha – „děštník“ archegonioforů zadržuje kapku vody



stopka
archegonioforu s
dýchacími otvory a
vzduchovými
dutinami



Marchantia polymorpha je dvoudomá (= vytváří samčí a samičí rostliny) a má také pohlavní chromosomy:



samičí gametofyt má
jeden X chromosom

samčí gametofyt jeden
Y chromosom

Y-chromosom
Marchantia polymorpha

Okada S et al. PNAS 2001;98:9454-9459

©2001 by National Academy of Sciences

PNAS

Sporofyt – drobný, štět krátký, dělení buněk sporofytu uvnitř obalu archegonia. Jak dozrají spory, buňky štětu se zvětší. Na bázi transportní pletivo placenty, ale bez meristému (játrovky ho nemají nikdy)





Figure 5.1 The development of the embryo and sporophyte of the liverwort *Marchantia polymorpha* L. (A) Two-celled embryo inside the archegonium. (B) Young spherical embryo lacking obvious cellular differentiation. (C) Expanded spherical embryo exhibiting tripartite organization. (D) Nearly mature sporophyte with well-defined foot, seta and capsule. Redrawn from Smith (1955) with permission from McGraw-Hill Companies.



K vegetativnímu rozmnožování u *Marchantia polymorpha* slouží pohárky s diskovitými rozmnožovacími tělíska (gemmae)



Políčkovitou skulpturu komplexní stélky má i ***Conocephalum conicum*** – mřížovec kuželovitý, jehož archegoniofory vypadají jako drobné zelené houbičky






Tobolky vyčuhující na spodu kuželovitých archegonioforů

Přisedlé antheridiofory



„Regulovatelné průduchy“ u *Preissia quadrata* – při ztrátě vody dokáže dýchací otvory pomocí buněk v bazální části téměř zcela uzavřít


archegoniofory



funguje jako segmentální uzávěr


Někteří zástupci tř. *Marchantiopsida* se druhotně přizpůsobili životu ve vodě

Riccia fluitans (trhutka plovoucí) pěstuje se také v akváriích




Vývoj sporofytu probíhá uvnitř sporofytu
Jedna z mála játrovek, která nemá elatery

Důlkovitý povrch
spór brání potopení
a usnadňuje jejich
šíření vodou




Riccia fluitans

Aerenchymatické vzdušné dutiny



Ricciocarpus natans – patří také k čel. Ricciaceae – plove podobně jako okřehky na hladině stojatých vod



Důlkovitý povrch spór
brání potopení a
usnadňuje jejich šíření
vodou



Ricciocarpus natans – gametangia u terestrické formy zanořená ve stélce, stejně jako sporofyt



zanořená antheridia



zanořené archegonium
s mladým sporofylem



Tobolka – vyvíjí se v obalu archegonia zanořeného v gametofytu

- nemá elatery
- taky štět redukovaný

3. Třída *Jungermanniopsida* se dvěma řády *Metzgeriales* a *Jungermanniales*



Metzgeriales - gametofytní stélka frondózní jednovrstevná, seta vyvinutá,
terminálně dvouboká



Metzgeria conjugata



U nás např. kroknice vidličnatá (***Metzgeria furcata***) rostoucí na kůře stromů s pentlicovitou vidličnatě větvenou stélkou.



Metzgeriales

Stélku tvoří jedna vrstva stejnocenných buněk




Protáhlé buňky plnící vodivou a mechanickou funkci tvoří **střední žebro**

Na žebre jednobuněčné hyalinní rhizoidy; někdy rhizoidy i na obvodových buňkách laloků stélky

Metzgeriales

Gametangia se zakládají při středním žebřu v ochranných „masitých“ obalech.


Tobolka puká 4 chlopněmi



Metzgeriales

Tak jako *Marchantia* může se i *Metzgeria* množit tělisky vegetativně


Metzgeria fruticulosa



V příhodných pomínkách vyrostou na těliscích rhizoidy a tělíska regenerují v nové stélky.

Metzgeriales

***Aneura pinguis* – bezžilka mastná – lesní prameniště – vícevrstvá frondózní stélka bez diferenciace pletiv**



Metzgeriales

Obligátní mykotrofie u játrovek! – *Cryptothallus mirabilis*

podzemní nezelený bělavý gametofyt
vyživovaný mykotroficky,
sporofyt nadzemní

Plastidy se nediferencují do chloroplastové formy

sev. Evropa, Grónsko, v horách i v Polsku,
Německu a Rakousku. V ČR zatím přehlížen?




Metzgeriales

Endosymbióza sinic u játrovek!

podobně jako hlevíky, také některé játrovky si „ochočily“ sinice v slizových dutinkách a získávají od nich vzdušný dusík fixovaný do přijatelné podoby



jamuška drobná *Blasia pusilla*




Jungermanniales gametofytní stélka foliózní, terminála trojboká, fyloidy v řadách, ne ve spirále

známější je kapraďovka sleziníkovitá (*Plagiochila asplenoides*) – roste na humózních lesních půdách a trouchnivějících lesních stromech.




Z hlediska didaktického je ***Plagiochila asplenoides*** vhodným objektem pro demonstraci rozdílů mezi foliózní játrovkou a mechem např. mikroskopickým srovnáním s podobnými fyloidy u mechu měříku (*Mnium*).

Fyloidy jsou sice **ve 3 řadách** - v jedné břišní a dvou bočních, břišní řada může být redukovaná




Bazzania tricrenata

Fyloidы mají **všechny buňky stejnocenné**, bez náznaků vodivých či mechanických pletiv, která se vyskytují u mechů






Transport látek u játrovek a jiných mechorostů – absence vodivých pletiv neznamená, že netransportují látky napříč gametofytem či sporofytem. Transport je odkázán na méně výkonnou apoplastickou či transmembránovou cestu a jelikož mají pazmodesmy, tak také na cestu symplastickou




Antheridia – stopkatá, ve shlucích v paždí fyloidů



Archegonia - chráněná často vakovitým perianthem, vzniklým srůstem 2 terminálních lístků



Masožravost u játrovek? – *Colura* a *Pleurozia* – modifikované fyloidy – připomínají váčkovité „podtlakové“ dvoukomorové pasti se záklopkou, schopné při podráždění nasát nálevníky



Africká pohoří



Sev. Evropa, Amerika, JV Asie

Masožravost u játrovek? – *Colura* a *Pleurozia* – modifikované fyloidy – připomínají váčkovité „podtlakové“ dvoukomorové pasti se záklopkou, schopné při podráždění nasát nálevníky



Africká pohoří

Takové pasti má krytosemenná vodní masožravá bublinatka (*Utricularia*, *Utriculariaceae*)





Štět bělavý - hyalinní tenkostěnné parenchymatické buňky

při dozrávání tobolky velmi krátký, chráněný perianthem

po dozrání tobolky se jeho buňky 20x prodlužují

Tobolka – zpravidla 4 chlopně



Oddělení *Bryophyta* (mechy)



Oddělení *Bryophyta* (mechy)

Gametofyt = v ontogenezi dvě fáze:

1. **protonema** (prvoklíček)



2. **gametofor** (gametofytní rostlinka) –
diferencovaný na:

2a. **kauloid** = lodyžka

2b. **fyloidy** = lístky

(2c.) **rhizoidy** = příchytná vlákna (někdy chybí)




Protonema – obvykle
vláknité

Primárně – ze spory



Sekundárně – z
gametofytických rostlinek



Protonema – anatomická a funkční diferenciace

1. chloronemální filamenta

- příčné přepážky
- rostou pomalu, $0,1\mu\text{m}/\text{min}$,
- bezbarvá stěna
- mnoho chloroplastů v buňce
- fotosyntetizují



* platí pro *Physcomitrella patens*


Protonema – anatomická a funkční diferenciace

1. chloronemální filamenta

- příčné přepážky
- rostou pomalu, $0,1\mu\text{m}/\text{min}$,
- bezbarvá stěna
- mnoho chloroplastů v buňce
- fotosyntetizují

2. kaulonemální filamenta

- červenohnědě pigmentovaná stěna
- šikmé přepážky
- málo chloroplastů v buňce
- rostou rychle, $0,33\ \mu\text{m}/\text{min}^*$, kolonizují prostor, absorbují vodu s živinami



* platí pro *Physcomitrella patens*


Protonema – anatomická a funkční diferenciace

1. chloronemální filamenta

- bezbarvá stěna
- příčné přepážky
- mnoho chloroplastů v buňce
- rostou pomalu, $0,1\mu\text{m}/\text{min}^*$,
- fotosyntetizují

2. kaulonemální filamenta


- červenohnědě pigmentovaná stěna
- šikmé přepážky
- málo chloroplastů v buňce
- rostou rychle, $0,33\mu\text{m}/\text{min}^*$, kolonizují prostor, absorbují vodu s živinami



* platí pro *Physcomitrella patens*


Chloronema může mít endopolyloidizovanou velikost jader ($2n$), kaulonema si zachovává haploidní stav ($1n$) – zjištěno v prvoklíčku *Physcomitrella patens*

Protonema – makroskopicky může tvořit několik mm silné plstnaté, svěže nebo tmavě zelené, déle rostoucí povlaky na obnažené půdě lesních cest nebo lesních příkopů




Protonema – přeměna v gametofor

Na kaulonemálních filamentech vícebuněčné **hlízkovité pupeny** – z nich vyrůstají „dospělé gametofyty“ = gametofory = lodyžky s lístky a rhizoidy



Z jedné spory ne jediná rostlinka, ale celý trs
prvoklíček = „mechové podhoubí“




Protonema = evoluční reminiscence?



Haploidní frondózní protonema

se strukturně podobá
vláknité (1D) či frondózní (2D)
struktuře stélky zelených řas
a parožnatek

Sphagnum - protonema



Coleochaete



Physcomitrella - protonema



vláknitá zelená řasa


Protonema = evoluční reminiscence?

Haploidní frondózní


protonema

se strukturně podobá

vláknité (1D) či frondózní (2D)
struktury stélky zelených řas
a parožnatek



Haeckelův zákon rekapitulace



Opakují tedy mechy v ontogenezi svou fylogenezi?

Ernst Haeckel



1834 – 1919

Kauloid – komplexní struktura

Vodivá centrální část - tenkostěnné protáhlé **hydroidy** bez protoplastu (jako tracheidy, ale nemají lignifikovanou stěnu) + zpevňující velmi tenké **stereidy**


Parenchymatický kortex - jeho vnější vrstvu tvoří tenké protáhlé **stereidy**

Vnější část - jednovrstevná „**epidermis**“ silnostěnných buněk



Kauloid – uspořádání fyloidů




Terminála – tetraedrická = odděluje buňky do tří směrů



Fyloid proto na kauloidu **uspořádány spirálně**

Kauloid – uspořádání fyloidů

Spirálové uspořádání je podmíněno tím, že tetraedrická terminála sice odděluje dceřinné buňky po 120° jako u játrovek, ale během růstu lístů se jejich pozice posune o 17° na úhel 137° !!!



měřík *Mnium insigne*

Fyloidy – komplexní struktura

Plocha zpravidla jednovrstevná, ze stejnocenných (= izodiametrických) buněk

Střední žebro = protáhlé tenkostěnné **hydroidy** + protáhlé tlustostěnné **stereidy**

Okraj = někdy protáhlé tlustostěnné **stereidy**



Rhizomnium punctatum



Rhizomnium glabrescens






řez středním žebrem

Svrchní strana fyloidů často kryta tenkou kutikulou – spodní strana mechových fyloidů bez kutikuly má absorbční funkci

Fyloidy – komplexní struktura

Protáhlé tlustostěnné stereidy mohou (ale nemusí) zpevňovat okraj fyloidů



Fyloidy – komplexní struktura

Střední žebro může vybíhat v delší „osinu“



Tortula ruralis




Polytrichum piliferum

Rhizoidy – struktura

- mnohobuněčné, větvené
 - s šikmými mezibuněčnými přepážkami,
 - obvykle hnědavé nebo hyalinní
- „Rhizoidy = přežívající protonema na dospělci“



Figure 9. Microscopic view of rhizoids of the brook moss, *Fontinalis*, showing multicellular structure and diagonal crosswalls. Photo by Janice Glime.



Rhizoidy – funkce

často na bázi kauloidu – především fixace gametoforu k substrátu



Physcomitrella patens



Rhizoidy – funkce


někdy i mezi fyloidu na kauloidu



Rhizoidy mechů přijímají podobně jako kořeny vodu + minerální látky; absorpcí živin však víc než rhizoidy zajišťují mechům v svém povrchem fyloidy


Rhizoidy – funkce

výjimečně se na mechových rhizoidech mohou tvořit i zásobní hlízky umožňující přežít nepříznivé období nebo se šířit



Ontogeneze sporofytu

1. ze zygoty v archegoniu začne růst štět (seta)
2. noha štětu ukotvena v gametofytu
3. štět roste dělením meristemu v subapikální části
4. rostoucí štět protrhne obal archegonia
5. zbytek archegonia = čepička (calyptra) dál chrání vrchol štětu
6. po dosažení potřebné délky se na vrcholu sety tvoří tobolka (*theca, capsula, sporangium*) s víčkem



Ontogeneze sporofytu

Funaria hygrometrica



mladé sporofyty





dospělé sporofyty



Transportní pletivo = placenta

na bázi štětu je noha (pes) s transportním pletivem - **placentou**

převádějící asimiláty
a vodu z gametofytu do sporofytu




Epidermis sporofytu

často **pravé průduchy**

často kryta **kutikulou**

Otvíráním průduchů „řídí“ sporofyt transport metabolitů z gametofytu.

Kutikula a zavření průduchů „pozdrží“ hydrataci oproti vyschlému gametofytu




Epidermis sporofytu

často **pravé průduchy**

často kryta **kutikulou**

Otvíráním průduchů „řídí“ sporofyt transport metabolitů z gametofytu.

Kutikula a zavření průduchů „pozdrží“ hydrataci oproti vyschlému gametofytu




Epidermis sporofytu

často **pravé průduchy**

často kryta **kutikulou**

Otvíráním průduchů „řídí“ sporofyt transport metabolitů z gametofytu.

Kutikula a zavření průduchů „pozdrží“ hydrataci oproti vyschlému gametofytu





Epidermis sporofytu

často **pravé průduchy**

často kryta **kutikulou**

Otvíráním průduchů „řídí“ sporofyt transport metabolitů z gametofytu.

Kutikula a zavření průduchů „pozdrží“ hydrataci oproti vyschlému gametofytu



Tyto zprvu nevýznamné adaptační výhody, mohly v konečném důsledku vyústit v osamostatnění sporofytu !


Stavba tobolky

uvnitř často **sloupek (columella)**


na něm **výtrusorodá vrstva (archesporium)** + **výtrusy (sporae)**

horní okraj tobolky tvoří **obústí (peristom)**,

na něm je **víčko (operculum)**, popř. i **čepička (calyptra** = přetvořený obal archegonia – je to ve skutečnosti gametofyt!)



columella





Stavba tobolky – funkce peristomu

Po odpadu víčka **zuby peristomu hygroskopicky** otvírají a zavírají ústí tobolky – dle počasí (vlhkosti vzduchu)

https://www.youtube.com/watch?v=jIJ9_EBoY-U

Eurhynchium praelongum - peristom




Tobolky mechů vytvoří výtrusy najednou, uvolňují je dlouho. Játrovky je taky tvoří najednou a uvolňují najednou pomocí elater. Hlevíky je tvoří postupně a uvolňují postupně se rozvírajícími chlopněmi a pseudoelaterami

Klasifikace mechů

680 rodů / zhruba 11 000 druhů

rozdělených do **5 tříd**



1. Třída *Takakiopsida*

jen rod *Takakia* – Himálaj, Borneo, Japonsko, Aleuty.

- drobné (do 2 cm)
- rhizoidy chybí
- horizontální „oddenky“
- hydroidy chybí
- protonema frondózní

dříve řazena k játrovkám
po usušení má skořicovou vůni
hlevíky i játrovky mají mykorrhizu
mechy ne – ! jen *Takakia* ano






Horizontální „oddenky“ – se sliznatými žlázkami



Figure 30. *Takakia lepidozoides* rhizome tip with mucous cells. Photo from the website of the Herbarium of Hiroshima University.



Fyloidы šídlovité, kruhového „archegoniálního“ průřezu, na gametofytu vyrůstají nepravidelně



Terminála odděluje buňky do více směrů


Gametangia

 – bočně mezi lístky, gametofor jednopohlavný, rostliny dvoudomé

velká archegonia



Figure 10. *Takakia ceratophylla* antheridium. Photo by Karen Renzaglia and modified by Janice Glime.




elipsoidní antheridia

Sporofyt – tobolka puká podélnou spirální dehiscencí

- tobolka bez průduchů
- štět bez hydroid



Figure 11. *Takakia ceratophylla* seta and aborted archegonia. Photo by Karen Renzaglia.




2. Třída *Sphagnopsida*

- rhizoidy jen na protonematu
- kauloid větvený
- hydroidy chybí
- bezžilné fyloidы tvořené **hyalocystami** a **chlorocystami**






Průduchy – na tobolce zpravidla nefunkční



Nefunkční průduchy
na tobolce *Sphagnum
fimbriatum*

Protonema – jen zpočátku náznak vláknitosti, pak frondózní, má rhizoidy






Dospělý
gametofyt
rašeliníků
rhizoidy nemá

Fyloidy – dimorfní buňky

Hyalocysty – bezbarvé mrtvé buňky

= nádrže na vodu s otvory,
vyztužené lištami, aby při ztrátě
vody neztratily tvar

Chlorocysty = živé zelené
(asimilační) buňky




Celý systém funguje jako
sací pletivo.



Fyloidy – dimorfní buňky

Sací schopnost 1 : 20 + slabě dezinfekční účinky = vítaná přednost v dobách, kdy ještě neexistovaly dámské vložky a jiné komerčně vyráběné hygienické pomůcky






Kauloid

– ochranný a absorbční kortex – velké mrtvé buňky – absorbce roztoků


– vnějšek dřeně – živé tlustostěnné prosenchymatické buňky
= výzduha lodyžky

– vnitřek dřeně – živé tenkostěnné parenchymatické zásobní buňky


= nahrazují chybějící rhizoidy



vícevrstevný kortex
hlavní lodyžky



jednovrstevný kortex
bočních větví



u některých druhů mají kortexové buňky tvar křivulí



nálevník *Habrotrocha roeperi* žijící endosymbioticky v retortových buňkách rašeliníků



Antheridia – kulovitá, stopkatá vtroušená mezi lístky zkrácených větvek „hlavičky“






Fig. 5. *Sphagnum*. External features of antheridial branch.

Fig. 6. *Sphagnum*. A. Portion of antheridial branch to show position of antheridia.
B. Single antheridium.



Archegonia

- na krátkých stopečkách na koncích větviček v „hlavičce“

Rašeliníky mohou být dvoudomé i jednodomé

Sporofyt



Štět – kratinký, schovaný v horní miskovité části pseudopodia

Pseudopodium = zelený výrůstek gametofytu nesoucí sporofyt

Tobolka - kulatá červenohnědá s víčkem jak rádiovka, nemá čepičku



Sporofyt





Štět – kratinký, schovaný v horní miskovité části pseudopodia

Pseudopodium =
zelený výrůstek gametofytu
nesoucí sporofyt

Tobolka - kulatá
červenohnědá s víčkem jak rádiovka, nemá čepičku


Sporofyt



Štět – kratinký, schovaný v horní miskovité části pseudopodia


Pseudopodium =
zelený výrůstek gametofytu
nesoucí sporofyt

Tobolka - kulatá
červenohnědá s víčkem jak rádiovka, nemá čepičku




Uvolnění spór explozí

1. Sesycháním neúplného sloupku vzniká podtlak




Uvolnění spór explozí

1. Sesycháním neúplného sloupku vzniká podtlak
2. Vzduch nasáván přes propustnou epidermis




Uvolnění spór explozí

1. Sesycháním neúplného sloupku vzniká podtlak
2. Vzduch nasáván přes propustnou epidermis
3. Seschnutím epidermis ztrácí propustnost a plochu



Uvolnění spór explozí

1. Sesycháním neúplného sloupku vzniká podtlak
2. Vzduch nasáván přes propustnou epidermis
3. Seschnutím epidermis ztrácí propustnost a plochu
4. Zmenšuje se objem a roste tlak v tobolce (0.4 až 0.6 MPa)



Uvolnění spór explozí

1. Sesycháním neúplného sloupku vzniká podtlak
2. Vzduch nasáván přes propustnou epidermis
3. Seschnutím epidermis ztrácí propustnost a plochu
4. Zmenšuje se objem a roste tlak v tobolce (0.4 až 0.6 MPa)
5. Překročení kritické hodnoty = odtržení (odstřelení) víčka = exploze slyšitelná i na vzdálenost několika metrů

Rod *Sphagnum* má zhruba 380 druhů


Rašeliniště vznikala v postglaciálu (stará max. 10-12 tisíc let)

Ulmifikace = rašelinění rozklad za nepřítomnosti vzduchu (v minulosti pokračovala karbonizací = uhelnatěním

Tmavá barva rašeliny = vysoký obsah uhlíku (v aerobních podmínkách by unikl ve formě CO_2)




Porosty rašeliníků pokrývají zhruba 1% povrchu souše

V krajině mají rašeliniště hydrologický a klimatologický význam




Vrstva rašeliny až 10 m

Díky konzervačním účinkům (kyselé prostředí) uchovává pyl a makrozbytky rostlin



Stratigrafické studium těchto zbytků umožňuje poznat složení flóry a vegetace, která rašeliniště obklopovala během postglaciálního vývoje



Rašelina jako surovina

Minulost

- palivo (výhřevnost až 4000 kal/kg)

Dnes

- lázeňství (Třeboňsko, Lúčky-kúpele u Ružomberku)
- zahradnický substrát



sušící se kusy vytěžené rašeliny = borky

Ambuchananiaceae

Rašeliníkům je příbuzná tasmánská *Ambuchanania leucobryoides*, připomínající náš bělomech sivý.

Fyloidy – velké, stejná stavba jako u *Sphagnum*

Kauloid – chudě nepravidelně větvený, tvořený stejnocennými buňkami

*1987



Roste zanořena ve vlhkém písru





Plate 4. *Ambuchanania leucobryoides* habitat: sandy washes southwest of Melaleuca, with the Bathurst Range beyond (image by Tim Rudman)



Figure 51. *Ambuchanania leucobryoides* leaf showing hyaline and photosynthetic cells. Photo by Lynette Cave.



Figure 52. *Ambuchanania leucobryoides* leaf cross section showing hyaline and photosynthetic cells. Photo by Lynette Cave.



3. Třída Andreaeopsida

- mají pseudopodium jako rašeliníky
- mají však rhizoidy

Vázané na vyšší (nevápnitá) pohoří, na boreální tajgu a arktickou tundru.



U nás 5 druhů, většinou velmi vzácných.

Častější jen v horách štěrbovka skalní (*Andreaea rupestris*).

Gametofytní rostlinky – typické červenohnědou až černou barvou



Andreaea blytii – pohoří Chibiny



Andreaea subulata


Fyloidy – někdy bez žilek, tvořené živými buňkami,
ne dimorfními jako u rašeliníků




Andreaea mutabilis – fylloidy bez žilek



Andreaea subulata – fylloidy s žilkou



Kauloid – buď stejnocenné buňky,
nebo tlustostěnné prosenchymatické buňky na povrchu a parenchymatické uvnitř



Rhizoidy – někdy multisériátní, ostatní mechy většinou uniseriátní






Figure 9. Microscopic view of rhizoids of the brook moss, *Fontinalis*, showing multicellular structure and diagonal crosswalls. Photo by Janice Glime.

Protonema – multisériátní ?až frondózní, ostatní mechy většinou uniseriátně



vláknité

Gametangia – stopkatá na koncích kauloidu mezi lístky a perichaetiálními parafýzami (ploníky a vlastní mechy mívají terminální perigonia)



Andreaea nivalis



stopkaté antheridium

stopkaté archegonium





Sporofyt

kratinký štět
ukrytý v
pastopečce
(pseudopodiu)
jako u rašeliníků,
bez průduchů



Tobolka – otvírá se 4
štěrbinami (dehiscencemi) ?
reminiscence na játrovky;
opakované otvírání a zavírání
řízeno hygroskopicky
sloupkem = uvolňování spór
dlouhou dobu







4. Tř. *Polytrichopsida*,

- fyloidy s žilkou
- velikostně největší mechy, až 1 m vysoké
- tobolka uzavřena blanitou epifragmou s otvory na obvodu
- čepička chlupatá

Mechy s „chabou konstrukcí“ nemohou s cévnatými rostlinami kompetovat o světlo ve vertikálním směru. I kdyby se vaskularizovaly a lignifikovaly a začly růst do výšek, vzdalovaly by se gametangií od vody, na které jsou při oplození závislé.



Kauloid






díky výšce mají
ploníky nejvíce
diferencovaná
„vodivá pletiva“

kromě hydroid ještě
leptoidy – mají
sítkovaná propojení, v
dospělosti ztrácejí
jádra, ale cytoplasmu
si zachovávají

(několikanásobně rychlejší
transport oproti difúzi u ostatních
mechů zjišťován radioaktivně
značenými cukry – 32 cm/h)

„cévní svazek“
mechanicky vyztužen
stereidami






fyloidy ploníků

– mezi mechy nejsložitější stavba „pseudomezofylu“

Svrchní strana s podélnými lamelami (tvoří je buňky s mnoha chloroplasty)

Konduplikátní svinutí fyloidu reguluje transpiraci a tím fotosyntézu a pohyb roztoků ve vodivém systému




fyloidy ploníků

hydroidy

leptoidy

stereoidy





Perigonia = jednopohlavné „květy“ ploníků

Perigonium = soubor rozšířených fyloidů a parafýz na vrcholu plodné lodyžky (samčí nebo samičí)

Antheridia – stopkatá mezi lístky a parafýzami samčího perigonia




Fig. 5. *Polytrichum*. L.s. through antheridial head.

Fig. 6. *Polytrichum*. Antheridia and paraphyses.





Fig. 7. *Polytrichum*. L.s. through archegonial head.



Archegonia - protáhlá, na krátkých stopkách, mezi lístky a parafýzami v samičích terminálních perigoniích

U nás v lesích a na degradovaných (odumřelých) rašelinistech najdeme několik zástupců rodu ploník (*Polytrichum*) – např. **ploník obecný (*Polytrichum commune*)**.





Dawsonia superba, New Zealand

Všichni zástupci tř. *Polytrichopsida* mají extrémně malé spory někdy jen 5–8 µm. U rodu *Dawsonia* je v jedné zralé tobolce až 65 miliónů výtrusů!




5. Třída **Bryopsida** (nejbohatší ~ 10 000 druhů) (4 podtřídy *Diphyscidae*, *Funariidae*, *Dicraniidae* a *Bryidae*)

- (i) pokročilá diferenciace pletiv gametofytu, ale ne tolik jako u ploníků (většinou chybí leptoidy),
- (ii) fyloidy obvykle se střední žilkou,
- (iii) průduchy vyvinuty.

U nás mnoho zástupců.

Archegonia a antheridia v samčích nebo samičích perigoniích na vrcholu kauloidu nebo koncích větví.



Víc než polovina druhů dvoudomých; Dioecie = fylogeneticky původní stav u mechů

Perigonia - na diskovitě rozšířeném vrcholu kauloidu



Rhizomnium glabrescens




Figure 17. *Bryum capillare* males with antheridia in a splash platform. Photo by Dick Haaksma.

Antheridia obvykle stopkatá, protáhlého tvaru




Figure 26. *Hypnum cupressiforme* perichaetial leaves, paraphyses, and antheridia. In this species, antheridia occur long the stem. Photo by Kristian Peters.



antheridia u rodu *Bryum*

Na chodnících, zdech, střechách, ale i holé půdě najdeme jemné stříbřitě světlezelené polštářky prutníku stříbrného (*Bryum argenteum*).



Bryum argenteum



Dicranum scoparium

V jehličnatých lesích najdeme často tmavozelené polštáře dvouhrotce chvostnatého (*Dicranum scoparium*) s jednostranně uspořádanými, obloukovitě zahnutými, šídlovitými fyloidy.



Ve vlhké trávě a na pařezech je častý trávník Schreberův (*Pleurozium schreberi*), kauloidy mají po odrhnutí lístků nehtem charakteristické rezavě hnědé zbarvení.



Pleurozium schreberi

Na prameništích a v olšinách najdeme zástupce rodu měřík (*Mnium*) s průsvitnými světlezelenými fyloidami, jež jsou dobrým objektem pro demonstraci hydroid a stereid.

Mnium spinosum




Koprofilie (obliba růst na výkalech) je typická pro druhy rodu *Splachnum*, jejichž často pestrobarevné tobolky vydávají podobný zápach a spóry přenášejí

masařky



Funaria hygrometrica



Drobné rostlinky zkrutku vláhojevného (*Funaria hygrometrica*) najdeme často na spáleništích v lesích (angl. proto nazýván Cinderella)


Fontinalis antipyretica

pramenička obecná - proudící voda (čisté řeky, potůčky, luční studánky). Vlnící se lodyžky až metrové délky. Pěstuje se v akváriích.



Leucobryum glaucum

bělomech sivý – indikuje degradované lesní půdy; tvoří šedozelené polštáře v borech a smrčinách. Anatomie se podobá rašeliníkům.



Sušené jemné gametofyty např. sourubky kadeřavé (*Neckera crispa*) či bělozubky ocáskovité (*Leucodon sciuroides*) byly využívány jako předchůdci toaletního papíru



Neckera crispa



Leucodon sciuroides



Od středověku až do 19. století byla výroba papíru drahou záležitostí. Nehledě ke značné tuhosti, drsnosti a nízké savosti dříve vyráběného ručního papíru.

drsná textura ručního papíru





Genetický model: *Physcomitrella patens*
celý genom $1C=510$ Mbp byl
sekvenován jako první mezi mechy

Genomy mechrostů

- velmi malé – ve srovnání s ostatními vyššími rostlinami.
- malé i počty chromosomů 10-20, nejméně *Takakia* n=4

Genomy mechiorostů

- velmi malé – ve srovnání s ostatními vyššími rostlinami.
- malé i počty chromosomů 10-20, nejméně *Takakia* n=4

Polyploidie – oproti ostatním vyšším rostlinám vzácněji.

Přitom by tak dobře fixovala heterozygozitu tam, kde je riziko totální homozygozity následkem selfingu obouohlavných gametofytů tak velké. Navíc by odstranila přímou selekci mutací v haploidním gametofytu – mohly by se pak uchovat „na horší časy“ nebo „na jiný genetický kontext“ jako v dominantním sporofytu cévnatých rostlin.


Genomy mechiorostů

- velmi malé – ve srovnání s ostatními vyššími rostlinami.
- malé i počty chromosomů 10-20, nejméně *Takakia* n=4

U self-kompatibilního měříku (*Mnium*) rostou archegonia a antheridia bok po boku. K samooplození tak může dojít velmi snadno.

Polyplloidie – oproti ostatním vyšším rostlinám vzácněji.

Přitom by tak dobře fixovala heterozygozitu tam, kde je riziko totální homozygozity následkem selfingu obouohlavných gametofytů tak velké. Navíc by odstranila přímou selekci mutací v haploidním gametofytu – mohly by se pak uchovat „na horší časy“ nebo „na jiný genetický kontext“ jako v dominantním sporofytu cévnatých rostlin.



Genomy mechrostů

- velmi malé – ve srovnání s ostatními vyššími rostlinami.
- malé i počty chromosomů 10-20, nejméně *Takakia* n=4

Polyploidie – oproti ostatním vyšším rostlinám vzácněji.


Přitom by tak dobře fixovala heterozygozitu tam, kde je riziko totální homozygozity následkem selfingu obouohlavných gametofytů tak velké. Navíc by odstranila přímou selekci mutací v haploidním gametofytu – mohly by se pak uchovat „na horší časy“ nebo „na jiný genetický kontext“ jako v dominantním sporofytu cévnatých rostlin.

Vzácnost polyploidie a malé genomy mechrostů pramení z jádroplasmové korelace (= velké jádro se do malé buňky nevejde). Velké buňky by zřejmě konstrukčně neudržely pohromadě mechovou rostlinku, které chybí opora v cévních svazcích.



Oddělení *Anthocerophyta* (hlevíky)

Anthoceros,
a Hornwort



Hlevíky mají jak znaky pokročilé (interkalární meristém, průduchy), tak i primitivní, společné s řasami (pyrenoid).

**Gametofytní stélka hlevíků je frondózní - dorzovertrální
- rozprostřená po podkladu**




Phaeoceros carolinianus

Gametofyt hlevíků je drobný - zpravidla velikostí nepřesahuje několik málo centimetrů




Terminální buňka vzrostného vrcholu hlevíků polodiskovitá nebo **klínovitě dvouboká**



Odděluje tak nové buňky do dvou směrů, čímž vzniká frondózní - plochá stélka.


Jediná terminální buňka vzrostného vrcholu je společným znakem všech mechorostů (podobně i u kapradin a plavuní, kde jich může být i několik; semenné rostliny mají diferencované vícevrstevné meristémy!)

Gametofyt hlevíků vytváří vidličnatě větvené laloky se zbytnělou střední částí - středním žebrem.



Rhizoidy hlevíků vznikají z povrchových buněk spodní strany stélky, jsou **hyalinní, jednobuněčné**

Mohou mít mykorrhizu




Phaeoceros carolinianus


Někdy **sliznaté dutinky** s koloniemi **endosymbiotických sinic** rodu *Nostoc* ve stélce

sliznaté dutinky u
Anthoceros punctatus

Cyanobacteria



David Webb



Sinice převádějí vzdušný dusík do amonné podoby, ta využívána hlevíky


Hlevíky produkují sliz obsahující sacharidy, které podporují růst sinic


U *Dendroceros* a *Megaceros* ústí slizových dutinek tvoří **dvojice ledvinitych buněk** schopných tato ústí zavírat a otvírat

Megaceros aenigmaticus

= homology
průduchů

mechorosty jinak na
gametofytu žádné
průduchy nemají!





Dendroceros crispatus

s černými komůrkami
obsahujícími kolonie sinic rodu
Nostoc

V buňkách často jedený obrovský chloroplast spojený s pyrenoidem

Pyrenoid = bílkovinné tělísko, metabolicky aktivní, obsahující RUBISCO.

Řasy pyrenoidy vícekrát v evoluci ztratily. U hlevíků se vyvinuly patrně nezávisle *de novo*.



Figure 2. Hornwort cells showing single chloroplast, doughnut-shaped pyrenoid in center, and absence of oil bodies. Photo by Chris Lobban.




Hlevíky mohou mít vzácně i dva a zcela výjimečně až osm chloroplastů na buňku, zatímco játrovky a mechy jich mají vždy mnoho →

chloroplasty v
buňkách
lístku mechu
Mnium
stellare




Vývoj archegonií – **endogenní** – jiný než u ostatních mechorostů a cévnatých rostlin které tvoří archegonia exogenně

exogenní vznik archegonií
u mechů, játrovek a jiných
rostlin



endogenní vznik archegonií **u hlevíků**






*Dendroceros
tubularis*

někdy až po 25
ve shlucích


Archegonia zanořená na povrch
horní strany stélky ústí jen jejich
krčky

Anthoceros crispulus




Antheridia – ve skupinkách v dutinkách uvnitř stélky,
zakládají se také endogenně – skupinově v nediferencované
komůrce (podobné jaké jsou po zeslizovatění osídleny sinicemi)

vývoj antheridií u hlevíků



hlevíky se tak liší od všech ostatních terestrických rostlin, které mají antheridia exogenní – vznikající z jedné buňky povrchové


vývoj antheridií u mechů, játrovek a jiných rostlin




Při dozrání antheridií praská stélka nad antheridiovou komůrkou, takže antheridia vyčnívají na povrch stélky




Dendroceros tubercularis



Chloroplasty buněk antheridiového obalu se při tom mění na oranžové nebo žluté chromoplasty



Hlevíky mají souměrně umístěné bičíky na spermatozoidech



Notothylas orbicularis

Sporofyt hlevíků bez sety



Tobolka protáhlá,
v počátečních
fázích **zelená**.





Drobná, často jen o
málo delší než 1 cm



Noha sporofytu ukotvena v gametofytní stélce
chráněna **pochvou**, tvořenou pletivem gametofytní stélky



Rozhraní mezi
nohou a
gametofytom
klkovitá
placenta,
převádí vodu a
organické látky
z gametofytu do
sporofytu
Pokusy s
transplantací
zeleného
sporofytu do *in*
vitro podmínek
skončily vždy
smrtí sporofytu



Válcovitá tobolka

střední sloupek (*columella*)

2 chlopňe




*Megaceros
flagellaris*

*Dendroceros
crispatus*


Na bázi tobolky **interkalární meristém** = kontinuální růst tobolky.

Zatímco v terminální části vypadávají zralé spory, v dolní teprve meiózou vznikají nové.


Spory se z jedné tobolky šíří poměrně dlouhou dobu.



Epidermis tobolky hlevíků má často **pravé průduchy** a **kutikulu**



Spory hlevíků triletní



Phaeoceros carolinianus

Pseudoelatery *Megaceros flagellaris*

Z archesporia vedle spor také sterilní **spirálovité pseudoelatery**, sloužící k vymršťování spor.

Hlevíky	spory : pseudoelatery = 1:1
Játrovky	spory : elatery = 4:1 až 8:1




Figure 10. *Phaeoceros* spore and pseudoelater. Photo by David H. Wagner, scale modified by Janice Glime.







Figure 11. *Leiosporoceros dussii* spores and pseudoelaters using fluorescence microscopy. Note the absence of spiral thickenings in the elaters. Photo by Andrew Blackwell, and Juan Carlos Villarreal A., Southern Illinois University.

Kromě hlevíků a játrovek nemají podobné struktury žádné jiné výtrusné vyšší rostliny



Vegetativní rozmnožování hlevíků

„hlízky“

Rozmnožovací tělíska u
Phymatoceros bulbiculosus





Fosilním dokladem hlevíků by mohl být
spodnodevonský – ***Sporogonites exuberans***




Sporogonites má podlouhle elipsoidní
sporangia opatřená sloupkem

Fosilním dokladem hlevíků by mohl být
spodnodevonský – ***Sporogonites exuberans***




Sporogonites má podlouhle elipsoidní
sporangia opatřená sloupkem

Fosilním dokladem hlevíků by mohl být
spodnodevonský – ***Sporogonites exuberans***



Nynější
spekulace



Sporogonites má podlouhle elipsoidní
sporangia opatřená sloupkem

Celkem hlevíky zahrnují zhruba 6 rodů/ 240 druhů.

vzácně na podzim na
obnažené půdě na
strništích **hlevík**
tečkovany
(*Anthoceros agrestis*); jméno
tečkovany od černých
teček = kolonie
endosymbiotických
sinic v dutinách stélky.

