





# PTÁCI

2. část

# Řád: KRÁTKOKRÍDLÍ (*Gruiformes*)

- různorodá skupina, málo společných znaků
- anizodaktylní noha (palec vysoko postavený či chybí) – běhavá, brodivá či lemovaná
- hnízdí na zemi či v rákosinách, nidifugní ml.
- většinou býložravci či všežravci
- u nás 8 druhů (hnízdí 7)



# Č: Jeřábovití – Gruidae

- velcí, podobní brodivým (dlouhé nohy a krk - v letu natažený), lysá barevná místa na hlavě, dobrí letci, samci nápadné ruční letky (přesahují ocas)
- rovinaté mokřady, ritualizovaný tok, všežravci



Jeřáb popelavý  
(*Grus grus*) (H)

# Č: Chřástalovití – *Rallidae*

- malí až středně velcí, často skrytí, v blízkosti vod
- tělo zploštělé ze stran, často dlouhé nohy s dlouhými prsty (lyska lemované)
- kožní štítek na čele – lysky, při pelichání neschopní letu
- všežravci, hnízda v rákosinách či na loukách



Chřástal vodní (*Rallus aquaticus*) (H)


# Chřástal kropenatý (*Porzana porzana*) (H)




# Chřástal malý (*Porzana parva*) (H)



# Chřástal polní (*Crex crex*) (H)



# Lyska černá (*Fulica atra*) (H)



fot. J. Mazgajska

# Slípka zelenonohá (*Gallinula chloropus*) (H)



# Řád: DROPI – Otidiformes

## Č: Dropovití – *Otididae*

- velcí pozemní ptáci, nejtěžší evropský létající pták (až 20 kg!)
- zcela chybí palec, 3 prsty se zploštělými drápy, bez kostrční žlázy
- ritualizovaný tok, samci větší, hnízdo na zemi, nidifugní ml., všežravci











Drop velký  
(*Otis tarda*)



# Řád: BAHŇÁCI (=DLOUHOKŘÍDLÍ) (*Charadriiformes*)

- různorodá skupina, většinou vázání na vodu
- plovací noha (redukce palce), blána často též redukována
- masožravci (hlavně bezobratlí) – různě modifikované zobáky
- dlouhá špičatá křídla – výborní letci, nejdelší taly
- hnízdo většinou na zemi, nidifugní (sluky, kulíci a spol.)/nidikolní ml. (racci, rybáci)
- u nás 84 druhů (hnízdí 16-17)



# Č: Tenkozobcovití – Recurvirostridae

- dlouhé štíhlé nohy, na prstech částečně plovací blána, někdy kolonie, 4 vejce



Tenkozobec opačný  
(*Recurvirostra avosetta*) (H)



Pisila čáponohá  
(*Himantopus himantopus*) (H)

# Č: Dytíkovití – *Burhinidae*

- středně velcí ptáci, velká hlava s velkýma žlutýma očima, na prstech částečně plovací blána
- otevřená krajina (step), noční aktivita, 2 vejce

Dytík úhorní (*Burhinus oedicnemus*)



# Č: Kulíkovití – Charadriidae

- menší ptáci, krátký zobák, krátký krk, velké oči, palec silně redukován či chybí, kratší nohy, 4 vejce
- otevřená krajina, nejčastěji mělčiny a břehy vod

Kulík písečný  
(*Charadrius hiaticula*)



Kulík říční  
(*Charadrius dubius*) (H)



# Kulík hnědý (*Charadrius morinellus*) (h)




# Čejka chocholatá (*Vanellus vanellus*) (H)



# Č: Slukovití – Scolopacidae

- malí až velcí ptáci, dlouhý zobák a nohy, palec částečně vyvinut
- otevřené i lesní biotopy, hnízdo na zemi či na stromech, 4 vejce

## Sluka lesní (*Scolopax rusticola*) (H)



# Bekasina otavní (*Gallinago gallinago*) (H)



# Břehouš černoocasý (*Limosa limosa*) (H)



Copyright © 2004 KK Hui



blasck  
ek.com


# Koliha velká (*Numenius arquata*)



# VODOUŠI – rod *Tringa* (u nás 7 druhů)



Vodouš tmavý  
(*Tringa erythropus*)



Vodouš rudonohý (*Tringa totanus*) (H)



Vodouš šedý (*Tringa nebularia*)



Vodouš kropenatý (*Tringa ochropus*) (H)



Vodouš bahenní (*Tringa glareola*)



Pisík obecný (*Actitis hypoleucos*) (H)

## JESPÁCI – rod *Calidris* (u nás 11 druhů)



Jespák obecný (*Calidris alpina*)




Jespák křivozobý (*Calidris ferruginea*)  
Jespák šedý (*Calidris temminckii*)



Jespák malý (*Calidris minuta*)



# Jespák bojovný (*Calidris pugnax*)



# Č: Rackovití – Laridae

- většinou světlé zbarvení, plovací noha (3 prsty s plovací blánou)
- výborní letci a plavci, silný hákovitý zobák – všežravci, mrchožrouti
- kolonie, mokřady a moře

Racek bělohlavý a středomořský (*Larus cachinnans* a *L. michahellis*) (H)



# Racek bouřní (*Larus canus*) (h)



# Racek chechtavý (*Chroicocephalus ridibundus*) (H)



# Č: Rybákovití – Sternidae

- štíhlí ptáci, vidličnatě ukončený ocas, krátké nohy, úzká křídla – výborní letci
- úzký špičatý zobák, lov ryb, většinou světlí s tmavým temenem
- kolonie, mokřady a moře

## Rybák obecný (*Sterna hirundo*) (H)




# Rybák černý (*Chlidonias niger*)



# Řád: MĚKKOZOBÍ (*Columbiformes*)

- zavalití ptáci, dlouhá špičatá křídla – dobří letci
- měkké lysé ozobí (v něm nozdry), kráčivé nohy (anizodaktylní)
- umí pít vodu sáním, drobivé obrysové peří
- mělká hnízda z větviček či dutiny, nidikolní ml. (krmí výměškem volete)
- hlavně rostlinná potrava
- u nás 5 druhů (všechny hnízdí)



# Č: Holubovití – *Columbidae*


## Holub hřivnáč (*Columba palumbus*) (H)




# Holub doupňák (*Columba oenas*) (H)




# Holub domácí (*Columba livia fa.domestica*) (H)



# Hrdlička zahradní (*Streptopelia decaocto*) (H)




# Hrdlička divoká (*Streptopelia turtur*) (H)



# Řád: KUKAČKY (*Cuculiformes*)

- úzký špičatý zobák, dlouhá špičatá křídla, dlouhý ocas
- vratiprst, potravou hmyz, nidikolní ml.
- hnízdní parazitismus (jen u některých druhů), netvoří páry
- u nás 1 druh





# Č: Kukačkovití – Cuculidae

## Kukačka obecná (*Cuculus canorus*) (H)



# Řád: SOVY (*Strigiformes*)

- predátoři s noční aktivitou, velké oči směřující dopředu, výborný sluch
- opeřené nohy se silnými drápy – spáry, vratiprst
- měkké obrysové peří, speciálně upravená první letka – neslyšný let
- krátký hákovitý zobák, vývržky, hnízda na stromech, v dutinách či na skalách, nidikolní ml., samice větší
- u nás 12 druhů (8 pravidelně hnízdí)



# Č: Sovovití – Tytonidae

- srdčitý závoj, noční aktivita, běháky opeřené, ale chodidla lysá
- široká zaoblená křídla, ocas kratší než nohy



# Č: Puštíkovití – *Strigidae*

- noční nebo denní aktivita, běháky i prsty opeřené, ocas delší než nohy

## Výr velký (*Bubo bubo*) (H)



# Puštík obecný (*Strix aluco*) (H)



# Puštík bělavý (*Strix uralensis*) (H)



Bohumir hlasek

[hlasek.com](http://hlasek.com)

*Strix uralensis* d331

# Kalous ušatý (*Asio otus*) (H)



# Kalous pustovka (*Asio flammeus*) (h)



# Sýc rousný (*Aegolius funereus*) (H)



# Sýček obecný (*Athene noctua*) (H)



# Kulíšek nejmenší (*Glaucidium passerinum*) (H)





Varpusoplil

# Výreček malý (*Otus scops*) (h)



# Řád: LELKOVÉ (*Caprimulgiformes*)

- noční, skrytě žijící ptáci, kryptické zbarvení a chování
- plochá hlava, zobák krátký široký s vibrisy, velké oči
- krátké nohy s částečným vratiprstem
- dlouhá špičatá křídla, měkké peří, let připomíná netopýry
- loví hmyz v letu, hnízdo na zemi, nidikolní ml.



# Č: Lelkovití – Caprimulgidae

## Lelek lesní (*Caprimulgus europaeus*) (H)



# Řád: SVIŠŤOUNI (*Apodiformes*)

- extrémní letoví specialisti s mohutnou létací svalovinou, dlouhá ruční část křídla s dlouhými letkami, slabé nohy, potravu získávají v letu, nidikolní ml.
- u nás 2 druhy (1 hnízdí)



## Č: Rorýsovité – *Apodidae*

- dlouhá srpovitá křídla, krátký vidličnatý ocas, velmi krátké nohy s drápy – závěsné (pamprodaktylní – všechny 4 prsty dopředu)
- krátký rozeklaný zobák – lov hmyzu v letu
- v letu kopulují i spí, kolonie (skály, budovy)


# Č: Rorýsovité – Apodidae

## Rorýs obecný (*Apus apus*) (H)



# Řád: SROSTLOPRSTÍ (*Coraciiformes*)

- různorodý řád masožravých ptáků, pestré zbarvení, dlouhý zobák
- 2 přední prsty při bázi srostlé – syndaktylní noha
- tuhé peří, hnízdí hlavně v dutinách, nidikolní ml.
- u nás 3 druhy (2 hnízdí)



# Č: Ledňáčkovití – Alcedinidae


- dlouhý silný špičatý zobák, krátká křídla a ocas, srůst prostředních prstů po celé délce, hnízdí v břehových norách, lov rybek či jiných živočichů

Ledňáček říční (*Alcedo atthis*) (H)



# Č: Vlhotví – Meropidae

- štíhlí ptáci, dlouhý špičatý zobák a křídla, dlouhý ocas, protažené střední rýdováky, koloniální, břehové nory, lov hmyzu v letu (hlavně blanokřídlí)



Vlha pestrá (*Merops apiaster*) (H)



Fernández Larreta

# Č: Mandelíkovití – Coraciidae


- mohutnější, silný široký zobák – lov bezobratlých i obratlovců
- dlouhá špičatá křídla, krátké nohy, hnízdí v dutinách

Mandelík hajní (*Coracias garrulus*)



# Řád: ZOBOROŽCI (*Bucerotiformes*)

- pestré zbarvení, dlouhý, často masivní zobák
- syndaktylní noha
- tuhé peří, hnízdí hlavně v dutinách, nidikolní ml.
- u nás 1 hnízdící druh



# Č: Dudkovití – Upupidae




- dlouhý zahnutý zobák, výrazná chocholka, polootevřená krajina, hnízdí v dutinách, potravu hledá na zemi (bezobratlí i obratlovci)

Dudek chocholatý (*Upupa epops*) (H)



# Řád: ŠPLHAVCI (*Piciformes*)

- stromoví ptáci, šplhavá (zygodaktylní) noha – dva prsty dopředu a dva dozadu, tuhé opeření, hnízdění v dutinách, nidikolní ml.
- u nás 10 druhů (všechny hnízdí)



## Č: Datlovití – *Picidae*

- dlouhý špičatý zobák, zpevněná lebka
- dlouhý jazyk se štětičkou
- tuhý ocas (podpora šplhu), obloukovitý let
- pestré zbarvení, akustická komunikace
- vydlabávají stromové dutiny
- potravou hmyz, rostlinné části

# Č: Datlovití – *Picidae*

## Krutihlav obecný (*Jynx torquilla*) (H)



# Žluna zelená (*Picus viridis*) (H)



# Žluna šedá (*Picus canus*) (H)



© Jan Ševčík



# Datel černý (*Dryocopus martius*) (H)

Josef hlasek  
hlasek.com  
*Dryocopus martius* 8585



© - lubomir hlasek  
[www.hlasek.com](http://www.hlasek.com)  
*Dryocopus martius* 6180

# Strakapoud velký (*Dendrocopos major*) (H)



# Strakapoud jižní (*Dendrocopos syriacus*) (H)



© - lubomír hlasek  
www.hlasek.com  
*Dendrocopos syriacus* 2413



© - lubomír hlasek  
www.hlasek.com  
*Dendrocopos syriacus* 2412

# Strakapoud bělohřbetý (*Dendrocopos leucotos*) (H)



# Strakapoud prostřední (*Dendrocopos medius*) (H)



© Jan Ševčík



© - Josef Hlasek  
[www.hlasek.com](http://www.hlasek.com)  
*Dendrocopos medius* 2414

# Strakapoud malý (*Dryobates minor*) (H)




chlasek  
com  
minor 8107




Pic épeichette  
(*Dendrocopos minor*)

# Datlík tříprstý (*Picoides tridactylus*) (H)



# Řád: SOKOLI (*Falconiformes*)

- denní predátoři (vývržky)
- skvělý zrak, ostře zahnutý silný zobák se zejkem, nozdry v lysém ozobí
- nohy se zahnutými drápy – spáry
- výborní letci – zašpičatělá úzká křídla (rychlý let a lov)
- samice větší, hnízda na stromech, skalách, antrop. substrátech, nidikolní ml.
- u nás 9 druhů (hnízdí 4)



# Č: Sokolovití – Falconidae

Sokol stěhovavý (*Falco peregrinus*) (H)



# Raroh velký (*Falco cherrug*) (H)



# Ostříž lesní (*Falco subbuteo*) (H)



# Poštolka obecná (*Falco tinnunculus*) (H)



# Dřemlík tundrový (*Falco columbarius*)

