


35 Derivace funkce a její užití – met.

Stručný přehled teorie – uváděn průběžně – spolu s metodickými radami a vzorovými výpočty úloh

Met.: Derivace funkce představuje jeden ze základních pojmů diferenciálního počtu. Byl vytvořen ve druhé polovině 17. století při řešení konkrétních fyzikálních a geometrických problémů.

Většina času, který je ve středoškolské matematice věnován diferenciálnímu počtu, je určena pro geometrický význam derivace funkce a jeho využití při vyšetřování průběhu funkcí a při řešení praktických úloh.

Geometrický význam derivace funkce v daném bodě x_0 je **směrnicí tečny** ke grafu funkce v tomto bodě.



Obrázek lze využít k vysvětlení způsobu určení směrnicí tečny grafu funkce f (tedy způsobu určení derivace funkce f).

Na obrázku:

- část grafu funkce $f: y = f(x)$
- sečna $s = \leftrightarrow TS$ se směrovým úhlem φ
- tečna t se směrovým úhlem α vedená ke grafu funkce f bodem T .

Je zřejmé, že směrnicí k_s sečny s určíme z pravoúhlého trojúhelníku STQ takto:

$$k_s = \operatorname{tg} \varphi = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

Ze sečny se stane tečna v okamžiku, kdy bod S přejde po části grafu funkce f do bodu T . Pohyb bodu S do T a přechod sečny do tečny jsou na obrázku naznačeny červenými šipkami.

Přitom se zároveň zmenšují rozměry ΔSTQ (např. $\Delta x \rightarrow 0$).

Směrnicí tečny: $k_t = \lim_{S \rightarrow T} k_s = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$

Směrnicová rovnice tečny t je pak

$$t: y = k_t x + q$$

Derivace funkce f v bodě x_0 je tedy $f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ (čteme: limita podílu

přírůstku funkční hodnoty a přírůstku argumentu za předpokladu, že se přírůstek argumentu blíží k nule).

Derivace funkce v intervalu: Má-li funkce $f: y = f(x)$ v každém bodě x jisté množiny M derivaci $f'(x)$, pak funkci $f': y = f'(x)$ nazýváme derivací funkce f na množině M .

Derivace některých elementárních funkcí:

funkce	její derivace v bodě x	x z intervalu
$y = x^n, n \in \mathbf{N}$	$y = n \cdot x^{n-1}$	$(-\infty; \infty)$
$y = x^k, k \in \mathbf{Z}$	$y = k \cdot x^{k-1}$	$(-\infty; 0) \cup (0; \infty)$
$y = x^r, r \in \mathbf{R}$	$y = r \cdot x^{r-1}$	$(0; \infty)$
$y = c$	$y = 0$	$(-\infty; \infty)$
$y = \sin x$	$y = \cos x$	$(-\infty; \infty)$
$y = \cos x$	$y = -\sin x$	$(-\infty; \infty)$
$y = \operatorname{tg} x$	$y = \frac{1}{\cos^2 x}$	$\left(-\frac{\pi}{2} + k\pi; \frac{\pi}{2} + k\pi\right), k \in \mathbf{Z}$
$y = \operatorname{cotg} x$	$y = -\frac{1}{\sin^2 x}$	$(k\pi; (k+1)\pi), k \in \mathbf{Z}$
$y = e^x$	$y = e^x$	$(-\infty; \infty)$
$y = a^x, a > 0, a \neq 1$	$y = a^x \cdot \ln a$	$(-\infty; \infty)$
$y = \ln x$	$y = \frac{1}{x}$	$(0; \infty)$
$y = \log_a x, a > 0, a \neq 1$	$y = \frac{1}{x \cdot \ln a}$	$(0; \infty)$

Základní pravidla pro derivování:

1. $(f \pm g)'(x) = f'(x) \pm g'(x)$... derivace součtu (rozdílu) se rovná součtu (rozdílu) derivací
2. $(cf)'(x) = c \cdot f'(x)$ konstanta se „vynáší“ před znak derivace
3. $(fg)'(x) = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$ $(uv)' = u'v + uv'$
4. $\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{g^2(x)}$ $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}$
5. derivace složené funkce: $[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

Zvládnutí derivování elementárních funkcí a funkcí složených, a také zvládnutí používání základních pravidel pro derivování, představuje „abecedu“ celého diferenciálního počtu. Tomuto cíli musí učitel přizpůsobit obsah vyučovacích hodin, během nichž důkladným procvičováním dosáhne u studentů dostatečné obratnosti a jistoty ve výpočtech derivací. Jako první úlohu může zařadit ukázkou výpočtu derivace některé elementární funkce na základě definice:

Př.1: Necht' je dána funkce $f: y = x^2$. Vypočítejte její derivaci v libovolném bodě x .

Řeš.: $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x+\Delta x)^2 - x^2}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2x \cdot \Delta x + (\Delta x)^2 - x^2}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (2x + \Delta x) = 2x$;

Př.2: Necht' je dána funkce $f: y = \sin x$. Vypočítejte její derivaci v libovolném bodě x .

Řeš.: $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin(x+\Delta x) - \sin x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin x \cdot \cos \Delta x + \sin \Delta x \cdot \cos x - \sin x}{\Delta x} =$
 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin \Delta x}{\Delta x} \cdot \cos x = \cos x$

Příklad prověrky, kterou by studenti měli bez větších problémů zvládnout po zmíněném důkladném procvičení, než se přejde k dalším typům úloh na využití derivací:

A	B
Derivujte:	Derivujte:
1. $y = \frac{\sin(-x)}{\log 7}$	1. $y = \frac{\cos(-3x)}{\sin \frac{\pi}{6}}$
2. $y = x^5 \cdot e^3 + \cot g 2$	2. $y = \ln^5 x^4 + \log \pi$
3. $y = \frac{1}{\cos(-5x^3 + x^2)}$	3. $y = \sqrt{x^5 + 9x^3}$
4. $y = x^{\cot g \frac{\pi}{6}}$	4. $y = x^{\operatorname{tg} \frac{\pi}{15}}$
5. $y = x \cdot \ln 2 + \log 20$	5. $y = x^2 \cdot \operatorname{tg} \frac{\pi}{6} + \log x^5$
6. $y = 2^x \cdot \cot g(8x)$	6. $y = e^x \cdot \sin^4 x^5$
7. $y = \frac{\operatorname{tg}^5(2x^3 + x^7)}{\ln 3x}$	7. $y = \frac{\operatorname{tg}(4x^5 + \cot gx)}{\sqrt{x^3}}$
8. $y = e^{\log^3 x^5}$	8. $y = 5^{\ln x^7} \cdot (x^4 - 3)$

Znalost derivování si studenti mohou procvičit a souvislost derivace funkce a směrnice tečny upevnit na příkladech zabývajících se tečnami grafů funkcí:

Př.3: Napište obecnou rovnici tečny ke grafu funkce $f: y = f(x)$ v bodě T.

a) $f: y = x^2 - 2x, T[4; ?];$

b) $f: y = \frac{\sin 2x + 1}{\cos x + \sin x}, T\left[\frac{\pi}{2}; ?\right]$

Řeš.:

a) Tečna obecně ... $t: y = kx + q$, kde $k = y' = f'(x) = 2x - 2$.

Směrnice tečny v bodě T ... $k_T = f'(4) = 2 \cdot 4 - 2 = 6$.

Pro určení q musíme vypočítat y -ovou souřadnici T: $y_T = 4^2 - 2 \cdot 4 = 8 \Rightarrow T[4; 8]$.

$T \in t \dots 8 = 6 \cdot 4 + q \Rightarrow q = 8 - 24 = -16$.

Směrnice rovnice tečny ... $t: y = 6x - 16$.

Obecná rovnice tečny ... $t: 6x - y - 16 = 0$.

b) Tečna obecně ... $t: y = kx + q$, kde $k = y' = \frac{2 \cdot \cos 2x \cdot (\cos x + \sin x) - (\sin 2x + 1) \cdot (-\sin x + \cos x)}{(\cos x + \sin x)^2}$

$= \frac{2 \cdot (\cos^2 x - \sin^2 x) \cdot (\cos x + \sin x) - (\sin^2 x + 2 \sin x \cos x + \cos^2 x) \cdot (\cos x - \sin x)}{(\cos x + \sin x)^2} =$

$\frac{2 \cdot (\cos x + \sin x)^2 \cdot (\cos x - \sin x) - (\cos x + \sin x)^2 \cdot (\cos x - \sin x)}{(\cos x + \sin x)^2} = \frac{(\cos x + \sin x)^2 \cdot (\cos x - \sin x)}{(\cos x + \sin x)^2} = \cos x - \sin x$.

Směrnice tečny v bodě T ... $k_T = f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = \cos \frac{\pi}{2} - \sin \frac{\pi}{2} = 0 - 1 = -1$.

Pro určení q musíme vypočítat y -ovou souřadnici T: $y_T = \frac{\sin 2 \cdot \frac{\pi}{2} + 1}{\cos \frac{\pi}{2} + \sin \frac{\pi}{2}} = 1 \Rightarrow T\left[\frac{\pi}{2}; 1\right]$.

$T \in t \dots 1 = -\frac{\pi}{2} + q \Rightarrow q = 1 + \frac{\pi}{2}$.

Směrnice rovnice tečny ... $t: y = -x + 1 + \frac{\pi}{2}$.

Obecná rovnice tečny ... $t: 2x + 2y - \pi - 2 = 0$.

Př.4: Vypočítejte směrový úhel tečny vedené ke grafu funkce průsečíkem grafu s osou x .

a) $f: y = -x^2 + 2x$;

b) $f: y = \ln x$;

Průsečíky s osou x jsou dva: $P_{x1}[0; 0], P_{x2}[2; 0]$. Každým z nich lze vést jednu tečnu, jejíž směrnice $k = y' = -2x + 2$.

$t_1: y = k_1x + q_1, \text{ kde } k_1 = \text{tg}\varphi_1 = y'(0) = -2 \cdot 0 + 2 = 2 \Rightarrow \varphi_1 = 63^\circ 26'$;

$t_2: y = k_2x + q_2, \text{ kde } k_2 = \text{tg}\varphi_2 = y'(2) = -2 \cdot 2 + 2 = -2 \Rightarrow \varphi_2 = 116^\circ 34'$.

b) P_x -? $y = 0 \Rightarrow \ln x = 0 \Rightarrow x = 1 \Rightarrow P_x[1; 0]$ je jediný průsečík s osou x . Tímto průsečíkem lze vést jedinou tečnu, jejíž směrnice $k = y' = \frac{1}{x}$.

$t: y = kx + q, \text{ kde } k = \text{tg}\varphi = y'(1) = \frac{1}{1} = 1 \Rightarrow \varphi = 45^\circ$.

Př.5: Na grafu funkce $f: y = 2x^2 + x - 1$ určete bod T tak, aby tečna vedená tímto bodem byla

a) rovnoběžná s přímkou $p: x - y + 10 = 0$;

b) kolmá k přímce $q: 3x + y - 1 = 0$.

Řeš.: a) tečna $t \parallel p \Rightarrow k_t = f'(x) = \frac{4x + 1}{x_T} = k_p = 1$ ($p: y = x + 10$)

$x_T = 0 \Rightarrow y_T = 2 \cdot 0^2 + 0 - 1 = -1$.

$T[0; -1]$;

b) tečna $t \perp q \Rightarrow t \parallel q': x - 3y + m = 0 \Rightarrow k_t = f'(x) = \frac{4x + 1}{x_T} = k_{q'} = \frac{1}{3}$

($q': y = \frac{1}{3}x + \frac{m}{3}$)


$x_T = -\frac{1}{6} \Rightarrow$

$\Rightarrow y_T = 2 \cdot \left(-\frac{1}{6}\right)^2 - \frac{1}{6} - 1 = -\frac{10}{9}$. $T\left[-\frac{1}{6}; -\frac{10}{9}\right]$.

Souvislost derivace funkce a některých základních vlastností funkce:

(Stále je třeba si uvědomovat, že derivace funkce je vlastně směrnice tečny grafu funkce a učitel může využít následující obrázek, aby upozornil studenty na to, jak informace o polohách tečen grafu v konkrétních bodech určuje (napovídá) průběh grafu funkce!!!)

- **Spojitosť** funkce: Má-li funkce f v bodě a derivaci, pak je v tomto bodě spojitá. Obrácená věta ale neplatí! Funkce může být v bodě a spojitá a nemusí tam mít derivaci. (viz např. P₁₁, P₁₂, P₁₃)
- **Monotónnost** funkce: Má-li funkce f v bodě a kladnou (zápornou) první derivaci, pak je v tomto bodě rostoucí (klesající). (viz např. P₁, P₅, P₆, P₁₀, (P₃, P₇, P₉)). Obrácená věta ale neplatí! Funkce může být v bodě a rostoucí (klesající) a derivace v bodě a se může rovnat nule (viz. např. P₈) nebo dokonce vůbec nemusí existovat. (viz např., P₁₁, P₁₂, P₁₃)
- **Extrémy** funkce: Funkce f může (ale nemusí!!) mít v bodě a lokální extrém pouze tehdy, když $f'(a) = 0$ (pak a je stacionární bod) (viz např. P₂, P₄) nebo když derivace v bodě a neexistuje (viz např. P₁₂, P₁₃). Uvedené podmínky pro existenci extrému v bodě a jsou nutné, nikoliv však postačující. Tozn., že podmínka může být splněna a funkce v bodě a přesto extrém nemá (viz např. P₈, P₁₁). Ověření existence extrému funkce v daném bodě je třeba provést buď za pomoci intervalů monotónnosti nebo za pomoci vyšších derivací funkce.
- **Konvexnost a konkávnost** funkce: Má-li funkce f v bodě a druhou derivaci $f''(a) > 0$, pak je funkce v bodě a konvexní (dutá). Je-li $f''(a) < 0$, pak je funkce v bodě a konkávní (vypuklá). Body, ve kterých $f''(a) = 0$ a ve kterých se zároveň mění konvexní charakter funkce na konkávní či naopak, jsou inflexní body.



Než učitel naučí studenty vyšetřovat celý a kompletní průběh funkce, měli by se studenti na několika příkladech naučit zpracovávat jednotlivé fáze této náročné úlohy:

1. Monotónnost a extrémy funkce:

Př.6: Rozhodněte o typu monotónnosti funkce f v daném bodě x :

a) $f: y = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - 3x, \quad x = -2;$

b) $f: y = 2 \sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) \quad x = \frac{\pi}{4};$

Řeš.: a) $y' = x^2 + x - 3, \quad y'(-2) = (-2)^2 + (-2) - 3 = -1 < 0 \Rightarrow f$ je v $x = -2$ **KLESAJÍCÍ**;

b) $y' = 4 \cos\left(2x - \frac{\pi}{4}\right), \quad y'\left(\frac{\pi}{4}\right) = 4 \cos\left(2 \cdot \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4}\right) = 4 \cos \frac{\pi}{4} = 4 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2} > 0 \Rightarrow$


$\Rightarrow f$ je v $x = \frac{\pi}{4}$ **ROSTOUCÍ**;

Př.7: Určete intervaly monotónnosti a extrémy dané funkce:

a) $f: y = \frac{1}{40} \cdot (3x^4 - 4x^3 - 36x^2);$

b) $f: y = \frac{x^2 - 3x + 2}{x};$

Řeš.: a) $y' = \frac{1}{40} \cdot (12x^3 - 12x^2 - 72x) = \frac{12}{40} \cdot x(x^2 - x - 6) = \frac{3}{10} \cdot x \cdot (x + 2)(x - 3)$



Funkce f je **klesající** v intervalech $(-\infty; -2)$ a $(0; 3)$.


Funkce f je **rostoucí** v intervalech $(-2; 0)$ a $(3; \infty)$.

V bodě $x = -2$ má funkce **lokální minimum** ... $A \left[-2; -\frac{8}{5}\right]$.

V bodě $x = 0$ má funkce **lokální maximum** ... $B[0; 0]$.

V bodě $x = 3$ má funkce **lokální minimum** ... $C \left[3; -\frac{189}{40}\right]$.

$$b) y' = \frac{(2x-3) \cdot x - (x^2+3x-2)}{x^2} = \frac{x^2-2}{x^2} = \frac{(x+\sqrt{2}) \cdot (x-\sqrt{2})}{x^2}$$



Funkce f je rostoucí v intervalech $(-\infty; -\sqrt{2})$ a $(\sqrt{2}; \infty)$.

Funkce f je klesající v intervalech $(-\sqrt{2}; 0)$ a $(0; \sqrt{2})$.

V bodě $x = -\sqrt{2}$ má funkce lokální maximum ... $A[-\sqrt{2}; 2\sqrt{2} + 3]$.


V bodě $x = \sqrt{2}$ má funkce lokální minimum ... $B[\sqrt{2}; 2\sqrt{2} - 3]$.

2. Konvexnost a konkávnost funkce:

Př.8: Určete intervaly konvexnosti a konkávnosti funkce: $f: y = x^4 - 6x^2 + 8$.

Řeš.: 1. první derivace: $y' = 4x^3 - 12x$;

2. druhá derivace: $y'' = 12x^2 - 12 = 12 \cdot (x + 1) \cdot (x - 1)$;



Funkce f je konvexní v intervalech $(-\infty; -1)$ a $(1; \infty)$.

Funkce f je konkávní v intervalu $(-1; 1)$.

Funkce f má v bodech $x = -1$ a $x = 1$ dva inflexní body ... $D[-1; 3]$ a $E[1; 3]$.

3. Asymptoty grafu funkce:

Př.9: Je dána funkce $f: y = \frac{1}{(1-x)^3}$. Určete všechny asymptoty jejího grafu.

Řeš.: 1. Asymptoty bez směrnice: Jediným bodem nespojitosti funkce f je $x = 1$.

Asymptota bez směrnice existuje v bodě nespojitosti právě tehdy, jeli alespoň jedna z jednostranných limit v tomto bodě nevlastní.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{(1-x)^3} = \frac{1}{0^+} = +\infty;$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{(1-x)^3} = \frac{1}{0^-} = -\infty;$$

Asymptota bez směrnice: $a_b: x = 1$

2. Asymptoty se směrnici: $a_s: y = kx + q$

$$k = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{(1-x)^3 \cdot x} = 0;$$

$$q = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - kx) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - 0 \cdot x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{(1-x)^3} = 0;$$

Asymptota se směrnici: $a_s: y = 0$

Osnova pro vyšetření průběhu funkce $f: y = f(x)$:

1. $D(f)$, sudost, lichost, periodičnost, průsečíky s osami, intervaly kladných a záporných funkčních hodnot
2. Chování funkce f v nevlastních bodech (určení $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$),


určení asymptot (pokud existují)

- **bez směrnice** asymptota a_b bez směrnice může existovat pouze v bodě nespojitosti b , a to tehdy, jestliže alespoň jedna z jednostranných limit v b je nevlastní. Pak **$a_b: x = b$** .

- **se směrnici** **$a_s: y = kx + q$** , kde **$k = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x}$** , **$q = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - kx)$**

3. Určení intervalů monotónnosti a extrémů funkce (užití první derivace funkce)
4. Určení intervalů konvexnosti a konkávnosti a inflexních bodů funkce (užití druhé derivace funkce)
5. Graf funkce

Pozn. k asymptotám se směrnici:



Je-li a_s asymptota, pak se pro $x \rightarrow \infty$ **přímka a_s** a **křivka f** , (tedy **$kx + q$** a **$f(x)$**) neomezeně přibližují. Proto:

$$1) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{kx+q} = 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} \cdot \frac{1}{k + \frac{q}{x}} = \frac{1}{k} \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 1.$$

Tozn., že **$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = k$** .


$$2) \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} (kx + q) = \lim_{x \rightarrow \infty} kx + q.$$

Tozn., že **$q = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) - \lim_{x \rightarrow \infty} kx = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - kx)$** .

Analogicky pro asymptotu při $x \rightarrow -\infty$.

Př.10: Vyšetřete průběh funkce: $f: y = \frac{x^3}{(x-1)^2}$.

- Řeš.: ① a) **$D(f) = R - \{1\}$** ; b) Funkce f není **ani sudá ani lichá** ... ~~S~~ , ~~L~~ ;
 c) Průsečíky s osami souřadnic: **$P_x = P_y [0; 0]$** ;
 d) Intervaly kladných a záporných funkčních hodnot:



$$\textcircled{2} \text{ a) } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3}{(x-1)^2} = \left[\frac{x^3}{x^2 \cdot \left(1 - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}\right)} \right] = \lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty;$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{(x-1)^2} = \left[\frac{x^3}{x^2 \cdot \left(1 - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}\right)} \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} x = +\infty;$$

b) Asymptoty:

1. bez směrnic ... bod nespojitosti: $x = 1$.

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^3}{(x-1)^2} &= \frac{1}{0^+} = +\infty; \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^3}{(x-1)^2} &= \frac{1}{0^+} = +\infty; \end{aligned} \right\} \boxed{a_b \dots x = 1}$$

2. se směrnicí ... $y = kx + q$;

$$k = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \left[\frac{x^3}{x^3 - 2x^2 + x} \right] = 1;$$


$$q = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - kx) = \left[\frac{x^3}{(x-1)^2} - x = \frac{x^3 - x^3 + 2x^2 - x}{(x-1)^2} \right] = 2;$$

$$\boxed{a_s \dots y = x + 2}$$

$$\textcircled{3} \quad y' = \frac{3x^2 \cdot (x-1)^2 - x^3 \cdot 2(x-1)}{(x-1)^4} = \frac{(x-1) \cdot (3x^3 - 3x^2 - 2x^3)}{(x-1)^4} = \frac{x^3 - 3x^2}{(x-1)^3} = \frac{x^2 \cdot (x-3)}{(x-1)^3};$$

■ y' neexistuje pro $x = 1$, ale $1 \notin D(f)$;


■ $y' = 0 \Leftrightarrow \boxed{x = 0 \vee x = 3 \dots \text{stacionární body}}$



V bodě $x = 3$ má funkce **lokální minimum** ... $A \left[3; \frac{27}{4} \right]$;


$$\textcircled{4} \quad y'' = \left[\frac{x^3 - 3x^2}{(x-1)^3} \right]' = \frac{(3x^2 - 6x) \cdot (x-1)^3 - (x^3 - 3x^2) \cdot 3 \cdot (x-1)^2}{(x-1)^6} = \frac{(x-1)^2 \cdot 6x}{(x-1)^6} = \frac{6x}{(x-1)^4};$$

■ $y'' = 0 \Leftrightarrow \boxed{x = 0 \dots \text{kritický bod}}$



V bodě $x = 0$ je **inflexní bod** ... $B[0; 0]$.

⑤ Graf:



Slovní úlohy řešené užitím derivací:

U slovních úloh jde o to, abychom na základě zadaných parametrů vztahujících se k nějakému ději, který musíme pro účely řešení matematizovat do podoby vhodné funkce f , našli hodnotu veličiny, případně několika veličin, pro které uvedená funkce f nabude extrémní, tedy buď maximální nebo minimální, hodnoty.

Abychom byli v řešení slovní úlohy úspěšní, musíme provést přehledný zápis, ve kterém jasně určíme:

Zadané veličiny:

Hledané veličiny: je-li jich více, musíme všechny vyjádřit pomocí jedné z nich a pomocí veličin zadaných

Funkci, u které budeme hledat extrém:

Pozn. 1: V zadání každé úlohy je vždy naprosto jasně řečeno, jaká veličina má být maximální nebo minimální –

- např.: 1) „...určete rozměry ... tak, aby **objem** byl maximální ...“,
- 2) „...určete rozměry ... tak, aby **povrch** byl minimální ...“,
- 3) „... určete čísla ... tak, aby jejich **součin** byl maximální ...“ , ...

Učitel by měl na začátku projít se studenty v některé sbírce úloh pár zadání příkladů a vyzvat studenty, aby rychle v textu našli funkci, u níž budou hledat extrém. Zbaví je tím obav, že pro ně bude obtížné správnou funkci najít.

Pozn. 2: Hledání extrémů funkce f se samozřejmě provádí za pomoci určení první derivace funkce, určení bodů, ve kterých první derivace neexistuje a především určení stacionárních bodů, ve kterých je první derivace rovna nule. Protože nás však u těchto praktických úloh vůbec nezajímá průběh funkce f , nýbrž pouze body, v nichž má extrém, můžeme místo intervalů monotónnosti použít následující tvrzení:

**Nechť $f'(x_0) = 0$, $f''(x_0) = f'''(x_0) = \dots = f^{n-1}(x_0) = 0$,
ale $f^n(x_0) \neq 0$.**

Je-li n – sudé číslo, pak má f v x_0 lokální extrém, a to:

- **maximum**, když $f^n(x_0) < 0$;
- **minimum**, když $f^n(x_0) > 0$.




Je-li n – liché číslo, pak f v x_0 lokální extrém nemá.

Studenti si nepochybně použití posledního tvrzení k určení extrémů funkce lépe zapamatují, jestliže jim učitel ukáže, jak tvrzení funguje na následujících třech jednoduchých funkcích:

f: $y = x^4$
 $y' = 4x^3$
 stac. bod ... 0
 $y'' = 12x^2, \quad y''(0) = 0$
 $y''' = 24x, \quad y'''(0) = 0$
 $y^{IV} = 24 > 0$
 První od nuly různá derivace je čtvrtá, tedy **sudá**, pro bod $x = 0$ je **kladná**, proto má funkce f v tomto bodě **minimum**.

g: $y = x^3$
 $y' = 3x^2$
 stac. bod ... 0
 $y'' = 6x, \quad y''(0) = 0$
 $y''' = 6$
 První od nuly různá derivace je třetí, tedy **lichá**, proto funkce g v tomto bodě **extrém nemá**.

h: $y = -x^2$
 $y' = -2x$
 stac. bod ... 0
 $y'' = -2 < 0$
 První od nuly různá derivace je druhá, tedy **sudá**, pro bod $x = 0$ je **záporná**, proto má funkce h v tomto bodě **maximum**.




Př.11: Určete stranu čtverců, které musíme vyříznout ve všech rozích obdélníkového kartonu o rozměrech 80 cm a 50 cm tak, aby po složení vznikla krabice maximálního objemu.

Řeš.: **Dáno:** rozměry obdélníku: $m = 80 \text{ cm}, n = 50 \text{ cm}$;

Hledáme: x ... strana čtverce ;

Funkce, u níž určujeme extrém: **Objem kvádru $V = abc$** ;



$$V = abc = (80 - 2x) \cdot (50 - 2x) \cdot x$$

$$f: y = V = 4x^3 - 260x^2 + 4000x$$

$$y' = 12x^2 - 520x + 4000 = 4 \cdot (3x^2 - 130x + 1000)$$

$$y' = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 130x + 1000 = 0 \Leftrightarrow \text{red box} \vee \text{red box}$$

Kořen $33, \bar{3}$ nepřichází v úvahu vzhledem k zadaným rozměrům kartonu. Proto budeme dál pracovat pouze s kořenem $x = 10$.


Ověříme pomocí vyšších derivací, že pro $x = 10$ nabude funkce f maxima:

$$y'' = 24x - 520, \quad y''(10) = 240 - 520 = -280 < 0 \Rightarrow \text{v bodě } x = 10 \text{ je maximum.}$$

Pozn.: Ve zvědavé třídě může učitel očekávat dotaz (nebo jej může v případě dostatku času položit sám): Jak s řešením úlohy souvisí druhý kořen $x = \frac{100}{3} = 33, \bar{3}$?

Aby neztrácel příliš mnoho času, měl by být učitel na tuto situaci připraven:

$$1) \text{ Graf funkce } f: y = 4x^3 - 260x^2 + 4000x = 4x \cdot (x^2 - 65x + 1000) = 4x \cdot (x - 25)(x - 40)$$




2) Hledaná délka strany čtverce x evidentně musí ležet v $(0; 25)$. Stacionární bod $x = \frac{100}{3}$ leží mimo tento interval, ale kubická funkce f v něm má minimum.

Př.12: Do koule daného poloměru ($R = 30 \text{ cm}$) vepište kužel maximálního objemu. Určete poloměr podstavy a výšku kužele.

Řeš.: **Dáno:** koule s poloměrem R ;

Hledáme: poloměr podstavy r a výšku v vepsaného kužele (dvě neznámé – jednu musíme vyjádřit pomocí druhé, případně pomocí zadané veličiny R ;



$$\begin{aligned} \Delta AOS: r^2 + (v - R)^2 &= R^2 \\ r^2 + v^2 - 2Rv + R^2 &= R^2 \\ r^2 &= 2Rv - v^2 \end{aligned}$$

Funkce, u níž určujeme extrém: **Objem kužele** $V = \frac{1}{3} \pi r^2 v$;

$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 v = \frac{1}{3} \pi (2Rv - v^2) v$$

$$f: y = V = \frac{2\pi R v^2}{3} - \frac{\pi v^3}{3}$$

$$y' = \frac{4\pi R v}{3} - \pi v^2 = \pi v \cdot \left(\frac{4R}{3} - v \right)$$

$$y' = 0 \Leftrightarrow \text{red box} \vee \text{red box}$$

Pro řešení úlohy má evidentně význam pouze druhý kořen.

Ověříme pomocí vyšších derivací, že pro $v = \frac{4R}{3}$ nabude funkce f maxima.

$$y'' = \frac{4\pi R}{3} - 2\pi v, \quad y'' \left(\frac{4R}{3} \right) = \frac{4\pi R}{3} - 2\pi \cdot \frac{4R}{3} = -\frac{5R}{3} < 0 \Rightarrow \text{pro } v = \frac{4R}{3} \text{ má } f \text{ maximum.}$$

Nakonec dopočítáme druhý požadovaný rozměr:

$$r^2 = 2Rv - v^2 = 2R \cdot \frac{4R}{3} - \frac{16R^2}{9} = \frac{8R^2}{9} \Rightarrow r = + \frac{2R\sqrt{2}}{3};$$

Poloměr podstavy kužele je $r = + \frac{2R\sqrt{2}}{3}$ ($r = 20\sqrt{2} \text{ cm}$), výška kužele $v = \frac{4R}{3}$ ($v = 40 \text{ cm}$).

Derivace funkce zadané implicitně:

Funkce může být zadaná

- explicitně (přímo, tedy rovnicí $f: y = f(x)$)
- **implicitně** (nepřímo, zastřeně, zprostředkovaně) – např. pomocí analytického vyjádření křivky $F(x, y) = 0$, která sama nemusí být grafem funkce, ale může představovat sjednocení grafů několika funkcí f_i (viz např. kuželosečky).

Derivování implicitní funkce:

x ... známým způsobem

y ... jako složenou funkci závisící na x

$$(\text{např.: } (y^3 + x^2 + 7)' = 3y^2 \cdot y' + 2x)$$

Př.13: Napište rovnici tečny křivky $k: x^2 + y^2 - 6x + 24y + 53 = 0$ v jejím bodě $T[9; -4]$.

Řeš.: $t: y = kx + q, \quad k = y'$

$$2x + 2yy' - 6 + 24y' = 0 \quad /:2$$

$$yy' + 12y' = 3 - x$$

$$y' = \frac{3-x}{y+12}$$

$$y'(T) = \frac{3-9}{-4+12} = -\frac{3}{4}$$

$$t: y = -\frac{3}{4}x + q$$

$$T \in t \Rightarrow -4 = -\frac{3}{4} \cdot 9 + q \Rightarrow q = -4 + \frac{27}{4} = \frac{11}{4}$$

$$t: y = -\frac{3}{4}x + \frac{11}{4}$$

$$t: 3x + 4y - 11 = 0$$

Př.14: Kterým bodem elipsy $E: 4(x-1)^2 + y^2 = 1$ je vedena tečna, která svírá s kladnou poloosou x úhel $\varphi = 45^\circ$?

Řeš.: $t: y = kx + q, \quad k = y' = \operatorname{tg} \varphi$

$$8(x-1) + 2yy' = 0$$

$$y' = \frac{y}{4(x-1)} = \operatorname{tg} 45^\circ = 1$$

$$y = 4(x-1)$$

$$E: 4(x-1)^2 + [4(x-1)]^2 = 1$$

$$20x^2 - 40x + 19 = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{40 \pm \sqrt{1600 - 1520}}{40} = \frac{10 \pm \sqrt{5}}{10}$$

$$x_1 = \frac{10 - \sqrt{5}}{10} \Rightarrow y = -\frac{2\sqrt{5}}{5} \Rightarrow T_1 \left[\frac{10 - \sqrt{5}}{10}; -\frac{2\sqrt{5}}{5} \right];$$

$$x_2 = \frac{10 + \sqrt{5}}{10} \Rightarrow y = \frac{2\sqrt{5}}{5} \Rightarrow T_2 \left[\frac{10 + \sqrt{5}}{10}; \frac{2\sqrt{5}}{5} \right].$$

Fyzikální význam derivace:

Jednou z nejdůležitějších oblastí použití derivace ve fyzice je derivace podle časové proměnné vyjadřující **rychlost změny nějaké proměnné v čase**.

Např. rychlost je derivace dráhy podle času;
zrychlení je derivace rychlosti podle času; ...

Př.15: Kámen vyhozený z výšky $h = 10 \text{ m}$ svisle vzhůru má počáteční rychlost $v_0 = 20 \frac{\text{m}}{\text{s}}$.

a) Jakou rychlost bude mít kámen v čase 1,5 s?

b) Za jaký čas dosáhne maximální výšku?

c) Jakou výšku kámen dosáhne?

Řeš.: a) $s = h + v_0 t - \frac{gt^2}{2}$

$$s = 10 + 20t - 5t^2$$

$$v = s' = \frac{ds}{dt} = 20 - 10t$$

$$v(1,5) = (20 - 10 \cdot 1,5) \frac{\text{m}}{\text{s}} = 5 \frac{\text{m}}{\text{s}};$$

b) výška bude maximální $\Leftrightarrow v = 0 \frac{\text{m}}{\text{s}} \Rightarrow 20 - 10t = 0 \Rightarrow t = 2 \text{ s};$

c) $H = s(2) = (10 + 20 \cdot 2 - 5 \cdot 2^2) \text{ m} = 30 \text{ m}.$

Rychlost kamene v čase 1,5 s je $5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$. Maximální výšku 30 m dosáhne za $2 \text{ s}.$

Př.16: Těleso sjede po nakloněné rovině 50 m dlouhé za 10 s. Jaká je jeho konečná rychlost, pokud předpokládáme, že dráha je kvadratickou funkcí času a že počáteční rychlost je nulová?

Řeš.: $s = at^2 + bt + c$

$$v = s' = \frac{ds}{dt} = 2at + b$$

$$s(0) = 0 \text{ m} \Rightarrow c = 0$$

$$v(0) = 0 \Rightarrow b = 0$$

$$s \dots 50 = a \cdot 10^2 + 0 \cdot 10 + 0 \Rightarrow a = \frac{1}{2}$$

Závislost dráhy na čase: $s = \frac{1}{2}t^2$;

Konečná rychlost: $v = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot t = 2 \cdot 0,5 \cdot 10 \frac{\text{m}}{\text{s}} = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$.

Konečná rychlost tělesa je $10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$.

Př.17: Rychlík jedoucí rychlostí $90 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ má zabrzdit tak, aby se rovnoměrně zpomaleným pohybem zastavil na vzdálenost 1 km. Po jakém čase zastaví?

Řeš.: $v_0 = 90 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 25 \frac{\text{m}}{\text{s}}$; $s = 1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$;

$$s = v_0 t - \frac{a}{2} t^2 = 25t - \frac{a}{2} t^2; \quad v = s' = 25 - at = 0 \Rightarrow a = \frac{25}{t};$$

$$s = 25t - \frac{25}{2t} t^2 = 12,5t \Rightarrow 1000 = 12,5t \Rightarrow t = \frac{1000}{12,5} \text{ s} = 80 \text{ s};$$

Rychlík zastaví za 80 s .

Př.18: Množství elektrického náboje Q , který prochází vodičem, se mění s časem podle vztahu: $Q = 3t^2 + 2t + 2$. a) Vypočítejte okamžitou hodnotu proudu i v době $t = 1 \text{ s}$.
b) Vypočítejte, kdy bude hodnota okamžitého proudu $i = 20 \text{ A}$.

Řeš.: $Q = 3t^2 + 2t + 2$

$$i = Q' = \frac{dQ}{dt} = 6t + 2$$

a) $i(1) = (6 \cdot 1 + 2) \text{ A} = 8 \text{ A}$;

b) $20 = 6t + 2$

$$6t = 18$$

$$t = 3 \text{ s}.$$

V čase 1 s je okamžitá hodnota proudu 8 A . Hodnoty 20 A bude dosaženo za 3 s .

Př.19: V indukční cívce s indukčností $L = 0,03 \text{ H}$ protéká proud $i = 15 \sin^5(3t)$.

Vypočtete indukované napětí v čase $t = \frac{2\pi}{9} \text{ s}$.

Řeš.: $u = -L \cdot \frac{di}{dt}$;

$$\frac{di}{dt} = 15 \cdot 5 \cdot \sin^4(3t) \cdot \cos(3t) \cdot 3 = 225 \cdot \sin^4(3t) \cdot \cos(3t);$$

$$u\left(\frac{2\pi}{9}\right) = \left[-0,03 \cdot 225 \cdot \sin^4\left(3 \cdot \frac{2\pi}{9}\right) \cdot \cos\left(3 \cdot \frac{2\pi}{9}\right)\right] V = \left[-0,03 \cdot 225 \cdot \sin^4 \frac{2\pi}{3} \cdot \cos \frac{2\pi}{3}\right] V =$$

$$= \left[-6,75 \cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^4 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)\right] V = 1,9 \text{ V}.$$

Okamžitá hodnota indukovaného napětí je $1,9 \text{ V}$.

Př.20 Těleso koná harmonický kmitavý pohyb a pro jeho výchylku z rovnovážné polohy platí $y = y_m \cdot \sin(\omega t)$, kde y_m je amplituda výchylky a ω je úhlová frekvence pohybu. Odvodte vzorec pro výpočet rychlosti a zrychlení harmonického kmitavého pohybu.

Řeš.: $y = y_m \cdot \sin(\omega t)$;

$$v = y' = \frac{dy}{dt} = y_m \cdot \omega \cdot \cos(\omega t);$$

$$a = v' = \frac{dv}{dt} = -y_m \cdot \omega^2 \cdot \sin(\omega t) = -\omega^2 \cdot y .$$

Základní poznatky:

1. Určete derivace funkce (Realisticky.cz – 10.2.7):

$$\text{a) } y' = \left(\frac{3}{3x-1}\right)'; \quad \text{b) } y' = [\cos(3x + \pi)]'; \quad \text{c) } y' = \left[\frac{1}{(x^2+2x-3)^6}\right]'; \quad \text{d) } y' = \left(\sqrt[3]{x^2 + \cos x}\right)';$$

$$\left[-\frac{9}{(3x-1)^2}; -3 \cdot \sin(3x + \pi); -\frac{12 \cdot (x+1)}{(x^2+2x-3)^7}; \frac{1}{3} \cdot \frac{2x - \sin x}{\sqrt[3]{(x^2 + \cos x)^2}}\right]$$

2. Určete rovnici tečny a normály grafu funkce $y = \frac{1}{x}$ v bodě $[-1, -1]$.

$$[\text{Realisticky.cz – 10.2.14, } y = -x - 2, y = x]$$

Typové příklady standardní náročnosti

3. Vypočítejte derivace funkcí:

$$\text{a) } y = \sqrt[3]{x} \cdot (2x^2 + 1)$$

$$\text{b) } y = \cos^2\left(\frac{x}{2}\right) + \sqrt{1 + x^2}$$

$$\text{c) } y = \ln \sqrt{\frac{1 - \sin x}{1 + \sin x}}$$

$$\text{d) } y = \sqrt{x \cdot \sqrt{x} \cdot \sqrt{x}}$$

$$\left[y' = \frac{(14x^2 + 1) \cdot \sqrt[3]{x}}{3x}\right]$$

$$\left[y' = \frac{-\sin x}{2} + \frac{x}{\sqrt{1 + x^2}}\right]$$

$$\left[y' = \frac{-1}{\cos x}\right]$$

$$\left[y' = \frac{7 \cdot \sqrt[8]{x^7}}{8x}\right]$$

4. Vypočítejte derivace (Realisticky.cz – 10.2.8):

$$\text{a) } [\sin(e^{5x})]'$$

$$\text{b) } [2^{\cos(x^2+2x)}]'$$

$$\text{c) } [e^{\sin^2 x}]'$$

$$[y' = 5 \cdot e^{5x} \cdot \cos e^{5x}; y' = -(2x + 2) \cdot \sin(x^2 + 2x) \cdot 2^{\cos(x^2+2x)} \cdot \ln 2; y' = e^{\sin^2 x} \cdot \sin 2x]$$

5. Určete rovnici tečny grafu funkce $f: y = x^2 - 2x + 3$, která je rovnoběžná s přímkou

$$p: 3x - y + 5 = 0.$$

$$\left[t: 12x - 4y - 13 = 0, T\left[\frac{5}{2}; \frac{17}{4}\right]\right]$$

6. Určete rovnici tečny ke křivce $y^2 + 3x + 4y - 7 = 0$, v bodě $T[-8, 4]$.

$$[t: x + 4y - 8 = 0]$$

7. Do koule o poloměru R vepište kužel maximálního objemu. Určete výšku tohoto kužele.

$$\left[v = \frac{4}{3}r \right]$$

8. Ze čtvrtky kartonu formátu A4 (210 x 297 mm) vystřihněte v rozích čtyři stejné čtverečky tak, aby složením vzniklého obrazce vznikla krabice maximálního objemu.

[Realisticky.cz – 10.2.15: Je nutné vystřihnout čtverce o straně 40,4 mm.]

9. Určete ideální rozměry válcové pивní plechovky, která při objemu 0,5 l bude mít minimální povrch (minimální spotřeba plechu).

$$\left[\text{Realisticky.cz} - 10.2.15: r = \sqrt[3]{\frac{V}{\pi}}, r = v \right]$$

10. Vyšetřete průběh funkce: a) $f: y = x^4 - 2x^2$; b) $f: y = \frac{x-1}{(x-2)^2}$

Rozšiřující cvičení

11. Určete rovnice tečen křivky $k: x^3y + x^2y^2 = 1 + x$ v jejích průsečících s přímkou $p: x = -1$.

$$[t_1: x + y + 1 = 0; t_2: y - 1 = 0]$$

12. Určete rovnici tečny křivky $k: x \cdot \sin y - \cos y + \cos 2y = 0$ v jejím bodě $T \left[1; \frac{\pi}{4} \right]$.

$$[t: 2 \cdot (\sqrt{2} + 1) \cdot x - 4y + \pi - 2 \cdot (\sqrt{2} + 1) = 0]$$

13. Trosečníka na voru unáší mořský proud rychlostí 7 km/h. Kolmo na směr proudu pluje obchodní loď rychlostí 30 km/h (vzhledem k povrchu Země). V jeden okamžik je námořní loď vzdálena od místa, kde se protínají jejich trajektorie 100 km a trosečník 10 km. V jaké nejmenší vzdálenosti se minou? Zachrání loď trosečníka, když předměty jeho velikosti vidí na vzdálenost 20 km?

[Realisticky.cz – 10.2.15: Minou se v minimální vzdálenosti 13 km, asi ho loď zachrání.]