



# Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin

## Jména rostlin

(stabilita i důvody změn)



Petr Bureš



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

# Kodifikace botanické nomenklatury (1867)

1. základy již v Linnéově *Philosophia botanica* (1751) v kapitole *Nomina*.





Pojmenování rostlin podléhá sofistikovanému souboru pravidel botanické nomenklatury - **nomeklatorickému kódu**

# Kodifikace botanické nomenklatury (1867)

1. základy již v Linnéově *Philosophia botanica* (1751) v kapitole *Nomina*.

2. 1867 pověřil botanický kongres v Paříži „komisi devíti“ – v jejím čele – Alphons de Candolle. = Zpracování prvního nomenklatorického kódu



Alphonse de Candolle  
1806-1893

Pojmenování rostlin podléhá sofistikovanému souboru pravidel botanické nomenklatury - **nomeklatorickému kódu**



# Kodifikace botanické nomenklatury (1867)

1. základy již v Linnéově *Philosophia botanica* (1751) v kapitole *Nomina*.

2. 1867 pověřil botanický kongres v Paříži „komisi devíti“ – v jejím čele – Alphons de Candolle. = Zpracování prvního nomenklatorického kódu

3. Nomenklatorická komise v období mezi kongresy shromažďuje podněty pro zpřesnění kódu

4. změny může schválit pouze botanický kongres, konaný ca 1x za 6 let.




Alphonse de Candolle  
1806-1893

Pojmenování rostlin podléhá sofistikovanému souboru pravidel botanické nomenklatury - **nomeklatorickému kódu**



Kód - tvoří nomenklatorická komise IAPT, mezi kongresy shromažďuje podněty pro nový kód,  
Nový kód - schvaluje botanický kongres,  
poslední kongres byl 23-29. července 2017 v Číně  
v Šen-čenu – příští bude v Brazílii  
v Rio de Janeiro 2023



Aktuální verze  
kódu vyšla o rok  
později v r. 2018



# Jména taxonů supragenerických (nadrodové úrovně)

jednoslovná, s velkým počátečním písmenem, s koncovkami, označujícími taxonomickou úroveň

taxon	latinsky	koncovka	příklad
říše	regnum	-ae	<i>Plantae</i>
podříše	subregnum	-bionta	<i>Cormobionta</i>
oddělení	divisio	-phyta	<i>Magnoliophyta</i>
třída	classis	-opsida nebo -atae	<i>Liliopsida</i>
podtřída	subclassis	-idae	<i>Liliidae</i>
řád	ordo	-ales	<i>Cyperales</i>
čeled'	familia	-aceae	<i>Cyperaceae</i>
podčeled'	subfamilia	-oidea	<i>Cyperoidea</i>

## Jméno rodu (*genus*)

podstatné jméno v jednotném čísle nebo slovo, které je za podstatné jméno považováno s velkým počátečním písmenem - např.

*Eleocharis*

# Jméno druhu (*species*)

dvouslovné (binomické)

= jméno rodu (*nomen genericum*) + druhový přívlastek (*epitheton specificum*) - např. *Viola odorata*

jméno rodové

*Viola*

*odorata*

přívlastek druhový



nejčastěji  
přídavné jméno

nebo

podstatné jméno  
v druhém pádě

Přívlastek začíná vždy malým písmenem, i když je odvozen od jména osoby.

Např. *Rubus josefianus* (Podle českého botanika Josefa Holuba)

*Minuartia SMEJKALII* (Podle moravského botanika Miroslava Smejkala)



Není-li přívlastek jednoslovny, musí být slova, která jej tvoří, spojena spojovací čárkou (spojovníkem, nikoli pomlčkou)

Např. ***Dryopteris filix-mas***

nikoli *Dryopteris filix - mas*

nebo ***Capsella bursa-pastoris***

nikoli *Capsella bursa - pastoris*



## Jména taxonů infraspecifických (nižší než druh)

Pojmenovávají se přívlastky - nelze je psát samostatně,  
Píší se jen za jménem druhu nebo jménem jiného infraspecifického  
taxonu, k němuž se vztahují, spolu se zkratkou vyznačující o jakou  
taxonomickou úroveň se jedná.

**poddruh, plemeno, subspecies, subsp. nebo ssp.**

Př. *Eleocharis palustris* ssp. *vulgaris*

**odrůda, varieta, varietas, var.**

Př. *Eleocharis palustris* var. *septentrionalis*

**forma, f.**

Př. *Eleocharis uniglumis* f. *nulliseta*

# Princip priority

## Zásada III.

Pojmenování taxonomické skupiny se zakládá na principu priority zveřejnění.

## Zásada IV.

**Každá taxonomická skupina** v určitém vymezení, postavení a hierarchické úrovni, s výjimkou některých zvláštních případů, **může mít jen jedno správné jméno, a to nejstarší, které je v souladu s pravidly.**

Priorita směrem do minulosti omezena (čl. 13).

**1. 5. 1753** = počáteční bod (starting point) - platí pro cévnaté rostliny, játrovky, rašeliníky, pro lišeňníky a většinu řas



Ztotožňován s 1. vydáním - Linnéova *Species plantarum*

# Princip priority

Jiné počáteční body (starting points) mají z vyšších rostlin:

**1. 1. 1801** - mechy (kromě rašeliníků) - Hedwig: *Species muscorum*

**31. 12. 1820** - fosilní rostliny - Sternberg: Flora der Vorwelt



Kašpar Maria Šternberk (1761–1838)

Šternberský palác první sídlo sbírek Národního muzea

# Princip priority

PŘ. Tentýž taxon byl pojmenován dvěma jmény:

*Viola saxatilis* F.W.Schmidt 1797

*Viola arenaria* DC. 1830



Které jméno je správné?

To starší - tedy *Viola saxatilis* F.W.Schmidt 1797

## Výjimka

Výjimku z tohoto pravidla tvoří jména chráněná kódem - *nomina conservanda* (jejich seznam je v kódu uveden)

# Příklad návrhu na konzervaci jména před kongresem ve Vídni

TAXON 54 (2) • May 2005: 551–552

Nordenstam • (1696) Conserve *Senecio leucanthemifolius*

## (1696) Proposal to conserve the name *Senecio leucanthemifolius* against *S. varicosus* (Compositae)

Bertil Nordenstam

Department of Phanerogamic Botany, Swedish Museum of Natural History, P. O. Box 50007, SE-104 05 Stockholm, Sweden. [bertil.nordenstam@nrm.se](mailto:bertil.nordenstam@nrm.se)

- (1696) *Senecio leucanthemifolius* Poir., Voy. Barbarie 2: 28. 1789 [Dicot.: Comp.], nom. cons. prop.  
Lectotypus (hic designatus): “*Senecio leucanthemifolius*. Cote de Barbarie”, Poiret (P-LAM).  
(=) *Senecio varicosus* L. f., Dec. Pl. Horti Upsal. 1: 9. Apr-Jun 1762, nom. rej. prop.  
Lectotypus (hic designatus): Herb. Linnaeus No. 996.25 (LINN).

Ten. ex Nyman (1879), *S. cyrenaicus* (E. A. Durand & Barratte) Pamp. (1918), *S. kebdanicus* Maire & Sennen (1935), *S. caroli-malyi* Horvatic (1956), and *S. transiens* (Rouy) Jeanm. (2003). Some authors (Alexander l.c., Greuter l.c.) go so far as to include *S. vernalis* Waldst. & Kit. (1800) as a variety or subspecies of *S. leucanthemifolius*. This traces to Chater & Walters (l.c.), who pointed to the difficulty of clearly distinguishing *S. leucanthemifolius* from some populations of *S. vernalis*. The latter has an orig-

# Změny jmen

**Žádné správné jméno nesmí být svévolně měněno, pokud se nezjistí okolnosti, které jeho platnost ruší.**

Takové okolnosti mohou být:

1. vyloučení homonymie
2. přesun ve smyslu horizontálním
3. přesun ve smyslu vertikálním

# 1. Změna jména v důsledku vyloučení homonymity

= dva různé taxony se nemohou jmenovat stejně.

Pokud se omylem stalo - platí princip priority - platné je to starší, pro druhý taxon je třeba, vytvořit jméno nové (pokud není k dispozici)

# *Carduus glaucus* Baumg.


Enum. Stirp. Transs. 3 : 58

(1817). Mladší homonymum



Johann Christian  
Gottlob Baumgarten  
1765-1843

Enumeratio stirpium ...  
Transsilvaniae Vol. 3,  
1817.



## CLASSIS XVIII. SYNGENESIA.

*Distel; kleine Ackerdistel; G. Fodor bogdts. II.  
Il. Cardo crep. I.*

*In cultis, nemoribus, ruderatis et sylvis elatioribus, item ad sepes viasque communis, Jul. Aug. A. pannonicus L. 1718. C. caule bipinnati, erecto, intermixti; fol. semidecurrentibus, lanceolatis, integrerrimi, margine ciliatis; pedunculo longissimo lanuginoso, 1-capitato; anthodio ovati squamis inermibus, linea alba notatis, corollulis pallide purpureis.*

*Hungarian Thistle, A. Le Chardon de Hongrie. G. Hungarische Distel. G. Magyarországi bogáts. G. In asperis montosis versus montes Galatinus et Arsyjetje. Jul. Aug. P.*

*Distel 1719. C. caule 2- 3-pedali, erecto, anguloso, sulcato striato, glauco, subpubescente, superne ramoso, ramis simplicibus; fol. omnibus utrinque glabris, carnosis, glaucis, semidecurrentibus, inaequaliter dentato spinosis, radicali, et inferiorib. oblongo-ovatis, caul. intermedio ovato-obuso-lanceolato, rameis brevissimis, oblongo-lanceolatis; pedunc. longissimis, alterois, teretibus, sulcatis, tomentosis, apice subtantutibus, 1-capitatis, bracteis alternis, raris, remotissimis vestitis; capitulo et violaceo-purpureo; anthodio subgloboso, glauco, glabro, squamis linearibus, apice mucrone nigrecenti terminantibus, pappo scabriuscculo. C. defloratus. J. A. t. 89. Cirsium III. montanum, Cl. II p. CXLIX. ic. Ej. Pann. p. 659. ic.*


*Glaucus Thistle. A. Le Chardon glaue. G. Graugrüne Distel. G. Öse bogdts. II.*

*In mon. b. calcareo-ropestribus juxta pagum Totzko Szent György ibidem in M. Bodell; item in herbidis subalpinis sylvisque montosis versus M. Szal, et Aquam Mineralem Lövete; item in Sedibus Csik et Hámroszék. Jun. — Aug. P.*

# ***Carduus glaucus*** Baumg.

Enum. Stirp. Transs. 3 : 58

(1817). Mladší homonymum



Johann Christian  
Gottlob Baumgarten  
1765–1843


Enumeratio stirpium ...  
Transsilvaniae Vol. 3,  
1817.



# ***Carduus glaucus*** Cav.

Icon. 3: 226

(1794). Starší homonymum



Antonio José  
Cavanilles  
1745–1804

Icones et  
descriptions  
plantarum quae aut  
sponte in Hispania  
... Vol. 3,  
1794.

# ***Carduus glaucus*** Baumg.

Enum. Stirp. Transs. 3 : 58  
**(1817).** Mladší homonymum




Johann Christian  
Gottlob Baumgarten  
1765-1843

Enumeratio stirpium ...  
Transsilvaniae Vol. 3,  
1817.



# ***Carduus glaucus*** Cav.

Icon. 3: 226  
**(1794).** Starší homonymum



Antonio José  
Cavanilles  
1745–1804

Icones et  
descriptions  
plantarum quae aut  
sponte in Hispania  
... Vol. 3,  
1794.

*Klasea nudicaulis* Fourr.

# ***Carduus glaucus*** Baumg.

Enum. Stirp. Transs. 3 : 58  
**(1817).** Mladší homonymum



Johann Christian  
Gottlob Baumgarten  
1765-1843


Enumeratio stirpium ...  
Transsilvaniae Vol. 3,  
1817.



***Carduus glaucinus*** Holub Folia Geobot. Phytotax. 9: 272, nom. nov. pro sp. ***Carduus glaucus*** Baumg. (1974)

# ***Carduus glaucus*** Cav.

Icon. 3: 226  
**(1794).** Starší homonymum



Antonio José  
Cavanilles  
1745–1804


Icones et  
descriptions  
plantarum quae aut  
sponte in Hispania  
... Vol. 3,  
1794.

***Klasea nudicaulis*** Fourr.

# ***Carduus glaucus*** Baumg.

Enum. Stirp. Transs. 3 : 58

(1817). Mladší homonymum



Johann Christian  
Gottlob Baumgarten  
1765-1843

Enumeratio stirpium ...  
Transsilvaniae Vol. 3,  
1817.




*Carduus defloratus* subsp. *glaucus* (Rchb. f.) Nyman

# ***Carduus glaucus*** Cav.

Icon. 3: 226

(1794). Starší homonymum



Antonio José  
Cavanilles  
1745–1804


Icones et  
descriptions  
plantarum quae aut  
sponte in Hispania  
... Vol. 3,  
1794.

*Klasea nudicaulis* Fourr.

## 2. Přesun ve směru horizontálním

Linné 1753 popsal rod *Scirpus* a v rámci něj také druh *Scirpus palustris*

*Scirpus* L. 1753



*Scirpus palustris*  
L. 1753

## 2. Přesun ve směru horizontálním


Linné 1753 popsal rod *Scirpus* a v rámci něj také druh *Scirpus palustris*

*Scirpus* L. 1753

*Scirpus palustris*  
L. 1753

Brown 1810 popsal z Austrálie rod *Eleocharis*

*Eleocharis* R. Br. 1810





## 2. Přesun ve směru horizontálním

Linné 1753 popsal rod *Scirpus* a v rámci něj také druh *Scirpus palustris*

*Scirpus* L. 1753

Brown 1810 popsal z Austrálie rod *Eleocharis*

*Eleocharis* R. Br. 1810



Roemer & Schultes 1817 se rozhodli přiřadit *Scirpus palustris* k rodu *Eleocharis*

**Taxon zůstává na stejném úrovni, epiteton se zachovává**

## 2. Přesun ve směru horizontálním

Linné 1753 popsal rod *Scirpus* a v rámci něj také druh *Scirpus palustris*

*Scirpus* L. 1753

*Scirpus palustris*  
L. 1753

Brown 1810 popsal z Austrálie rod *Eleocharis*

*Eleocharis* R. Br. 1810

Roemer & Schultes 1817 se rozhodli přiřadit *Scirpus palustris* k rodu *Eleocharis*

*Eleocharis palustris* (L.)  
Roem. & Schult. 1817

## 2. Přesun ve směru horizontálním

Linné 1753 popsal rod *Scirpus* a v rámci něj také druh *Scirpus palustris*

*Scirpus* L. 1753

*Scirpus palustris*  
L. 1753

Brown 1810 popsal z Austrálie rod *Eleocharis*

*Eleocharis* R. Br. 1810

Roemer & Schultes 1817 se rozhodli přiřadit *Scirpus palustris* k rodu *Eleocharis*

*Eleocharis palustris* (L.)  
Roem. & Schult. 1817

**Taxon zůstává na stejném úrovni, epiteton se zachovává**

# Kombinace a basionym

Kombinace = jméno vzniklé přesunem pod jiný taxon téže nebo jiné úrovně.

# Kombinace a basionym

Kombinace = jméno vzniklé přesunem pod jiný taxon téže nebo jiné úrovně.


Basionym (ve vztahu k příslušné kombinaci) je původní jméno, na němž je kombinace založena.

# Kombinace a basionym

Kombinace = jméno vzniklé přesunem pod jiný taxon téže nebo jiné úrovně.

Basionym (ve vztahu k příslušné kombinaci) je původní jméno, na němž je kombinace založena.

*Eleocharis palustris* (L.) Roemer et Schultes je kombinace založená na basionymu *Scirpus palustris* L.



Za jménem – vzniklým kombinací – je vedle deskriptora uveden také **kombinátor**: jméno + deskriptor v závorce + kombinátor za závorkou

Za jménem – vzniklým kombinací – je vedle deskriptora uveden také **kombinátor**: jméno + deskriptor v závorce + kombinátor za závorkou

*Eleocharis palustris* (L.) Roem. et Schult.

L. = Linné = deskriptor

Roem. et Schult. = Roemer et Schultes - kombinátoři



Za jménem – vzniklým kombinací – je vedle deskriptora uveden také **kombinátor**: jméno + deskriptor v závorce + kombinátor za závorkou

*Eleocharis palustris* (L.) Roem. et Schult.

L. = Linné = deskriptor

Roem. et Schult. = Roemer et Schultes - kombinátoři

*Eleocharis vulgaris* (Walters) Á. et D. Löve

Walters - deskriptor;

Á. et D. Löve - kombinátoři ( místo "et" lze psát i "&")



Za jménem – vzniklým kombinací – je vedle deskriptora uveden také **kombinátor**: jméno + deskriptor v závorce + kombinátor za závorkou

*Eleocharis palustris* (L.) Roem. et Schult.

L. = Linné = deskriptor

Roem. et Schult. = Roemer et Schultes - kombinátoři



*Eleocharis vulgaris* (Walters) Á. et D. Löve

Walters - deskriptor;

Á. et D. Löve - kombinátoři ( místo "et" lze psát i "&")

## Výjimka

Nikdy nepíšeme deskriptora ani kombinátora u nominátních (= typových) taxonů!

Př. *Eleocharis palustris* (L.) Roem. et Schult. subsp. *palustris*

*Eleocharis quinqueflora* (F.X.Hartman) O.Schwarz **1949**

Bas.: *Scirpus quinqueflorus* F.X.Hartman **1767**



© T. Muer

*Eleocharis quinqueflora* (F.X.Hartman) O.Schwarz **1949**

Bas.: *Scirpus quinqueflorus* F.X.Hartman **1767**

*Eleocharis pauciflora* (Lightfoot) Link **1827**

Bas.: *Scirpus pauciflorus* Lightfoot **1777**



© T. Muer

*Eleocharis quinqueflora* (F.X.Hartman) O.Schwarz **1949**

Bas.: *Scirpus quinqueflorus* F.X.Hartman **1767**

*Eleocharis pauciflora* (Lightfoot) Link **1827**

Bas.: *Scirpus pauciflorus* Lightfoot **1777**

Oba basionomy se však vztahují ke stejnému druhu popsanému nezávisle na sobě dvěma autory.

Která kombinace je tedy správná?



© T. Muer

*Eleocharis quinqueflora* (F.X.Hartman) O.Schwarz **1949**

Bas.: *Scirpus quinqueflorus* F.X.Hartman **1767**

*Eleocharis pauciflora* (Lightfoot) Link **1827**

Bas.: *Scirpus pauciflorus* Lightfoot **1777**

Oba basionomy se však vztahují ke stejnému druhu popsanému nezávisle na sobě dvěma autory.

Která kombinace je tedy správná?



Ta první, neboť i když je sama o sobě mladší, je učiněna na základě staršího basionymu v daném ranku (druhovém).

**Výjimka**, kdy při přesunu horizontálním nemá prioritu epiteton nejstarší:

**pokud by zachováním nastala tautonymie nebo homonymie**

Př. Linné popsal jaterník podléšku jako druh *Anemone hepatica* L. 1753 v rámci rodu *Anemone*.

Později samostatný rod *Hepatica* Miller 1754

Jak by mělo v duchu pravidel znít jméno pro horizontální přesun?

*Hepatica hepatica*

Tautonymie - situace, kdy druhový epiteton opakuje rodové jméno není v botanické nomenklatuře přípustná.

Proto vystaveno jméno nové - stalo se 2x:

*Hepatica nobilis* Miller 1768

*Hepatica triloba* Chaix 1785

Které je správné?


Starší - *Hepatica nobilis* Miller 1768.



### 3. Přesun ve směru vertikálním

Walters 1953 rozlišil v rámci druhu *Eleocharis palustris* L. poddruh *E. palustris* subsp. *vulgaris*

*Eleocharis palustris* (L.) Roem. & Schult.




*Eleocharis palustris*  
subsp. *vulgaris*  
Walters 1953

### 3. Přesun ve směru vertikálním

Walters 1953 rozlišil v rámci druhu *Eleocharis palustris* L. poddruh *E. palustris* subsp. *vulgaris*

*Eleocharis palustris* (L.) Roem. & Schult.



Á. Löve & D. Löve 1976 se na základě odlišného chromosomového počtu rozhodli oddělit tento poddruh do samostatného druhu

### 3. Přesun ve směru vertikálním

Walters 1953 rozlišil v rámci druhu *Eleocharis palustris* L. poddruh *E. palustris* subsp. *vulgaris*

*Eleocharis palustris* (L.) Roem. & Schult.



Á. Löve & D. Löve 1976 se na základě odlišného chromosomového počtu rozhodli oddělit tento poddruh do samostatného druhu

*Eleocharis vulgaris*  
(Walters) Á. Löve  
& D. Löve 1976

### 3. Přesun ve směru vertikálním

Walters 1953 rozlišil v rámci druhu *Eleocharis palustris* L. poddruh *E. palustris* subsp. *vulgaris*

*Eleocharis palustris* (L.) Roem. & Schult.



Á. Löve & D. Löve 1976 se na základě odlišného chromosomového počtu rozhodli oddělit tento poddruh do samostatného druhu

*Eleocharis vulgaris*  
(Walters) Á. Löve  
& D. Löve 1976



**Taxon mění úroveň, epiteton může zůstat stejné, ale nemusí.**

# Přesun ve směru vertikálním

Snižuje nebo zvyšuje se úroveň taxonu


- není třeba prioritu epitetu či uninomu zachovat (je to však doporučeno).

Př. Epiteton zachováno

*Alyssum gmelinii* Jord.

sníženo na  
subsp. úroveň:

*Alyssum montanum* L.  
subsp. *gmelinii* (Jord.)  
Hegi et E. Schmidt




# Přesun ve směru vertikálním

Př. Uninom zachován

*Betonica* L.

snížena na sekční úroveň:

*Stachys* L. sect. *Betonica*  
(L.) Bentham



© - josef hlasek  
[www.hlasek.com](http://www.hlasek.com)  
*Betonica officinalis* 4659

Epiteton nebo uninominální jméno není zachováno

PŘ.      *Magnolia virginiana* var. *foetida* L. 1753  
je-li varieta povýšena na hodnotu druhu pak:  
*Magnolia grandiflora* L. 1759  
Jméno *Magnolia foetida* (L.) Sargent 1889 sice respektuje  
doporučení o zachování epiteta, ale v důsledku zásady priority platí jméno  
předchozí.



Epiteton nebo uninominální jméno není zachováno

PŘ. *Lythrum intermedium* Ledeb. 1822

je-li hodnoceno jako var. druhu *L. salicaria* pak:

*Lythrum salicaria* var. *glabrum* Ledeb. 1843

nikoli

*Lythrum salicaria* var. *intermedium* (Ledeb.) Koehne 1881




*Lotus corniculatus* L. subsp. *slovacus* Žertová 1958

*Lotus borbásii* Ujhelyi 1961

Označují oba stejný taxon. Které je správné?

Obě!

Jedno na úrovni subspecifické a druhé na úrovni specifické.



## Zásada II


**Použití jmen taxonomických skupin se určuje pomocí nomenklatorických typů.**

Nomenklatorický typ je prvkem, se kterým je spojeno pojmenování dotyčného taxonu.

Pro čeledě je nomenklatorickým typem **jeden z rodů**  
Např. pro čeledě Asteraceae je to rod *Aster*

# Zásada typizace

Pro **rod** je nomenklatorickým typem **jeden z druhů**  
Např. pro rod *Salvia* je to druh *Salvia officinalis*



# Zásada typizace

Pro druh a všechny nižší kategorie je nomenklatorickým typem konkrétní dokladový exemplář (uložený obvykle v herbáři)

u nižších organismů je to může být lyofilizovaná živá kultura

výjimečně může být typem vyobrazení - ikonotyp




Figure 1. Lectotype of *Ca. echinatus* Desf. (G), by permission of the Curator.

(2) *Cirsium eriophorum* (L.) Scop., Fl. Carniol., ed. 2, 2: 130. 1771 ≡ *Carduus eriophorus* L. (basionym). Sp. Pl. 2: 893. 1753 ≡ *Cnicus eriophorus* (L.) Roth, Tent. Fl. Germ.: 345. 1788 ≡ *Eriolepis lanigera* Cass. in Cuvier, Dict. Sci. Nat. 41: 331. 1826, nom. illeg. (Art. 11.4)—Lectotype (designated by Del Guacchio & Iamonico [9] (p. 197)); Herb. Linnaeus, no. 966.32 (LINN) [digital image!])—<http://linnean-online.org/9831/>; “*Ci. eriophorum* var. *vul-*










Figure 3. Lectotype of *Ca. gigas* Ucria (from the *Panphyton siculum*, plate 170, figure on the right side).

= *Carduus gigas* Ucria, Nuova Racc. Opusc. Aut. Sicil. 6: 255. 1793.—Lectotype (designated here): [illustration] “*Carduus gigas acanthoides tomentosus, pycnopolysphaer-rocephalus*” in Cupani [54] (Plate 170).—Figure 3.






Co bude typem čeledi (A+B+C)? – Jak se čeleď bude jmenovat?

## Smysl typizace:

V padesátých letech zjistil anglický botanik Stuart Max Walters, že v Evropě existují v rámci druhu *Eleocharis palustris* populace, lišící se velikostí plodů, počtem chromozómů a několika dalšími znaky, v době Linnéově nerozlišitelné. Oba taxony lišily i ve geografickém rozšíření.



Co teď? - Popsat jako nový taxon s malými plody a pro druhý ponechat jméno založené na Linnéovském bazionymu.

Řešení: - měl vyhledat typ v Linnéově herbáři a hned věděl pro co ponechat původní

# Autoři jmen, jejich zkratky

Za jménem taxonu často připojujeme jméno nebo zkratku toho, kdo rostlinu popsal - **deskriptor** (descriptor z lat. *descriptio* = popis)

*Fagaceae* Dumortier

*Fagaceae* Dumort.

*Eleocharis* R.Brown

*Eleocharis* R.Br.

*Daphne arbuscula* Čelakovský

*Daphne arbuscula* Čelak.

*Dactylis glomerata* subsp. *slovenica* Domin

*Dactylis glomerata* subsp. *slovenica* Dom.

význam zkratek a předložek: s. l., s. s., non, nec, in, ex, sensu auct.

## Zásada I

**Botanická nomenklatura je nezávislá na zoologické a bakteriologické nomenklatuře.**

**Odlišnosti zoologické nomenklatury oproti botanické**

Zoologická pravidla jsou starší - 1842.

Platí zde také zásada typizace a zásada priority, ale starting point je 1.1.1758 - 10. vydání Linné: *Systema naturae*.

# 1. Zoologie připouští tautonyma

Např. *Bufo bufo* = ropucha obecná

*Buteo buteo* = káně lesní

*Naja naja* = kobra indická

*Huso huso* = vyza velká

*Torpedo torpedo* = parejnock elektrický

*Rattus rattus* = krysa obecná

*Gobio gobio* = hrouzek obecný

*Vulpes vulpes* = liška obecná



2. V zoologii se neuvádí jméno kombinátora - pouze se v případě kombinace jméno deskriptora dává do závorky.

### 3. Homonymita neplatí mezi zoologií a botanikou

např. rod *Sida*

v botanice = tropický rod z čel. *Malvaceae* (např. v Indii roste druh *Sida retusa*)

\*v zoologii = drobný perloočkovitý korýš (např. u nás se vyskytující *S. crystallina* = stejnonožka rdestová)



nebo rod *Dracunculus*

v botanice = rod z čel. *Araceae*

v zoologii = parazitický červ (např. *Dracunculus medinensis*

vlasovec medinský)



nebo rod *Arenaria*

*Arenaria interpres* = pták z čeledi kulíkovitých kameňáček  
pestrý (žije ve Skandinávii)

*Arenaria* = rostlina z čeledi hvozdíkovitých - písečnice –  
(např. p. douškolistá *Arenaria serpyllifolia*)



nebo jméno rodu *Oenanthe*, které představuje současně drozdovitého ptáka českým jménem bělořit (např. b. šedý *Oenanthe oenanthe*), ale i miříkovitou rostlinu haluchu (např. h. vodní *Oenanthe aquatica*)



obdobně i rod *Prunella* = pták z řádu pěvců pěvuška (např. *P. modularis* = p. modrá), ale i hluchavkovitá rostlina černohlávek (např. *P. vulgaris* = č. obecný)



Zoologický kód nedoporučuje dávat živočichům jména, kterými jsou pojmenovány jiné organismy.


# Kde je přehled všech publikovaných jmen?

(S odkazy na místo publikace  
a přehledem autorů botanických jmen)




Joseph Dalton Hooker  
1817–1911  
britský botanik

1895-



The screenshot shows the IPNI homepage with a search interface for plant names. The search form includes fields for 'Full Name' and 'Output Format' (set to 'Normal'). Below the search form are sections for 'Name', 'Author', 'Publication', and 'Extended Options'. A large green arrow points upwards from the bottom right towards the search form.

# Kde hledat data vydání?



Frans Antonie Stafleu  
1921–1997  
nizozemský botanik

Richard Sumner Cowan  
1921–1997  
americký botanik



F351  
3770  
Frans A. Stafleu and Richard S. Cowan


## Taxonomic literature

A selective guide to botanical publications and collections with dates, commentaries and types


### Volume 1: A-G

*S. H. Cowan  
R. S. Cowan*

Second edition



Bohn, Scheltema & Holkema  
Utrecht 1976



The screenshot shows a detailed view of the BHL website for the publication 'Taxonomic literature'. The page includes a header with the BHL logo and navigation links. Below the header, there's a search bar and a 'Browse by' section with links for 'Title', 'Author', 'Date', 'Collection', and 'Contributor'. The main content area displays the title 'Taxonomic literature: a selective guide to botanical publications and collections with dates, commentaries and types' and its variants. It lists the series 'Regnum vegetabile' and provides links to 'View Volume' and 'Download volume' for various editions (v. 1 to v. 8). On the right side, there's a sidebar with information about the holding institution (Smithsonian Libraries), sponsor (Biodiversity Heritage Library), and date scanned (12/10/2010). The bottom of the page features a 'DOI' link and a 'Find in a local library' button.

372. *Enumeratio stirpium magno Transsilvaniae principatu praeprimis indigenarum, in usum nostratum botanophilorum conscripta inque ordinem sexuali-naturale concinata. Wien, Hermannstadt 1816-1846, 4 vols. Oct. (Enum. stirp. Transsilv.)*

volume	pages	dates	dates in vol.
1	[i]-xxvii, [1]-427, [428 err.]	1816	p. xxvii: 14 Oct 1815
2	[i-x], [1]-392	Dec 1816	p. xii: 31 Oct 1815
3	[i]-xii, [1]-355	1817	p. xii: 29 Sep 1816 see Isis 1: 114. 1817
4	[i]-iv, [1]-236	1846	p. iv cal Maij 1840 editor: M. Fuss
Mantissa 1	[i-v], [1]-82, index	1846	p. iv, ibid. majis 1846 author: M. Fuss
Indices	[1]-112	1846	author: M. Fuss.

# Kde je přehled akceptovaných jmen?

Nejvíce používán; od 2013 se však neaktualizuje!

**Catalogue of Life: 2020-01-10 Beta**  
indexing the world's known species

English French Spanish Chinese Russian Portuguese Dutch German Polish Lithuanian Thai Vietnamese

**Search the Catalogue of Life - updated edition around the year**

Search for:

Show extinct taxa (+)  
 Match whole words only

**Search**

Annual Checklist Interface v1.9 rev 2126ab0 developed by Naturalis Biodiversity Center. Please note, this site uses [cookies](#). If you continue to use the site we will assume that you agree with this.

Včetně jmen živočichů / aktualizuje se

**The Plant List** A working list of all plant species

Home About Browse Statistics Feedback How to use this site

**2010-2019**  
**Kew**

**MONTGOMERY BOTANICAL GARDEN**

**Global Convergence Consortium**

**IOPPI**

**For the New York Botanical Garden**

**SANBI**

**GBIF**

**The Plant List** was a working list of all known plant species produced by the botanical community in response to Target 1 of the 2002-2010 Global Strategy for Plant Conservation (CSP/C). It has been static since 2013, but was used as the starting point for the International Network for the Catalogue of Life, which is now available online. The original version can still be found at [www.worldwidelife.org](http://www.worldwidelife.org).

We are currently developing a successor to the original community working list, known as the 2011-2020 CSP/C's updated Target 1, to achieve an online list of all known plants by 2020. We'd welcome feedback from users for improvements to its taxonomic backbone which is curated by a growing community of IOPPI Taxonomic Expert Networks (TENs).

The Plant List is a working list of all known plant species. It aims to be comprehensive for species of vascular plant (flowering plants, conifers, ferns and their allies) and of bryophytes (mosses and liverworts).

Collaboration between the Royal Botanic Gardens, Kew and Missouri Botanical Garden enabled the creation of The Plant List by combining multiple checklist data sets held by these institutions and other collaborators.

The Plant List is not perfect and represents work in progress. Our aims remain to produce a 'best effort' list, to demonstrate progress and to stimulate further work. Important limitations are summarised here.

**Summary Statistics**

Version 11 (September 2019) replaces Version 10 which remains accessible here. Version 11 includes new data sets, updated versions of the original data sets and improved algorithms to resolve logical conflicts between those data sets. The differences between versions are summarised here.

The Plant List includes 1,194,015 scientific plant names of species rank. Of these, 900,695 are accepted species names.

The Plant List contains 142 plant families and 17,329 plant genera.

The status of the 1,194,015 names is as follows:


Status	Total
Accepted	282,059 23.9%
Synonym	419,624 34.2%
Unresolved	582,322 42.0%

**Browse**

Click on the major plant group of interest to explore the taxonomic hierarchy embedded within The Plant List.

Flowering plants  
Conifers, cycads and other gymnosperms  
Ferns and their allies  
Mosses and liverworts

Work down the taxonomic hierarchy from Major Group (to find out which Families belong to each), to Family (to discover the Genera belonging to each) and finally Genus (to list the Species in each).



Ve výstavbě asi v současnosti nejspolehlivější

## **Rekapitulace:**

Pojmenování rostlin má pevná pravidla

= Mezinárodní kód botanické nomenklatury, jehož změny schvaluje pouze mezinárodní botanický kongres

## **Rekapitulace:**

Pojmenování rostlin má pevná pravidla

= Mezinárodní kód botanické nomenklatury, jehož změny schvaluje pouze mezinárodní botanický kongres

Nejčastější důvody změn

= jednoznačnost: princip priority, vyloučení homonym, typizace ...

= vývoj klasifikace: přesuny a kombinace ...

## **Rekapitulace:**

Pojmenování rostlin má pevná pravidla

= Mezinárodní kód botanické nomenklatury, jehož změny schvaluje pouze mezinárodní botanický kongres

Nejčastější důvody změn

= jednoznačnost: princip priority, vyloučení homonym, typizace ...  
= vývoj klasifikace: přesuny a kombinace ...

Zoologická a botanická nomenklatura jsou nezávislé

# **Rekapitulace:**

Pojmenování rostlin má pevná pravidla

= Mezinárodní kód botanické nomenklatury, jehož změny schvaluje pouze mezinárodní botanický kongres

Nejčastější důvody změn

= jednoznačnost: princip priority, vyloučení homonym, typizace ...  
= vývoj klasifikace: přesuny a kombinace ...

Zoologická a botanická nomenklatura jsou nezávislé

Existují internedově dostupné zdroje zachycující retrospektivně všechna jména a relevantní taxonomická díla