



Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin

Nahosemenné – 1. část

Petr Bureš



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Společné znaky semenných rostlin, (nahosemenných i krytosemenných)


odlišující je od

výtrusných vyšších rostlin
(játrovek, mechů, hlevíků, plavuní, kapradin a jejich
příbuzných)

1. Spora vers. semeno

Spora čili výtrus

- rozmnožovací buňka,
- vzniká meiózou v zárodečné vrstvě sporangia
- krytá rezistentním obalem ze sporopoleninu



spóra *Lycopodium clavatum*

Semeno


- mnohobuněčný rozmnožovací orgán
- vzniká z oplozeného vajíčka,
- krytý osemením (testou) = přeměněným integumentem



uvnitř: zárodek (embryo) + živné pletivo

- **primární** ž.p. (perisperm) = zbytek megaprothalia **u nahosemenných**
- + **sekundární** ž.p. (endosperm) **u krytosemenných**

2. Vzrostný vrchol stonku



výtrusné (mechorosty,
plavuně a monilofyty)


– zpravidla jediná buňka

semenné: mnohobuněčný

Vícevrstevný u krytosemenných

- vnější vrstvy = tunika dělí buňky antiklinálně (kolmo k povrchu)
- vnitřní vrstvy – korpus jeho buňky se dělí jak antiklinálně tak periklinálně



U nahosemenných zpravidla jednovrstevný jeho buňky se dělí jak anti- tak periklinálně



3. Zavírání průduchů

semenné rostliny – efektivnější regulace se zapojením kyseliny abscisové (ABA)

výtrusné rostliny – méně efektivní regulace, bez ABA



Abscisic Acid

- Inhibits growth and closes stomata in fruit and leaves about to fall
- Also used to close stomata in very hot conditions
- Stomata closed by inhibition of potassium / sodium import in to guard cells
- Before falling (called abscission), abscission zone is formed to form a protective layer against environment and bacterial infestation

Abscisic Acid: Control of Stoma Opening

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.

a. Open stoma b. Guard cell plasma membrane c. Closed stoma


ABA binding leads to influx of Ca^{2+} & the opening of K^+ channels. Water exits guard cells & stoma closes.

4. Vodivé elementy stonku = eustélé nebo ataktostélé

plavuňová větev ↑




Plektostélé – plavuně

Aktinostélé – plavuně,
eusporangiální kapradinyProtostélé – nejpůvodnejší typ
ryniofyty, plavuně,
vz. kapradinySifonostélé – ve středu stélé dutina
nebo dřeň (sifon), (*Osmunda*)Solenostélé – dutina, lýko, dřevo,
lýko, *Adiantum*, *Dicksonia*,
MarsileaDiktyostélé – síť dřevostředních
cévních svazků v oddencích
kapradinArhrostélé – do kruhu uspořádané uzavřené
cévní svazky ve stoncích přesliček

Semenné rostliny

přesličková větev ↗



Eustélé – souvislé válce lýka a dřeva
rozdelené radiálně procházejícími
dřeňovými paprsky na větší počet
cévních svazků kolaterálních, které jsou
kruhovitě uspořádány


**nahosemenné, bazální
krytosemenné a
dvouděložné**



Ataktostélé – cévní svazky se nepravidelně
rozložily v parenchymu, není zde
kambium a tyto rostliny nemohou proto
druhotně tlouстnout klasickým způsobem
(**jednoděložné**, *Piperaceae*, některé
Amaranthaceae)


7. Konec samostatnosti gametofytu

Mechorosty
(játrovky, mechy, hlevíky)




Sporofyt závislý na gametofytu, jen gametofyt se může množit vegetativně.

Výtrusné cévnaté rostliny
(ryniofyty, plavuně, monilofyty)



Gametofyt i sporofyt samostatné (někdy ze zásob – *Selaginella*, *Isoëtes*, *Salviniales*), ale jen sporofyt se může množit vegetativně

Semenné rostliny
(nahosemenné, krytosemenné)




Gametofyt závislý na sporofytu, jen sporofyt se může množit vegetativně

Oplození přestane být závislé na vodě


7. Konec samostatnosti gametofytu

Mechorosty
(játrovky, mechy, hlevíky)




Sporofyt závislý na gametofytu, jen gametofyt se může množit vegetativně.

Výtrusné cévnaté rostliny
(ryniofyty, plavuně, monilofyty)



Gametofyt i sporofyt samostatné (někdy ze zásob – *Selaginella*, *Isoëtes*, *Salviniales*), ale jen sporofyt se může množit vegetativně

vajíčko → semeno



Gametofyt závislý na sporofytu, jen sporofyt se může množit vegetativně

Semenné rostliny
(nahosemenné, krytosemenné)

Oplození přestane být závislé na vodě


7. Konec samostatnosti gametofytu

Mechorosty
(játrovky, mechy, hlevíky)




Sporofyt závislý na gametofytu, jen gametofyt se může množit vegetativně.

Výtrusné cévnaté rostliny
(ryniofyty, plavuně, monilofyty)



Gametofyt i sporofyt samostatné (někdy ze zásob – *Selaginella*, *Isoëtes*, *Salviniales*), ale jen sporofyt se může množit vegetativně

Semenné rostliny
(nahosemenné, krytosemenné)



Gametofyt závislý na sporofytu, jen sporofyt se může množit vegetativně

Oplození přestane být závislé na vodě

8. Pohlavnost fází životního cyklu se „přepne“

Výtrusné	Gametofyt Sporofyt	hermafroditní nebo jednopohlavný vždy bezpohlavní
Semenné	Gametofyt Sporofyt	vždy jednopohlavný hermafroditní nebo jednopohlavný

Oplození přestane být závislé na vodě

9. Genetické a evoluční důsledky rozdílů v pohlavnosti

Výtrusné Selfing hermafroditního gametofytu může vést ke vzniku totálně homozygotního sporofytu

Šance homologních chromosomů dostat se do další generace jsou stochastické = není o co soutěžit

Semenné Totální homozygot nemůže vzniknout, selfing (jednopohlavného) gametofytu není možný a selfing sporofytu vede „jen“ ke zvýšení homozygozity (a příp. inbrední depresi), nikdy ne k homozygozitě úplné.

9. Genetické a evoluční důsledky rozdílů v pohlavnosti

Výtrusné Selfing hermafroditního gametofytu může vést ke vzniku totálně homozygotního sporofytu

Šance homologních chromosomů dostat se do další generace jsou stochastické = není o co soutěžit

Semenné Totální homozygot nemůže vzniknout, selfing (jednopohlavného) gametofytu není možný a selfing sporofytu vede „jen“ ke zvýšení homozygozity (a příp. inbrední depresi), nikdy ne k homozygozitě úplné.

Jen jeden produkt ze 4 přežívá v samičí meióze = jen jeden z homologních chromosomů každého páru se dostane do další generace – to může vyústit v „boj o přežití“ tehdy, když je polaritou a asymetrií meiotického mikrotubulárního vřeténka šance přežít nějak determinována = meiotický tah

10. Pokročilá redukce gametofytu semenných rostlin

Mikroprothalium (desítky μm ; 5–3 buňky)

- (1) v mikrosporangiu → mnoho mikrospor
- (2) mikrospora endosporicky → 2-3 buněčné pylové zrno
- (3) pylové zrno (nezralý gametofyt) opouští mikrosporangium

P G

nahosemenné

krytosemenné

10. Pokročilá redukce gametofytu semenných rostlin

Mikroprothalium (desítky μm ; 5–3 buňky)

- (1) v mikrosporangiu → mnoho mikrospor
- (2) mikrospora endosporicky → 2-3 buněčné pylové zrno
- (3) pylové zrno (nezralý gametofyt) opouští mikrosporangium



nahosemenné

krytosemenné

10. Pokročilá redukce gametofytu semenných rostlin

Mikroprothalium (desítky μm ; 5–3 buňky)

- (1) v mikrosporangiu → mnoho mikrospor
- (2) mikrospora endosporicky → 2-3 buněčné pylové zrno
- (3) pylové zrno (nezralý gametofyt) opouští mikrosporangium




nahosemenné

krytosemenné

10. Pokročilá redukce gametofytu semenných rostlin

Mikroprothalium (desítky μm ; 5–3 buňky)

- (1) v mikrosporangiu → mnoho mikrospor
 - (2) mikrospora endosporicky → 2-3 buněčné pylové zrno
 - (3) pylové zrno (nezralý gametofyt) opouští mikrosporangium
-
- (4) dostává se na samičí orgán (= polináční kapku nebo bliznu)
 - (5) blána mikrospory praská → **pylová láčka** vyžívaná u nahosemenných pletivem nucellu u krytosemenných pletivy pestíku
 - (6) na konci láčky → 2 spermatozoidy nebo 2 spermatické buňky.



Pylová láčka = samčí gametofyt závislý na otcovském jedinci se stává závislý i na jedinci mateřském

Interakce mezi láčkou a pletivy nucellu resp. pestíků → evoluce geneticky řízené self-inkompatibility = ? jeden z klíčů evolučního úspěchu semenných rostlin

nahosemenné

krytosemenné

10. Pokročilá redukce gametofytu semenných rostlin

Mikroprothalium (desítky μm ; 5–3 buňky)

- (1) v mikrosporangiu → mnoho mikrospor
 - (2) mikrospora endosporicky → 2-3 buněčné pylové zrno
 - (3) pylové zrno (nezralý gametofyt) opouští mikrosporangium
-
- (4) dostává se na samičí orgán (= polináční kapku nebo bliznu)
 - (5) blána mikrospory praská → **pylová láčka** vyživovaná u nahosemenných pletivem nucellu u krytosemenných pletivy pestíku
 - (6) na konci láčky → 2 spermatozoidy nebo 2 spermatické buňky.

P G

P A L

P V S L

P V S1 S2 L

naho- 5 buněk

P G

P S1 S2

kryto- 3 buňky

nahosemenné

krytosemenné



10. Pokročilá redukce gametofytu semenných rostlin

Mikroprothalium (desítky μm ; 5–3 buňky)

- (1) v mikrosporangiu → mnoho mikrospor
 - (2) mikrospora endosporicky → 2-3 buněčné pylové zrno
 - (3) pylové zrno (nezralý gametofyt) opouští mikrosporangium
-
- (4) dostává se na samičí orgán (= polinační kapku nebo bliznu)
 - (5) blána mikrospory praská → **pylová láčka** vyžívaná u nahosemenných pletivem nucellu u krytosemenných pletivy pestíku
 - (6) na konci láčky → 2 spermatozoidy nebo 2 spermatické buňky.

Megaprothalium (mm– μm ; mnoho–8 buněk)

- (1) v megasporangiu → jediná megaspora (nikdy jej neopustí)
- (2) z megaspory → megaprothalium uvnitř vajíčka = megaprothalium obaleno jak stěnou megasporangia, tak integumentem (u nahosemenných je megaprothalium mnohobuněčné zpravidla jěště s archegonií)
- (3) u krytosemenných je megaprothaliem jen zárodečný vak, obsahující zpravidla jen osm jader/buněk



nahosemenné

krytosemenné



10. Pokročilá redukce gametofytu semenných rostlin

Mikroprothalium (desítky μm ; 5–3 buňky)

- (1) v mikrosporangiu → mnoho mikrospor
 - (2) mikrospora endosporicky → 2-3 buněčné pylové zrno
 - (3) pylové zrno (nezralý gametofyt) opouští mikrosporangium
-
- (4) dostává se na samičí orgán (= polináční kapku nebo bliznu)
 - (5) blána mikrospory praská → **pylová láčka** vyžívaná u nahosemenných pletivem nucellu u krytosemenných pletivy pestíku
 - (6) na konci láčky → 2 spermatozoidy nebo 2 spermatické buňky.

Megaprothalium (mm– μm ; mnoho–8 buněk)

- (1) v megasporangiu → jediná megaspora (nikdy jej neopustí)
- (2) z megasporý → megaprothalium uvnitř vajíčka = megaprothalium obaleno jak stěnou megasporangia, tak integumentem (u nahosemenných je megaprothalium mnohobuněčné zpravidla jěště s archegonií)
- (3) u krytosemenných je megaprothaliem jen zárodečný vak, obsahující zpravidla jen osm jader/buněk



11. Evoluce parazitismu a myko-heterotrofie

- Výtrusné autotrofní rostliny (řasy, mechrosty, plavuně a kapradorosty) nevytvářejí parazitické formy (výjimečně jen myko-heterotrofní gametofyty plavuní, a tř. *Psilotopsida*)
- U semenných rostlin vznikl parazitismus v řadě nezávislých linií opakovaně!



Monotropa hypopitys,
Ericaceae



Sarcodes sanguinea,
Ericaceae



Neottia nidus-avis,
Orchidaceae



Hydnora, Hydnoraceae



Lathraea, Orobanchaceae



Parasitaxus usta,
Podocarpaceae
(nahosemenný
parazit
nahosemenných
rostlin)



Hyobanche, Orobanchaceae



Viscum, Santalaceae



Cuscuta, Convolvulaceae




Rafflesia, Rafflesiaceae

Mykoheterotrofní paraziti hub = „analogy“ prothalií u *Lycopodium*, *Psilotum*, *Ophioglossum*, ...

11. Evoluce parazitismu a mykoheterotrofie


– holoparazitismus se vyvinul 11x v 9 liniích

celkem 390 druhů
je holoparazitických
 $\approx 0,13 \%$



11. Evoluce parazitismu a mykoheterotrofie


– hemiparazitismus se vyvinul 6x v 10 čeledích celkem 4100 druhů je hemiparazitických ≈ 1,4 %



11. Evoluce parazitismu a mykoheterotrofie

– obligátní mykoheterotrofie se vyvinula v 10 čeledích

celkem 515 druhů je obligátně mykoheterotrofních
≈ 0,18 %



Petrosaviaceae – celá čeleď = dva rody, obligátně mykoheterotrofní je *Petrosavia* (3 druhy), fakultativně mykoheterotrofní je *Japonolirion* (monotypický). JV Asie (Japonsko, Čína, Z Malajsie). Jediná čel. řádu Petrosaviales.

Burmaniaceae – 9 rodů (některé monotypické) s mykoheterotrofií. *Burmannia* – 19 obligátně mykoheterotrofních druhů (hlavně druhy deštných lesů) ostatní mají chlorofyl (hlavně druhy otevřených stanovišť); *Campylosiphon* několik obligátně mykoheterotrofních druhů v J Americe další v Z Africe. Celkově čeleď pantropicky rozšířená.

Orchidaceae – řada rodů obligátně mykoheterotrofní, jiné fakultativně

Iridaceae – 66/2035 – mykoheterotrofní jen rod *Geosiris* (2 druhy – Madagaskar, Mayotte)


Polygalaceae – 21/965 – mykoheterotrofní jen rod *Epirixanthes* (6 druhů v tropické JV Asii)

Ericaceae – 126/4010 – obligátně mykoheterotrofní je podčel. Monotropoideae (10/15)

Gentianaceae – 99/1740 – mykoheterotrofní jen rod *Voyria* (18 druhů většinou v tropické Americe vz. i v Z Africe)

11. Evoluce masožravosti

– karnivorie se vyvinula 10x ve 14 čeledích, zhruba 800 druhů je masožravých
 $\approx 0,26\%$



Bromeliaceae – 69/3540 – masožravost jen v rodech *Bromelia* (z ca. 20 druhů, tři masožravé) a *Catopsis* (z ca 20 druhů je masožravý *C. berteroiana*)

Eriocaulaceae – 7/1160 – z masožravosti podezřelý jen druh *Paepalanthus bromelioides*

Cephalotaceae – 1/1 – *Cephalotus follicularis* JZ Austrálie

Masožravý celý klad, zahrnující čeledi **Droseraceae** (3/205), **Nepenthaceae** (1/150), **Drosophyllaceae** (1/1), **Ancistrocladaceae** (1/12) a **Dioncophyllaceae** (3/3)

Masožravé čeledi **Sarraceniaceae** (3/32) a **Roridulaceae** (1/2)

Masožravost se nezávisle vyvinula v čeledích **Lentibulariaceae** (3/350), **Byblidaceae** (1/8) a také v rodu *Philcoxia* z čel. **Plantaginaceae** zahrnujícím 5 druhů omezených na Brazílii)

Stylidaceae – 6/245 – některé druhy australského rodu *Stylium* mají žláznaté trichomy na listech a stvolech

Specifické znaky nahosemenných


odlišující je od

rostlin krytosemenných


1. Buňky cévních svazků

Xylem nahosemenných – většinou tvoří **jen tracheidy a parenchym**; jen *Gnetopsida* mají i tracheje; krytosemenné mají navíc tracheje a libriformní fibrily



Floem nahosemenných – jen **sítkové buňky** (+ buňky Strassburgerovy); krytosemenné mají sítkovice (+ přidružené buňky)



Picea abies






Quercus petraea





2. Dvûrkaté dvojtečky propojující tracheidy

(opačně orientované „déravé“ vyklenutí buněčných stén sousedních buněk umožňuje zavírání a otvírání „ventilu“ pomocí pohybů „zátky“ ze střední lamely)
Efektivní obrana proti kavitaci





Ztenčeniny na tracheidách





3. Parenchymatické paprsky

ve dřevě nahosemenných – většinou **uniseriátní**

krytosemenné mají multiseriátní



Juniperus communis






Robinia pseudacacia



3. Parenchymatické paprsky

ve dřevě nahosemenných – většinou **uniseriátní**

krytosemenné mají multiseriátní



Juniperus communis



Robinia pseudacacia

Sekundární tloustnutí


– trvalou aktivitou interkalárních meristémů:

kambium – růst objemu


felogen – zacelovaní povrchu

rostoucího v závislosti na objemu


Primární tloustnutí – zprostředkováno diferenciací buněk, zejména cévních svazků




Sekundární tloustnutí



– pozice svazků původního eustélé je v kmeni jen sotva značná – tvoří ji „díly dortu“ oddělené dřeňovými paprsky (původně parenchymatickou dření mezi jednotlivými svazky); mezi tyto „původní paprsky“ se směrem k obvodu kmene vkládají činnosti kambia další dřeňové paprsky



Sekundární tloustnutí – analýza šířky letokruhů – dendrochronologické datovaní ze zbytků dřeva




oddělení *Gymnospermophyta* = nahosemenné

má šest tříd:

1. tř. *Cordaitopsida* – kordaity
2. tř. *Cycadopsida* – cykasy
3. tř. *Cycadeoideopsida* – benetity
4. tř. *Ginkgoopsida* – jinany
5. tř. *Pinopsida* – jehličnany
6. tř. *Gnetopsida* – liánovce

Podíl na recentní druhové diverzitě vyšších rostlin je malý

Současná druhová diverzita vyšších rostlin



1. tř. *Cordaitopsida* (kordaity)



Fosilní nahosemenné dřeviny s páskovitými listy a složenými šiškami
? Předchůdci jehličnanů

Jméno řádu je odvozeno od rodu *Cordaites*, pojmenovaného podle našeho mykologa a paleontologa z první poloviny 19. stol. Augusta Josefa Cordy (1809-1849).



Až 30 m vys. stromy

Vodivé elementy – eustélické, kmen
druhotně tloustne (na bázi až 1 m v průměru)

Dřevo – husté pyknoxylické, jako recentní
jehličnany; střed kmene – dřeň, na povrchu borka

Větve koruny – monopodiálně větvené



Xylem – podobný recentním jehličnanům z čel. *Araucariaceae* – tracheidami hustě spirálně dvojtečkovanými, parenchymové paprsky jednovrstevné (uniseriátní) jako u jehličnanů

Fosilní kordaity

Dadoxylon





tracheidy a uniseriátní
paprsky

tracheidy hustě spirálně
dvojtečkované

Recentní *Araucariaceae*

Wollemia – tracheidy



Araucaria – tracheidy



Kořeny – často chůdovité

– jako stromy v záplavových zónách
s dlouho stagnující vodou
(např. mangrove)





Figure 15. Reconstruction of Mangrove-type Cordaites
(Drawn by Jerry Jenkins after Cridland)



Listy

- kopinaté se souběžnou hustou žilnatinou
- 20-70 cm dlouhé,
- přisedlé
- spirálovitě uspořádané,





Listy

- kopinaté se souběžnou hustou žilnatinou
- 20-70 cm dlouhé,
- přisedlé
- spirálovitě uspořádané, tuhé,
- se sklerenchymovými výzvužemi mezi žilkami




Listy

- kopinaté se souběžnou hustou žilnatinou
- 20-70 cm dlouhé,
- přisedlé
- spirálovitě uspořádané, tuhé,
- se sklerenchymovými výztužemi mezi žilkami




Mikrostrobily – složené strobily = šišky drobných šišek v paždí listenů




Mikrosporofylly = „tyčinky“ – v paždí fertilen šupin (listenů) tvořících drobné jednoduché šišky

Pyl – většinou s jedním obvodovým vzduchovým vakem





Megastrobily – taky jehnědovité nebo klasovité „šíšky složené ze šišek“

- stopkatá plochá srdčitá vajíčka v paždí listenů jednoduchých šišek
- semena drobná plochá „okřídlená“



Vajíčka

- s pylovou a archegoniální komorou
- se dvěma archegonii




Cardiocarpus sclerostesta

Historie

- poprvé svrchní karbon (307 mya)
- vrchol přelomu karbonu a permu, kdy tvořily dominanty lesní vegetace
- vymírají ve svrchním permu (250 mya)

Zástupci - *Cordaites principalis*


Naleziště: Německo, Belgie



2. tř. Cycadopsida (cykasy)



Stálezelené recentní i fosilní dvoudomé dřeviny,
vzhledem připomínají palmy
recentně ~300 druhů
Hlavně tropy,
spíše sušší stanoviště



hlavní kořen kůlovitý, s četnými postranními, dichotomicky větvenými

při ohni se může kořen i kmen smrštit tak, že se část kmene zasune pod zem.






Fig. 8.17. *Cycas revoluta*. T.S. normal root (old).


Na bázi kmene adventivní **korálovité kořeny** (hlízkovité), horizontálně rostoucí. V hlízkách vrstva buněk se symbiotickými sinicemi (*Nostoc*, *Anabaena* nebo *Trichormus*, popř. bakterie rodu *Azotobacter*), fixujícími vzdušný dusík do biologicky využitelné formy - např. dusičnanů.



Kromě fixovaného dusíku produkují sinice také neurotoxin beta-N-methylamino-L-alanin (BMAA). Transportován do megastrobilů, kde je během vývoje vajíček vylučován z idioblastů jako obrana proti herbivorům.

Vodivé pletivo korálovitých kořenů je triarchní

Kmen štíhlý, válcovitý nebo kulovitý,
většinou nevětvený vysoký až 15 m (tu
dosahuje australská *Lepidozamia hopei*)



V kmeni je kromě xylemu vysoký podíl parenchymu = „řídká“ manoxylická struktura => nemůže odolávat mrazu a neunesl by těžké boční větve

Soustředná kambia – při tloustnutí kmene se vně zakládají nové kruhy kambia, vnitřní ale zůstávají ještě několik let dál aktivní = kmen tvořen soustřednými vodivými válcemi xylemu a floemu







Fig. 8.22. *Cycas* T.S. old stem (diagrammatic)



Ságo (nepravé) = škrobnatá opalizující kaše, která se suší a drtí na mouku. Získává se z parenchymatické kůry, dřeně a mezisvazkových parenchymatických paprsků kmene některých cykasů.

Listy v růžici na vrcholu kmene, řapíkaté, až 7 m dlouhé, tuhé, kožovité, zpravidla 1x zpeřené (velmi vz. 2x zpeřené nebo jednoduché).




Cycas micholitzii
s vidličnatě dělenými lístky



Macrozamia stenomera s vícenásobně vidličnatě dělenými lístky / úkrojky



Fosilní cykas *Bjuvia simplex* s jednoduchými listy




Vedle zpeřených asimilujících listů mají také nezelené trojúhelníkovité, často hrotité, ochranné šupiny (katafyly), porostlé trichomy. Katafyly chrání vzrostný vrchol kmene.



Kolaterální cévní svazky v řapíku a vřeteni listu cykasů uspořádány do tvaru obráceného písmene omega Ω



Jednotlivý svazek



Řez listovým úkrojkem s kolaterální střední žilkou

Kutikula - silná

Průduchy – často hluboce zanořené



Úkrojky listů - v mládí circinátně svinuté, v dospělosti často s hrotitou špičkou




Sporofyly často v šišticích (strobilech), nebo ve spirálovitém terminálním chocholu.

Reprodukční orgány mohou vznikat každý rok, u některých druhů však jejich tvorba může být jen jednou za 10–15 let; u některých druhů je tvorba šištic inicializovaná požárem.




Na jednom sporofylu
většinou 2
vajíčka
(někdy až 8)



Vajíčko (= homolog megasporangia)

Pletivo uvnitř vajíčka = nucellus
= (homolog archesporia)

(1) Jedna z buněk nucellu (mateřská) se meiózou rozdělí na 4 haploidní spóry;




Vajíčko (= homolog megasporangia)

Pletivo uvnitř vajíčka = nucellus
= (homolog archesporia)

(1) Jedna z buněk nucellu (mateřská) se meiózou rozdělí na 4 haploidní spóry;

(2) Tři z nich zaniknou




Vajíčko (= homolog megasporangia)

Pletivo uvnitř vajíčka = nucellus
= (homolog archesporia)



(1) Jedna z buněk nucellu (mateřská) se meiózou rozdělí na 4 haploidní spóry;

(2) Tři z nich zaniknou

(3) Zbude 1 megaspóra, která dělením vyplní vnitřek vajíčka megaprothaliem (= samičím gametofytem) s archegonii.





Vajíčka mají 1 trojvrstevný obal + obal nucelární





nucellus

\ (\rightarrow vnitřní blanité osemení)
 - integument (\rightarrow sklerotesta)
 / (\rightarrow sarkotesta)

Vajíčka mají 1 trojvrstevný obal + obal nucelární





Vajíčka mají 1 trojvrstevný obal + obal nucelární



\ (→ vnitřní blanité osemení)
 – integument (→ sklerotesta)
 / (→ sarkotesta)

Vajíčka mají 1 trojvrstevný obal + obal nucelární

**láčka pylová = mikroprothallium
= samčí gametofyt**



mikropyle

pylová komora



nucellus

\ (→ vnitřní blanité osemení)



– integument (→ sklerotesta)

/ (→ sarkotesta)


Vajíčka mají 1 trojvrstevný obal + obal nucelární




Vajíčka mají 1 trojvrstevný obal + obal nucelární




Vajíčka mají 1 trojvrstevný obal + obal nucelární




Vajíčka mají 1 trojvrstevný obal + obal nucelární





Vajíčka mají 1 trojvrstevný obal + obal nucelární







archegonia poměrně
jednoduché stavby 6 buněk





Mikrosporofyl

–
štítkovité nebo šupinovité



Mikrosporofylы – štítkovité nebo šupinovité




Zamia sp.
Cycadaceae
© G. D. Carr




vždy ve strobilech



Mikrosporangia – ve velkém množství na abaxiální ploše mikrosporofylu



Zamia sp.
Cycadaceae
© G. D. Carr



Pyl – monokolpátní bez vzdušných vaků




Přenos pylových zrn – větrem



Přenos pylových zrn třásněnkami

Třásněnky žerou pyl cykasů

slabá koncentrace myrcenu přiláká třásněnky do mikrostrobilů




třásněnka *Cycadothrips chadwicki*
pokrytá mikrospórami
Macrozamia lucida


Přenos pylových zrn třásněnkami

Třásněnky žerou pyl cykasů

slabá koncentrace myrcenu přiláká třásněnky do mikrostrobilů



třásněnka *Cycadothrips chadwicki*
pokrytá mikrospórami
Macrozamia lucida




Myrcen (nazýván dle myrtovitých, u nichž byl poprvé detekován).
Surovina v parfumerní výrobě.

Přenos pylových zrn třásněnkami


Třásněnky žerou pyl cykasů

slabá koncentrace myrcenu přiláká třásněnky do mikrostrobilů

↓
mikrostrobily s třásněnkami metabolicky zvýší teplotu až o 25 °C



třásněnka *Cycadothrips chadwicki*
pokrytá mikrospórami
Macrozamia lucida



Myrcen (nazýván dle myrtovitých, u nichž byl poprvé detekován).
Surovina v parfumerní výrobě.


Přenos pylových zrn třásněnkami

Třásněnky žerou pyl cykasů


slabá koncentrace myrcenu přiláká třásněnky do mikrostrobilů

mikrostrobily s třásněnkami metabolicky zvýší teplotu až o 25°C

uvolní se myrcen a jeho vysoká koncentrace vypudí třásněnky



třásněnka *Cycadothrips chadwicki*
pokrytá mikrospórami
Macrozamia lucida



Myrcen (nazýván dle myrtovitých, u nichž byl poprvé detekován).
Surovina v parfumerní výrobě.

Přenos pylových zrn třásněnkami

Třásněnky žerou pyl cykasů


slabá koncentrace myrcenu přiláká třásněnky do mikrostrobilů

mikrostrobily s třásněnkami metabolicky zvýší teplotu až o 25°C


uvolní se myrcen a jeho vysoká koncentrace vypudí třásněnky

vypuzené třásněnky hledají pyl v podobně vonících megastrobilech

Zahřívání se cyklicky opakuje => přenos pylu mezi pohlavími.



Myrcen (nazýván dle myrtovitých, u nichž byl poprvé detekován). Surovina v parfumerní výrobě.



třásněnka *Cycadothrips chadwicki*
pokrytá mikrospórami
Macrozamia lucida


Podobně se přenášejí pyl zamií i brouci



Pharaxonotha zamiae larvy se živí pylom dospělci také přenos pylu nastane při nechtěných návštěvách samičích šištic

Samčí strobily – bez toxinů = brouci je mohou žrát a při tom se kontaminovat pylem


Samičí šištice – s toxiny z kořenových sinic = brouci po nalétnutí do samičí šištice zjistí, že se díky toxinům žrát nedá = kontaminují vajíčka pylom ale nesežerou je!



Konzervativní morfologie cykasů = kantarogamie u nich může být stará až 300 mil. let – právě z té doby pocházejí nejstarší fosílie brouků!

Vznik pylu v mikrosporangiu

1. Meióza → tetráda haploidních mikrospór




Vznik pylu v mikrosporangiu

1. Meióza → tetráda haploidních mikrospór

2. Každá mikrospóra se mitózou rozdělí ve dvoubuněčné pylové zrno:

- menší buňka prothaliová
- velká buňka generativní




Vznik pylu v mikrosporangiu

1. Meióza → tetráda haploidních mikrospór

2. Každá mikrospóra se mitózou rozdělí ve dvoubuněčné pylové zrno:

- menší buňka prothaliová
- velká buňka generativní

3. Generativní buňka se rozdělí na buňku antheridiovou a láčkovou.



Vznik pylu v mikrosporangiu

1. Meióza → tetráda haploidních mikrospór


2. Každá mikrospóra se mitózou rozdělí ve dvoubuněčné pylové zrno:

- menší buňka prothaliová
- velká buňka generativní


3. Generativní buňka se rozdělí na buňku antheridiovou a láčkovou.

Zralé pylové zrno cykasů je tak trojbuněčné a obsahuje buňky:


prothaliovou, antheridiovou a láčkovou




Dozrání pylu v samčí gametofyt



1. 3-jaderný pyl zachycen polinační kapkou
2. Zachycení pylu vyvolá vysychání kapky
3. Vysycháním kapky pyl vtažen do pylové komory
4. V pylové komoře vyklíčí pylová láčka




Dozrání pylu v samčí gametofyt




1. 3-jaderný pyl zachycen polinační kapkou
2. Zachycení pylu vyvolá vysychání kapky
3. Vysycháním kapky pyl vtažen do pylové komory
4. V pylové komoře vyklíčí pylová láčka



4a. Antheridiová buňka se rozdělí na spermatickou a vegetativní




Dozrání pylu v samčí gametofyt




1. 3-jaderný pyl zachycen polinační kapkou
2. Zachycení pylu vyvolá vysychání kapky
3. Vysycháním kapky pyl vtažen do pylové komory
4. V pylové komoře vyklíčí pylová láčka



- 4a. Antheridiová buňka se rozdělí na spermatickou a vegetativní
- 4b. Spermatická buňka se rozdělí na dva polyciliátní spermatozoidy
- 4c. Zralý samčí gametofyt má tedy 5 buněk/jader (prothaliová, vegetativní, dva spermatozoidy a láčková)




Dozrání pylu v samčí gametofyt




1. 3-jaderný pyl zachycen polinační kapkou
2. Zachycení pylu vyvolá vysychání kapky
3. Vysycháním kapky pyl vtažen do pylové komory
4. V pylové komoře vyklíčí pylová láčka



- 4a. Antheridiová buňka se rozdělí na spermatickou a vegetativní
- 4b. Spermatická buňka se rozdělí na dva polyciliátní spermatozoidy
- 4c. Zralý samčí gametofyt má tedy 5 buněk/jader (prothaliová, vegetativní, dva spermatozoidy a láčková)






Oplození






1. Láčka proroste skrz nucellus do archegoniální komory

Oplození




1. Láčka proroste skrz nucellus do archegoniální komory
2. Průnik láčky do archegoniální komory vyvolá **otevření krčků archegonií** a vyloučení tekutiny do archegoniální komory

Oplození






1. Láčka proroste skrz nucellus do archegoniální komory
2. Průnik láčky do archegoniální komory vyvolá **otevření krčků archegonií** a vyloučení tekutiny do archegoniální komory
3. Spermatozoidy se uvolní z láčky do zvlhlé archegoniální komory




Cycadaceae – láčky větvené
Zamiaceae – láčky nevětvené

Oplození



1. Láčka proroste skrz nucellus do archegoniální komory
2. Průnik láčky do archegoniální komory vyvolá **otevření krčků archegonií** a vyloučení tekutiny do archegoniální komory
3. Spermatozoidy se uvolní z láčky do zvlhlé archegoniální komory
4. Pomocí bičíků doplavou spermatozoidy tekutinou v archegoniální komoře až k oosféře v archegoniu
5. Jeden z nich splyne s oosférou



Cycadaceae – láčky větvené
Zamiaceae – láčky nevětvené

Spermatozoidy


obrovské – až 500 µm velké

Největší samčí pohlavní buňky v rámci rostlinné i živočišné říše

spirálovitě uspořádané bičíky
(bičíků je na spermatozoidu až 25 000)



Objevil je Japonec
Seiichiro Ikeno (1866-1943)
v roce 1896




Oplozené vajíčko zraje v semeno

vnější obal = dužnatá sarkotesta (endozoochorie)

střední obal = dřevnatá sklerotesta


vnitřní obal blanity.



Změna barvy zralé sarkotesty = jasná adaptace na endozoochorii

Z oplozené oosféry vzniká embryo s 2-6 dělohami

Embryo vyživováno pletivem megaprothalia = primárním živným pletivem



Historie

poprvé v permu,

vrchol v juře,


nyní 10 rodů se zhruba 300 druhy




Fylogeneticky navazují *Cycadopsida*
na semenné monilofyty ze tř.
Pteridospermopsida



Ivy Livingstone © BIODIDAC




Tři hlavní linie cykasů divergovaly v permu, na evoluci se projevil kontinentální drift



1. čel. **Cycadaceae** jediný rod *Cycas*.



Převážně jihových. Asie, jediný druh na Madagaskaru a pobřeží vých. Afriky.



Geografické rozšíření současných cykasovitých.

1. čel. **Cycadaceae** jediný rod *Cycas*.


Převážně jihových. Asie, jediný druh na Madagaskaru a pobřeží vých. Afriky.




Fosilní doklady cykasů jsou po celém světě – mj. Aljaška, Antarktida, Evropa, Grónsko, ...

Geografické rozšíření současných cykasovitých.

Cycas = nejprimitivnější zástupce - ploché megasporofyly - připomínají 1x zpeřené trofofyly, spirálně uspořádány tak jako trofofyly




Zpravidla více než dvě (4-8) vajíčka (semena) na jednom megasporofylu




úkrojky listů jednožilné

Cycas revoluta má pohlavní chromosomy


systém podobný jako u člověka XX = samice; XY = samec;



chromosom Y kratší než X



2. čel. *Stangeriaceae*



Průduchy
– nezапуštěné

Cycadaceae




Stangeriaceae



Zamiaceae



2. čel. *Stangeriaceae*



Průduchy

– nezапуštěné

Cycadaceae



Stangeriaceae




Zamiaceae



Úkrojky listů – s 1 centrální žilkou a mnoha bočními (transverzálními) žilkami rovnoběžnými resp. z části vidličnatě větvenými



2. čel. *Stangeriaceae*



Megasporofyly – ve strobilech

Průduchy

– nezапуštěné

Cycadaceae



Stangeriaceae




Zamiaceae



Úkrojky listů – s 1 centrální žilkou a mnoha bočními (transverzálními) žilkami rovnoběžnými resp. z části vidličnatě větvenými






3. čel. *Zamiaceae*

- megasporofyly se 2 vajíčky

Čeled zahrnuje 8 rodů




Čeleď zahrnuje 8 rodů

3. čel. *Zamiaceae*

- megasporofyly se 2 vajíčky

- úkrojky listů vícežilné, v mládí ploché nebo konduplikátně svinuté





Čeleď zahrnuje 8 rodů

Kmen často
hladký (na obr.
Encephalartos)



3. čel. Zamiaceae

- megasporofyly se 2 vajíčky

- úkrojky listů vícežilné, v mládí ploché nebo konduplikátně svinuté



Zamia

Florida, Mexiko J. Amerika, též Kuba, megastrobily
drobnější







Microcycas calocoma - endemit Kuby, strobily až 90 cm



Dioon - Stř. Amerika, má obrovské oosféry - až 6 mm!



jméno *Dioon edule* je podle toho, že mouka ze škrobnatých semen se využívá k přípravě tortilly v některých částech Mexika



Ceratozamia - Mexiko



Ceratozamia sp.
Cycadaceae
Gerald D. Carr



© Kirsten Llamas
photographed at Montgomery Foundation

Počet jedinců v populacích může snadno klesnout pod kritickou mez.

Celá řada druhů ohrožena např *Encephalartos*.



Encephalartos
(Presly nazývaný píchoš)
roste v Jižní Africe,



strobily až 45 kg
těžké

3. tř. Cycadeoideopsida




Fosilní dřeviny, vzhledem připomínající současné cykasy.

Liší se obouohlavnými strobily!



"Dilophosaurus amidst Williamsonia"
Copyright © Walter Myers
<http://www.arcadiastreet.com>




Historie

Původ není zcela jasný - navazují zřejmě na kapradosemenné *Pteridospermopsida*



poprvé – trias

divergence – křída


vymření – horní křída



Dominovaly v druhohorách a byly proto pravděpodobně složkou potravy dinosaurů




Obouohlavný strobilus = „květ“




povrch „pestíku“ s mikropylárními otvory


Obouohlavný strobilus = „květ“




Obouohlavný strobilus = „květ“




Obouohlavný strobilus = „květ“



Obouohlavný strobilus = „květ“




Obouohlavný strobilus = „květ“



Obouohlavný strobilus připomíná uspořádáním, vzhledem a funkcí obouohlavný květ krytosemenných (*Magnoliophyta*).

Williamsonia



Magnolia




Lilium



Obouohlavný strobilus připomíná uspořádáním, vzhledem a funkcí obouohlavný květ krytosemenných (*Magnoliophyta*).

Williamsonia



Magnolia




Lilium




Z toho vychází
tzv. **terorie strobilární (=euanthiové)**


Květ vznikl z jednoduchého obouohlavného strobilu
bennetitů: Cycadeoideopsida ancestroři krytosemenných



Charles Edwin Bessey
(1845 –1915)



Williamsonia - válcovitý kmen, několik m vysoký, již ve svrchním triasu, strobily na koncích větví, semena oválná,





Cycadeoidea

- kulovitý kmen
- strobily - přisedlé na kmeni
- semena - žebernatá až křídlatá



„poupě“ a otevřený „květ“

4. tř. *Ginkgopsida* (jinany)



Opadavé druhotně tloustnoucí dřeviny




Fosilní, s jediným
recentním zástupcem

Ginkgo biloba
pensum
jinanem dvoulaločný



Historie

poprvé - svrchní perm
divergence - jura a křída
ústup - třetihory




V současnosti jediný druh - *Ginkgo biloba* - živoucí fosílie (200 mil. let), jeden z nejstarších existujících rostlinných druhů na Zemi.

Také u jinanů se soudí, že byly podstatnou složkou potravy a tedy i jednou z podmínek expanze dinosaurů



Listy jinanů v současnosti však nežerou skoro žádní hmyzí herbivoři !

Starobylost a izolovanost jinanů dokresluje jejich specifický houbový parazit *Bartheletia paradoxa*



Starobylost a izolovanost jinanů dokresluje jejich specifický houbový parazit *Bartheletia paradoxa*, tvořící bazální linii agaricomycot v rámci bazidiomycot


Basidiomycota →



Feuille de Gingko en cours de dégradation
d'après Mycol Research 2008



Bartheletia paradoxa



MYCOLOGICAL RESEARCH 112 (2008) 1265-1279



British Mycological Society
promoting fungal science
journal homepage: www.elsevier.com/locate/mycres



Bartheletia paradoxa is a living fossil on Ginkgo leaf litter
with a unique septal structure in the Basidiomycota

Christian SCHEUER^{a,*}, Robert BAUER^b, Matthias LUTZ^b, Edith STABENTHEINER^c,
Vadim A. MEL'NIK^d, Martin GRUBE^e

^aUniversität Graz, Institut für Pflanzwissenschaften, Bereich Systematische Botanik und Geobotanik,
Hohenegasse 6, 8010 Graz, Austria


^bUniversitätsmedizinisches Institut, Lehrstuhl Spezielle Botanik und Mykologie, Auf der Morgenstelle 1,
72076 Tübingen, Germany

^cUniversität Graz, Institut für Pflanzwissenschaften, Bereich Pflanzenphysiologie, Schubertstraße 51, 8010 Graz, Austria

^dKomarov Botanical Institute of the Russian Academy of Sciences, 2 Prof. Popov Street, 197576 St. Petersburg, Russia

Evolučně navazují jinany pravděpodobně na kordaity

Cordaites



fosilní *Ginkgo*




Ginkgo biloba



Dřevo kmene – pyknoxylické (málo parechymu)

Xylem – jen s tracheidami (žádné tracheje, žádné fibrily)

Tracheidy – s gymnospermními dvůrkatými dvojtečkami



Větve - téměř vodorovně odstálé,
- s výraznými brachyblasty



Kmen

- až 30 m vys., na bázi v obvodu až 9 m

Borka kmenu

- silná, záhy nahrazuje epidermis
- obsahuje taninové buňky, stejně jako borka jehličnanů

Listy

jednoduché, vějířovité, ve
dva laloky rozdělené

žilnatina vějířovitá, žilky
stejnocenné

u fosilních vějířovitě dřípené
v tenké úkrojky



Listy

jednoduché, vějířovité, ve
dva laloky rozdělené

žilnatina vějířovitá, žilky
stejnocenné

u fosilních vějířovitě dřípené
v tenké úkrojky



spirálovitě ve svazečcích na koncích
brachyblastů, na zimu opadávají

Listy

jednoduché, vějířovité, ve
dva laloky rozdělené

žilnatina vějířovitá, žilky
stejnocenné

u fosilních vějířovitě dřípené
v tenké úkrojky



spirálovitě ve svazečcích na koncích
brachyblastů, na zimu opadávají

na mladých
nezkrácených
větvích jednotlivě



Jinan je
dvoudomý,





pohlavní chromosomy

ZW typu

ZZ = samec;




ZW = samice); W > Z

Mikrosporofyly (mikrosporangiofory) - stopka se dvěma sporangii,
- spirálovitě v jehnědách



Mikrosporofyly (mikrosporangiofory)

- stopka se dvěma sporangií,
- spirálovitě v jehnědách





Pyl - bez vzdušných vaků, monosulkátní


- tvoří se na jaře
- zralý pyl je 3-buněčný

Vajíčka - nahá,

- na stopkách zpravidla dvě,
- transverzálně postavená



Archegonia zjednodušené stavby jen ze 6 buněk =
= čtyři buňky krčkové + kanálková ventrální buňka + oosféra



Opýlení

1. Pyl přenesen větrem ze samčích stromů na polyniční kapku vajíček





2. Přítomnost pylu v polyniční kapce vyvolá její vysychání

3. Vysycháním kapky pyl vtažen do pylové komory

Oplození


1. V pylové komoře vyklíčí z pylu láčka
2. Láčka (samčí gametofyt) roste a větví se v nucellu, který ji vyživovuje několik měsíců
3. Po opadu semen ze stromu proroste láčka (její hlízovitá část = „antheridium“) skrz stěnu nucellu do archegoniální komory

Prorůstání se děje produkcí enzymů (hlavně proteáz)




Oplození

4. Hlízovitý konec láčky („antheridium“) nese dva polyciliátní spermatozoidy




5. Spermatozoid (70–90 μm)
oplodní vaječnou buňku
(4–7 měsíců po opylení)

Bičíků je na spermatozoidu
zhruba tisíc



Jinany = poslední fylogenetická linie s bičíkatými spermatozoidy



Oplození vyšších rostlin v dalších liniích se tak definitivně odpoutalo od vodního prostředí

Příjem a vedení anorganických živin z půdního roztoku jsou však vyšší rostliny k vodnímu prostředí připoutány trvale

Jinany = poslední fylogenetická linie s bičíkatými spermatozoidy

jejich objev v r. 1896 byl botanickou senzací







FIG. 1. Sakugoro Hirase in 1912 (age 56)

Hirase S (1896) Spermatozoids of *Ginkgo biloba* (in Japanese). Bot Mag Tokyo 10:367–368

V semeno se vyvíjí zpravidla jen jedno z dvojice vajíček, druhé zakrňuje



Semeno – až 3 cm v průměru -
na povrchu dužnatá sarkotesta,
unitř tuhá sklerotesta, pod ní je
škrobnaté živné pletivo s
dvouděložným embryem.



Semena nejprve zelená
Po opadu na zem žloutnou a
postupně odporně páchnou.
Zdrojem zápachu je kyselina
máselná.



V Číně a Japonsku se semena zbavená sarkotesty máčí ve slané vodě,



poté se praží a prodávají pod názvem pehko nebo se přidávají do dezertů.

V posledních letech je z jinanu vyráběna nesčetná řada potravinových doplňků s potenciálně lečivým účinkem



Samotná rostlina se za příhodných podmínek dožívá až 2000 let stáří.






V Číně je podle rukopisů od 7. stol. pěstován jako chrámový strom.




Odsud byl přenesen i do Japonska a Koreje ke stejnemu účelu.



Prvním Evropanem, který jej objevil byl lékař holandského velvyslanectví Engelbert Kaempfer – 1690 ve městě Nagasaki. Jméno gink-go znamená v překladu stříbrný plod nebo také stříbrná meruňka. V roce 1730 přivezl Kaempfer tento strom do milánské bot. zahrady.




Téprve v roce 1956 bylo objeveno refugium v JV Číně - v horách Tien Mu Shan mezi provinciemi Zhejiang a Anhwei.



Téprve v roce 1956 bylo objeveno refugium v JV Číně - v horách Tien Mu Shan mezi provinciemi Zhejiang a Anhwei. Třetihorní areál jinanu zabíral téměř celou severní polokouli.



Zářez rozdělující list ve dvě stejné části symbolizoval pro velkého německého básníka a přírodovědce J. W. Goetheho přátelství a jednotu dvou milujících se lidí, což vyjádřil v básni Ginkgo biloba



Nehvizdyella bipartita = fosilní rod jinanovitých – nižší stromy s jednotlivými vajíčky a kopinatými listy (do 11 cm délky) na brachyblastech.



Popsaný z křídových sedimentů u Nehvizd a Hloubětína SV od Prahy v r. 2005 paleobotanikem Jiřím Kvačkem a jeho spolupracovníky.

