


# **GYNEKOLOGICKÉ MALIGNITY**


## **NÁDORY KŮŽE**

**MUDr. Jana Maistryszinová, Ph. D.**

**MUDr. Jana Folberová**




# Anatomie ženské pánve




© 2009 Terese Winslow  
U.S. Govt. has certain rights


# Topografická anatomie na CT či MR



# Nádory děložního hrdla


- **Incidence:** 11/100 000 žen k roku 2013, 9/100 000 k roku 2018 ,
- mortalita 3/100 000 žen
- 3 nejčastější malignita v ČR





## Věková struktura pacientů


Graf zobrazuje aktuální věkovou strukturu pacientů s danou diagnózou ZN a zemřelých na danou diagnózu ZN. Věková struktura ukazuje % zastoupení věkových skupin mezi pacienty (popř. zemřelými na diagnózu).



35 % pacientek mladších 45 let


## Věková struktura pacientů

Graf zobrazuje aktuální věkovou strukturu pacientů s danou diagnózou ZN a zemřelých na danou diagnózu ZN. Věková struktura ukazuje % zastoupení věkových skupin mezi pacienty (popř. zemřelými na diagnózu).



## C53 - ZN hrdla děložního - cervicis uteri - Incidence, ženy

regionální přehled dle přepočtu na světový standard (ASR-W) za období 1977-2018



Zdroj dat: ÚZIS ČR  
<http://www.svod.cz>

- **Etiologie, rizikové faktory:**

**Perzistentní infekce humánním papilomavirem (HPV) onkopotentní typy 16 a 18 (99 % prekanceróz H- SIL), HPV 31,33,35 a 51**

sexuální chování, kouření, časný věk 1. těhotenství, vysoký počet porodů a potratů – lacerace děložního čípku, porucha imunitního systému, špatné socioekonomicke podmínky


- **Prekanceróza:** cervikální intraepiteliální neoplázie CIN I.-III. nejčastěji v 25-35 letech

Carcinoma in situ v 35-44 letech

- **Invazivní karcinom mezi 45.-55. rokem**

## Klinický obraz:

- exofytický nebo endofytický růst
- krvácení po pohlavním styku, bolest, vodnatý výtok, symptomy z prorůstání do okolních orgánů
- obstrukce močovodů-hydronefroza ledviny
- **časná stadia jsou asymptomatická**



**Šíření:** lokální do děložních vazů (parametrií), do okolních orgánů, šíření lymfogenní, hematogenní


**Diagnostika:** gynekologické vyšetření, vag. UZ



## Prebioptické metody

- **neinvazivní metody ke zjištění prekancerotického stavu-**  
cytologie, kolposkopie, spektroskopie a HPV testace


## Cílená biopsie – minibiopsie, cílená excize, kyretáz děložního hrdla

- RTG plic, cysto a rektoskopie, CT pánve a břicha
- příp. MR pánve, PET/CT
- TM SCC, CYFRA-21, HCG






**Cytologie - odběr z povrchu exocervixu špátlí, z endocervixu speciálním kartáčkem, nátěr na sklo**





**Kolposkopie** - těžké dysplastické změny děložního čípku  
**Rozšířená kolposkopie** s 5% kyselina octovou



# Cervical Intraepithelial Neoplasia (CIN)

## CIN v místě transformační zóny





© Elsevier. Kumar et al: Robbins Basic Pathology 8e - [www.studentconsult.com](http://www.studentconsult.com)



**CIN jsou definovány jako alterace dlaždicového epitelu**, charakterizované abnormální buněčnou proliferací, vyzráváním a cytologickými atypiemi /především jadernými - hyperchromásie, zvětšení - nárůst N/C poměru, pleomorfismus, které jsou v různé míře přítomny ve všech vrstvách epitelu, bez ohledu na stupeň cytoplazmatické maturace.

Jejich grading /CIN I, II a III / je pak založen na části epitelu vykazující známky vyzrávání

Terapie CIN se řídí tíží léze a výsledky kolposkopie. Pacientky s biopticky ověřenou CIN I a uspokojivým kolposkopickým nálezem mohou být pouze sledovány.

**Hlavními metodami léčby pro pacientky s biopticky ověřenou CIN II,III jsou pak ablace či exscize.**

## Konizace děložního čípku



Krátký zákrok s odstraněním postižené části čípku  
Rozsah dle možností k zachování těhotenství

**Trachelektomie prostá či radikální u žen plánujících těhotenství – odstranění téměř celého hrdla děložního, radikální s kraniální částí pochvy a děložními vazami**

**Simplexní hysterektomie**  
**Radikální hysterektomie**

# SCREENING CA DĚLOŽNÍHO HRDLA

- 1x ročně cytologické vyšetření, kolposkopie, kompletní gynekologické vyšetření
- Adresné zvaní
- **Prevence:** očkování 3 profylaktické vakcín proti HPV – bivalentní HPV 16,18 Cervarix, kvadrivalentní v kombinaci s HPV 6 a 11 (prevence genitálních bradavic) Silgard, nanovalentní Gardasil 9
- Nejlépe u dívek před zahájením pohlavního života mezi 9. -10. rokem, věkové rozmezí (9-45 let), v současné době nabízeno i chlapcům



## Věk 9 až 14 let\*

1. dávka:  
Dnes

2. dávka:  
za 5-13 měsíců

1. dávka:  
Dnes

2. dávka:  
za 2 měsíce  
po 1. dávce

3. dávka:  
6. měsíc  
po 1. dávce

\*Přípravek Gardasil 9 lze podat podle třídávkového schématu (0, 2, 6 měsíců). Druhá dávka se má podat nejméně jeden měsíc po první dávce a třetí dávka se má podat nejméně 3 měsíce po druhé dávce. Všechny tři dávky mají být podány v průběhu jednoho roku.

## Věk 15 let a starší



### Ochrana proti HPV typům

6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58

Ochrana proti typům HPV, které způsobují rakovinu děložního čípku, análního otvoru, vulvy, vaginy a genitální bradavice

ano

### Pokrytí ochrany proti rakovině děložního čípku

90%

Pokrytí ochrany proti rakovině análního otvoru, vulvy a vaginy

85-95%

### Pokrytí ochrany proti genitálním bradavicím

90%

### Vakcína vhodná pro ženy i muže

ano

### Orientační cena za dávku

3 555 Kč\*

Hrazeno ze zdravotního pojištění pro 13leté

plně hrazeno\*

## 1. MÝTUS



**Vakcíny nemohou vyvolat onemocnění způsobená HPV, protože neobsahují živé části viru**

Vakcíny proti HPV jsou vyráběny metodami genetického inženýrství, nejedná se tedy o oslabené či mrtvé viry, ale o jejich napodobeniny – VLP (Virus-like particles). Ty obsahují pouze povrchové bílkoviny virů, ale nikoli jejich geny. Vakcíny proti HPV nemohou tedy v žádném případě způsobit onemocnění, proti kterému očkujeme.<sup>6,7</sup>

## HPV, čeleď Papillomaviridae

neobalené dsDNA viry, jejichž replikace probíhá v jádře hostitelské buňky

Pro papillomaviry je charakteristická jak druhová, **tak tkáňová specifita**. Byly detekovány u širokého spektra obratlovců, kromě lidských papillomavirů jsou známy např. králičí, hovězí, kočičí, nebo papouščí, ale dosud nebyl zaznamenán jejich mezidruhový přenos.

Podle typu infikovaného epitelu lze rozlišovat **typy kožní, slizniční a dále některé typy nacházené současně jak v lézích kůže, tak i sliznic**.

Podle svého onkogenního potenciálu se HPV dělí na **vysoko rizikové typy (high risk, HR)** a **typy nízce rizikové (low risk, LR)**

K HR patří např. typ **16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58**, mezi LR typy řadíme např. typ **6, 11, 34, 40, 42, 43, 44, 54, 70, 74**.

Nejvyšší riziko maligní transformace buněk děložního čípku představují především **HPV typy 16 a 18**

Každoročně se ve světě infikuje virem HPV asi 300 milionů žen, z toho asi 100 milionů subtypem 16 a 18.

Přítomnost DNA high-risk HPV se prokazuje v 99,7% u spinocelularního karcinomu  
a v 95 % u adenokarcinomu.

K odhalení typu HPV infekce slouží hybridizační testy.


Maximum výskytu pozorujeme u sexuálně aktivních žen před dosažením 25. roku věku (15–40 %), poté  
incidence klesá a po 35. roce věku perzistuje virus už jen u 5–10 % žen.

Perzistence HPV v epitelu čípku děložního souvisí s neschopností imunitního systému eliminovat virus

Ke vzniku samotného nádoru přispívají další **tzv. nádorové promotory**, všeobecně známé rizikové faktory – sexuálně přenosné infekce, časné zahájení pohlavního života, pohlavní promiskuita, kouření, porucha imunity.

Pro rutinní preventivní a diagnostický screening cervikálních lézí obvykle plně postačuje určení **HPV negativity** nebo **HPV positivity**, v případě pozitivity určení přítomnosti některého typu ze skupiny HR HPV, případně podle charakteru léze i LR HPV

Nejpoužívanější metodou je **Hybrid Capture II systém (Digene)**, který používá pro hybridizaci RNA sondy jak pro skupinu HR HPV typů (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68 ), tak pro skupinu LR HPV typů ( 6,11,42,43,44 )



Obr.: Princip metody Hybrid Capture®2

Jeho podstatou je metoda založená na přímé hybridizaci HPV DNA, detekce pomocí specifických protilátek konjugovaných s příslušným detekčním enzymem, v tomto případě nejčastěji za použití chemiluminiscenčního substrátu. Pro zvýšení citlivosti detekce se využívá metoda amplifikace signálu, tím se tato metoda stává srovnatelně citlivou s detekcí na bázi PCR. Touto metodou lze podle některých publikací detektovat přítomnost papillomavirů s citlivostí již od 1pg HPV DNA/ml.

Přetravání viru v epitelu (v této fázi nemusí být detekovatelné cytologií nebo kolposkopií ještě žádné změny) i po 35. roce života je největším rizikem pro vznik přednádorového stavu a karcinomu.

V současné době jsou screeningové programy založeny ve všech rozvinutých zemích na **onkologické cytologii**, řada zemí nyní doplňuje k zvýšení spolehlivosti screeningu i HPV testaci na onkogenní typy.

Screening cervikálního karcinomu je dnes ve světě uznáván jako nejfektivnější ze všech dostupných screeningových programů

**FIGO klasifikace**- velikost tumoru + hloubka invaze  
**Histopatologie:** Spinocelulární karcinom 85-90 %,

Nová klasifikace pro adenokarcinomy- **Silvův systém**

Sarkomy, melanom




Figure 1. Staging of uterine cervix carcinoma according to FIGO<sup>(3)</sup>.

## Léčba:


**Chirurgická** - konizace, hysterektomie, radikální hysterektomie s pánevní lymfadenektomií

## Radioterapie

- pro stadia IIB a výše - **kurativní RT v konkomitanci s CHT (cDDP)** a s kombinací **brachyterapie** (dávka 45+6 Gy, + BRT 27,5-30 Gy), ozař. objem pánev s/bez paraaortální uzliny
- adjuvantní (zevní s kombinací BRT, dávka 45 Gy+ BRT 10 Gy)
- Paliativní – prevence bolestí, krvácení, mírnění potíží z infiltrace okolních tkání, CHT s cisplatinou+taxany, bevacizumab

**Prognóza** – 5 letý OS v I st. 92 %, II st 75 %, III st 50 %, IV 12 %

# Radioterapie oblast dělohy, pánevních a paraaortálních lymfatických uzlin




# Brachyterapie BRT (brachys = krátký)

## ozařování z krátké vzdálenosti

### Iridium 192

- poločas rozpadu 74 dní
- energie záření 0,38 MeV
- zdroj s vysokým dávkovým příkonem  
**HDR** (high dose rate)
- dávkový příkon nad 12 Gy/hod

### HDR BRT



# Uterovaginální aplikace (UVAG)


- zavedení uterinní sondy do dutiny děložní a ovoidů do poševních kleneb
- výkon se provádí v krátkodobé celkové anestezii (cca 20-30 minut)

*Indikace:*

**kurativní léčba karcinomu hrudla děložního, lokálně pokročilá stadia FIGO IIB a IIIB  
BRT (5x 6,0 Gy UVAG) v kombinaci se zevní RT ( konkom. CHT)**

**paliativní BRT – hemostypticky**

# *Fletcherův aplikátor*



*půlovoidy*

*celé  
ovoidy*

*malé*




*celé  
ovoidy*


*střední*

*celé  
ovoidy*

*velké*

*celé  
ovoidy*






- NÚ: průjmy, potíže při močení, při RT na oblast paraaortálních uzlin nauzea a zvracení, chronické poškození ledvin, sexuální dysfunkce- fibróza pochvy

# Ca děložního těla

**Incidence:** nejčastější gyn. malignita,

- incidence 35/100 000 žen
- mortalita 8/100 000 žen
- Věkové rozložení mezi 60.-75. rokem



**Etiologie, rizikové faktory:**

**I typ – hyperestrogenismus – dobře diferencované, mladší věk, lepší prognóza**

**II typ – bez závislosti na hormonech, nediferencované, starší pacientky**

**Rizikové faktory:** zvýšená hladina estrogenů - pozdní menopauza, nulliparita, ovariální poruchy s neoponovaným prolongovaným působením estrogenů, vysoký věk, obezita, DM, hormonálně aktivní nádory ovaria, imunodeficitní onemocnění a imunosuprese. Lynchův syndrom

**Protektivní ochranné faktory** - vyšší parita, dlouhodobé užívání HAK- redukce rizika až o 50 %.

## Symptomy nemoci:

Většinou diagnostikován časně – nepravidelné nebo postmenopauzální krvácení z rodidel tzv. metrorragie, bolesti podbřišku

## Diagnostika:

- gynekologické vyšetření - USG vag. sondou ( výška endometria, hranice endometrium/myometrium, invaze a infiltrace hrdla)
- histologický odběr získaný separovanou abrazí, ev. při hysteroskopii
- RTG plic, CT břicha + pánve
- Tumor marker Ca 125, HE4
- fakultativně: cystoskopie, rektoskopie, kolonoskopie, USG či CT hrudníku a břicha, CT, MR event. PET

## Histopatologie:

I. **epiteliální nádory 96-98 %** (endometriální adenoca, clear cell ca, serósní papilární ca, adenosquamozní ca)

II. **sarkomy** (leiomyosarkom, endometrální stromální sarkom, adenosarkom) - špatná prognóza

III. **nádory trofoblastu** - koncentrovány celostátně do centra pro léčbu trofoblastu ve FN Motol v Praze

## Klasifikace stádií dle FIGO a TNM

# Terapie

**1. Adekvátní chirurgický výkon** - indikován u všech pacientek klinického stadia I - III, s výjimkou pacientek, u nichž jsou interní kontraindikace operačního výkonu. (**hysterektomie, bilat. AE, lymfadenektomie, laváž**)  
Operační přístup - klasická laparotomie, laparoskopicky asistovaný vaginální výkon

## 2. Radioterapie

### a) adjuvantní radioterapie

- u všech pokročilých nádorů od stádia I b a při nádorovém postižení uzlin.
- neadekvátní operační výkony

### b) primární radioterapie u pacientek s kontraindikací operačního výkonu

### c) paliativní radioterapie většinou cílené ozáření recidiv

## 3. Chemoterapie

- adjuvantní léčba u klinického stadia T3, N1, event.v kombinaci s radioterapií CBDCA/Paclitaxel
- paliativní léčba u klinického stadia IV
- léčba recidiv

**4. hormonální léčba** - medroxyprogesteronacetát, megestrolacetát, tamoxifen, inhibitory aromatáz  
Nádorové buňky vyzrávají vlivem gestagenů

# Intrauterinní aplikace (IU)

*Indikace:* **inoperabilní nádor těla děložního** (kurativa, paliace),  
BRT (2x 7-8 Gy, 3x 6,3 Gy, 5x 7,5 Gy, 4x 8,5 Gy), většinou v kombinaci se zevní RT

- zavedení uterinního aplikátoru do dutiny děložní  
a pochvy
- **výkon v krátkodobé CA** (cca 30 minut)



# Vaginální aplikace, vaginální válec, lineární zářič (LZ)

*Indikace:* adjuvantní RT u karcinomu těla děložního, BRT samostatně nebo v kombinaci se zevní RT

primární terapie u karcinomu vaginy,  
paliativní BRT poševních MTS

- zavedení aplikátoru (vaginální válec) do pochvy
- výkon bez CA



# Ca vaječníků a vejcovodů


- **Incidence: 9,3/100000 žen, mortalita 4/100000**
- průměrný věk pacientek s epiteliálním typem nádoru ovaria je 57 let, u ostatních typů 30 let.
- maximum výskytu tumorů vejcovodů se uvádí kolem 50. roku života.
- incidence na vzestupu, tu ovari **21,4/100 000 žen, mortalita nejvyšší mezi gynekologickými malignitami – až 75 % nádorů diagnostikováno ve vyšším stádiu**, tu vejcovodů **1,4/100000**

## Etiologie, rizikové faktory:

- vysoký počet ovulací (snížení počtu ovulací těhotenstvím, kojením a HAK má protektivní vliv),
- zánětlivé procesy v malé pánvi, endometrióza, polycystická ovaria, ionizační záření na pánev, talek, azbest, vliv výživy
- v 5 –10 % případů mutace v genech BRCA1 a 2 , Lynch

**Šíření:** cestou implantačních metastáz na serozách  
nebo přímým šířením do okolních orgánů, lymfogenně

Peritoneální rozsev je často přítomen již v době primárního diagnózy



## Klinické příznaky:

- časná stádia **bezpríznaková**, nádory bývají odhaleny náhodně a to pouze asi v 10 % případů ( při gyn. vyšetření nebo při chirurgickém výkonu v dutině břišní).
- v pozdních stádiích bývají příznaky často nespecifické (poruchy trávení, nadýmání, zvětšování břicha, pocit tlaku a tíhy v břiše, někdy se ohlásí náhlou příhodou břišní při torzi nebo ruptuře, zánět či trombóza žil DKK)

## Diagnostika:

- gynekologické vyšetření, histologie
- **CA 125 – specifické u 80 % zvýšená hladina**, Ca 19-9 (u mladých - CEA, hCG, AFP)
- USG pánve, RTG plic, CT pánev+RP, metodou volby je NMR, PET,
- fakultativně: cystoskopie, rektoskopie, kolonoskopie

## Histopatologie:

- **nádory epiteliální** (serosní, mucinosní, endometroidní, clear cell, anaplastické, Brennerův tumor)
  - cca 80-90 % všech maligních ovariálních tumorů a vyskytuje se **především od 30. roku výše.**
- **nádory z gonadálního mezodermu** (granulozový nádor ovaria, arrhenoblastom)
  - 5-10 % ovariálních tumorů, vyskytuje se ve všech věkových skupinách, častěji po menopause.
- **germinální nádory** (dysgerminom, non-dysgerminomy - z extraembryonálních tkání - nádor ze žloutkového váčku, nádory z trofoblastu - choriokarcinom, z embryonálních tkání – teratom)
  - 5 % ovariálních tumorů a vyskytuje se převážně **v dětství a v mladém věku do 25 let.** Často se vyskytuje ve smíšené formě

## Klasifikace stádií dle FIGO a TNM

**Prognóza** - I. klinickém stadiu dosahují 5letého přežití v 70–80 %,  
II. klinické stadium v 60 %, ve III. klinickém stadiu ve 23 % a ve IV. klinickém stadiu v 8 %.  
Pětileté přežití v případě pánevní recidivy se pohybuje mezi 14–34 %.

- **Chirurgie !!!** - peritoneální laváž, inspekce a palpace peritoneálních povrchů, biopsie adhezí primárního tumoru s okolím, odběr bioptických vzorků z peritonea, močového měchýře, pravého a levého parakolického prostoru, pravé klenby brániční, peritoneum pánevní stěny v místě tumoru) cytoreduktivní výkon = **dosažení nulového makroskopického rezidua=nejlepší prognóza**
- 0 cm reziduum median přežití 99 měsíců vs 1cm 36 měsíců vs více než 1cm 29 měsíců
- **CHT**- zlatý léčebný standard u FIGO II-IV CBDCA+paclitaxel 6-9x, HIPEC paliace
- RT – není standard, pouze paliativně
- **Biologická léčba** – bevacizumab solo či s CHT, catumaxomab u maligního ascitu
- **PARP inhibitory**- posilují účinek CHT u pacientek s mutací BRCA 1 a 2
  - olaparib, rucaparib, niraparib


Poly (ADP-ribose) polymerase inhibitors, which are often called PARP inhibitors, are a targeted therapies that are used to treat cancers. **PARP is a protein that has a role in cellular growth, regulation and cell repair which helps the cancer cells repair themselves and survive.** The PARP inhibitor stops the cancer cells being repaired which causes the cells to die and so reduces tumor growth.

# Ca vulvae

## Epidemiologie

- ženy nad 60 let
- incidence v ČR stacionární (4/100 000)
- vznikající na podkladě **HPV infekce**

Graf zobrazuje aktuální věkovou strukturu pacientů s danou diagnózou ZN a zemřelých na danou diagnózu ZN. Věková struktura ukazuje % zastoupení věkových skupin mezi pacienty (popř. zemřelými na diagnózu).



- je mnohdy zjištěn až v pokročilém stadiu, kdy je možná pouze léčba paliativní. Tento stav je způsoben ve větším počtu případů tím, že se pacientky dostaví na gynekologické vyšetření pozdě.

## Etiologie, rizikové faktory

- dystrofické změny, chronický zánětlivý proces
- **prekanceróza - VIN I-III**
- **Kouření, imunodeficiency**

### **Klinika:**

- tuhý, vyvýšený infiltrát
- tendence k povrchové ulceraci
- putridní zápach, svědění, pálení, špinění, krvácení
- destrukce vulvy, vaginy, perianální krajiny
- metastazování - inguinálních uzliny, uzliny malé pánve, plíce, játra

**Šíření: lokální, lymfogenní, hematogenní- málo časté (plíce, játra, kosti)**

### **Diagnostika:**

- **gynekologické vyšetření**
- **vulvoskopie**  
posouzení hraničních lezí.
- **cílená biopsie**
- **další vyšetření:** RTG plic, uretrocystoskopie, rektoskopie,  
UZ inquin, CT pánve, retroperitonea, vyšetření SNL a reg. uzlin

## **Histopatologická klasifikace nádorů vulvy**

- varianty dlaždicobuněčného karcinomu (90-94 %)
- maligní melanom (4-8 %)
- epitelální nádory ze žlázek a adnexálních struktur (1-2 %)  
(adenoca, sarkomy)

## **Klasifikace stádií dle FIGO a TNM**

**Prognostické faktory:** klinický staging, histologický typ nádoru a grading, velikost a charakter růstu, lokalizace, celkový stav pacientky, věk, interkurence limitující terapeutické možnosti

## Terapie

- základní léčebnou modalitou **chirurgický výkon** (mutilující a technicky velmi náročný).  
Hlavní podmínkou konzervativního postupu při operaci je detekce a vyhodnocení stavu uzlin.
- **a) možnosti operační léčby:** široká excize, hemivulvektomie u lateralizovaných lézí, radikální vulvektomie nebo exenterace s bilat. inguino-femorální lymfadenektomií
- **b) radioterapie:**
  - samostatná RT nebo konkomitantně s CHT u prim. inop. a když odmítou operaci, dávka 60-70 Gy
  - adjuvantní - dávka 45-50 Gy, v případě tu nad 4 cm, 1 a více pozit. uzlin s transkaps. propagací, resekční okraj pod 8 mm,
  - paliativní
  - technika: poloha na zádech - frog leg, 3D plánování s CT, ozařovaný objem vulva s/bez ingvinálním a pánevními uzlinami
  - NÚ: vlhká deskvamační radiodermatitída, průjem, strangurie a dysurie,
- **c) chemoterapie:** k potenciaci účinku radioterapie nebo u pokročilých a recidivujících onemocnění.
- cDDP, 5-FU, mitomycin

# NÁDORY KŮŽE

- Spinocelulární karcinom
- Bazocelulární karcinom
- Maligní melanom
- nemelanomové nádory jsou heterogenní skupina nemocnění s různým biologickým chováním
- Incidence 196/100 000, nízká mortalita 4,5/100 000

# Bazocelulární karcinom



Příklad běžně se vyskytujícího BCC (nodulární BCC)

- Vychází z bazální vrstvy epidermis,
- Výskyt u bílé rasy, ve starším věku častěji u mužů
- Etiologie: chronická expozice UV záření, chronická imunosuprese, genetická predispozice (xeroderma pigmentosum, Gorlinův syndrom)
- Klinika: výskyt v místech exponovaných slunci, nodulární forma 70 %, superficiální 15 %, s pigmentem
- Vzdálené mts jsou velmi vzácné, častěji lokálně destruktivní růst
- Terapie: totální excize s lemem 5mm, kryoterapie tekutým dusíkem, RT, fotodynamická léčba – expozice UV záření o definované vlnové délce při senzibilizaci porfyriny (fotoexcitace v nád. bb)
- Imiquimod, vismodegib – inhibice hedgehog signální dráhy

# Spinocelulární karcinom

- Vychází z epidermálních keratinocytů
- Ve vyšším věku, častěji u mužů, fototyp kůže I a II
- Etiologie: chronická expozice UV záření, ionizace, chronické dráždění kůže- v jizvách, popáleninách, chemické karcinogeny (arsen), genetické faktory, HPV infekce
- Klinika: difusně infiltrující forma, exofytická forma, časté krvácení, ulcerace
- Lymfogenní šíření, hematogenní při pokročilém onemocnění
- Terapie: radikální excize, disekce postižených lymfat. uzlin, RT, CHT u diseminovaného onemocnění




# Maligní melanom

- Neuroektodermální nádor vznikající z melanocytů, vznik na kůži, sliznicích i v oku
- Incidence dramaticky vzrostlá 20/100 000, mortalita 5/100 000
- Etiologie: genetické faktory- familiární výskyt (5 %), mutace genů pro CDKN2A, BRCA 2, p16
- nejvýznamnější UV záření- důležitá je dávka UV záření v dětství, nárazové opalování se spálením, velké množství pigmentových névů

## C43 - Melanom kůže

srovnání incidence v ČR s ostatními zeměmi světa, ASR - světový standard



Kožní fototyp	Charakteristika	Reakce kůže na slunce*	Hranice zčervenání kůže bez ochrany
I	velmi světlá kůže, rezavé vlasy, pihy	vždy se spáli, někdy se opálí do červena, nikdy nepigmentuje	10 minut
II	světlá kůže, světlé vlasy	vždy se opálí do červena, někdy slabě pigmentuje	10 – 20 minut
III	středně světlá kůže, hnědé až tmavé vlasy	někdy se opálí do červena, zřídka se spáli, vždy pigmentuje	20 – 30 minut
IV	tmavá kůže, tmavé vlasy	nikdy se nespáli, velmi dobře pigmentuje	45 minut

Foto: Liga proti rakovině, Švýcarsko

\* Reakce kůže v průběhu první 30-minutové expozice slunečnímu záření v létě



- A asymetrie
- B nepravidelné okraje (borderline)
- C skvrnité zbarvení (color)
- D průměr nad 5mm
- E trvalé zvětšování v čase (enlargement)



- Povrchově se šířící melanom
- Nodulární melanom
- Akrolentiginozní melanom- dlaně, plosky, prsty
- Lentigo maligna melanom –v obličeji



## Diagnostika- klinické vyšetření, dermatoskopické vyšetření




- Klasifikace dle Breslow (tloušťka nádoru v milimetrech) a Clark (hloubka invaze), počty mitóz, ulcerace, známky regrese nádoru, lymfocytární lem
- Radikální excize, vyšetření sentinelové uzliny při tloušťce 0,5-1 mm
- RTG srdce plic, UZ lymfat. uzlin, UZ jater, PET/CT
- Stanovení mutací v klíčových onkogenech BRAF, c-KIT, NRAS, PD-L1 status

**Terapie:** radikální excize s bezpečnostním lemem 1-2 cm, disekce spádové lymfatické oblasti při pozitivní sentinelové uzlině

- Adjuvantní terapie – **imunoterapie** - interferonem alfa,  
adjuvantní RT výjimečně
- Léčba diseminovaného onemocnění – chirurgie, CHT
- Cílená léčba **BRAF inhibitory** – **vemurafenib**, **dabrafenib**, trametinib
- Moderní imunoterapie – **ipilimumab** - anti CTLA4 protilátka
- Onkolytická vakcína T-VEC- v rámci studií, není stanovena úhrada
- **Prognóza:** Breslow < 1mm 5 leté přežití 95-100 %, 2,1-4 mm 60-75 %, > 4mm 50 %

## Léčebný algoritmus po kompletní resekci maligního melanomu (stadium III a IV) – adjuvantní léčba



Kombinace dabrafenib + trametinib a monoterapie pembrolizumabem jsou indikovány jen po resekci stadia III, nivolumab po kompletní resekci stadia III a IV

T-VEC, což je rekombinantní HSV-1 (herpes virus 1) exprimující GM-CSF (granulocyte-macrophage colony-stimulating factor). Geneticky modifikovaný virus se množí pouze v nádorových buňkách a šetří zdravou tkán. Replikaci v infikované buňce vyvolá její rozpad a následně proniká do okolních nádorových buněk, kde proces pokračuje. Současně, díky lýze, dochází k uvolnění nádorových antigenů, které pak mohou stimulovat lokální i systémovou imunitní reakci. Předpokládá se, že onkolytické viry destruují nádorovou tkán jednak přímou onkolyzou či apoptózou infikovaných buněk, dále apoptózou okolních dosud neinfikovaných nádorových buněk i uvolněním systémové imunitní reakce proti nádoru [11]. T-VEC je oslabený onkolytický herpes simplex virus obsahující gen pro GM-CSF. Virus tak kromě poškození buňky vlastní replikaci produkuje GM-CSF, což zesiluje buněčnou protinádorovou imunitní reakci. T-VEC získal v roce 2015 schválení FDA (Food and Drug Administration) pro léčbu neresektovatelného metastatického melanomu.

Review

## Talimogene Laherparepvec (T-VEC): An Intralesional Cancer Immunotherapy for Advanced Melanoma

**oslabený herpes simplex virus exprimující gen pro GM-CSF**  
indikace neresekabilní metastatický melanom




Figure 1. T-VEC proposed mechanism of action. TDA tumor-derived antigen. GM-CSF: Granulocyte–macrophage colony-stimulating factor. [33]. Image courtesy of Amgen Inc. Open access: used under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Accessed on 22 January 2021.



A: at diagnosis



B: after 6 months



C: after 12 months

**Figure 2.** 62 years old patient presenting with 2 huge malleolar lesions and lymphnodal metastases from acral melanoma. She was treated with T-VEC over a period of 2 years, achieving a complete remission, which is lasting after 2 years from the end of treatment. (A). At diagnosis; (B). after 6 months; (C). After 12 months.



Děkuji za pozornost