

## Slabá formulace diferenciální úlohy

Předpokládejme diferenciální rovnici v silné formě  $L(u) = 0$ . Ve slabé formě ji lze psát

$$\int_{\Omega} L(u) \, d\Omega = 0.$$

Platnost rovnice v silné formě implikuje platnost formy slabé, opačně tomu rozhodně není. Aby slabá forma implikovala silnou, muselo by platit

$$\int_{\Omega} vL(u) \, d\Omega = 0,$$

pro všechny (vhodně integrovatelné) funkce  $v$ . Matematický smysl slabé formulace spočívá v převedení hledané funkce  $u$  mimo diferenciální operátor  $L(u)$ , takže podmínky na diferencovatelnost hledaného řešení jsou oslabeny a převedeny na podmínky diferencovatelnosti pomocných funkcí  $v$ . Formálně se převodu dá dosáhnout (opakovanou) aplikací per partes až k

$$\int_{\Omega} uL^{\dagger}(v) \, d\Omega = 0 \quad (+ \text{okrajové členy}),$$

kde  $L^{\dagger}$  je oprátor sdružený s  $L$ . V praxi můžeme vyvádění  $u$  zastavit, kde potřebujeme: například pro operátory Laplaceova typu, které jsou druhého řádu, zpravidla ponecháme požadavek na spojitost hledané funkce i funkcí aproximačních a per partes aplikujeme pouze jednou:

$$\int_{\Omega} v\Delta \, d\Omega = \int_{\partial\Omega} v\nabla u \cdot d\mathbf{S} - \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, d\Omega.$$

Vraťme se zpět k zavedení slabé formy. Jedná se o soubor nekonečně mnoha podmínek, ale můžeme se omezit na vybranou třídu funkcí  $v$ , v rámci které chceme slabé řešení optimalizovat. Pro potřeby MKP samozřejmě volíme

$$v = \sum_i v[i]N[i],$$

čili snažíme se slabé řešení optimalizovat na množině funkcí přípustných jako řešení problému MKP; dostáváme

$$\sum_i v[i] \int N[i]L(u) d\Omega = 0.$$

Mají-li  $v[i]$  být libovolná, dostáváme tadiční Galerkinovy podmínky

$$i : \int_{\Omega} N[i]L(u) d\Omega = 0.$$

Prověříme ještě vliv jednoduchých okrajových podmínek: okrajový integrál můžeme napsat jako

$$\int_{\partial\Omega} v \nabla u \cdot \mathbf{n} dS,$$


takže pro triviální Neumannovu podmínku na hranici,  $u_n|_{\partial\Omega} \equiv \nabla u|_{\partial\Omega} \cdot \mathbf{n} = 0$ , nedostáváme žádný příspěvek. Dirichletova podmínka také nepřináší žádný okrajový příspěvek, ale z jiného důvodu. Po dosazení ansatzu MKP do obou vyskytujících se funkcí máme

$$i : \sum_j \int_{\partial\Omega} N[i] \nabla N[j] \cdot \mathbf{n} dS.$$

U Dirichletovské hranice sice není derivace hledané funkce nijak omezena, ale sestavujeme pouze pro uzly  $i$  ležící uvnitř simulovaného objemu a hodnota jejich tvarových funkcí na hranici je nulová.

## Metoda konečných prvků ve 2D

Věnujme se nejprve tvaru aproximačních funkcí  $N[i]$ .



Definice zůstává stejná:  $N[i]$  se skládá z po částech lineárních oblastí (v našem případě částí rovin) tak, že je jednotková v uzlu  $i$  a nulová na všech stěnách elementů obsahujícího uzel  $i$ , které samy uzel  $i$  neobsahují.

Každá ze stěn  $N[i]$ , označovaná jako  $N^T[i]$  je tedy tvořena částí roviny

$$ax + by + cz + d = 0,$$

jejíž koeficienty jsou v rámci  $T\{i, j, k\}$  definovány z podmínek

$$N[i]|_{\mathbf{x}[i]} = 1 \quad N[i]|_{\mathbf{x}[j]} = 0 \quad N[i]|_{\mathbf{x}[k]} = 0.$$

(vzhledem k linearitě  $N[i]$  to zaručuje i nulovost na spojnici  $j-k$ )

V praxi obvykle integrujeme v rovině  $xy$ , takže tvarové funkce volíme přímo jako  $N^T[i] = ax + by + c$ .

Soustava rovnic omezující  $N^T[i]$  má tvar

$$ax[i] + bx[i] + c = 1$$

$$ax[j] + bx[j] + c = 0$$

$$ax[k] + bx[k] + c = 0,$$

řešení Kramerovým pravidlem dává

$$N^T[i] = \frac{1}{\Delta_T} [(y_j - y_k)x + (x_k - x_j)y + (x_j y_k - x_k y_j)],$$

kde  $|\Delta_T| = 2S_T$  souvisí s plochou elementu  $T$  a platí

$$\Delta_T = (x_i y_j + x_j y_k + x_k y_i) - (x_i y_k + x_j y_i + x_k y_j).$$


## Momentové integrály ve 2D

Je vidět, že pro operátory Laplaceova typu (lineární, druhého řádu) každé dosazení do funkcionálu MKP povede na integrand ne vyšší než druhé mocniny v proměnných  $x$ ,  $y$ , přičemž parametry integrálu budou známé hodnoty – souřadnice vrcholů elementů.

To ovšem také znamená, že celé sestavování rovnic se rozpadne na výpočet mnoha integrálů typu

$$I^T(a, b) = \iint_T x^a y^b dS,$$

kde  $a + b \leq 2$ . Tyto integrály nazýváme *momentovými*. Zjevně,  $I^T(0, 0) = S_T$ .



Nalezneme nyní momentové integrály  $I^T(k, j)$  nad obecně položeným (trojúhelníkovým) segmentem  $T$ .

Integrály přes prvek mohou zjevně být rozepsány jako

$$I^T(k, j) = \int_{x_a}^{x_b} \int_{p_1}^{p_3} x^k y^j dy dx + \int_{x_b}^{x_c} \int_{p_2}^{p_3} x^k y^j dy dx.$$

Obecná přímka  $p$  zadaná v rovině  $xy$  body  $[x_1, y_1]$  a  $[x_2, y_2]$  může být zapsána ve tvaru

$$p: \quad y = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}x + \frac{x_1y_2 - x_2y_1}{x_1 - x_2},$$

což pro momentové integrály přináší

$$I^T(k, j) = \int_{x_a \frac{y_a - y_b}{x_a - x_b}x + \frac{x_a y_b - x_b y_a}{x_a - x_b}}^{x_b \frac{y_a - y_c}{x_a - x_c}x + \frac{x_a y_c - x_c y_a}{x_a - x_c}} \int_{x_a \frac{y_a - y_b}{x_a - x_b}x + \frac{x_a y_b - x_b y_a}{x_a - x_b}}^{x_c \frac{y_a - y_c}{x_a - x_c}x + \frac{x_a y_c - x_c y_a}{x_a - x_c}} x^k y^j dy dx + \int_{x_b \frac{y_b - y_c}{x_b - x_c}x + \frac{x_b y_c - x_c y_b}{x_b - x_c}}^{x_c \frac{y_a - y_c}{x_a - x_c}x + \frac{x_a y_c - x_c y_a}{x_a - x_c}} \int_{x_b \frac{y_b - y_c}{x_b - x_c}x + \frac{x_b y_c - x_c y_b}{x_b - x_c}} x^k y^j dy dx$$

Po provedení integrace můžeme všechny momenty až do druhého řádu psát

$$I^T(0, 0) = S_T$$

$$I^T(1, 0) = \frac{1}{3}(x_a + x_b + x_c)S_T \quad I^T(0, 1) = \frac{1}{3}(y_a + y_b + y_c)S_T$$

$$I^T(2, 0) = \frac{1}{6}(x_a^2 + x_b^2 + x_c^2 + x_a x_b + x_b x_c + x_a x_c)S_T$$

$$I^T(0, 2) = \frac{1}{6}(y_a^2 + y_b^2 + y_c^2 + y_a y_b + y_b y_c + y_a y_c)S_T$$

$$I^T(1, 1) = \frac{1}{12}[2(x_a y_a + x_b y_b + x_c y_c) + x_a(y_b + y_c) + x_b(y_a + y_c) + x_c(y_a + y_b)]S_T$$

Všimněme si, že momentové integrály byly upraveny až na tvar, ve kterém jsou zcela symetrické – tímto způsobem je překonána speciálnost volby polohy bodů při odvození momentových integrálů (například singularity, které by se projevil při svislé hraně v posledním obrázku).

### Okrajové příspěvky ve 2D FEM

Příspěvek okrajových podmínek Dirichletova a homogenního Neumannova typu v matici soustavy nevystupuje, v obecnějším případě jejich lineární kombinace jej lze nalézt explicitně. Předpokládejme smíšenou okrajovou podmínku ve tvaru  $\alpha u + u_n = 0$ , čili

$$\sum_j u[j] (\alpha N[j] + \nabla N[j] \cdot \mathbf{n}) = 0.$$

Potom v rámci okrajového integrálu můžeme psát

$$K_{ij} : \quad \sum_j u[j] \int_{\partial T} N^T[i] \nabla N^T[j] \cdot \mathbf{n} dl = -\alpha \sum_j u[j] \int_{\partial T} N^T[i] N^T[j] dl.$$

Vyhodnoňme poslední integrál nad hranicí  $i$ - $j$  elementu  $T(i, j, k)$ . Na zvolené hraně  $l$  elementu platí

$$N^T[i]|_l = \frac{x - x_j}{x_i - x_j} \quad N^T[j]|_l = \frac{x - x_i}{x_j - x_i}.$$

Parametrizaci hrany pak volíme jako  $x = x_j + (x_i - x_j)\tau$ ,  $y = y_j + (y_i - y_j)\tau$ , takže celkem dostáváme

$$\int_{\partial T} N^T[i] N^T[j] dl = - \int_0^1 \frac{(x - x_j)(x - x_i)}{(x_i - x_j)^2} L_{ij} d\tau = -L_{ij} \int_0^1 \tau(\tau - 1) d\tau = \frac{L_{ij}}{6},$$

kde  $L_{ij} = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2}$  představuje délku hranice v uvažovaném elementu. Obdobně dostaneme

$$\int_l N^T[i] N^T[i] dl = L_{ij} \int_0^1 \tau^2 d\tau = \frac{L_{ij}}{3}.$$

### *Sestavovací procedura ve 2D*

pro každý element  $T$  :

pro každý **vnitřní** uzel  $i$  elementu  $T$ :

1)  $K_{ii} + = I_T$

2a) je-li uzel  $j$  vnitřní:  $K_{ij} + = I_{v=k}$       je-li uzel  $j$  vnější:  $b_i + = u[j]I_{v=k}$

2b) je-li uzel  $k$  vnitřní:  $K_{ik} + = I_{v=j}$       je-li uzel  $k$  vnější:  $b_i + = u[k]I_{v=j}$

další vnitřní uzel elementu  $T$

*další element.*

Pořadí indexů v matici  $K$  je třeba nemíchat (index aktuálního uzlu je při přičítání neustále první). V kroku 2) je uzel  $v$  vždy ten, který nevystupuje v indexech matice  $K$ .

Indexy  $i, j, k$  (tam kde se jedná o vnitřní uzly) nejsou pořadová čísla odpovídajících uzlů, ale pořadová čísla těchto uzlů v seznamu vnitřních uzlů.