

Chí-test

(Chí-kvadrát, χ^2 , Test dobré shody)

- slouží ke statistickému testování shody mezi očekávanými a pozorovanými hodnotami
- pro naše genetické účely – testování shody mezi očekávanými a pozorovanými počty jedinců v jednotlivých fenotypových nebo genotypových třídách
= **testujeme, zda se pozorovaný fenotypový/genotypový poměr shoduje s teoretickým (očekávaným)**

$$\chi_N^2 = \sum \frac{(x_i - e_i)^2}{e_i}$$

x_i = naměřené (zjištěné) hodnoty

e_i = očekávané hodnoty

N = počet stupňů volnosti, $N = n - 1$

n = počet sčítanců (počet fenotypových/genotypových tříd)

Chí-testem vypočítaná hodnota se pak srovnává s kritickou hodnotou odpovídající zvolené hladině významnosti (nejčastěji 5 %) při daném počtu stupňů volnosti (viz. příklad)

Příklad: V populaci F_2 bylo 404 jedinců $A-$ a 129 aa . Vypočítejte pomocí testu χ^2 , zda se tento číselný poměr shoduje s ideálním poměrem 3:1.

$$\chi_N^2 = \sum \frac{(x_i - e_i)^2}{e_i}$$

$$\begin{aligned} x_i: & 404 & : & 129 \\ e_i: & 399,75 & : & 133,25 \end{aligned}$$

Celkem je 533 jedinců a testujeme poměr 3:1 $533/4 = aa$ $\times 3 = A-$

$$N = n - 1 = 2 - 1 = 1$$

$$\chi_N^2 = \frac{(404 - 399,75)^2}{399,75} + \frac{(129 - 133,25)^2}{133,25} = 0,045 + 0,136 = \underline{\underline{0,181}}$$

Kritická hodnota na 5% hladině významnosti pro 1 stupeň volnosti je 3,84

↓ viz. tabulka

Hodnoty χ^2 pro pravděpodobnost $P = 0,95$ až $0,001$ pro $N = 1$ až 30

| N | 0,95 | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,50 | 0,30 | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,001 |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | 0,004 | 0,016 | 0,064 | 0,15 | 0,46 | 1,07 | 2,71 | 3,84 | 5,41 | 6,64 | 10,83 |
| 2 | 0,103 | 0,21 | 0,45 | 0,71 | 1,39 | 2,41 | 4,61 | 5,99 | 7,82 | 9,21 | 13,82 |
| 3 | 0,35 | 0,58 | 1,01 | 1,42 | 2,37 | 3,67 | 6,25 | 7,82 | 9,84 | 11,34 | 16,27 |
| 4 | 0,71 | 1,06 | 1,65 | 2,20 | 3,36 | 4,88 | 7,78 | 9,49 | 11,67 | 13,28 | 18,47 |
| 5 | 1,15 | 1,61 | 2,34 | 3,00 | 4,35 | 6,06 | 9,24 | 11,07 | 13,39 | 15,09 | 20,52 |
| 6 | 1,63 | 2,20 | 3,07 | 3,83 | 5,35 | 7,23 | 10,65 | 12,59 | 15,03 | 16,81 | 22,46 |
| 7 | 2,17 | 2,83 | 3,82 | 4,67 | 6,35 | 8,38 | 12,02 | 14,07 | 16,62 | 18,48 | 24,32 |
| 8 | 2,73 | 3,49 | 4,59 | 5,53 | 7,34 | 9,52 | 13,36 | 15,51 | 18,17 | 20,09 | 26,13 |
| 9 | 3,32 | 4,17 | 5,38 | 6,39 | 8,34 | 10,66 | 14,68 | 16,92 | 19,68 | 21,67 | 27,88 |
| 10 | 3,94 | 4,87 | 6,18 | 7,27 | 9,34 | 11,78 | 15,99 | 18,31 | 21,16 | 23,21 | 29,59 |
| 11 | 4,57 | 5,58 | 6,99 | 8,15 | 10,34 | 12,90 | 17,28 | 19,68 | 22,62 | 24,73 | 31,26 |
| 12 | 5,23 | 6,30 | 7,81 | 9,03 | 11,34 | 14,01 | 18,55 | 21,03 | 24,05 | 26,22 | 32,91 |
| 13 | 5,89 | 7,04 | 8,63 | 9,93 | 12,34 | 15,12 | 19,81 | 22,36 | 25,36 | 27,69 | 34,53 |
| 14 | 6,57 | 7,79 | 9,47 | 10,82 | 13,34 | 16,22 | 21,06 | 23,69 | 26,87 | 29,14 | 36,12 |
| 15 | 7,26 | 8,55 | 10,31 | 11,72 | 14,34 | 17,32 | 22,31 | 25,00 | 28,26 | 30,58 | 37,70 |
| 16 | 7,96 | 9,31 | 11,15 | 12,62 | 15,34 | 18,42 | 23,54 | 26,30 | 29,63 | 32,00 | 39,25 |
| 17 | 8,67 | 10,09 | 12,00 | 13,53 | 16,34 | 19,51 | 24,77 | 27,59 | 31,00 | 33,41 | 40,79 |
| 18 | 9,39 | 10,87 | 12,86 | 14,44 | 17,34 | 20,60 | 25,99 | 28,87 | 32,35 | 34,81 | 42,31 |
| 19 | 10,12 | 11,65 | 13,72 | 15,35 | 18,34 | 21,69 | 27,20 | 30,14 | 33,69 | 36,19 | 43,82 |
| 20 | 10,85 | 12,44 | 14,58 | 16,27 | 19,34 | 22,78 | 28,41 | 31,41 | 35,02 | 37,57 | 45,32 |

Příklad: V populaci F_2 bylo 404 jedinců $A-$ a 129 aa . Vypočítejte pomocí testu χ^2 , zda se tento číselný poměr shoduje s ideálním poměrem 3:1.

$$\chi_N^2 = \sum \frac{(x_i - e_i)^2}{e_i}$$

$$\begin{array}{l} x_i: 404 \quad : 129 \\ e_i: 399,75 : 133,25 \end{array}$$

Celkem je 533 jedinců a testujeme poměr 3:1 $533/4 = aa$ $\times 3 = A-$

$$N = n - 1 = 2 - 1 = 1$$

$$\chi_N^2 = \frac{(404 - 399,75)^2}{399,75} + \frac{(129 - 133,25)^2}{133,25} = 0,045 + 0,136 = \underline{\underline{0,181}}$$

Kritická hodnota na 5% hladině významnosti pro 1 stupeň volnosti je 3,84



zjištěná hodnota $0,181 < 3,84$, tedy na 5% hladině významnosti nebyl nalezen rozdíl mezi zjištěnými a předpokládanými hodnotami a tedy byl potvrzen štěpný poměr 3 : 1

Příklad: Ověřte, že při tvorbě gamet dochází k nezávislému rozchodu alel do gamet (princip segregace), tedy že u monohybrida vznikají dva druhy gamet se stejnou četností. Použijte minci, jejíž líc představuje dominantní alelu a rub recesivní alelu monohybrida Aa. Hod'te mincí 100x a poznamenejte si kolikrát padne líc a kolikrát rub. Pomocí χ^2 -testu ověřte podíl 1:1.