

kržatka zimní - *Tubaria hiemalis*

- přev. eutrof. trávníky, zimní

hlíva hnízdovitá - *Phyllotopsis nidulans*

- vzácnější dřevní druh, roste i v zimě, nepříjemný plynový zápach

ucháč čepcovitý - *Gyromitra infula*

- náš jediný podzimní ucháč, nejedlý (trocha gyromitrinu)

kyjanka křehká - *Clavaria fragilis*

- trávníky, korbačikoidní vzhled, nejedlá

strmělka mlženka - *Clitocybe nebularis*

- intenzivní nasládlá vůně, jedlá, nesbírá se pro pach, kt. při vaření ještě zesiluje

penízovka sametonohá - *Flammulina velutipes*

- roste trsnatě na listnáčích, tmavý plstnatý třeň, jedlá

helmovka rýhonohá - *Mycena polygramma*

- nejedlá

trepkovitka - *Crepidotus*

- bílá, bez třeně

bělochoroš modravý - *Oligoporus caesius* (syn. *Postia caesia*)

na jehličnanech, hl. pařezech smrků hojný

vláknice zemní - *Inocybe geophylla*

- spermatická vůně i chuť, jedovatá (muskarin)

hnojník obecný - *Coprinus comatus*

hnojník třpytivý - *Coprinus micaceus*

- zbytky vela zejm. na mladých plodnicích (drobná zrníčka); na dřevě

pečárka ovčí - *Agaricus arvensis*

- tendence k žloutnutí (stáří, řez), příjemná vůně i chuť (anýz, mandle), jedlá

šedopórka osmahlá - *Bjerkandera adusta*

pevník nachový - *Chondrostereum purpureum*

dřevomor červený - *Hypoxylon fragiforme*

- nepříliš dlouho odumřelé buky

penízovka kuželovitá - *Rhodocollybia* (*Collybia*) *butyracea*

- jedlá

popraška smrková (*Coniophora piceae*)

- symbióza s velkými mravenci, jejichž larvy hledají datli, tvořící tak otvory v kmeni

helmovka skvrnitá - *Mycena maculata*

trsnatá, červenavě skvrnatějící, dřevo (hl.) jehličnanů, především ve vyšších polohách

troudnatec kopytovitý - *Fomes fomentarius*

- pouze na listnácích, hnědý => šedý, póry otlačením Netmavnou (na rozdíl od někdy podobné lesklokorky ploské)

troudnatec pásovaný - *Fomitopsis pinicola* (syn. *Fomes marginatus*)

- častěji jehličnany, žluto-oranž.-červené tóny

lesklokorka ploská - *Ganoderma lipsiense*

- zejm. listnáče, háčky mouchy (*Agathomyia wankowiczi*)

lištička pomerančová - *Hygrophoropsis aurantiaca*

- jehličnaté lesy, někdy na dřevě, jedlá, ne příliš chutná

šťavnatka slonovinová - *Hygrophorus eburneus*

- slizký klobouk, zejm. pod buky, jedlá

špička cibulová - *Marasmius alliaceus*

- černý třeň, výr. česneková vůně, bučiny, jedlá

ryzec nasládlý - *Lactarius subdulcis*

pod buky, nejedlý

ryzec zelený - *Lactarius blennius*

- bučiny, palčivý

helmovka vlasová - *Mycena capillaris*

- kyselé bučiny, nejedlá

kostrovka páchnoucí - *Skeletokutis odora*

- „plyn a zvratky“, vzácná pralesní houba na padlých kmenech

bránovitec jedlový - *Trichaptum abietinum*

- nafialovělý, jehličnany

trámovka jedlová - *Gloeophyllum abietinum*

- jehličnany, řidší lupeny než tr. plotní

anýzovník vonný - *Gleophyllum odoratum*

- nejčastěji řezné plochy pařezů smrku

helmovka růžová - *Mycena rosea*

- jedovatá

šupinovka slizká - *Pholiota adiposa*

- zejm. buky, nejedlá

černorosol bukový - *Exidia plana*

- buk (topol, habr)

černorosol utřatý - *Exidia truncata*

- dub (lípa), plodnice tlustší, nesrůstají

štítočka jelení - *Pluteus cervinus*

- hnědý klobouk, růžové lupeny, jedlá

čepičatka jehličnanová - *Galerina marginata*

- prudce jedovatá (amanitin), podobná opěnce měnlivé

krásnorůžek rohovitý - *Calocera cornea*

lysohlávka tajemná - *Psilocybe arcana* (syn. lys. modrající - *Psil. cyanescens*)

- s tím synonymem to není tak docela pravda, pravá lysohlávka modrající u nás takřka jistě neroste, pravděpodobně se u nás vyskytují 2-3 blízce příbuzné druhy (l. česká – *P. bohemica*, l. moravská – *P. moravica* a l. tajemná – *P. arcana*)