

8.10.2007 Brno-Černovice, Černovický hájek

Bedla zardělá (*Leucoagaricus leucothites*)

- lupeny nedosahují třeně (volné), bílá, bez šupin na klobouku, má bílé lupeny, pouze v dospělosti s lehkým narůžovělým nádechem.

Čepičatka jehličnatá (*Galerina marginata*)

- Klobouk tupě kuželovitý, s výrazným hrbolkem, hladký, suchý, za vlhka slizký, okraj prosvítavý a rýhovaný, za mlada ověšený zbytky vln. Barva za vlhka šedohnědá až tmavohnědá, za sucha přechází do žlutohněda. Lupeny široce připojené až sbíhavé, vykrojené, prostrádané kratšími lupénky, barvy světle hnědé. V mládí jsou zakryté blanitým závojem. Třeň později dutý, u vrcholu hnědavě poprášený, pod prstenem mívá žlutohnědé pásy, které směrem k bázi tmavnou. Barvy žlutohnědé až tmavohnědé, dole většinou temněji hnědý až načernalý. Dužnina barvy žlutavé až plavohnědé, chuť i vůně mírná, poněkud okurkově moučná. Výtrusný prach rezavě hnědý. Jedovatá

Čechratka olšová (*Paxillus rubicundulus*)

- Klobouk - okraj v mládí podvinutý, jinak výrazněji vláknitě šupinatý, většinou rozpraskaný. Za vlhka až naslizlý. Lupeny husté, sbíhavé, částečně vidlené, barvy žluté až okrově hnědé, po poranění pouze mírně hnědnou. Pod olšemi

Čechratka podvinutá (*Paxillus involutus*)

Čirůvka šedožemlová (*Tricholoma scalpturatum*)

- šedě šupinatý klobouk, moučná vůně, žloutne, mykorrhizní, jedlá

Čirůvka topolová (*Tricholoma populinum*)

- vázána na topoly, klobouk barvy tmavohnědé až červenohnědé, lupeny jsou husté, zoubkem přirostlé, barvy bělavé, ve stáří lehce hnědnoucí, vůně i chuť okurkově moučná, jedlá houba nevalné chuti (ale proti gustu žádný dišputát)

Čirůvka dvoubarvá (*Lepista saeva*)

- Klobouk je zbarven okrově šedě až šedobéžově, lupeny jsou v mládí bělavé, v dospělosti špinavě žluté až okrové, -(modro)fialový třeň! na podzim mimo les. jedlá

Helmovka narůžovělá (*Mycena rosea*)

- velmi podobná h. ředkvičkové, ale bez fialových odstínů, statnější

Helmovka žlutobílá

- bílé lupeny, žlutý klobouk a třeň

Helmovka krvonohá (*Mycena haematopus*)

- Pro tuto helmovku je charakteristické kalně červené až červenavě hnědé zbarvení, ojíněný třeň. V mládí má zdobený okraj klobouků, vylučuje tmavě krvavě červené mléko po porušení a roste na dřevu.

Helmovka medonohá (*Mycena renati*)

Klobouk později ploše kuželovitý, ve stáří se zdviženým okrajem, jemně rýhovaný až zhruba do 3/4, bělavý, masově narůžovělý až narůžověle hnědý, ve středu tmavší. Lupeny krátkým zoubkem sbíhavé, široké, barvy bělavé, posléze s růžovým nádechem. Třeň bělavý, zlatožlutý, oranžově žlutý až okrovohnědý, ve spodní části bíle plstnatý.

Helmovka šafránová (*Mycena crocata*)

- Klobouk - tvar má kuželovitý nebo vyklenutý, barvy hnědošedé se světlejším okrajem, který bývá někdy šafránově skvrnitý. Lupeny jsou krátce připojené, barvy bílé, zbarvující se oranžově. Třeň je hladký, na lomu vylučuje šafránově zbarvenou tekutinu.

Hlíva dubová (*Pleurotus dryinus*)

- Klobouk barvy bílé, bělavé až naředlé, od okraje žloutnoucí. Lupeny jsou sbíhavé, barvy bílé, krémové a ve stáří žloutnoucí a hnědě skvrnitě. Dužnina je dosti tuhá, barvy bílé, poraněním však žloutne, vůně jemná, kořená, chuť mírně oříšková. V mládí zakrývá lupeny blanité velum. Často i na živých dřevinách, na nejrozličnějších druzích. Tuhá, nejedlá

Hnojník obecný (*Coprinus comatus*)

- tvar klobouku je zpočátku vejčité válcovitý, později zvoncovitý, ve stáří se od okraje rozplývá, barvy bílé až bělavé, radiálně vláknitý, později pokrytý odstávajícími hnědavými vláknitými šupinami. Lupeny jsou zprvu bílé, volné, později růžovějící, ve stáří černé a rozplývající se. Prsten je vytrvalý, bílý, posunovatelný. Jedlý

Holubinka parková (*Rusulla pulchella*)

- klobouk červenavý, záhy se odbarvuje do špinavě šedava až zelenava, třeh šedne, palčivá

Hvězdovka (*Geastrum sp.*)

Choroš smolonohý (*Polyporus badius*)

- Plodnice choroše smolonohého je jednoletá a ploše nálevkovitá až vějířovitá. Klobouk je tenký, jemně plstnatý, později lysý, lesklý, barvy kaštanově hnědé až červenohnědé. Okraj je ostrý, zvlněný, světle kaštanový až nažloutlý. Rourky jsou sbíhavé, barvy okrové. Třeh černohnědý, krátký

Lesklokorka ploská (*Ganoderma applanatum*)

- Klobouk má polokruhovitý tvar a je bokem přirostlý, poměrně tenký a plochý. Povrch je polokruhovitě brázditý a hrbolatý, často poprášeny kakaově hnědým výtrusným prachem. Horní strana je skořicově zbarvená a ostře kontrastuje s bílými rourkami. Rourky bílé, pomačkáním hnědnou.

Líha obrněná (*Lyophyllum loricatum*) – trsnatá

Líha srostlá – bílá, trsnatá, roste nejčastěji při okrajích lesních cest, často v kopřivách, obsahuje mutagenní látky

Pýchavka palicovitá (*Handkea excipuliformis*)

- Plodnice má palicovitý tvar a je rozdělená na dvě části, plodnou a sterilní, s jemnými opadávajícími osténky a zrníčky. V mládí bílá, později okrová až světle hnědá.

Rezavec lesknavý (*Inonotus radiatus*)

- Plodnice rezavce rostou většinou střežovitě nad sebou. Povrch je jemně plstnatý, ve stáří lysý, paprscitě zbrázděný, občas soustředěně kruhatý. V mládí je plodnice zářivě žlutá až oranžově červená, později má barvu rezavě hnědou se žlutobílým okrajem, ve stáří je barva hnědá, až hnědočerná s ostrým světlejším okrajem. V mládí velmi často roní velké kapky tekutiny.

Rudoušek uťatý (*Rhodocybe truncata*)

- Klobouk je lysý, barvy plavě okrové až masově hnědé. Lupeny jsou široce připojené až sbíhavé, husté, nízké. Barvy naokrovělé až masově načervenalé. Vůně kořeněná, typická fialková vůně, chuť nasládlá.

Ryzec osikový (*Lactarius controversus*)

- Klobouk je mírně vyklenutý, uprostřed promáčklý, někdy až nálevkovitý. Zbarven je v mládí bělavě, později s okrově až masově růžovými skvrnami, lupeny barvy v mládí krémové, ve stáří špinavě růžové. Mléko bělavě neměnné, palčivé, někdy svíravé.

Strmělka mlženka (*Clitocybe nebularis*)

- Klobouk v mládí má vyklenutý tvar s podvinutým okrajem, později je plochý s okrajem zvlněným. Je masitý, barvy šedé a na povrchu ojíněný. Lupeny jsou široce připojené až sbíhavé, od dužniny klobouku lehce oddělitelné, husté, barvy bílé ale brzy jsou žlutě krémové. Nápadný pach

Strmělka přehmutá (*Clitocybe flaccida*)

- Klobouk má ploše sklenutý tvar, široce promáčklý a někdy až nálevkovitý s podvnután okrajem. Povrch je hladký, barvy žlutavé, plavé až plavě hnědé s vodnatými skvrnami nebo mramorovaný. Okraj je světlejší. Lupeny jsou úzké, vidlené a dlouze sbíhající na třeh. Barvy jsou smetanové až světle červenorezavé. Třeh je barvy okrové až světle oranžově hnědé, dole je však bíle plstnatý.

Slzečník žlutkový (*Bolbitius vitellinus*)

- Klobouk má v mládí tvar vajíčka, posléze je zvoncovitý a ve stáří plochý. Klobouk je tence blanitý a rychle vadnoucí. Do středu je paprscitě rýhovaný. Povrch je slizký, lepkavý, barvy žlutkově nebo citrónově žluté, posléze vybledající. Lupeny jsou prořídle, bledě hlínové, pak světle rezavě žluté. Třeh je dlouhý, štíhlý, válcovitý, dutý a křehký. Povrch je celý bíle vločkatě poprášeny.

Slzivka (*Hebeloma sp.*)

- hnědě skvrnitě ostří lupenů, zemitý pach

Sírovec žlutooranžový (*Laetiporus sulphureus*)

- Tvar klobouku je v mládí hlízovitý, později polokruhovitý nebo vějířovitý, bokem přirostlý. Povrch je silně vrásčité, ojíněný, žlutooranžový, okrově nažloutlý nebo žlutě načervenalý. Rourky jsou velmi krátké s drobnými sírově žlutými póry.

Štítovka vrbová (*Pluteus salicinus*)

- klobouk barvy modrošedé či nazelenalé, nalezneme ji také na dřevě topolů, jasanů, olší, dubů a jiných listnáčů

Štítovka jelení (*Pluteus cervinus*)

- Klobouk je hnědavý nebo šedý, zprvu zvonovitě vyklenutý, později vodorovně rozložený, na středu mírně vyniklý, radiálně paprscitě vláknitý, lesklý, za sucha radiálně rozpukáný. Lupeny jsou od třehů odsedlé, zpočátku bílé, později narůžovělé až masově růžové. Třeh je bílý, tmavě podélně žíhaný.

Šupinovka kostrbatá (*Pholiota squarrosa*)

- Klobouk má široce kuželovitý až vyklenutý. Na středu má většinou hrbolk. Povrch je suchý s výraznými šupinami, na středu vztyčenými. Šupiny mají barvu rezavě okrovou až hnědou a jsou na světle žlutém až žlutookrovém podkladě. Lupeny jsou přirostlé, husté. Barvu mají olivově žlutookrovou, později žlutohnědou, ve stáří až okrově hnědou s olivovým nádechem. Třeh je barvy nahoře nažloutlé až citrónově žluté, přecházející dolů v rezavě okrovou až rezavě hnědou. V mládí je hustě odstále šupinatý s pavučinovitě plstnatou prstenovitou zónou.

Trepkovitka (*Crepidotus sp.*)

Outkovka pestrá (*Trametes versicolor*)

- Plodnice je kloboukatá a většinou střechovitě uspořádaná. Klobouk je úzce připojený k substrátu, plochý. Povrch je lesklý, plstnatý, s hedvábitě hnědě až šedě pásovaný. Ve stáří černavý, v mládí má okraj bělavý až okrový. Rourky jsou až 3 mm vysoké s bílými až krémovými nešednoucími póry.

Závojenka (*Entoloma sp.*)

- šedohnědý klobouk, růžový výtrusný prach

Žampion lesní (*Agaricus silvaticus*)

- Klobouk tmavě skořicově až hnědě vláknitě šupinkatý. Pokožka po otlačení oranžově červená, později hnědně. Lupeny volné, husté, nejdříve růžové, později čokoládově hnědé s bělavě vločkatým ostřím. Prsten převislý, bělavý, blanitý, opadavý.

