

Klouzek žiháný (*Suillus collinitus*) – vláknite žihana pokožka klobúka, naružovelé bazálne mycélium. Častý v mestách, vápencových lomoch, mykorhitická huba v symbióze s borovicemi, často s borovicou čiernou.

Čechratka podvinutá (*Paxillus involutus*) – jedovatá, hnedavá, lupene sa ľahko dajú odpojiť z klobúka, hojná

Holubinka parková (*Rusulla pulchella*) – jablkovite kruchá dužina (všetky ryzce a holubinky), klobouk červenavý, záhy odbarvuje, třeň šedne, páľčivá

Čírůvka šedožemlová (*Tricholoma scalpturatum*) – vykrojené lupeny u třeň (všetchny čírůvky), belavý třeň, klobúk má hnedosivý, vonia po čerstvo rozomletej múke

Odstraněno: ý

Helmovka mléčná (*Mycena galopus*) – roní biele mlieko, rastie na opade

Rhytisma acerinum – patri do Ascomycetes, na listoch javora tvorí čierne škvrny – stromata, v príbehu zimy tvorí pohlavné výtrusy

Odstraněno: Rhytisma

Čírůvka biela (*Tricholoma album*) – nejedlá, sametovĕ biela, nepríjemný chemický pach

Pevník chlupatý (*Stereum hirsutum*) – hladký hymenofor, drevná huba (najmä dub), vrchná strana klobúka odstate chlpatá, velmi hojný

Odstraněno: hymanofor

Pavučinec (*Cortinarius*), podrod Phlegmacium – výrazné farby, výtrusy sa zachytávajú na pavučinke (cortina), klobúk vlhký, třeň suchší, neprebádaná skupina (hlavnĕ je jich mnoho), niektorĕ druhy silno jedovatĕ..radšej nejest

Odstraněno: Phlegmatium

Odstraněno: sieťke

Dřevnatka mnohovářá (*Xylaria polymorpha*) – drevná huba, pevná tvrdá stroma so zanorenými peritheciami

Tmavobĕlka (*Melanoleuca*)

Lesklokorka plošká (*Ganoderma aplanatum*) – v mládí biele póry, chorošovitá huba, na povrchu klobúka má tvrdú kôru, tvorí metabolické teplo, ktoré spôsobuje, usádzanie hrdzavohnedých výtrusov na vrchnej strane klobúka, často v hrubých vrstvách

Helmovka slizká (*Mycena epipterygia*) – citrónovobiele odtiene, lepkavý hlúbik (třeň)

Helmovka ředkvičková (*Mycena pura*) – klobúk je viac rozprestretý ako u ostatných helmoviek, má rôzne farebné formy, hygrofánna (hygrofánni), mierne jedovatá

Odstraněno: hygrofágnna

Křehutka (*Psathyrella*) – zbytky vĕlla ostávajú na klobúku v pásoch, hygrofánna (spôsobuje to viacero farebných odtieňov na klobúku), má čokoládovo-hnedý výtrusný prach

Odstraněno: hygrofágnna

Strmělka přehnutá (*Clitocybe inversa*) – hojná podzimná huba, rastie na opade, saprofytická, rezavý až svetlo hnedý klobúk, zbiehavé lupene, klobúk nálevkovitý, mierne jedovatá

Odstraněno: saprofitická

Bedla ??? (nemá české jméno ☹) (*Leucoagaricus serenus*) – na eutrofných pôdach, v ktorých je veľa tlejúcich zbytkov, v okolí jilmov a olše a podobných náročných dřevin, má volné až odsedlé lupene (ako všetky bedly)

Odstraněno: jasná

Václavka (Armillaria) – obľúbená podzimná jedlá huba, má prstenec, hnedé odtiene, žltá na bázi třeň, biely výtrusný prach, u starších plodníc často hnedavé lupene, treba aspon 20 minut poriadne tepelne upraviť

Bedlička hřebenitá (Lepiota cristata) – stred klobúka hnedý, dookola svetlejšia, nápadný pach

Šedopórka zakouřená (Bjerkandera fumosa) – rastie najmä na vrbach

Helmovka narůžovělá (Mycena rosea) – statnejšia v porovnaní s ostatnými helmovkami, kyjovitý třeň, jedovatá rovnako jako h. ředkvičková

Černorosol bukový (Exidia glandulosa)

Penízečka drobnovýtrusá (Baeospora myosura) – často na šiškách, ojiněný třeň

Odstraněno: ojinělý

Šafránka (Tricholomopsis) – jedlá huba (podradnej akosti), třeň vo farbe klobúka – načervenalý, na pařezoch, žlté lupene, zvaná aj kardinálka

Šupinovka šedohlínová (Pholiota lenta) – podzimná, vložky vella na klobúku, tvorí hrubú vrstvu slizu, pavučinovité vellum, hnedý výtrusný prach, je možná záměna s pavučincom, v mládí nažltlé lupene, na dřevě či opadu

Odstraněno: pavučinovití

Křehutka sametová (Lacrimaria lacrimabunda) – plstnatá

Cystidovka rybovonná – hnedá, v strede klobúka bordová

Odstraněno: Cistidovka

Odstraněno: rýhovaná

Ryzec smrkový (Lactarius deterrimus) – podobný ryzcovi pravému, mlieko sa sfarbuje na zeleno, jedlý

Dřevnatka parohatá (Xylaria hypoxylon) – bežná, na dreve

Slzivka (Hebeloma) – hladký klobúk za vlhka slizký, lupene majú svelé ostrie, belavý třeň, ktorý je v hornej časti vločkatý (pozostatky vella), v mládí na ostrí kvapôčky, zemitý-ředkvový pach

Piptoporus betulinus (Březovní obecný) – parazitický choroš, spôsobuje hnedú hnilobu, papierovitá vrstva na vrchnej strane klobúka

Helmovka zlatolemá (Mycena aurantiomarginata) – oranžové ostří lupenů

Odstraněno: oranžovobřítká

Helmovka tuhonohá (Mycena galericulata) – nápadně tuhý třeň, velmi proměnlivá: na dřevě, Cortinarius varius (Pavučinec různý) – v mládí modrofialové lupene, biely třeň (z podrodu Phlegmacium)

Odstraněno: oražová

Odstraněno: ¶

Holubinka Quéletova (Russula queletii) – rastie v smrečinách, hlavně na vápnik bohatých miestach, má purpurovo-fialovú farbu třeň aj klobúka, biele lupene, vonia po angreštovo-jablkovom kompóte, palčivá - nejedlá

Odstraněno: quéletova

Strmělka mlženka (Clitocybe nebularis) – šedohnedy ojinělý klobúk

Klouzek sličný (*Suillus grevillei*)

Slizečka ocasatá (*Xerula radicata*) – část z plodnice roste pod zemou na dřevě

~~Penízovka kuželovitá (*Collybia asema*) – velmi hojná~~

Odstraněno: Pěnízečka

Odstraněno: Beaspora ...

Bělochoroš modravý (*Postia caesia*)

Pýchavka hruškovitá (*Lycoperdon pyriforme*) – v mládí jedlá

Štítovka jelení (*Pluteus cervinus*) – ružové lupene

Čepičatka jehličnatá (*Galerina marginata*) – v stupni jedovatosti porovnatelná s muchomůrkou zelenou