

OXIDY A HYDROXIDY

Oxidy jsou sloučeniny O²⁻ s prvky kovovými i nekovovými. Ke skupině minerálů - oxidů jsou řazeny také přírodní hydroxidy a oxi-hydroxidy (např. Fe O /OH/).

Systém oxidů

- starší učebnice (např. Slavík a kol. 1974) řadí oxidy podle rostoucího podílu kyslíku ve vzorci

Dnes přirozenější krystalochemická klasifikace:

- *oxidy s tetraedrickou strukturou*
- *oxidy s oktaedrickou strukturou*
- *kombinované tetraedrické + oktaedrické struktury oxidů*
- *kubické oxidy*
- *struktury s jiným uspořádáním struktury*

Struktury oxidů si můžeme obecně představit jako nejtěsnější uspořádání velkých atomů O, kationty obsazují vzniklé dutiny v tomto skeletu.

Oxidy s tetraedrickou strukturou (minerály SiO₂)

Minerály SiO₂ jsou v zemské kůře velmi rozšířené (křemen). *Vyskytuje se v několika polymorfních modifikacích (viz obr.), jejichž vznik je závislý na teplotě a tlaku při jejich krystalizaci. Struktury modifikací SiO₂ jsou tvořené trojrozměrným skeletem vzájemně provázaných tetraedrů SiO₄. (výjimka stišovit – oktaedrický)*

Nejdůležitější z nich je křemen (nejrozšírenější horninotvorný minerál)

Polymorfní modifikace SiO₂:

Křemen nižší (α křemen) - trigonálně trapezoedrický

Křemen vyšší (β křemen) - hexagonální

(teplota fázového přechodu obou modifikací je 573 °C za atmosf. tlaku).

- **vysokoteplotní a nízkotlaké modifikace (tridymit a cristobalit)** –
v dutinách kyselých vulkanitů (Nezdenice)
- **vysokotlaké modifikace (coesit, stišovit)** – v meteorických kráterech,
vznikají při impaktu

Křemen

- *krytaly jsou sloupcovité (α křemen – trigonální a hexagonální prizma, klence, trigonální trapezoedr, β křemen – hexagonální prizma a dipyráma).*
Agregáty zrnité. *Dvojčatné srůsty běžné (alpský, brazílský a japonský).*

Struktura: trojrozměrná struktura křemene (obdoba tektosilikátů) se jeví jako kombinace šestičlánkových a osmičlánkových smyček tetraedrů SiO_4 , v relativně kompaktním uspořádání.

Fyzikální vlastnosti:

- bezbarvý (křišťál), bílý nebo různě zbarvený (fialový – ametyst, hnědý – záhněda, černý – morion, růžový – růženín, žlutý – citrín)
- skelný lesk
- Tvrnost 7, hustota 2.7
- Není štěpný

Geneze velmi rozmanitá:

- podstatný horninotvorný minerál kyselých magmatitů (granit, granodiorit, ryolit, pegmatity /růženín – Bory, Písek/, aplity,.....), metamorfítů (fylity, svory, ruly, granulty,.....)
- v klastických sedimentech (píska, pískovce, droby,.....)
- hydrotermální minerál (rudní žíly, greiseny) – Cínovec (záhnědy), Banská Štiavnica (ametyst), samostatné křemenné žíly (Žulová)
- alpská parageneze (Vysoké Taury),
- dutiny paleobazaltů (melafyry) – ametyst, achát, jaspis – podkrkonoší (Kozákov, Stará Paka,...)

Průmyslový význam: sklářská surovina, optické segmenty

Kromě uvedených minerálů patří do skupiny SiO₂ také:

- *mikrokrystalické (navenek amorfni) variety SiO₂* – chalcedony
- *morfologicky i vnitřní stavbou amorfni* – opál ($\text{SiO}_2 \cdot n \text{H}_2\text{O}$)

Chalcedony – mají agregátní struktury, složené z submikroskopických vláken, zrn a tyčinek, při RTG- analýze odpovídají křemenu. Variety – achát, jaspis, onyx, karneol.

Opál – je hydratovaný SiO₂ a je složen z malých kuliček o velikosti asi 100 nm (vnitřní stavba). V drahém opálu toto uspořádání láme a rozkládá světlo a způsobuje ohnivý barevný třpyt.

Oxidy s oktaedrickou strukturou

(hematit, korund, ilmenit, rutil, kasiterit)

Hematit, korund a ilmenit jsou izostrukturní fáze. Anionty kyslíku tvoří nejtěsnější uspořádání se symetrií hexagonální. Ve 2/3 oktaedrických dutin jsou rozmištěny kationty (Fe, Al, ...). Symetrie krystalu je trigonální.

Hematit – Fe_2O_3

- *krystaluje v soustavě trigonální, krystaly jsou tabulkovité* (tvary – klenec, ditrigonální skalenoedr – viz modely). Tence tabulkovité krystaly tvoří *varieta „spekularit“*. *Agregáty variabilní dle geneze: lupenité, zrnité, paprsčité („lebník“), práškovité (okry), oolity.*

Fyzikální vlastnosti:

- *Barva černá až červená* (dle kvality krystalů a charakteru agregátů), *polokovový lesk (práškovité aggregáty matné)*, někdy náběhové barvy
- Tvrnost 5, hustota 5
- Není štěpný

Geneze hematitu:

- *sedimentární oolitické rudy* (Barrandien – ordovik: Nučice, Zdice)
- *prekambrické železnorudné páskované formace (BIF)* – Kursk (Rusko)
- *hydrotermální* (na sideritových žilách Slovenského rudohoří, s křemenem Horní Blatná u Jáchymova)

Význam: ruda Fe

Korund – Al_2O_3

- *krystaluje v soustavě trigonální, krystaly soudečkovité* (tvary – klenec, ditrigonální skalenoedr – viz modely). *Agregáty zrnité („smírek“).*

Fyzikální vlastnosti:

- *bezbarvý (leukosafír), modrý (safír), červený (rubín), skelný lesk*
- *tvrdost 9*, hustota 4

- Není štěpný

Geneze korundu:

- *pegmatity bohaté hliníkem* (Bory u Velkého Meziříčí)
- *druhotně přechází do náplavů (velmi odolný vůči zvětrávání)* (Jizerská louka)

Význam: vzácný minerál, *klenotnictví, brusné účely*

Ilmenit – Fe Ti O₃

- *krystaluje v soustavě trigonální, krytaly jsou tence tabulkovité* (tvary – klenec, ditrigonální skalenoedr – viz modely

Fyzikální vlastnosti:

- *barva černá, kovový lesk*
- tvrdost 5, hustota 5
- velmi slabě magnetický

Geneze:

- *akcesorický minerál v horninách (gabra, granitoidy, bazalty, amfibolity, ruly,...)*
- *magnetit – ilmenitové magmatogenní rudy v gabrech*
- *druhotně v náplavech* (Jizerská louka – „iserín“)

Význam: ruda Ti

Rutil a kasiterit

- jsou izostrukturální fáze.

Atomy Ti (Sn) tvoří tetragonální buňku – prostorově centrovou a jsou rozmištěny v oktaedrech kyslíků. Symetrie krystalu je tetragonální.

Rutil – Ti O_2

- *krystaluje v soustavě tetragonální, krystaly jsou krátce sloupcovité* (tvary – tetragonální prizmata a dipyramidy) – viz modely. *Hojné dvojčatné srůsty dle (101).* Jehlicovité krystaly (varieta „sagenit“)

Fyzikální vlastnosti:

- *barva červenohnědá až hnědočerná, skelný až polokovový lesk*
- tvrdost 7, hustota 4
- velmi odolný vůči zvětrávání

Geneze:

- *akcesorický minerál v horninách (granulity, amfibolity, ruly,...), v pegmatitech* (Věžná u Rožné)
- *alpská parageneze* – varieta „sagenit“ – bývá v křišťálech
- *druhotně v náplavech* (Soběslav, Golčův Jeníkov)

Kasiterit (cínovec) – Sn O_2

- *krystaluje v soustavě tetragonální, krystaly jsou krátce sloupcovité* (tvary – tetragonální prizmata a dipyramidy) – viz modely. *Hojné dvojčatné srůsty dle (101).* Agregáty zrnité

Fyzikální vlastnosti:

- *barva hnědá, hnědočerná, skelný až polokovový lesk*
- tvrdost 7, hustota 7, velmi odolný vůči zvětrávání

Geneze:

- *vysokoteplotní hydrotermální procesy – ložiska greisenového typu (parageneze + křemen, wolframit, scheelit, topaz, cinvaldit, arzenopyrit)* (Cínovec, Krupka, Horní Slavkov)
- *některé pegmatity, zejména lithné* (Rožná)
- *druhotně v náplavech* (Malajsie)

Význam: ruda Sn

Oxidy s kombinovanou tetraedrickou - oktaedrickou strukturou (spinelidy - magnetit, spinel, chromit)

Spinelidy zahrnují izostrukturní fáze. Anionty kyslíku tvoří nejtěsnější uspořádání se symetrií kubickou. V části tetraedrických i oktaedrických dutin jsou rozmištěny příslušné kationty. Symetrie krystalu je kubická, krystalovým tvarem oktaedr. Hojně dvojčatné srůsty dle (111).

Magnetit Fe_3O_4

- **krytaly tvaru oktaedru.** Agregáty zrnité, zrna izometrická

Fyzikální vlastnosti:

- **barva černá, kovový lesk**
- tvrdost 6, hustota 5
- je magnetický

Geneze:

- **výskyty a ložiska v bazických intruzivech – gabrech** (Ural, Švédsko)
- **Fe-skarny** (Malešov u Kutné Hory, Vlastějovice nad Sázavou, Měděnec, Pernštejn)
- **metamorfovaná ložiska Lahn-Dillského typu (vulkanickosedimentární)** – Malá Morávka, Zlaté Hory, Malý Děd (Hrubý Jeseník)
- **páskovaná železnorudná formace (BIF)** – (Kursk, Rusko)
- **akcesorický minerál** v chloritických břidlicích (oktaedry) – Sobotín, také v bazaltech

Význam: nejkvalitnější ruda Fe

Spinel MgAl_2O_4

- **krytaly tvaru oktaedru.** Agregáty zrnité, zrna izometrická

Fyzikální vlastnosti:

- **různě zbarvený, skelný lesk**, drahokamové odrůdy červené, černá varieta „pleonast“
- **tvrdost 8**, hustota 3.5

Geneze:

- *v metamorfovaných dolomitických a dolomit-kalcitických mramorech*
(Sokolí U Třebíče, Stará Červená Voda u Žulové)
- *díky své odolnosti vůči zvětrávání sekundárně v náplavech* (Jizerská louka – pleonast)

Význam: vzácný minerál, drahokamové odrůdy

Chromit (Fe, Mg) Cr₂O₄

- *krystaly tvaru oktaedru.* Agregáty zrnité, zrna izometrická

Fyzikální vlastnosti: *podobný magnetitu*

- *barva černá až černohnědá, kovový lesk*
- není magneticky

Geneze:

- *výskyty a ložiska v ultrabazických horninách – peridotitech a hadcích*
(Ural, Albánie) – akcesoricky v hadcích u Nové Vsi u Oslavan, Drahonín u Tišnova

Význam: jediná ruda Cr

Oxidy s kubickou strukturou

Uraninit UO_2 s (podíly Pb, Ra)

- krystaly netvoří, *struktura krychlové symetrie s kubickou koordinací atomů uranu*
- *agregáty kusové a ledvinité*

Fyzikální vlastnosti:

- *barva černá, smolný lesk („smolinec“)*
- tvrdost 6, hustota 8-10
- je silně radioaktivní

Geneze:

- *výskyty a ložiska hydrotermálního původu – žilného typu, hlušinou karbonáty, tmavý fluorit, pyrit (Příbram, Rožínka - Olší)*
- *hydrotermální žilná ložiska „pětiprvkové formace“ (Jáchymov, Zálesí u Javorníka)*

Druhotnými minerály uranové slídy (torbernit, autunit, ...)

Význam: ruda U, strategická surovina

Oxidy s jiným uspořádáním struktury

Kuprit Cu₂O

- *kryystaluje v soustavě krychlové*, krystalovým tvarem osmistěn, agregáty zrnité
- zbarvení za čerstva červené s diamantovým leskem na krystalových plochách, rychle nabíhá ocelově šedě s polokovovým leskem
- tvrdost 4, hustota 6

Geneze:

- *na rudních výskytech a ložiskách Cu – produkt oxidace Cu-rud* (Běloves u Náchoda)
- vzácně v dutinách paleobazaltů (melafyrů) - Studenec

Hydroxidy a oxid-hydroxidy

Gibbsit (hydrargillit) $\text{Al}(\text{OH})_3$

- jednoklonný minerál s vrstevní strukturou, tabulkovité krystalky dle 001, podobný slídám, s perletovým leskem
- struktura dioktaedrická
- komponenta bauxitů a lateritů

Brucit $\text{Mg}(\text{OH})_2$

- trigonální minerál s vrstevní strukturou, tabulkovité krystalky, výborná štěpnost dle (001), s perletovým leskem, podobný mastku
- struktura trioktaedrická
- vyskytuje se na puklinách hadců (Kutná Hora)

Diaspor AlO(OH) α

Boehmit AlO(OH) χ

- obě modifikace kosočtverečné

Bauxity, laterity (sedimentární horniny): směs hydroxidů a oxid-hydroxidů Al

- jsou celistvé, zemité, různě zbarvené (šedé až načervenalé při příměsi FeOOH)

Výskyty na Slovensku, ložiska v Maďarsku na na Balkánu

Goethit **Fe O (OH)** α

- *rombický*, krystaly jehličkovité (příbramská „sametka“), agregáty vláknité, krápníkovité až celistvé, *rezavý, hnědý až černý*
- *součást limonitu*

Lepidokrokit **Fe O (OH)** χ

- *podobný goethitu*
- *součást limonitu*

Limonit: směs hydroxidů a oxid-hydroxidů Fe, vzniká zvětráváním sulfidů železa, sideritu apod.

Manganit **Mn O (OH)** χ

- *kosočtverečný*
- *černý*, na vrypu hnědý
- *součást manganomelanů*

Manganomelany: (psilomelan, wad) – oxidy a hydroxidy Mn

- jsou podobné amorfním látkám
- *wad* – *černý, zemitý: dendrity na puklinách hornin*
- *psilomelan* – černý, kompaktní

Geneze: na ložiskách manganových rud (Chvaletice v Železných horách)