




# BIOCHEMIE REGULACE

WIENER – kybernetika






## Regulační mechanismy



## Regulace na enzymové úrovni – rychlá odezva

- Michaelisovskou kinetikou – hexokinasa  $K_m 10^{-4} \text{ M}$ 
  - glukokinasa  $K_m 10 \text{ mM}$
- Inhibicí produktem




- Zpětnou vazbou – allosterie negativní x pozitivní
- Řídícími enzymy v cyklech – citrátový cyklus - ICDH
  - glykolyza PFK
- Kovalentní modifikací – proteasy
  - fosforylaza A B
  - trombin

## Regulace na úrovni NK – indukce a represe – pomalá odezva

JACOB MONOD (1961) operonový model

### Regulace hladiny enzymů v buňce

- Operon - skupina strukturních genů DNA koordinovaně regulovaných promotorem a operátorem




# Regulace hladiny enzymů v buňce

- Promotor - oblast poblíž genu, kde se váže RNAPolymerasa
- Regulátorový gen - gen produkující represor
- Operátor - místo vazby represoru


## Regulace na úrovni NK – indukce a represe – pomalá odezva

JACOB MONOD (1961) operonový model

(a) bez induktoru




(b) s induktorem



## Regulace na úrovni NK – indukce a represe – pomalá odezva

Čtyři kroky, ve kterých může být regulována exprese eukaryontních genů



## Prostorové uspořádání

- Kompartmentace - mitochondrie –  $\beta$ oxidace, citrátový cyklus, respirace
  - cytoplasma – glykolysa, synthesa mastných kyselin
- Transportní systémy - ATPasa
  - karnitinový cyklus

## Humorální regulace


Endokrinní systém – žlázy s vnitřní sekrecí → hormony

BAYLISS, STARLING (1904) - hormony

Chemické složení – NO, AMK, peptidy, bílkoviny, steroidy,  
k.arachidonová


# Hormony

- aminokyselinové, peptidové,  
steroidní, pocházející z MK




<sup>+</sup>H<sub>3</sub>N.His.Ser.Glu.Gly.Thr.Phe.Thr.Ser.Asp.Tyr.Ser.  
.Lys.Tyr.Leu.Asp.Ser.Arg.Arg.Ala.Gln.Asp.Phe.Val.  
.Gln.Trp.Leu.Met.Asn.Thr.CO<sup>−</sup>

Glukagon




Prostaglandin PGA<sub>1</sub>

# Řízení




# Řízení

CNS




## Receptory pro hormony


### Steroidy-tyroidní hormony



# Inzulín




# Peptidy




## Druží poslové

### cAMP







Cílový enzym: aktivace proteinkinasy A



# G-proteiny




# Fosfatidylinositol-4,5-bisfosfát






# Hormony

- Thyroxin - celková stimulace metabolismu




# Hormony

- adrenalin, noradrenalin (regulace odbourávání glykogenu ve svalech)
- Tyr → DOPA → dopamin → noradrenalin → adrenalin




# Metabolismus sacharidů

- Regulace syntézy a odbourávání glykogenu
  - adrenalin (sval), glukagon (játra)



# Hormony

- Inzulin
- Mr 11,5 kDa



# Hormony




- Efekt inzulinu
  - Játra: hromadění glukosy uvnitř buněk - syntéza glykogenu
- Efekt glukagonu
  - regulace odbourávání glykogenu v játrech (nízká hladina glukosy stimuluje sekreci glukagonu - fosforolýza, stimulace lipas adipocytů))

# Hormony

- Diabetes mellitus
  - nízký poměr inzulin/glukagon, hladina glukosy 15 mM, vylučování močí
  - blokování an. glykolýzy, stimulace glukoneogeneze
  - mobilizace tuků, tvorba ketolátek

# Hormony

- Prostaglandiny









# Hormony

- Steroidní hormony
  - cholesterol → pregnenolon (monooxygenasy mitochondrií)
    - kůra nadledvinek (aldosteron, kortisol)
    - pohlavní žlázy, placenta (progesteron, testosterone, etstradiol)


# Hormony

- Steroidní hormony




# Hormony


- Hormony bezobratlých
- (ekdyson + juvenilní hormon)
- Regulace svlékání a metamorfózy hmyzu



- rostlinné hormony
- Mechanismus – aktivace plasmatické H<sup>+</sup>-ATPas




# NO jako hormon




# Nervový vzruch


- ATPasa,  $\text{Na}^+ \text{-K}^+$




membránový potenciál, mV




instantaneous view at  $t = 0$



instantaneous view at  $t = 1 \text{ millisecond}$





# Vedení nervového vzruchu




myelinová pochva

Ranvierův zářez







# Synapse




(b)




(a)





↓  
cholinacetyltransferasa



# Imunochemie

# ZÁKLADNÍ ÚKOLY IMUNITNÍHO SYSTÉMU

- OBRANA PROTI PATOGENŮ
- ODSTRAŇOVÁNÍ ABNORMÁLNÍCH BUNĚK  
(NÁDOROVÝCH, POŠKOZENÝCH,  
INFIKOVANÝCH...)

## BUŇKY IMUNITNÍHO SYSTÉMU:

RŮZNÉ TYPY BÍLÝCH KRVINEK (LEUKOCYTŮ):

MONOCYTY, MAKROFÁGY, GRANULOCYTY,  
LYMFOCYTY...

## ZBRANĚ IMUNITNÍHO SYSTÉMU:

Fagocyty (požírají mikroby)

Komplement

Protilátky

NK-buňky (zabíjejí infikované a nádorové buňky)

T-lymfocyty (několik typů)

# Imunitní odpověď

- Buněčná imunita – T-lymfocyty
- Humorální imunita – B-lymfocyty

Spuštěna interakcí s antigenem

# T- LYMFOCYTY:

VZNIKAJÍ V BRZLÍKU (THYMU)

ROZEZNÁVAJÍ HLAVNĚ FRAGMENTY  
(VNITROBUNĚČNÝCH) PROTEINŮ NA  
POVRCHU JINÝCH BUNĚK

ÚČEL: DETEKCE BUNĚK INFIKOVANÝCH  
“SKRYTÝMI” INTRACELULÁRNÍMI PARAZITY  
(např. VIRY)


# T LYMFOCYTY:

POMOCNÉ TYPU 1 (POMÁHAJÍ VYVOLÁVAT  
ZÁNĚT)

POMOCNÉ TYPU 2 (POMÁHAJÍ JINÝM  
BUŇKÁM (B LYMFOCYTŮM) DĚLAT  
PROTILÁTKY)

CYTOTOXICKÉ (ZABÍJEJÍ INFIKOVANÉ  
BUŇKY, ABY SE NESTALY ZDROJEM  
INFEKCE)

# T LYMFOCYTY: DŮLEŽITÉ FUNKČNÍ SUBPOPULACE



**T<sub>H</sub>**      **B**




$T_c$   
(killer)




# Funkce T<sub>C</sub>

## Cytotoxic T cell activation

■—Antigen



# Funkce T<sub>H</sub>




## B- LYMFOCYTY:

VZNIKAJÍ V KOSTNÍ DŘENI

VYRÁBĚJÍ PROTILÁTKY (VĚTŠINOU ZA  
VYDATNÉ POMOCI T-LYMFOCYTŮ)

# VZNIK REPERTOÁRU B LYMFOCYTŮ



**TABLE 35-2 Isotypes of Human Immunoglobulins**

| Class            | Heavy Chain | Light Chain | Subunit Structure          | Molecular Mass (kD) |
|------------------|-------------|-------------|----------------------------|---------------------|
| IgA <sup>b</sup> | α           | κ or λ      | $(\alpha_2\kappa_2)_nJ^a$  | 360–720             |
|                  |             |             | $(\alpha_2\lambda_2)_nJ^a$ |                     |
| IgD              | δ           | κ or λ      | $\delta_2\kappa_2$         | 160                 |
|                  |             |             | $\delta_2\lambda_2$        |                     |
| IgE              | ε           | κ or λ      | $\varepsilon_2\kappa_2$    | 190                 |
|                  |             |             | $\varepsilon_2\lambda_2$   |                     |
| IgG <sup>b</sup> | γ           | κ or λ      | $\gamma_2\kappa_2$         | 150                 |
|                  |             |             | $\gamma_2\lambda_2$        |                     |
| IgM              | μ           | κ or λ      | $(\mu_2\kappa_2)_5J$       | 950                 |
|                  |             |             | $(\mu_2\lambda_2)_5J$      |                     |




Figure 24–32. Molecular Biology of the Cell, 4th Edition.





Figure 24–23. Molecular Biology of the Cell, 4th Edition.



## PROTILÁTKY:


OBALÍ MIKROORGANISMY A ZNEMOŽNÍ  
JIM NASEDNOUT NA BUŇKY

OBALENÉ MIKROORGANISMY JSOU  
„CHUTNĚJŠÍ“ PRO FAGOCYTY  
(POŽÍRAČE MIKROBŮ)


foreign  
molecules






viruses



bacteria



### ANTIBODIES FORM AGGREGATES




antibody and antigen  
aggregates are ingested  
by phagocytic cells

special proteins in  
blood kill antibody-  
coated bacteria or viruses

# ANTIGENY

*Anti* = proti (řecky)


*gen* = od *gegnomai* tvořit



Makromolekulární látky přirozeného nebo umělého původu, které organismus rozpozná jako cizí (nevlastní). Po vpravení do vhodného (komplementárního) organismu, antigeny stimulují tvorbu protilátek, lymfokinů, regulačních a výkonných T-lymfocytů, čímž se navodí imunitní odpověď'.



*Antigen* je většinou užíván ve významu kompletního antigenu



**IMUNOGENNOST** schopnost vytvořit imunitní odpověď  
(vznik protilátky)


**SPECIFIČNOST** schopnost reagovat s těmito protilátkami,  
jejichž tvorbu vyvolal.  
S jinými protilátkami nereaguje

**HAPTÉN** nemůže vyvolat imunitní odpověď, ale může reagovat s těmito buňkami a protilátkami, které vznikly po interakci imunogenu s imunokomplementární buňkou.

→ Haptén je součástí molekuly kompletního antigenu

### SLOŽENÍ IMUNOGENU:

- 1) MAKROMOLEKULÁRNÍ NOSIČ (*carrier*)
- 2) NÍZKOMOLEKULÁRNÍ DETERMINANTNÍ SKUPINY  
**determinanty, epitofy**





IMUNOGENEM nemůže být jakákoliv látka  
STUPEŇ IMUNOGENNOSTI je závislý na genetické  
Odpovědnosti a zralosti zvířete, kterému se imunogen  
aplikuje.

### FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI IMUNOGENU:

- a) molekulová hmotnost
- b) rozpustnost
- c) elektrický náboj
- d) tvar molekuly

## CHEMICKÉ VLASTNOSTI IMUNOGENU:

IMUNOGEN

PROTEINY, POLYPEPTIDY

POLYSACHARIDY

NUKLEOPROTEINY

Čisté **lipidy** jsou zpravidla jen **haptény**, ale v komplexech s proteiny nebo polysacharidy se stávají dobrými imunogeny. Imunogenovou aktivitu mohou mít všechny biopolymery, které jsou přítomné v živých systémech, ale i syntetické anebo polosyntetické (konjugované) antigeny.

Schopnost vyvolat imunitní odpověď není stejně silná.

Nejsilnější **proteiny**, potom **polysacharidy** a jejich komplexy.

želatina

(slabý imunogen)

malý počet

determinantních

skupin

albumin

(silný imunogen)

dostatečný počet

determinantních skupin

**REAKCE ANTIGENŮ**

**IN VIVO**

**IN VITRO**

**IN VIVO**

**REAKCE**

**IN VITRO**

**REAKCE**


-prospěšná (vznik imunity)  
-škodlivá (imunopatologická)  
-indiferentní (neodpovídá)  
jsou základem imunochemických metod

Základem reakcí je **vznik biospecifické vazby** mezi vazebnými místy protilátky a determinantními skupinami antigenu za vzniku protilátkově-antigenních **komplexů** (imunokomplexů), při interakcích antigenu a protilátky se uplatňují stejné nekovalentní interakce jako např. enzym-substrát, hormon-receptor h.


**ROZDÍL:** protilátky nemění strukturu antigenu irreverzibilně

## SÍLY, KTERÉ SE UPLATŇUJÍ PŘI VAZBĚ ANTIGENU S PROTILÁTKOU


- VODÍKOVÉ VAZBY
- NEPOLÁRNÍ HYDROBÓBNÍ INTERAKCE
- COULOMBOVY SÍLY
- VAN DER WAASOVY SÍLY
- LONDONOVY DISPERZNÍ PŘITAŽLIVÉ SÍLY
- STÉRICKÉ ODPUDIVÉ SÍLY




# Příprava polyklonálních protilátek




inject antigen A




take blood later



# Příprava monoklonálních protilátek




# Příprava monoklonálních protilátek



# Imunochemické metody

- RIA  
(radioimunoanalýza)



# Imunochemické metody

- (ELISA- enzyme linked immunosorbent assay)

