




TYPY HORNIN A JEJICH CHEMISMUS

Vliv na utváření primární struktury krajiny

Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu OP VK Inovace výuky geografických studijních oborů (CZ.1.07/2.2.00/15.0222)
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

SCHEMATICKÁ GEOLOGICKÁ MAPA ČESKÉ REPUBLIKY



Vliv geologického podloží

- Různý způsob zvětrávání hornin
- *Př. pískovce*
 - hornina ze které zvětrávají
 - tmel
 - > různá **úživnost** vzniklých substrátů
- **pH půdy** - jedním z nejvýznamnějších faktorů, které ovlivňují rozšíření rostlin
 - Příčiny:
 - toxicita H^+ a OH^- iontů
 - toxicita Al (Fe, Mn) v kyselých půdách
 - změny v přístupnosti živin
 - (P, Fe, Mn, NH_4^+ – nepřístupné ve vápnatých půdách;
 - K, Ca, Mg, P, NO_3^- , S, Mo – špatně přístupné v kyselých půdách)
- Vliv reliéfu

Klasifikace trofických řad

- Součást geobiocenologické typizace krajiny
 - 5 B 3
 - Vyjadřují rozdíly v **minerální bohatosti** a **kyselosti půd**
- 

Trofické řady a meziřady

- **A – oligotrofní řada**
- AB – oligo-mezotrofní meziřada
- **B – mezotrofní řada**
- BC – mezotrofně-nitrofilní meziřada
- **C – nitrofilní řada**
- BD – mezotrofně bázická meziřada
- **D – bázická řada**
- CD – nitrofilně-bázická meziřada

Horninové podloží – vztah k trofickým řadám


- **A – oligotrofní trofická řada**
 - Velmi kyselé a živinami chudé horniny
- **B – mezotrofní trofická řada**
 - Mírně kyselé až neutrální, středně bohaté až bohatší horniny
- **C – nitrofilní trofická řada**
 - Různorodé horniny
 - Široké říční nivy, zahliněné sutě
 - Akumulace živin -> obohacování dusíkem
- **D – bázická trofická řada**
 - Bázemi bohaté především karbonátové horniny, bázické silikátové horniny

Velmi kyselé a živinami chudé horniny

- **A – oligotrofní trofická řada**

- kyselé žuly, ruly, svory, fylity, křemité porfyry a porfyrity, křemité diority, křemence, buližníky a křemité pískovce

- silně kyselé litozemě, podzolové rankry, kambizemě, kryptopodzoly



- Ostrůvkovitý až souvislý výskyt v hercynských pahorkatinách, vrchovinách a hornatinách, jen výjimečně i v moravské části Karpat

Mírně kyselé až neutrální horniny

- B – mezotrofní trofická řada
 - biotitické žuly, ruly, droby, syenity, diority, flyšové jílovce, gabra
- Hluboké zvětralinny a svahoviny neutrálních až bazických hornin
 - čediče, andezity, amfibolity
- Neogenní a křídové sedimenty a překryvy **sprašových hlín**
- mezotrofní kambizemě a luvizemě
- 1/4 ČR, především ve **flyšové části** moravských Karpat, ostrůvkovitě v hercynské části ČR (souvislý výskyt např. v Českém středohoří a v Doupovských vrších)

Bázemi bohaté horniny


- **D – bázická trofická řada**
- Karbonátové horniny
 - **vápence, vápnité slepence, pískovce a jílovce, vápnité spraše, vápnité opuky**
- Bázické silikátové horniny
 - **hadce, čediče a amfibolity**
- Typické rendziny, karbonátové černozemě, karbonátové litozemě a karbonátové regozemě
- Ostrůvkovitý výskyt
 - Krasové oblasti (Moravský kras, Český kras, Pavlovské vrchy)
 - Sprašové oblasti (moravské úvaly)
 - Oblasti bázických vyvřelin (České středohoří)
 - Vzácněji i na vápnitých křídových sedimentech České tabule a vápnitých sedimentech Středomoravských Karpat



Extrémní substráty


- **Hadce** (serpentinit)
 - Vysoký obsah Mg -> zvětráváním vzniká MgCO_3
 - toxické pro většinu rostlin (i těsněji vázaných živočichů (měkkýši))
 - Výrazný vliv reliéfu nadmořské výšky (srážky)
 - 1. vegetační stupeň – extrémně bázické
 - 2. vegetační stupeň – extrémně bázické
 - 3. vegetační stupeň
 - Plošiny kyselé
 - Svahy bázické
 - Dále kyselé

Žuly






Ruly – ortoruly, pararuly...




Geo ČR


- ortoruly, granulity a velmi pokročilé migmatity v moldanubiku a proterozoiku
- proterozoické horniny, assyntsky zvrásněné s různě silným variským prepracováním (břidlice, fylity, svory až pararuly)
- pestrá série moldanubika (svorové ruly, pararuly až migmatity s složkami vápenců, erlanu, kvarcitu, grafitu a amfibolitu)
- jednotvarná série moldanubika (svorové ruly, pararuly až migmatity)









Rozšíření horských třtinových smrčů.




Rozšíření horských papratkových smrčů.



Rozšíření rašelinných a podmáčených smrčů.






Doložené a předpokládané rozšíření acidofilních bučín.




Písky












Rozšíření subkontinentálních borových doubrav.



Rozšíření vlhkých acidofilních doubrav.




Rozšíření acidofilních doubrav na písku.



Doložené a předpokládané rozšíření suchých acidofilních doubrav.

Flyš




Geo ČR

tercierní horniny alpínsky zvrásněné (pískovce, břidlice)

mezozoické horniny alpínsky zvrásněné (pískovce, břidlice)


0 25 50 75 100 km









Spraš








Rozšíření polonských dubohabňin.




Rozšíření karpatských dubohabňin. Na mapě nejsou zaznamenány přechodné porosty k hercynským dubohabňinám v oblasti Českého masivu.



Doložené a předpokládané rozšíření hercynských dubohabňin.




Vápence





HORNINY

-  křídové vápence, jílovce a slínovce
-  předprvohorní, prvohorní a křídové vápence a mramory
-  třetihorní vápence a vápnité sedimenty



Vulkanity



Geo ČR

-  vulkanické horniny terciární (čediče, fonolity, tufy)
-  vulkanické horniny zčásti metamorfované, proterozoické až paleozoické (amfibolity, diabasy, melafyry, porfyry)


Doupovské hory




České středohoří



Lužické hory




Hadce (serpentina)



Nejvýznamnější hadcové lokality
v České republice: ● Borek u Chotě-
boře, ● Mohelno, ● dolnokralovické
hadce, ▲ Slavkovský les, ■ Křemže,
▲ Mladá Vožice, ● Raškov, ● Staré
Ransko

1





Zdroje

- <http://www.geology.cz/extranet/geodata/mapserver>
- http://geologie.vsb.cz/reg_geol_cr/1_kapitola.htm
- CHYTRÝ, M., KUČERA, T., KOČÍ, M. (2001): *Katalog biotopů České republiky : interpretační příručka k evropským programům Natura 2000 a Smaragd*. Vyd. 1. Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2001. 304 s. ISBN 8086064557
- CHLUPÁČ, I., ŠTORCH, P. eds. (1992): Regionálně geologické dělení Českého masívu na území České republiky. Čas. Mineral. Geol., 37, 4, 258-275. Praha.
- BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): *Geobiocenologie II*. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171