

## **Mineralogie systematická /soustavná/**

- je dílčí disciplínou mineralogie
- studuje a popisuje charakteristické znaky a vlastnosti jednotlivých minerálů a třídí je do přirozené soustavy (systému)

**Minerál /nerost /** - anorganická homogenní přírodnina (většinou krystalická látka - s definovatelnou strukturou), jejíž chemické složení se dá vyjádřit vzorcem

### **Znaky a vlastnosti (u každého minerálu):**

1. Chemické složení (chemismus) – vzorec, vytváření pevných roztoků, izomorfní příměsi (příklady křemen, plagioklasy, sfalerit)
2. Struktura
3. Krystalografie (soustava, bodová grupa = oddělení, vůdčí krystalové tvary)
4. Fyzikální vlastnosti – hlavní poznávací znaky, podobnost (barva, hustota, tvrdost, štěpnost, lesk a jiné: magnetismus, radioaktivita, luminiscence, rozpustnost ve vodě a v činidlech, ....)
5. Geneze (podmínky vzniku a výskytu, asociace – parageneze)
  - za kterých podmínek a v jakém prostředí minerál vzniká, je stabilní, v jakých společenstvech minerálů se nachází,
  - přeměny minerálu a jejich příčiny
6. Topografická mineralogie
7. Význam minerálu v geologii, průmyslové využití

### **Dřívější klasifikace minerálů**

Zmínka, podle jakých principů byly minerály řazeny do systému dříve:  
-hlavně dle vnějších znaků, patrných na první pohled

př. **skupina “halovců”**, charakterizovaných jako nerosty nekovové, lehké a měkké – kalcit CaCO<sub>3</sub>, sádrovec CaSO<sub>4</sub>.2 H<sub>2</sub>O, kryolit Na<sub>3</sub>AlF<sub>6</sub>

př. **“těživce”** siderit FeCO<sub>3</sub>, baryt BaSO<sub>4</sub>, ....

Uvedené názvy zanikly v pol. 19. století – zůstaly názvy:  
“leštěnec olověný” = galenit  
“kyz železný” = pyrit:

## **Dnes je mineralogický systém založený výhradně na krystalochemické příbuznosti minerálů (krystalochemická klasifikace minerálů)**

To znamená, že minerály jsou rozdeleny do několika hlavních skupin podle chemického složení.

V rámci nich jsou minerály děleny (nebo seskupovány) podle strukturní a tím tedy i krystalografické příbuznosti, případně opět podle chemické příbuznosti.

### ***Hlavní skupiny mineralogického systému:***

- 1/ Prvky a příbuzné nerosty (slitiny kovů)
- 2/ Sulfidy a příbuzné sloučeniny (selenidy, teluridy, arzenidy, antimonidy a bismutidy)
- 3/ Halovce (halogenidy)
- 4/ Oxidy a hydroxidy
- 5/ Uhličitany (karbonáty), dusičnany (nitráty), boritany (boráty)
- 6/ Sírany (sulfáty) a příbuzné sloučeniny Te, Cr, Mo a W
- 7/ Fosforečnany (fosfáty), arzeničnany (arzenáty), vanadičnany (vanadáty)
- 8/ ***Křemičitany (silikáty) – jsou nejhojnější (horninotvorné minerály) a nejdůležitější***

### **Psaní vzorců – kulaté a hranaté závorky:**

(Fe, Mg, ....Mn, ..) – jeden prvek je izomorfně zastupován dalšími prvky – pořadí určuje klesající množství kationtu (prvku), pevné roztoky


[ ] - aniontová skupina, např.  $[\text{Si}_2\text{O}_6]$

**Pevný roztok (izomorfní řada, směsný krystal)** – další základní jednotka přirozeného systému minerálů

**Pevný roztok (směsný krystal):** - pevná látka s homogenní krystalovou strukturou, nejčastěji jde o směs dvou chemicky definovaných komponent. V ní jsou určité ekvivalentní pozice obsazovány různými ionty.

- homogenní krystalovaný minerál s proměnlivým kvantitativním poměrem složek, které se zastupují na základě blízké chemické a krystalografické příbuznosti (GS)

- pevný roztok olivínu: **forsterit**  $Mg_2 SiO_4$  ----- **fayalit**  $Fe_2 SiO_4$



- pevný roztok plagioklasů (Na-Ca živců):

0% 10 30 50 70 90 100%  
**albit** - oligoklas - andezín - labradorit - bytownit - **anortit**




Kyselé plagioklasy



Bazické plagioklasy

### 3 – komponentní pevné roztoky:



#### Izostrukturální skupina barytová:

baryt	$\text{Ba SO}_4$
celestin	$\text{SrSO}_4$
anglesit	$\text{PbSO}_4$

#### Izostrukturální skupina apatitová:

apatit	$\text{Ca}_5 (\text{PO}_4)_3 \text{Cl}$
pyromorfit	$\text{Pb}_5 (\text{PO}_4)_3 \text{Cl}$
mimetezit	$\text{Pb}_5 (\text{AsO}_4)_3 \text{Cl}$
vanadinit	$\text{Pb}_5 (\text{VO}_4)_3 \text{Cl}$

Všechny členy uvedených izostrukturálních (dříve izomorfních) skupin jsou si velmi blízké také z hlediska morfologie krystalu.

Mísitelnost mezi jednotlivými členy je většinou velmi omezená!

**Varieta (odrůda)** – u některých minerálů rozeznáváme určité variety, lišící se např. barvou, charakterem agregátu apod.

- křemen (ametyst, růženín, .....
- korund (rubín, safír, .....
- hematit (spekularit, lebník, .....

### **Mineralogické názvosloví**

- jednoslovné na rozdíl od zoologického či botanického
- pro většinu minerálů platný mezinárodní termín, nejběžnější nerosty mají také názvy české (halit = sůl kamenná, křemen = quartz)
- koncovky -it, -in, -an
- jména nerostů s počátečním malým písmenem

### **Původ jmen některých minerálů**

a/ dle tvaru krystalu či typu agregátu

lepidolit – šupinkatý  
aktinolit – paprsčitý  
sanidin – tabulkovitý

b/ podle barvy

pyrop – oheň  
azurit – modrý  
chrysoberyl – chrysos = zlatý

c/ podle jiných fyzikálních vlastností

plagioklas, ortoklas – štěpný  
diamant (amadas = nezkrotný)

d/ podle použití : grafit (grafein = psáti)

e/ podle naleziště : labradorit, cinvaldit

f/ podle významných - bertrandit, goethit, bornit, wollastonit

g/ jiné názvy: apatit – klamavý

## **Minerální asociace, parageneze**

***Asociace minerálů (širší termín)*** – společný výskyt různých minerálů v horninách, na žíle, v dutině. Může jít o jednu nebo více minerálních paragenezí, které jsou odrazem několika po sobě jdoucích minerogenetických procesů.

***Minerální parageneze (parageneze)*** - společný výskyt různých minerálů v horninách, na žíle či v dutině.

Je zákonitě podmíněný chemickým složením a termodynamickými podmínkami prostředí. Současně se vyskytující minerální fáze jsou tedy výsledkem jednoho minerogenetického aktu.