

Primatologie - úvod



Doc. Václav Vančata


katedra biologie a ekologické Ped F UK

Antropologie

Fyzická antropologie


- Fyzická antropologie a biologie člověka jsou dvě různé, i když příbuzné, discipliny
- **Fyzická antropologie** chápe člověka jako **biosociální** bytost a má vazby na sociální i experimentální vědy, také na ekologii a etologii a to včetně nehumánních primátů
- **Biologie člověka** chápe člověka především jako biologický objekt a má potenciální vazbu na lékařské vědy

Antropocentrismus



Člověk je zcela unikátní bytost odlišná lidskou kulturou, myšlením a dalšími výhradně lidskými vlastnostmi od všech další organismů

Biologismus



**Člověk je pouze
dalším „unikátním“ druhem**


Člověk je od samého
počátku
druhem biosociálním.

Kultura je u něj úzce
propojena s biologií
a chováním.

Biosociálnost má
genetické základy u
všech hominidů včetně
velkých lidoopů



Evolute



Variabilita populační i časová

časová




populační



Růstová antropologie a primatologie



Molekulární a genetická antropologie a primatologie



Primatologie



ontogeneze
chování, soc.struktura



ekologie
ochrana prostředí

Primatologie

Ad definitio věda o primátech. Avšak také antropologie, která se zabývá také některými aspekty biologie a života nehumánních primátů, a proto je primatologie považována mnohými fyzickými i sociálně kulturními antropology za součást fyzické antropologie.

Primatologie dnes zahrnuje řadu experimentálních oborů, i primatologie se zabývá vedle morfologie, ekologie a etologie, také problémy spadajícími do kompetence experimentálních oborů jako biochemie, fyziologie a genetika.

Na rozdíl od antropologie však **primatologové nikdy necítili potřebu oddělovat biologické a sociální stránky života primátů**, a tak není výjimkou, že etolog (sociální vědec) přešel do oblasti genetické či neurověd, anebo i naopak, a není výjimkou, že primatologické výzkumy mají mezioborový biosociální charakter. Primatologie je tedy moderní, dynamicky se rozvíjející interdisciplinární vědou, která se zabývá biologickými, biosociálními a sociálními rysy primátů a societ ve kterých primáti žijí.

Primatologie tedy explicité zahrnuje všechny biologické i sociálně vědní discipliny, které se programově zabývají primáty a jejich životem.

Primáti (*Primates*),


řád savců, do něhož patří jako biologický druh také člověk. Současná systematika primátů vymezuje více než 300 druhů.

Jedná se o skupinu **býložravých, všežravých, výjimečně hmyzožravých savců žijících převážně v tropickém a subtropickém pásmu Země**. Většinou jsou to čtyřnozí středně velcí savci (od 1 do 50 kg) žijící sociálním způsobem života často vázaným na stromy nebo lesní ekosystémy.

Je to jeden z nejstarších v současné době stále žijících řádů savců, jehož evoluce započala zřejmě na konci druhohor v křídě (zhruba mezi 90–80 miliony lety).

Primáti se od ostatních savců liší polouzavřenou nebo uzavřenou orbitou, chrupem s vyčnívajícím špičákem a **zubním vzorcem 2–1–(4)3(2)–3, chápavou pětiprstou končetinou u pokročilejších skupin s nehty, ??stereoskopickým nebo alespoň částečně stereoskopickým?? viděním, relativně velkým a rozvinutým mozkem s redukovaným čichovým lalokem a dobře rozvinutou mozkovou kúrou a mozečkem. Hlavním smyslovým orgánem je zrak, důležitý je i sluch. Čich má většinou doplňkový význam. Primáti mají vynikající prostorovou orientaci. Příslušníci řádu *Primates*, kromě lidoopů a lidí, mají nespecializovanou čtyřnohou lokomoci. Charakteristická je velká vnitrodruhová i mezidruhová biogeografická, ekologická, potravní a sociální diverzita.**

Geografické rozšíření primátů



řád: Primates – Primáti

miniřád: *Prosimii* - Poloopice

nadčeled': *Loroidea*

čeled': *Lorisidae* - outloňovití

čeled': *Galagonidae* - kombovití

nadčeled': *Lemuroidea*

čeled': *Cheirogaleidae* - makiovití

čeled': *Megaladapidae* (*Lepilemuridae*)

čeled': *Lemuridae* - lemurovití

podčeled': *Lemurinae* - lemuři

podčeled': *Hapalemurinae* - hapalemuři

čeled': *Indridae* - indriovití

čeled': *Daubentoniidae* – ksukolovití

miniřád: *Tarsiiformes* - Nártouni

nadčeled': *Tarsioidea*

čeled': *Tarsiidae* - nártounovití



miniřád: *Anthropoidea* - vyšší primáti

superčeled': *Platyrrhina* - širokonosí primáti

nadčeled': *Ceboidea*

čeled': *Callithricidae* - kosmanovití

podčeled': *Callimiconinae* - kalimikové

podčeled': *Callithricinae* - kosmani

čeled': *Cebidae* - malpovití

podčeled': *Aotinae* - mirikiny

podčeled': *Callicebinae* - titiové

podčeled': *Cebinae* - malpy

čeled': *Atelidae* - chápanovití

podčeled': *Pitheciinae* - chvostani

podčeled': *Atelinae* - chápani

superčeled': *Catarrhina* - úzkonosí primáti

nadčeled': *Cercopithecoidea*

čeled': *Cercopithecidae* - kočkodanovití

podčeled': *Cercopithecinae* - kočkodani

podčeled': *Colobinae* - hulmani

nadčeled': *Hominoidea*

čeled': *Hylobatidae* - gibbonovití

čeled': *Hominidae* - hominidé

podčeled': *Ponginae* - orangutani

podčeled': *Paninae* - šimpanzi

podčeled': *Homininae* - lidé


Srovnání poloopic a vyšších primátů

ANTHROPOIDEA vyšší primáti



srostlá kost čelní
a dolní čelist


očnice je plně
uzavřená



velký mozek,
primární je zrak

stavba ucha
podobná člověku

zuby jsou v zásadě
podobné člověku,
vyjímečně chybí
poslední stoličky



smyslové a vnitřní
orgány jsou podobné
lidským


barevné vidění
nepohyblivé uši
čich málo výkonný

nehty na prstech

PROSIMII polopice




nesrostlá kost čelní
a dolní čelist



očnice je ze zadu
otevřená

dlouhé čelisti,
malé špičáky

zubní hřebínek
z dolních řezáků,
častá modifikace
a redukce zubů,
podjazykový orgán



malý mozek s výraznou
čichovou funkcí

není vetvořen
kostěný zvukovod


tapetum lucidum
odrazová vrstva
v očních bulvách

výborný čich
rhinarium („vlhké nozdry“)
pohyblivé ušní boltce


velmi dlouhé
zadní končetiny

čistící pseudodrápek







Způsob života primátů




Lokomoce primátů



Lokomoční adaptace skeletu primátů



Chování primátů a jeho projevy



Chování:
**Lokomoční, potravní,
sociální, herní, rodičovské, sexuální,
agonistické**

Projevy chování:
**komunikace, žraní, agrese, kopulace, aj.
vždy vznikají v interakci s ekologickými podmínkami**

Ekologie primátů






FIGURE 3.7 Different patterns of spatial distribution of potential food resources.

Ekologické adaptace primátů




Potravní adaptace primátů



Frugivorie

Folivorie

Gumivorie

Insectivorie





Malé teritorium, tendence k listožavosti
territorialita, silná vokalizace, silně dominantní chování samců

Velké teritorium, tendence k všežravosti
složité chování a sociální struktura, samice partnerky samců

Životní historie primátů





FIGURE 3.11 Primates show striking interspecific differences in many aspects of their life histories.

Životní historie a ontogeneze



žijící primáti

lemurovití loriovití nártouni širokonosé úzkonosé
opice opice lidoopi



nejstarší
opice

první
fosilní
primáti

poslední
společný
předek

55 Paleocén


65

Svrchní křída

85

98

věk v milionech let



Definice primátů – kámen úrazu

- Vznik a evoluce prvních primátů byla spojena s evolucí krytosemenných rostlin a příslušných nových typů ekosystémů, a to jak rostlinné tak živočišné složky.
- V důsledku toho a vzhledem k morfologii zubů prvních primátů je zřejmé, že primáti byli původně spíše býložraví a pojídali především měkké části rostlin, např. plody

Základní znaky primátů – stará definice


- Znaky spojené s uchopováním – tedy adaptace k životu ve stromech a keřích.
 - Podle analýz fosilního materiálu i výzkumu archaických žijících příbuzných primátů je zcela evidentní, že již předci nejstarších primátů – tedy euarchotní savci – byli přizpůsobeni k životu ve stromech.
 - *Jedná se tedy o symplesiomorfní znak, který je sice typický pro primáty, ale vznikl již dříve.*
- Znaky spojené se skákáním – adaptace na stromové prostředí s případnou predací na malou pohyblivou kořist.
 - *Tento znak se vyskytuje pouze u některých skupin euprimátů a tudíž to není znak typický pro primáty*, navíc fosilní doklady prokazují, že nejstarší primáti byli spíše býložraví, eventuálně všežraví, a jejich potrava byla, podle charakteristik zubů, spíše měkká.

Základní znaky primátů – stará definice

- Znaky na zubech (a čelistech) spojené s převažují býložravostí – vše nasvědčuje tomu, že
 - toto je *znak charakteristiký pro všechny primáty*. Navíc někteří badatelé zpochybňují, že první primáti byli velmi malí, srovnatelní s tanami. To potvrzuje i velikost známých archaických plesiadapoidních primátů.
- Znaky související se zlepšování vizuálního systému a typu percepce s významnou úlohou zraku – *tento komplex znaků je nepochybně významný a typický pro primáty*,
 - *avšak vyvíjel se postupně*, některé podkorové struktury mozku jsou neobyčejně starobylé, a typicky specializované pouze pro primáty, jiné jsou relativně mladé a typické pouze pro euprimáty, nebo pouze pro antropoidní, vyšší primáty, a jiné se vyvíjely paralelně u haplorrynních a strepsirrhynních primátů.

Základní znaky primátů – stará definice

- Zvětšování očí a očnic, které se uzavírají – tento znak všeobecně uznávaný jako typický a systematicky významný komplex znaků se objevuje až u euprimátů
 - a podle všeho se vyvíjel paralelně u haplorhhiních a strepsirrhiních primátů.
 - Větší počet světločivných buněk a sbíhající se, nebo paralelení, oční osy totiž umožňují kvalitnější a ostřejší vidění u poloopic, což může být důležité při nočním, nebo alespoň částečně nočním způsobu života polopic. To je také ve shodě s výskytem *tapetum lucidum* v zadní části oční bulvy a vlhkým „savčím“ rhinariem - nozdrami).
 - U vyšších primátů je tento komplex výhodný pro vývoj stereoskopického trichromatického vidění.
- Zvětšování a přestavba mozku, zejména v korových oblastech souvisejících se zrakem – tento znak je typický zase pouze pro euprimáty
- Zmenšování čichového aparátu a s tím související zkracování čelistí – i tento znak je typický pouze pro euprimáty
- Bulla petrosa je typický primáti znak, ale jeho existence byla **prokázána pouze u euprimatimorfních primátů** – její adaptivní význam, pokud vůbec nějaký má, není prokázaný.




Základní znaky primátů – nová definice

- **Znaky charakterizující řád *Primates*:** 1. Prodloužený třetí molár se současným zvětšením hypoconulidu; 2. postprotocingulum na horních molárech, 3. Prodloužení článků prstů ruky.
- **Znaky charakterizující infrařád *Euprimataformes (Plesiadapini, Euprimates)*:** 1. Relativně krátké metatarsy, 2. nehet na palci ruky, 3. Bulla petrosa
- **Znaky charakterizující polořád *Plesiadapoida* - nadčeled'** *Plesiadapoidea* – tři archaické moláry, variabilní chrup, chybění uzavřené orbity, velmi úzké dlouhé splanchnocranum s velkou čichovou oblastí, nehtu pouze na palci ruky možné drápky na zbytku autopodií.
- **Znaky typické pro *Euprimates*:** 1. Prodloužení tarzů, 2. Zvětšení processus peronaeus na prvním metatarsu (halluxu), 3. Dopředu směřující alespoň částečně uzavřené orbity a relativně krátké splanchnocranum (snout).

Počátky primátů

Purgatorius a denní tany




Purgatorius – svrchní křída



Ptilocercus lowii

zástupce denních plodožravých tan





Archiprimáti - Plesiadapiformes



Archaická stavba lebky archiprimátů





Fig. 1. *Ignacius graybullianus* skulls. **A:** UM 108210, from University of Michigan locality SC-62, in right lateral view. White arrow indicates the cochlea of the right ear, visible through a break in the promontorium; black arrow indicates the inner (dorsal) surface of the left petrosal. **B:** USNM 482353, from locality SC-4, in ventral view. White arrow indicates the right petrosal, which is rotated more than 90°, and is therefore visible in oblique dorsal view. Scale bar, 1 cm.




Fig. 1. 3D reconstructions of a cranium of *I. graybullianus* (USNM 421608) based on uhrCT data. Clockwise from upper left: rostral, caudal, ventral, and dorsal.








Fig. 2. Previously published (Kay et al., 1990, 1992) specimen of *Ignacius graybullianus* (USNM 421608) that was removed from a freshwater limestone from the early Eocene (Wa-1) of the Clarks Fork Basin, Wyoming. **A:** Whole specimen. **B:** Close-up of detail of right ear region, in ventral view. Note that the edge of the petrosal overlaps the entotympanic at their point of contact (see white arrow). Scale bar in A, 1 cm.

Nové objevy rodu *Carpolestes*

Revoluce v názorech na evoluci primátů?



Nové pohledy na vznik primátů

- Původně „primáti skupina“ *Archonta* je polyfyletická
- Primáti pocházejí ze skupiny *Euarchonta*, která vzniká již v křídě.
- Primáti jsou nejblíže příbuzní s tanami (*Tupaiidae*) a poletuchami (*Dermoptera*)
- Hlodavci a zajícovití jsou primátům příbuznější než dříve favorizovaní letouni

Místo primátů v systému savců

Cohort Boreoeutheria Springer & de Jong 2001, new rank

Magnorder Laurasiatheria Waddell, Okada & Hasegawa, 1999, new rank

 Order Eulipotyphla Waddell, Okada & Hasegawa, 1999

 Superorder Variamana, new⁴

 Order Chiroptera Blumenbach, 1779

 Grandorder Fereungulata Waddell, Okada & Hasegawa, 1999, new rank

 Order Cetartiodactyla Montgelard, Catzeffis & Douzery, 1997

 Order Perissodactyla Owen, 1848

 Mirorder Ostentoria, new⁵

 Order Carnivora Bowdich, 1821

 Order Pholidota Weber, 1904

 Magnorder Euarchontoglires Murphy, Stanyon & O'Brien, 2001

 Grandorder Glires Linnaeus, 1758, new rank

 Order Lagomorpha Brandt, 1855

 Order Rodentia Bowdich, 1821

 Grandorder Euarchonta Waddell, Okada & Hasegawa, 1999, new rank

 Order Primates Linnaeus, 1758




 Mirorder Paraprimates, new⁶



 Order Dermoptera Illiger, 1811

 Order Scandentia Wagner, 1855

Theilhardina asiatica

55 milionů let
rozvoj Euprimates





- **Superčeled' Platyrrhina**
 - čeled' *Proteopithecidae incertae sedis*
 - **Nadčeled' Ceboidea**
- **Superčeled' Catarrhina**
 - **Nadčeled' Cercopithecoidea**
 - čeled' *Victoriapithecidae*
 - čeled' *Cercopithedae*
 - **Nadčeled' Parapihtecoidea**
 - čeled' *Parapithecidae*
- **Velkočeled' Hominidea**
 - **Nadčeled' Propliopithecoidea**
 - čeled' *Oligopithecidae*
 - čeled' *Propliopithecidae*.
 - **Nadčeled' Proconsuloidea**
 - čeled' *Proconsulidae*
 - **Nadčeled' Hominoidea**
 - čeled' *Pliopithecidae*
 - čeled' *Oreopithecidae*
 - čeled' *Hylobatidae*
 - čeled' *Afropithecidae incertae sedis* – **afropiteki**
 - čeled' *Hominidae* – **clowiekowate**

- Nadčeled' *Hominoidea*
 - čeled' *Pliopithecidae*
 - čeled' ***Hylobatidae***
 - čeled' *Oreopithecidae*
 - čeled' *Afropithecidae incertae sedis*
 - tribus Afropithecini
 - čeled' ***Hominidae***
 - Podčeled' *Kenyapithecinae incertae sedis*
 - » Tribus *Kenyapithecini*
 - Podčeled' *Sivapithecinae*
 - » Tribus *Anakarapithecini incertae sedis*
 - » Tribus *Sivapithecini*
 - Podrodzina *Homininae*
 - » tribus: ***Pongini* – orangutani ???**
 - » tribus *Gryphopithecini incertae sedis*
 - » Tribus *Dryopithecini*
 - » **Tribus *Homimini***
 - » Subtribus *Panina*
 - » Subtribus *Hominina*

