

Kardiovaskulární ústrojí (*systema circulatorium*)

- **transportní** soustava
- **přenos látek** (například dýchacích plynů, živin, zplodin metabolismu, hormonů, imunocytů),
- **propojuje** všechny orgány v těle


Skládá se:

- krevních cév
- srdce
- lymfatických cév

Srdce: (cor)

Zevní popis:


- dutý, svalnatý orgán
- červenohnědé barvy
- 270 až 320 g
- velikost jeho pěst
- tvar kužele
- Uloženo v mediastinu
- základna (stopka) (**basis cordis**)
- hrot (**apex cordis**)
- přední plocha – **facies anterior (sternocostalis)**
- zadní plocha **facies posterior (diaphragmatica)** centrum tendineum bránice
- pravý okraj (**margo dexter**)
- levý okraj (**margo sinister**)



Vnitřní stavba:



rozdělena na čtyři samostatné srdeční oddíly

- pravou předsíň (***atrium dextrum***)
- levou předsíň (***atrium sinistrum***)
- pravou komoru (***ventriculus dexter***)
- levou komoru (***ventriculus sinister***)





H.Mayer

- Povrchovou hranici mezi předsíněmi a komorami rýha – **sulcus coronarius**
- předsíně vybíhají ve slepé choboty – ouška (**auricula dextra et sinistra**)
- **septum interatriale**
- horní a dolní dutá žíla (**vena cava superior et inferior**)
- srdeční žilní splav (**sinus coronarius**)
- žíly plicní (**venae pulmonales**) do pravé předsíně




- plicní kmen ***truncus pulmonalis*** z p. komory
- srdečnice (***aorta***)
- ***sulcus interventricularis anterior, posterior***
- ***septum interventriculare***
- ***incisura apicis cordis***
- Věnčité tepny (***arteriae coronariae cordis***)
- srdeční žíly (***venae cordis***) odvod krve z věč. tepen





Dutiny srdeční: Pravá předsíň (*atrium dextrum*)

- **zadní oddíl** - hladká stěna
(ústí velké žíly)
- **Přední oddíl** – zvrásněna
stěna četnými svalovými
hranami (vybíhá – ouško
auricula dextra)
- odděluje svislá hrana
(crista terminalis)
- odpovídá rýze mezi obou dutých žil
(sulcus terminalis)



- otvor horní dutá žíla
(ostium venae cavae superioris)
- vyústění dolní duté žíly
(ostium venae cavae inferioris) - lemováno chlopní (**valvula venae cavae inferioris**)
- otvorem žilní splav srdeční (**ostium sinus coronarii**) s malou chlopní – otvírají se v něm tři až čtyři **venae cordis anteriores**






A. Nuss
© Heuer

- ***septum interatriale***
- jamka oválného tvaru (***fossa ovalis***) s vyvýšeným okrajem (***limbus fossae ovalis***) po (***foramen ovale***)
- ***foramen atrioventriculare dextrum***
- trojcípá chlopeň (***valva tricuspidalis***)


Pravá komora (*ventriculus dexter*)

- tvar trojbokého jehlanu
- vrchol směřuje k srdečnímu hrotu
- ***ostium atrioventriculare dextrum***
- ***ostium trunci pulmonalis***
- trojcípá chlopeň
(*valva tricuspidalis*)
 - skládá z předního, zadního a septálního cípu
(*cuspis anterior, posterior, septalis*)
 - základna přirůstá k okraji vazivového kroužku ostia
 - Cípy - pomocí šlašinek (*chordae tendineae*) upevněny k ***musculi papillares*** (odstupují od stěn myokardu)




- ***Ostium trunci pulmonalis*** je opatřeno chlopní - ***valva trunci pulmonalis***

- ze tří poloměsíčitých řas – ***valvula semilunaris anterior, dextra, sinistra***
- Volný okraj každé řasy je uprostřed ztluštělý.
- Řasy vytvářejí spolu se stěnou tři poloměsíčité kapsy (***sinus trunci pulmonalis***)




- ***septum interventriculare***
- Dutina dělena na vtokovou a výtokovou část
 - Vtoková část - svalové hrany
 - výtoková část - hladká
 - Hranice - svalová hrana (***crista supraventricularis***)





Levá předsíň (*atrium sinistrum*)

- **fossa ovalis** lemovaná řasou (*falx septi*)
- čtyři plicní žíly
 - dvě zprava (*venae pulmonales dextrae*)
 - dvě zleva (*venae pulmonales sinistrale*)
- ústí (*ostia venarum pulmonalium*)
- **ostium atrioventriculare sinistrum**
- **valva bicuspidalis**
- Levé ouško **auricula sinistra**
- stěna – hladká
- stěna ouška – svalové hrany




Levá komora (*ventriculus sinister*)

- tvar kužele
- *ostium atrioventriculare sinistrum*
- *ostium aortae*
- dvojcípou chlopní (***valva bicuspidalis*** *seu* ***valva mitralis***)
 - dva cípy (***cuspis anterior*** a ***posterior***)
 - trojúhelníkovitý tvar
 - přirostlé k vazivovému kroužku *ostia*
 - dva silné papilární svaly
 - ***Chordae tendineae*** obou svalů-upínají na okraje cípů




- *Ostium aortae* je opatřeno chlopní (**valva aortae**)
 - skládá se ze tří poloměsíčitých řas (**valvula semilunaris dextra, sinistra et posterior**)
 - tři poloměsíčité kapsy (**sinus aortae**)
 - Na povrchu tepny se vyklenují - **bulbus aortae**
 - odstupuje pravá věnčitá tepna a levá **věnčitá tepna**
- Stěna vtokové části - četné svalové hrany
- Výtoková část - hladká



Stavba srdce: (tří vrstev)

1) Nitroblána srdeční *(endocardium):*

- tenká, hladká a lesklá vazivová blána
- Vystýlá dutiny srdeční a povrch srdečních chlopní.
- V předsíních je silnější než v komorách
- Cípaté chlopně - vyztuženy vazivovými ploténkami (*laminae fibrosae*)




2) Svalovina srdeční (*myocardium*):

rozdělen na **pracovní** (provádí kontrakce srdečních oddílů)

a **vodivý** (převodní systém srdeční)

Pracovní myokard- vytváří dva samostatné systémy:


- a) **myokard předsíní** - povrchovou a hlubokou vrstvou
- b) **myokard komor** – silnější, tři vrstvy (levá komora je třikrát silnější)
 - Povrchová vrstva je společná pro obě komory
 - Prostřední vrstva je pro každou komoru samostatná.
 - Hluboká vrstva je uspořádána síťovitě a je podkladem ***musculi papillares***



- Oba systémy (síně, komory) - odděleny pomocí **skeletu srdečního** - tvořen vazivovou fibrózní tkání (tvoří jej čtyři vazivové obloučky)
- K nim se připojují *laminae fibrosae* jednotlivých cípů cípatých a poloměsíčitých chlopní
- Ve spojích vznikají tak - dvě vazivové ploténky trojúhelníkovitého tvaru


Vodivý myokard (převodní systém srdeční)

- zvláštní typ myokardu
- schopnost vytvářet a převádět rytmické vzruchy
 - srdeční kontrakce
- ***Nodus sinuatrialis***
(sinusový uzlík)
 - ústí horní duté žíly
 - do myokardu předsíní vysílá paprsčitě všemi směry pruhy vodivé svaloviny
 - 70 / min (sinusový rytmus)




- **Nodus atrioventricularis**
**(předsíňokomorový uzlík
Aschoff–Tawarův)**

- leží pod endokardem pravé předsíně mezi úponem septálního cípu *valva tricuspidalis*
- Má oválný tvar
- Navazuje další část převodního systému
- (40 / min.)



- **Fasciculus atrioventricularis**
(Gaskell–Hisův můstek)
 - je proužek
 - navazuje na *nodus atrioventricularis*
 - prostupuje do vazivové části mezikomorového septa
 - při dolním okraji se dělí na dvě raménka (**crus dextrum et crus sinistrum**)
- **Crus dextrum et crus sinistrum**
 - Sestupují pod endokardem
 - směřují k myokardu pravé a levé komory.
 - Konečné úseky se pod endokardem komor rozpadají do sítě Purkyňových vláken (tvoří rozsáhlou subendokardiální síť.)




Osrdečník (*pericardium*)

- zevní vrstvy – *pericardium fibrosum*
- vnitřní vrstvy – *pericardium serosum*


1) Pericardium fibrosum:

- Tvar čtyřbokého jehlanu
- jeho základna **basis pericardii** (*facies diaphragmatica*) nasedá na **centrum tendineum** bránice
- je spojena s bránicí, prostupuje přes ni **vena cava inferior**
- **Vrchol perikardu (*cupula pericardii*)**, dosahuje do úrovně **angulus sterni**. Prochází zde **velké cévní kmeny**
- Boční stěny přivrácené k **mediastinální pleuře**, volně s ní srůstají




2) Pericardium serosum:



- ze dvou listů:
 - Zevní list (*lamina parietalis*) na vnitřní straně fibrózního perikardu
 - Vnitřní list (*lamina visceralis*) též epikard (*epicardium*) pokrývá jako tenká, hladká blána povrch myokardu.
- někde se mezi **myokard** a **epikard** vsouvá různě silná vrstva **tukového vaziva**.
- Mezi oběma listy serózního perikardu je vytvořena štěrbinovitá dutina (*cavitas pericardialis seu cavum serosum pericardii*),
- Uvnitř malé množství čiré tekutiny (*liquor pericardii*).



Layers of the Pericardium and of the Heart Wall




- Podél začátku velkých tepen (*truncus pulmonalis* a *aorta ascendens*) je vytvořena ***porta arteriarum***.
 - vybíhá zde krátký serozní obal (*vagina serosa arteriarum*)
- Podél žil pak ***porta venarum***
Tato branka má tvar příčně položeného písmene T.
- Štěrbina pod oběma portami - ***sinus transversus pericardii***






Srdeční cévy:

- Srdeční tepny
(arteriae coronariae cordis)
- Srdeční žíly
(venae cordis)



Srdeční tepny:



- dvě věnčité tepny *arteria coronaria cordis sinistra et dextra*



- uloženy **subepikardiálně**
- obaleny vrstvou tukové tkáně.
- tepny konečné (terminální)
- Chybí** kolaterální oběh


1) Arteria coronaria cordis sinistra:

- Vystupuje ze **sinus aortae sinister**,
- mezi **truncus pulmonalis** a levé ouško a dělí se na dvě větve –
 - **ramus interventricularis anterior**
 - **ramus circumflexus**





Ramus interventricularis anterior:

- Sestupuje v **sulcus interventricularis anterior** po přední ploše srdce až k srdečnímu **hrotu** a svými větvemi se podílí na zásobování **přední stěny** srdce a přední části **mezikomorového septa**.





Ramus circumflexus:

- do levé části **sulcus coronarius**, stáčí se na diafragmatickou plochu srdce a vydává větve pro levou předsíň a levou komoru.



2) Arteria coronaria cordis dextra:


- ze **sinus aortae dexter**,
- prochází mezi **auricula dextra a truncus pulmonalis**
- klade se do pravé části **sulcus coronarius**,
- větví se - pro **pravou předsíň, komoru**.
- pokračuje na zadní stranu srdce až k **sulcus interventricularis posterior**,
- klade se konečný úsek této tepny – **ramus interventricularis posterior**
- Zásobuje i část **zadní stěny levé komory**, zadní část **mezikomorového septa**



Srdeční žíly:


tří skupiny

- *sinus coronarius,*
- *venae cordis anteriores*
- *venae cordis minimae*



1) Sinus coronarius cordis:

- odvádí ze srdce asi **60%** krve.
- vzniká na **diafragmatické ploše** srdce v levé části **sulcus coronarius**.
- Je dlouhý 3 až 5 cm,
- ústí do pravé předsíně.
- Vzniká soutokem několika žilních kmenů:
 - a) *vena cordis magna*
 - b) *vena cordis media*
 - c) *vena cordis parva*




2) *Venae cordis anteriores:*

- jsou 2 až 4 žíly
- sbírají krev z **přední stěny pravé komory**
- vyústují samostatně do pravé předsíně

3) *Venae cordis minimae*

- četné drobné žilky
- ústí samostatnými drobnými otvůrky (**foramina venarum minimarum**) do všech srdečních dutin
- Odvádějí **40% krve**



Mízní cévy srdce:

- začínají slepě v srdečních tkáních
- vytvářejí tři navzájem propojené lymfatické sítě
 - **subendokardiální**,
 - **myokardiální**
 - **Subepikardiální**
- Z nich odvádí mízu:

1) *Truncus lymphaticus cordis dexter:*


- Sbírá mízu přibližně z oblastí vyživovaných pravou koronární tepnou

2) *Truncus lymphaticus cordis sinister –*

- provází levou koronární tepnu

Míza se dostává:

- k srdečním mízním uzlinám uložených **před a za odstupem aorta ascendens** – ***nodus lymphaticus praeaorticus*** a ***retroaorticus***.



Nervy srdeční:

- Srdce je inervováno **autonomním** nervovým systémem
- tj. sympatickými a parasympatickými nervovými vlákny
- ovlivňuje převodní systém i průsvit věnčitých tepen
- vytváří se **dvě smíšené** pleteně, uloženy u aortálního oblouku

1) **Plexus cardiacus superficialis** (*v arcus aortae*)

2) **Plexus cardiacus profundus** (*za arcus aortae*)


1) **Sympatická vlákna** přicházejí z *truncus sympatheticus* (zvyšují srdeční frekvenci)

2) **Parasympatická vlákna** jsou větvemi obou bloudivých nervů (zpomaluje srdeční frekvence, vasokonstrikci koronárních tepen)

Krevní cévy: (vasa)

Dělíme :

- 1) tepny (**arteriae**) - drobné tepénky (**arteriolae**)
- 2) žíly (**venae**) - žilek (**venulae**)
- 3) vlásečnice (**capillarae, vasa capillaria**)



Stavba:


Liší se dle druhu cévy.

Stěna tepen:

je pevná a pružná

tří vrstvy:

- 1) **tunica intima** - tvořena e.j. plochým – endotel
- 2) **tunica media** - obsahuje vazivo s elastických vláken a hladkou svalovinu.
 - poměr závislý na průsvitu tepen a vzdálenosti od srdce (drobné tepénky jsou čistě svalové)
- 3) **tunica externa** - je tvořena vazivem




Stěna žil:

- tři vrstvy
- není pružná
- obsahuje méně svaloviny
- chybí elastická vlákna
- kapsovité chlopně


Stěnu kapilár:

- tvoří pouze jediná vrstva – **endotel**

Krev (*sanguis*)



Největší bariéra pro přestup rozpuštěných látak a tekutiny představuje kapilární stěna. Přestup přes ni se děje třemi druhy pórů: velkými pory, malými pory a mikropory.




Tepny (arteriae)

Pulmonální systém:

1) *Truncus pulmonalis*



- vystupuje z pravé komory srdeční a směřuje pod oblouk aorty,
- rozděluje na *arteria pulmonalis dextra et sinistra*
- Plicních hilech se větví *arteriae pulmonales* dále pak větví podél bronchů až k alveolům



2) *Venae pulmonales*

- vznikají z drobných žil, z kapilární sítě po obvodu **plicních alveolů**.
- V plicích probíhají žíly **ve vazivu** mezi jednotlivými **plicními segmenty**
- Směřují k plicnímu hilu
- Z každé plíce dvě žíly
- Všechny čtyři (dvě **venae pulmonales dextrae** a dvě **venae pulmonales sinistrale**) se otevírají do levé předsíně.

Pulmonary Circulation




Aortální systém:

tři hlavní úseky:

- *aorta ascendens*,
- *arcus aortae*,
- *aorta descendens*


I. Aorta ascendens:

- (3 až 5 cm) po výstupu z levé komory srdeční rozšířený v ***bulbus aortae*** - v oblasti ***valva aortae***
- odstupují v pravém a levém ***sinus aortae*** věnčité tepny – ***arteria coronaria cordis dextra*** a ***arteria coronaria cordis sinistra***



II. Arcus aortae:

- vytváří oblouk překračuje střední rovinu, probíhá šikmo dozadu k páteři
- u třetího hrudního obratle přechází do *aorta descendens*.
- oblouk je spojen s ***truncus pulmonalis*** pomocí ***ligamentum arteriosum*** (obliterovaný ***ductus arteriosus***)
- Odstupuje zde:
 - 1) ***Truncus brachiocephalicus***
 - 2) ***Arteria carotis communis sin.***
 - 3) ***Arteria subclavia sin.***




1) *Truncus brachiocephalicus*:

Zásobuje:

- pravou horní končetinu
- pravou část hlavy a krku


Vystupuje:


- za *manubrium sterni*, za pravý sternoklavikulárni kloub
- rozděluje na dvě větve:
 - ***arteria carotis communis dextra***
 - ***arteria subclavia dextra***



2) Arteria carotis communis: (dx., sin.)

- zásobující příslušnou stranu hlavy a krku
- vystupuje po stranách průdušnice a hrtanu až k štítné chrupavce
- dělí se na **a. carotis externa** a **a. carotis interna**
(Rozdvojení leží v **trigonum caroticum** - ohrazeném *m. sternocleidomastoideus*, *venter posterior musculi digastrici* a *venter superior musculi omohyoidei*)
- leží zde parasympatický paraganglion – **glomus caroticum**







- parasympatický paraganglion – ***glomus caroticum***


A. carotis externa:

- zásobuje svaly a kůži krk a hlavu
- Za fossa retromandibularis, se dělí na své konečné větve
 - a) přední – a. thyroidea superior, a. lingualis, a. facialis
 - b) laterální – a. sternocleidomastoidea
 - c) zadní – a. occipitalis, a. auriculari posterior
 - d) mediální – a. pharyngea ascendens
 - e) konečné – a. temporalis superficialis, a. maxillaris




Arteria thyroidea superior:

- **Odstupuje:** ve výši jazylkы
- sestupuje obloukovitě ke štítné žláze
- Vydává větve k **výživě:** infrahyoïdních svalů, hrtanu a štítné žlázy




Arteria lingualis: (10)

- odstupuje nad jazylkou
- dostává se do sublinguální krajiny,
- směřuje dopředu až k hrotu jazyka
- Větví se -
- **Vyživuje:** spodinu dutiny ústní, podjazykovou žlázu a přední dvě třetiny jazyka




Arteria facialis:

- odstupuje ve výši **angulus mandibulae**
- Vstupuje do *trigonum submandibulare*,
- prochází submandibulární žlázou
- dostává se přes *corpus mandibulae* do obličeje
- v obličeji směřuje ke koutku ústnímu, ke křídlu nosnímu a končí u vnitřního koutku oka
- **Zásobuje:** oblast hltanu sluchové trubice, submandibulární a submentální krajiny, suprathyoidních svalů




Arteria occipitalis:

- po odstupu probíhá dorzokraniálním směrem ke spodině lební,
- kde se klade do ***sulcus arteriae occipitalis*** na mediální straně proc. *mastoideus*.
- Přes ***m. trapezius*** do krajiny týlní
- **Vyživuje:** okolní svaly, ušní boltec, týlní a částečně i temenní krajinu




Arteria auricularis posterior:

- za boltec ušní před ***processus mastoideus***
- Vyživuje: okolní svaly, *glandula parotidea*, ušní boltec, zasahuje i do týlní krajiny
- Jedna z větví (*arteria stylomastoidea*) vstupuje přes ***foramen stylomastoideum*** do ***canalis nervi facialis***, - až do středoušní dutiny a dutiny lební




Arteria pharyngea ascendens:

- Vystupuje podél stěny hltanu až pod spodinu lební k ***foramen jugulare***
- Vyživuje hltanu, středoušní dutiny
- Jedna větev i **tvrdou plenu mozkovou**



Arteria temporalis superficialis:

- začíná za **čelistním kloubem**, prostupuje příušní žlázou,
- Před ušním boltcem se stáčí do podkoží spánkové krajiny.
- **Vyživuje:** příušní žlázy, čelistního kloubu, zevního boltce, přilehlé části tváře a zejména čelní, spánkové a temenní oblasti.



Arteria maxillaris:

- Nejsilnější, tři úseky:


A) pars mandibularis – za ramus mandibulae.

- *a. alveolaris inferior*
- *a. meninge media*

B) pars pterygoidea – prochází mezi oběma *mm. pterygoidei*


C) pars pterygopalatina – probíhá ve *fossa pterygopalatina*

- *a. infraorbitalis*
- *a. alveolaris sup. post. et ant.*
- *a. palatina*
- *a. sphenopalatina*





Arteria carotis interna:

- zásobuje převážnou část mozku a obsah očnice vystupuje k bázi lební
- **Sinus caroticus** je rozšířený začátek tepny, ve stěně receptory
- **Karotický sifón:**
 - **pars cervicalis** (před vstupem do *canalis caroticus*)
 - **pars petrosa** (klade se do *sulcus caroticus*)
 - **pars cavernosa** (větve pro tvrdou plenu a okolí)
 - **pars cerebralis** (vysílá větev pro oko a. ophtalmica a větve pro mozek)



3) Arteria subclavia:




- vyživuje horní končetinu, část krku, přední a laterální stěnu hrudníku
- probíhá obloukem nad **cupula pleurae**, prochází skrze štěrbinou mezi **m. scalenus anterior et medius** a klade se na první žebro,
- podbíhá klíček
- pokračuje do podpažní jamky jako **arteria axillaris**



Větve arteria subclavia:


1) Arteria vertebralis:

- vystupuje kraniálně do *foramen processus transversi C6*
- až k atlasu, kde se klade do ***sulcus arteriae vertebralis atlantis***, do ***subarachnoidálního prostoru***
- Přes *foramen magnum*
do dutiny lební
- Na *clivus*
spojují v ***arteria basilaris***




2) Arteria thoracica interna:

- Přes *apertura thoracis superior* do hrudníku
- Sestupuje po zadní ploše přední stěny hrudní okrajem sterna až do výše šesté mezižeberní štěrbiny,
- Větví se konečné
 - *a. musculophrenica*
 - *a. epigastrica superior*
- **Zásobuje:** thymus, tracheu, průdušky, perikard, stěnu hrudníku, bránici, zadní stranu přední stěny břišní,



3) *Truncus thyrocervicalis*:

- krátký silný kmen,
- odstupuje při mediálním okraji *m. scalenus anterior* směrem nahoru
- Dělí se:
 - a) *a. thyroidea inferior*
 - b) *a. cervicalis ascendens*
 - c) *a. cervicalis superficialis*
 - d) *a. suprascapularis*





4) *Truncus costocervicalis:*

- vystupuje ze zadní strany a. *subclavia*
- běží dorzálně
- při krčku prvního žebra dělí na:


a) *a. cervicalis profunda*

b) *a. intercostalis suprema*





5) Arteria transversa colli:

- odstupuje z *a. subclavia* po jejím výstupu z **fissura scalenorum**
- Směřuje k **angulus superior scapulae**
- větví a vyživuje:
 - *m. levator scapulae*,
 - *mm. rhomboidei*
 - *m. trapezius*




Arteria axillaris:

- je přímým pokračováním a. *subclavia* v podpažní jamce
- Hranice leží při **dolním okraji prvního žebra**.
- pokračuje jako **a. brachialis**
- Větví se:
- **Rami subscapulares**
- **A. thoracica suprema**
- **A. thoracoacromialis**
- **A. thoracica lateralis**
- **A. subscapularis**
- **A. circumflexa humeri anterior**
- **A. circumflexa humeri posterior**




Arteria brachialis:

- navazuje na a. axillaris ve výši **collum chirurgicum humeri**
- sestupuje po mediální straně paže do jamky loketní
- v loketní jamce se dělí na konečné větve.
 - A. *radialis*
 - A. *ulnaris*
- Odstupují:
 - A. *profunda brachii*
 - A. *collateralis ulnaris superior et inferior*





Arteria radialis:

- zásobuje předloktí a podílí se na výživě ruky
- K bázi prvního metakarpu, prostupuje do dlaně,
- dělí na konečné větve
a. princeps pollicis a
ramus palmaris profundus
- podílí na utvoření povrchového a hlubokého tepenného oblouku – ***arcus palmaris superficialis et profundus***



Arteria ulnaris:

- zásobuje loketního kloubu, vyživuje kůži a svaly na ulnární straně předloktí
- dostává se do dlaně,
- Dělí se na ***ramus palmaris superficialis*** a ***profundus***, (spolu s *a. radialis* vytvářejí povrchový a hluboký tepenný oblouk)




Arcus palmaris superficialis:

- Vystupují: **3 aa. digitales palmares communes**,
- Z nich větve: **aa. digitales palmares propriae**


Arcus palmaris profundus:

- Odstupují: **aa. metacarpeae palmares** - distálně se spojují s **a. digitales communes** povrchového oblouku




Dorsum manus:

- je vyživováno z tepenné pleteně na hřbetu ruky – ***rete carpi dorsale***.
- odstupují tři ***aa. metacarpeae dorsales***,
- ty se dělí na ***aa. digitales dorsales***




III) Aorta descendens:

- navazuje na aortální oblouk ve výši Th3
- sestupuje ke L4, kde je **bifurcatio aortae**
- podle průběhu dělíme:
 - *aorta thoracica*
 - *aorta abdominalis*





1) Aorta thoracica:

- Sestupuje kaudálně do výše Th11–12,
- prochází skrze ***hiatus aorticus*** do dutiny břišní.
- Nejprve leží **vlevo** od páteře jícnu,
- Dole se přesouvá do **střední roviny**
- sestupuje mezi páteří a jícnem
- vydává větve **parietální** pro **stěnu hrudní** a **viscerální** pro hrudní **orgány**:



Aa. intercostales posteriores:

- jsou tepny vnikající do jednotlivých **mezižebří** (s výjimkou prvních dvou)
- Klade se do **sulcus costae**, ventrálne anastomozuje s **aa. intercostales anteriores**. (odstupující z a. thoracica interna)
- Vyživují: páteřní kanál, mezižeberní svaly, zádové svaly, kůži, u žen mléčnou žlázu



Aa. phrenicae superiores:

- odstupují těsně nad bránicí
- zásobují jí

Rami bronchiales:

- jdou k bronchům
- Zajišťují nutritivní oběh v plicích


Rami oesophagei:

- větví ve stěně jícnu

Rami pericardiaci:


- zásobují zadní stěnu perikardu

Грудная часть аорты, вид спереди



2) Aorta abdominalis:


- Sestupuje ve střední rovině před páteří od bránice až k L4
- *bifurcatio aortae* na dvě **aa. Iliacae communes**
- vydává větve **parietální** ke stěně dutiny břišní, větve **viscerální** k jednotlivým orgánům a větve konečné



Parietální větve:


Arteriae phrenicae inferiores:

- párové větve, zásobují kaudální stranu bránice
- Vydávají **aa. suprarenales superiores (dextra et sinistra)** k nadledvinám



Arteriae lumbales:

- čtyři párové segmentální tepny, jež mají obdobný průběh jako tepny mezižeberní
- Zásobují páteř, svalstvo zadní stěny břišní i kůži



Viscerální větve párové:

- jsou uloženy retroperitoneálně

Arteriae suprarenales mediae:

- větve vyživující nadledviny

Arteriae renales:


- odstupují ve výši mezi L1 a L2
- Před hilem se dělí na dva *rami praepelvici* a jeden *ramus retropelvicus*

Arteriae testiculares:

- Odstupují ve výši L2 po zadní stěně břišní, prostopují **tříselným** kanálem, v semenném provazci
- Zásobují varle a nadvarle

Arteriae ovaricae:




- V pánvi vstupují cestou *ligamentum suspensorium ovarii* do horní části *ligamentum latum uteri*
- Vyživují vaječníky, vejcovod a částečně i dělohu.



Viscerální větve nepárové:



Truncus coeliacus:

- krátký kmen
- dělí se na tři větve:
 - **a. gastrica sinistra** (jde ke kardii žaludku a přikládá se ke *curvatura minor ventriculi*)
 - **a. hepatica communis** (dělí na *a. hepatica propria* a *a. gastroduodenalis*)
(*a. cystica*)
 - **a. lienalis** (k pankreatu a slezině, odstupuje i *a. gastroepiploica sinistra*)




Arteria mesenterica superior:

- Odstupuje ve výši L1
- probíhá obloukovitě dolů do pravé jámy kyčelní.
- Vydává větve pro **střevo** v rozsahu od **kaudální části duodena po flexura coli sinistra**
 - **A. pancreaticoduodenalis inferior**
 - **Aa. jejunales et ilei**
 - **A. ileocolica**
 - **A. colica dextra**
 - **A. colica media**



Arteria mesenterica inferior:


- ve výši L3
- Vydává větve pro trávicí trubici od *flexura coli sinistra* až po horní část rekta:
 - **A. colica sinistra** (k sestupného tračníku)
 - **Aa. sigmoideae** (do mesosigmoidea zásobují *colon sigmoideum*)
 - **A. rectalis superior** (sestupuje k ampulární části konečníku)



Konečné větve:


Arteria sacralis mediana (aorta caudalis):

- nepárová tepna, která je vlastním kaudálním pokračováním *aorta abdominalis*,
- představuje zakrnělou tepnu ocasu
- Sestupuje ve střední rovině po přední ploše kosti křížové a kostrči
- končí klubkovitou arteriovenosní anastomozou (*glomus coccygeum*)
- vystupuje z ní **vena sacralis mediana**




Arteria iliaca communis:

- výše L4 (**bifurcatio aortae**)
- Probíhá po mediální ploše *m. psoas major*
- shora ji kříží močovod a *vasa testicularia*
- ve výši *art. sacroiliaca* se dělí na **a. iliaca interna** a **a. iliaca externa**




Arteria iliaca interna:

- zásobuje stěnu a orgány malé pánve (močový měchýř, vnitřní pohlavní orgány a konečník)
- Je relativně tenká a krátká




Parietální větve:

- **A. iliolumbalis** 1
- **A. sacralis lateralis** 2
- **A. obturatoria** 6 (pro svaly stehna, kyč.kloubu, svaly)
- **A. glutaea superior** 12
- **A. glutaea inferior** 11
- **A. pudenda interna** 10
vydává větve ke konečníku
a. rectalis inferior a při
zadním okraji **diaphragma
urogenitale** z ní odstupuje **a.
perinealis**, která svými
větvemi zásobuje *scrotum*
nebo *labia majora pudendi*.



Viscerální větve:


- **A. umbilicalis** je u plodu hlavní tepnou, odstupují větve k horní ploše močového měchýře
- **A. vesicalis inferior**
- **A. rectalis media**
- **A. uterina**
u žen
- **A. ductus deferentis**
u muže.



Fi

Arteria iliaca externa:


- Před vstupem do **lacuna vasorum** odstupují:
 - *arteria epigastrica inferior*
 - *arteria circumflexa ilium profunda*



- 1 - a. iliaca external;
- 2 - a. epigastrica inferior;
- 3 - a. circumflexa ilium [iliaca] profunda;
- 4 - a. obturatoria;
- 5 - a. umbilicalis;
- 6 - aa. vesicales superiores;
- 7 - a. vesicalis inferior;
- 8 - ductus deferens;
- 9 - vesicula seminalis;
- 10 - a. rectalis media;
- 11 - a. glutealis inferior;
- 12 - a. pudenda internal;
- 13 - a. sacralis lateralis;
- 14 - a. glutea superior;
- 15 - a. iliaca internal;
- 16 - a. iliaca communis sinistra;
- 17 - a. iliaca communis dextra (отрезана).


Arteria femoralis:

- distálním pokračováním
a. iliaca externa
- Na přední stranu stehna se dostává přes ***lacuna vasorum*** pod ***ligamentum inguinale***
- Distálním směrem vstupuje do ***canalis adductorius*** a skrze ***hiatus tendineus*** pokračuje do ***fossa poplitea*** jako ***arteria poplitea***




A. femoralis vydává řadu kolaterálních větví:

- *A. epigastrica superficialis* 13
- *A. circumflexa ilium superficialis* 12
- *A. pudendae externae* 9
- *A. profunda femoris* 11
- *Rami musculares* 10
- *A. genus descendens* 5




Arteria poplitea:

- pokračováním a.
femoralis ve fossa
poplitea
- ***Arteriae surales***
- ***Arteriae genus***
(*rete articulare genus*)
- A.poplitea - dělí se
na dvě konečné
větve:
 - ***A. tibialis anterior***
 - ***A. tibialis posterior***



Arteria tibialis anterior:

- prochází skrze
membrana interossea cruris na přední stranu bérce,
- sestupuje distálně podél
m. tibialis anterior a pod
retinaculum extensorum
dostává na hřbet nohy,
- Končí jako **arteria dorsalis pedis**




A. tibialis anterior vydává řadu větví:

- **Rami musculares**
- **A. recurrens tibialis anterior et posterior**


podílejí se na vytvoření
tepenné pleteně kolem
articulatio genus

- **A. malleolaris anterior medialis**
- **A. malleolaris anterior lateralis**




Arteria dorsalis pedis:

- probíhá na hřbetu nohy pod povrchovou fascií k **první interoseální štěrbině**,
- kde se dělí na své konečné větve
- ***Aa. tarseae mediales***
- ***A. tarsea lateralis***
- ***A. arcuata***
- ***A. metatarsaea dorsalis prima***
- ***Ramus plantaris profundus***





Arteria tibialis posterior:

- zadní straně bérce
- Podbíhá spolu s ***nervus tibialis*** pod ***arcus tendineus musculi solei***
- klade se na hluboké flexory bérce
- Za mediálním kotníkem sestupuje do ***planta pedis***



Arteria tibialis posterior vydává řadu větví:

- **Rami musculares** (zadní skupiny svalů bérce)
- **Arteria peronea**
(*Rami calcanei laterales*)
- **Rami malleolares mediales**
- **Rami calcanei mediales**
- Konečné větve:
 - *A. plantaris medialis*
 - *A. plantaris lateralis*




Žíly (*venae*):

- Duté žíly:
 - *vena cava superior*
 - *vena cava inferior*
- Do levé předsíně
směřují čtyři
 - *venae pulmonales*


Horní dutá žíla: (*vena cava superior*)

- krátký žilní kmen (asi 6 cm)
- Sbírá krev z **oblasti hlavy** a horních končetin
- Vzniká soutokem dvou **venae brachiocephalicae** ve výši připojení chrupavky prvního **pravého žebra** ke **sternu**
- Sestupuje kaudálně předním horním **mediastinem**
- Otevří se do **pravé předsíně**
- k významnějším přítokům horní duté žíly **vena azygos**





Venae brachiocephalicae:

- Vzniká soutokem **vena jugularis interna** a **vena subclavia**
- Tento soutok se nachází za **articulatio sternoclavicularis**, je označován jako žilní úhel (**angulus venosus**) otevírají se zde i velké mízní kmeny
- je dlouhá asi 3 cm





Přítoky HDŽ:

- Vv. thyroideae inferiores**
(Kolem štítné žlázy je obvykle vytvořena pleteň – **plexus thyroideus impar**)
- V. vertebralis**
- V. thoracica interna**
- V. intercostalis suprema**



Vena jugularis interna:



- Přivádí krev z dutiny lební,
- obličejoých oblastí hlavy a krku
- Navazuje na ***sinus sigmoideus*** a začíná v dorzolaterální části ***foramen jugulare*** rozšířením – ***bulbus superior vena jugularis internae***
- Za sternoklavikulárním kloubem se rozšiřuje v ***bulbus inferior vena jugularis internae***
- spojuje se s *vena subclavia* v *angulus venosus*



1) Intrakraniální přítoky:

Sinus durae matris:


- sbírají krev z mozku (*vv. cerebri*) a mozkových plen (*vv. meningeae*)





2) Extrakraniální přítoky:

- **Vv. pharyngeae** (z hltanu)
- **V. facialis**
- **V. lingualis**
- **Vv. thyroideae superiores**
- **V. thyroidea media**
- **V. retromandibularis**
- **Vena jugularis externa**





Vena jugularis externa:

- **vena auricularis posterior**
- **vena occipitalis**
- **vena jugularis anterior**

FireAid - все по
медицине.


Vena subclavia:

- pokračováním *v. axillaris* (*hranící je první žebro*)
- K přítokům patří:
 - *V. transversa colli*
 - *V. suprascapularis*




Vena axillaris:

- navazuje ve výši úponu *m. pectoralis major* (na úrovni *collum chirurgicum humeri*) na párovou **vena brachialis**



Přítoky v.axillaris:

- **V. thoracoepigastricae**
- **V. thoracica lateralis**
- **Vv. costoaxillares**
- **V. cephalica**



Žíly horní končetiny:


1) Hluboké žíly:

- jsou zpravidla **zdvojené**, doprovázejí jednotlivé tepny a jejich názvy jsou od tepen odvozené.

2) Povrchové (podkožní) žíly:


- vytvářejí na **dorzální** i **palmární** straně ruky vzájemně propojené podkožní žilní sítě

Вены плечевого пояса и свободной части верхней конечности, правой (полусхематично)




Vena basilica:

- vzniká na ruce z dorzální žilní pleteně nad **čtvrtou metakarpální štěrbinou** jako **vena salvatella**
- Pokračuje na ulnární straně předloktí a paže
- vstupuje do **sulcus bicipitalis medialis**
- Na rozhraní mezi distální a prostřední třetinou paže **zanořuje** do hloubky a otevří se do **vena brachialis**




Vena cephalica:

- na palcové straně **rete venosum dorsale manus**
- Pokračuje na laterální straně předloktí a paže
- klade se nejprve do **sulcus bicipitalis lateralis**
- a proximálněji do **sulcus deltoideopectoralis**.
- zanořuje se do hloubky a otevřá se do **vena axillaris**
- **Vena basilica i vena cephalica** přibírají další drobné podkožní žíly
- V oblasti loktní jamky jsou spojeny pomocí **vena mediana cubiti**




Dolní dutá žíla: (*vena cava inferior*)

- z dolní části těla
- Vzniká ve výši L4
- spojením *v. iliaca communis dextra et sinistra*
- vpravo od aorty a vystupuje retroperitonea
- přes bránici (**foramen venae cavae inferioris**)
- otevří se do pravé předsíně




Parietální přítoky:

- **Vv. iliaceae communes** (krev z pánve a dolních končetin)
- **Vv. lumbales** (jsou čtyři páry segmentárně uspořádaných žil)
- **Vv. phrenicae inferiores**
- **V. sacralis mediana**




Viscerální přítoky:

- **Vv. testiculares**
(u muže)
- **vv. ovaricae** (u ženy)
- **Vv. renales**
- **V. suprarenalis dextra**
- **Vv. hepaticae**
- **V. umbilicalis**




Venae iliaceae communes:

- Vznikají před pravým a levým **art. sacroiliaca** soutokem:
 - **V. iliaca interna**
 - **V. iliaca externa**




Vena iliaca interna:

- Vzniká z venosních pletení malé pánve nad **foramen ischiadicum majus**.
- Nachází se za stejnojmennou tepnou a je kryta peritoneem




Parietální přítoky:

- **Vv. glutaeae
superiores et
inferiores**
 - **Vv. obturatoriae**
 - **Vv. sacrales lat.**
 - **Vv. iliolumbales**
 - **Vv. pudendae
internae**




Viscerální přítoky:

- *Plexus venosus vesicalis*
- *Pl. venosus prostaticus*
- *Pl. venosus vaginalis*
- *Pl. venosus uterinus*
- *Pl. ovaricus*
- *Pl. venosus rectalis*
- *Pl. venosus sacralis*



Vena iliaca externa:

- pokračováním v. femoralis
- Začíná pod mediální částí *ligamentum inguinale* v *lacuna vasorum*
- **Přítoky:**
 - V. epigastrica inferior
 - V. circumflexa ilium profunda




Žíly dolní končetiny:

- dělíme na hluboké a povrchové
- Oba tyto systémy jsou navzájem propojeny četnými spojkami
- **Hluboké žíly:** provázejí stejnojmenné tepny, většinou zdvojené až ztrojené (**vena femoralis**)
- **Povrchové žíly:** Podkožní venosní systém vytváří vzájemně propojené pleteně na chodidle i na hřbetu nohy (**vena saphena parva et vena saphena magna**), (**vena saphena accessoria**)




Vrátnicová žíla (*vena portae*):

- *Vena portae* zajišťuje funkční jaterní oběh
- vstřebanými látkami z nepárových orgánů dutiny břišní
- dlouhá asi 8 cm
- Vzniká soutokem ***v. mesenterica superior*** a ***v. lienalis*** za *caput pancreatis* ve výši těla obratle L2
- Za hiatus - vstupují do pravého a levého jaterního laloku
- Další: ***v. gastrica sinistra, dextra, Vv. paraumbilicales***




Fetální krevní oběh:

- zajišťuje přísun kyslíku a živin plodu
- krev přicházející z placenty nepárovou **vena umbilicalis**
- Přes **ductus venosus** do
- **vena cava inferior** mísí se s krví málo okysličenou
- krev jde do **pravé předsíně**, kde je směrována pomocí **valva venae cavae inferioris** přes otevřené **foramen ovale** do **levé předsíně** a přes **levou komoru** do **aorty**.




- krev přitékající horní dutou žílou, se v **pravé předsíni** mísí s krví z dolní duté žíly
- minimálně, směřuje do **pravé komory** a odtud do **plicnice**. Plíce jsou nevzdušné
- většina krve z ***truncus pulmonalis*** skrze ***ductus arteriosus*** do aortálního oblouku
- Z dolních končetin a cestou *vena cava inferior* se vrací do srdce
- Větší část krve je odváděna prostřednictvím širokých ***arteriae umbilicales*** (větve *arteriae iliaca internae*) do placenty




Slezina (*lien, splen*):

- Slezina je orgánem cévního systému
- Funkce:
 - krvetvorným orgánem
 - destruovány poškozené červené krvinky
 - rezervoár krve
 - imunitního systému
- protáhlý tvar, podobá se kávovému zrnu, 12 cm
- šedofialovou barvu a měkkou konsistenci






Zevní popis:




- Přední pól sleziny (***extremitas anterior***)
- zadní pól sleziny (***extremitas posterior***)
- Horní okraj (***margo superior seu acutus***)
- zářezy (***crenæ lienis***)
- Dolní okraj (***margo inferior seu obtusus***)
- (***facies diaphragmatica***)
- (***facies visceralis***)
- (***hilus lienis***)

Stavba sleziny:

- na povrchu kryta peritoneem (*tunica serosa*)
- tenké vazivové pouzdro (*tunica fibrosa seu capsula lienis*)
- vazivové trámce (*trabeculae lienis*)
- Laloky
- Červená dřeň (*pulpa lienis*) široké tenkostěnné sinusy naplněnými krví
- Bílou dřeň - mízní tkáně (*folliculi lymphatici lienales*)



- uložena pod levou klenbou brániční
 - podélná osa je rovnoběžná s
- 10. žebrem**
- Zadní pól je asi 4 cm od páteře



Mízní soustava: *(systema lymphaticum)*

Míza (*lympha*):



- bezbarvá až mléčně zbarvená tekutina
- vyplňuje cévy mízního systému
- Obsahuje **méně bílkovin** než krevní plazma, má schopnost se srážet.
- Vzniká **z tkáňového moku**, odkud je nasávána do **mízních kapilár**.
- Denně vznikne asi **1,5 až 2 litry** mízy.
- Při průtoku mízními uzlinami je míza obohacována o **lymfocyty a specifické protilátky**.

Mízní cévy:

a) Mízní kapiláry


(*vasa lymphocapillaria*)

- Začínají slepě ve tkáních
- jemné cévy s tenkou stěnou,
- tvořena pouze **jednou vrstvou endotelových buněk**
- místy „štěrbiny“, bazální membrána na jejich povrchu je neúplná, to usnadňuje **transport látek** z tkáňového moku do mízy
- Průsvit nepravidelný
- spojují se do sítí
(rete lymphocapillare)




b) Mízní cévy (*vasa lymphatica*):

- z mízních kapilár.
- Mají podobnou stavbu jako tenkostěnné **žíly** (včetně systému **chlopní**)
- Dělíme je na:
 - hluboké mízní cévy
 - povrchové mízní cévy




c) Mízní pleteně (plexus lymphatici):

- z nich pak mízní kmeny
(trunci lymphatici)
- dva silné mízovody:
 - *ductus lymphaticus dexter*
 - *ductus thoracicus*
- Průměr kolem 5 mm
- tvořena třemi vrstvami –
tunica intima, tunica media a tunica externa



Hrudní mízovod: (*ductus thoracicus*)

- vzniká pod bránicí, ve výši L1–2,
- soutokem ***truncus intestinalis***, (přivádí mízu z uzlin v oblasti *mesenteria*) a z ***truncus lumbalis dexter et sinister*** (přivádějí mízu z paraaortálních lumbálních uzlin).
- V místě soutoku - bývá vřetenovitě rozšířen (***cisterna chyli***)
- **Průběh**-pravé straně páteře za aortou a společně skrze ***hiatus aorticus*** do hrudníku, kříží střední rovinu, klade se za ***arcus aortae***, na levou stranu jícnu
- Skrze ***apertura thoracis superior*** do krční oblasti
- otevřírá do ***angulus venosus sinister***




významné tři přítoky:

1) *truncus jugularis sinister*

2) *truncus subclavius sinister*

3) *truncus bronchomediastinalis sinister*

Лимфатические узлы и сосуды шеи и средостения




Ductus lymphaticus dexter:

- krátký mízní kmen
- sbírá mízu ze zbývající „čtvrtiny“ těla.
- Vzniká soutokem tří kmenů:


- 1) ***truncus jugularis dexter***
- 2) ***truncus subclavius dexter***
- 3) ***truncus bronchomediastinalis dexter***

Лимфатические узлы и сосуды шеи и средостения




Mízní uzliny (*nodi lymphatici*):

- vloženy do průběhu mízních cév
- filtrují mízu z určité oblasti (regionální uzliny)
- tvar je rozmanitý (kulovitý, fazolovitý)
- velikost kolísá od 2 dc 30 mm
- šedorůžové barvy
- Pohmat tuhé





Stavba uzliny:

- vazivové pouzdro (**capsula nodi lymphatici**)
- vazivové stroma, trámce
- odstupuje **jemné retikulum** prostoupené **lymfocyty**
- povrchově uloženou kůru (**cortex**)
- centrálně dřeň (**medulla**)
- štěrbinovité prostory vystlané endotelem (**sinusy**)
- přívodné mízní cévy (**vasa afferentia**)
- **Hilus**
- odvodná mízní céva (**vas efferens**)




Mízní uzliny hlavy:

- *Nodi lymphatici occipitales*
- *Nodi lymphatici retroauriculares*
- *Nodi lymphatici parotidei*
- *Nodi lymphatici submandibulares*
- *Nodi lymphatici submentales*
- *Nodi lymphatici retropharyngei*




Mízní uzliny a cévy krku:

- *Nodi lymphatici cervicales superficiales*
- *Nodi lymphatici cervicales profundi*



Mízní uzliny a cévy horní končetiny a přilehlé části hrudníku:

- Na horní končetině jsou vytvořeny dva systémy mízních cév:
 - 1) **Povrchové mízní cévy** – v podkožním vazivu na hřbetu ruky
- Z této sítě vystupují **tři skupiny** sběrných cév (kolektory)
 - Laterální, mediální, přední kolektory
 - ***nodi lymphatici cubitales superficiales***
(v mediálním)




2) Hluboké mízní cévy: provázejí jednotlivé arteriální kmeny a končí v *nodi axillares*,

- Vloženy: *nodi lymphatici cubitales profundi*

Všechny výše uvedené kolektory končí v oblasti axilly ve velké skupině 40 až 50 mízních uzlin (*nodi lymphatici axillares*)

- *Centrales*
- *Laterales*
- *Subscapulares*
- *Pectorales*
- *apicales (infraclavicularis)*




Mízní cévy a uzliny hrudníku:

1) Parietální uzliny jsou uložené na stěně hrudníku:

- ***Nodi phrenici superiores***
- ***Nodi lymphatici parasternales***
- ***Nodi lymphatici intercostales***


2) Viscerální uzliny:

- se nacházejí kolem orgánů dutiny hrudní





Mízní uzliny a cévy plicní:

- ***Nodi lymphatici pulmonales***
- ***Nodi lymphatici bronchopulmonales***
- ***Nodi lymphatici bronchiales***
- ***Nodi lymphatici tracheobronchiales superiores et inferiores***
- ***Nodi lymphatici tracheales***
- ***Nodi lymphatici mediastinales anteriores, posteriores***



Mízní uzliny břišní pánevní dutiny:

- Uloženy především podél velkých cév a sbírají mízu z oblastí vyživovaných příslušnými cévami
- ***Nodi lymphatici iliaci externi, interni***
- ***Nodi lymphatici sacrales***
- ***Nodi lymphatici iliaci communes***
- ***Nodi lymphatici lumbales (nodi paraaortales)***
- ***Nodi lymphatici coeliaci (nodi lymphatici mesenterici)***



Mízní uzliny a cévy dolní končetiny:

- probíhají jednak **v podkožním** vazivu (povrchové mízní cévy), jednak provázejí **krevní cévy** (hluboké mízní cévy)


1) Povrchové - z mízní pleteně na hřbetu nohy

- **Mediální kolektory**
(nodi lymphatici inguinales profundi)
- **Laterální kolektory**
- **Zadní kolektory**
*(nodi lymphatici poplitei,
nodi inguinales profundi)*





2) Hluboké mízní cévy- sledují cévní kmény.

- dostávají do *nodi lymphatici inguinales profundi*
- Nejproximálnější uzlina u *lacuna vasorum* (**Cloquetova-Rosenmüllerova uzlina**) přitéká míza z celé DK




Brzlík (*thymus*):

- měkký lymfatický orgán
- Velikost se během života mění
- Po narození (váha 12 až 15 g)
- do dvou let zvětšuje
(30 až 40 g),
- Poté nezměněn až do puberty
- pak začne involuce
- Ve stáří postupně atrofuje,
mění se na vazivové těleso se
zbytky původní tkáně (***corpus
adiposum thymi***)




NOVOROZENEC



Uložení:

- před tracheou
- skládá se ze dvou asymetrických laloků (*lobus dexter et sinister*)
- Na povrchu - tenké vazivové pouzdro (*capsula thymi*),
- odstupují do hloubky **jemná septa**
- Ta na jednotlivé lalůčky (*lobuli thymi*)
- (*cortex thymi*)
- (*medulla thymi*)
- spojeny centrálním pruhem (*tractus centralis*)
- parenchym brzlíku je *reticulum thymi*, (T lymfocyty)



Funkce:

- Kontroluje tvorbu, zrání a diferenciaci T lymfocytů