

Základy interpretace výsledků imunologických laboratorních testů

Vyšetření imunoglobulinů

- O hladině Ig nás velmi zhruba informuje procentuální zastoupení **gamafrakce** při elektroforéze bílkovin, jedná se však o vyšetření velmi hrubé, které odhalí pouze výrazné změny ve smyslu plus nebo minus. Elektroforéza séra je výhodným screeningovým vyšetřením ke zjištění možného **paraproteinu**.
- Pro vyšetření hladiny imunoglobulinů třídy **IgG, IgA, IgM** se používá **radiální imunodifuze**, častěji **turbidimetrie** nebo spíše **nefelometrie**. Referenční „normální“ hladiny se liší podle laboratoře, v níž je měření prováděno.

Zvýšení hladin Ig můžeme najít:

- Při subakutních a chronických zánětlivých procesech, zejména infekčního nebo revmatického původu.

zvýšení IgA:

- při zánětech převážně **slizničního charakteru**
- při jaterních cirhózách

zvýšení IgG:

- záněty intersticiální

Osamocené zvýšení IgM při normálních hladinách jiných isotypů

- jako odraz proběhlého nebo subakutního zánětu je poměrně řídké

Hladina IgE

se zjišťuje nejčastěji **ELISA technikami**.

Zvýšení IgE

- doprovází alergické stavy prvého (atopického) typu přecitlivělosti, parazitární choroby
- jiné onemocnění (imunodeficitní, autoimunitní a další)

Normální hodnota IgE nevylučuje možnost alergického postižení

Izolované zvýšení hladiny jedné třídy Ig:

- při myelomu,
- monoklonálních gamapatiích
- u pacientů ve vyšších věkových skupinách, neboť hladiny Ig, zejména IgA, mají tendenci se zvyšovat s věkem

Snížení hladin jedné nebo více tříd imunoglobulinů může být způsobeno:

- poruchou tvorby Ig při primárních protilátkových nebo kombinovaných imunodeficitech.

- sekundární poruchou tvorby protilátek, nejčastěji při lymfomech nebo leukémiích
- ztrátami Ig močí, stolicí nebo rozsáhlými secernujícími plochami

Hladina IgE

se zjišťuje nejčastěji **ELISA technikami**.

Zvýšení IgE

- doprovází alergické stavy prvého (atopického) typu přecitlivělosti
- parazitární choroby
- jiné onemocnění (imunodeficitní, autoimunitní a další)

Normální hodnota IgE nevylučuje možnost alergického postižení

Snížení hladiny IgE

- nemá podle současných znalostí žádnou diagnostickou hodnotu
- Hladiny IgE jsou výrazně závislé na věku

udávají se v mezin. jednotkách (1 IU=2,4ng IgE). Pro dospělou populaci se za normální považuje pod 150 IU/ml

Hladinu specifického IgE (tj IgE namířeného proti konkrétnímu alergenu) je nutno zjišťovat velmi citlivými metodikami, nejčastěji **ELISA** nebo **RIA**.

Vyšetření je indikováno zejména v případech, kdy u pacienta není možno provézt kožní testy časné přecitlivělosti

- při kožním ekzému
- příliš nízkém věku pacienta
- nebezpečí závažné anafylaktické reakce u silně senzibilizovaného pacienta.

Vyšetření hladiny IgD nemá s výjimkou podezření na IgD myelomu téměř žádnou diagnostickou hodnotu.

**Kvalitativní změny Ig:
velký význam má průkaz paraproteinu.**
podezření na přítomnost paraproteinu je
možno vyslovit již při elektroforetickém
vyšetření séra

další laboratorních vyšetření:

- neobjasnitelná vysoká sedimentace erytrocytů pacienta
- vysoká hladina jediné třídy Ig při normálních nebo snížených hladinách ostatních tříd

**Pro stanovení diagnózy myelomu je
nutné provézt další laboratorní
vyšetření:**

Sternální punkce:

- nachází se zvýšený počet plazmatických buněk, často abnormální morfologie (myelomové buňky)
- imunologické vyšetření většinou prokazuje zvýšenou hladinu té třídy Ig, v níž je přítomen paraprotein, zatímco u jiných tříd nacházíme **imunoparézu** – snížení hladin dané útlakem kostní dřeně
- v krvi je přítomna anémie, někdy i leukopenie a trombocytopenie
- v séru můžeme nalézt hyperkalcémii
- zvýšenou hladinu beta – 2 mikroglobulinu
- na RTG skeletu, zejm. plochých kostí nacházíme ostře ohraničená osteolytická ložiska.

Kryoglobuliny

Mají schopnost se při teplotách nižších než je teplota těla srážet.

Mnohé kryoglobulinémie jsou klinicky němé, některé z nich však mohou vyvolávat závažné klinické obtíže:

- poškození funkce ledvin
- vaskulitu
- chladovou kopřivku

Kryoglobulinémie často doprovázejí další imunopatologické stavy:

- paraproteinémie
- autoimunitní choroby
- chronická hepatitida C

Při vyšetření přítomnosti kryoglobulinu je nutno zajistit takový transport krve, aby teplota neklesla pod 37°C nebo lépe krev odebrat přímo na ambulanci imunologického oddělení.

Vyšetření komplementového systému

Zvýšení hladin jednotlivých složek k. systému (C3 a C4)

Může být odrazem zánětlivé aktivity

Snížení hladin složek

- způsobeno vrozenou poruchou tvorby jednotlivých složek (např. u C4 jsou heterozygotní deficit velmi časté)
- zvýšenou spotřebou k.s. při aktivaci komplexy Ag-Ab (akutní stádium systémových imunokomplexových vaskulitid)

Hladinu C3, C4 a případně jiných složek k.s. se vyšetřují **jednoduchou radiální imunodifuzí, turbidimetricky a nefelometricky.**

Pokud je u pacienta podezření na defekt některé složky klasické cesty aktivace k.s., provádí se **test CH50** při podezření na defekt alternativní složky lze provézt vyšetření **AH50**

Při vyšetření nemocného na podezření na hereditární angioedém

(vrozený nebo získaný deficit inhibitoru C1 složky komplementu- C1- INH)

- se vyšetřuje koncentrace C1 – INH v séru
- funkční test aktivity tohoto inhibitoru.

Proteiny „akutní fáze“

se provádí jednoduchou radiální difuzí, turbidimetricky nebo nefelometricky

Nejčastěji se sleduje **hladina C – reaktivního proteinu (CRP)**

zjišťování hladin jiných proteinů a.f. jako alfa – 1 – antitripsinu, orosomukoidu, ceruloplasminu, sérového amyloidu A a dalších má již menší význam. Normálně je hladina CRP velmi nízká (pod 10mg/l), při zánětech stoupá až do hodnot stovek mg/l

- Hladinu CRP více zvyšují**
záněty bakteriální než virové. **Se zvýšením**
CRP se setkáváme i při
- záněty neinfekčního charakteru
 - při infarktu myokardu
 - v pooperačním období
 - U revmatických chorob: např. v akutní fázi revmatoidní artritidy jsou vždy hladiny CRP výrazně zvýšeny, na druhé straně u **systémový lupus erythematoses** nacházíme pouze minimální zvýšení CRP.

**snížení hladin těchto složek může vést
k různým chorobám.**

Nejznámější je deficit alfa – 1 – antitrypsinu

- vede ke vzniku plicního emfyzému
- k postižení jater

Nízkou hladinu ceruloplasminu nacházíme u Wilsonovy choroby projevující se jaterními a neurologickými příznaky způsobenými depozicí mědi v tkáních

Vyšetření autoprotilátek

- Průkaz přítomnosti autoprotilátek - vysoká hodnota při diagnostice autoimunitních chorob
- v současné době se jedná o jistě stovky různých popsaných autoprotilátek, které je možno vyšetřovat
- přesto bývá sortiment vyšetřovaných protilátek prováděný většinou laboratoří úzký

- **Důvody:**
- obtížnost průkazu některých autoprotilátek
- nízká výpovědní hodnota prokázané autoprotilátky
- některé autoprotilátky mohou mít velkou diagnostickou hodnotu, přesto nejsou příčinou vzniku konkrétního autoimunitního onemocnění
- mnohé autoimunitní choroby způsobeny **autorektivními T – lymfocyty** (těžké prokazovat) a přítomnost autoprotilátek bývá pouze doprovázejícím **epifenoménem**

Např. u **Hashimovy tyreoiditidy**

- nacházíme při laboratorním vyšetření protilátky proti **tyreoglobulinu** nebo **mikrozomům štítné žlázy**.

Revmatoidní faktor

je autoprotilátkou namířenou proti konstantní části molekuly IgG.

- prokazován nepřímou aglutinací (latex-fixační test) nebo ELISA metodikami.
- Je diagnostickým znakem ukazujícím na onemocnění revmatoidní artritidou. (Asi 20% nemocných s klinicky zřejmou revmatoidní artritidou nemá s revmatoidním faktorem prokazatelný; pak se mluví o séronegativní revmatoidní artritidě).
- Další revmatické choroby:
- systémový lupus erythematoses, Sjögrenův syndrom
- jiná onemocnění:
- chronické hepatitidy, subakutní bakteriální endokarditidy a další.
- S nízkými titry revmatoidního faktoru se můžeme setkat u starších osob, ačkoli tito lidé netrpí žádnou z uvedených chorob.

Antinukleární protilátky (ANA, starší název ANF)

- se vyšetřují nepřímou imunofluorescencí.
- Substrát pro vyšetření:
- buňky tkáňových linií
- řezy živočišnými tkáněmi, (krysí játra).
- Nález antinukleárních protilátek je důležitý diagnostický text pro:
 - systémový lupus erythematoses (SLE)
 - u nemocných s některými jinými revmatickými chorobami (revmatoidní artritida, sklerodermie, Sjögrenův syndrom),
 - pacientů s chronickou autoimunitní hepatitidou a dalšími onemocněními.
 - u zdravých, zejména starších lidí - nízké titry ANA

Podle obrazu při imunofluorescenci můžeme odlišit několik typů antinuklaárních Ab

- homogenní, granulovaný, periferní a nukleolární
- jednotlivé typy mají vazbu k určitým chorobám. Je též možno blíže specifikovat, proti kterým Ag jádra jsou protilátky namířeny –průkaz:
 - proti dvouvláknové (nativní) DNA,
 - histonům
 - extrahovatelným nekleárním Ag (ENA) sem se řadí antigeny označované jako Ro, La, Sm, Jo a další.

Tato bližší specifikace ANA opět umožňuje přesnější stanovení diagnózy.

Antimitochondriální Ab jsou ukazatelem primární biliární cirhózy, u jiných chorob nebo u zdravých lidí se vyskytují zřídka,

- vyšetření nepřímou imunofluorescencí na řezech zvířecími ledvinami, jejich přítomnost se projeví fluorescencí ledvinních kanálků. **Protilátky proti antigenům štítné žlázy** - proti tyreoglobulinu a mikrozomální peroxidáze se vyskytují zejména u nemocných s **Hashimotovou tyreoiditidou**,

méně často u jiných postižení štítné žlázy vazbou na receptory pro TSH (tyreotropní hormon) je příčinou Graves- Basedowovy choroby používají se RIA testy.

Protilátky proti hladkému svalstvu se vyskytují:

- u nemocných s chronickou autoimunitní hepatitidou,
- při akutních hepatitidách
- u zdravých lidí

Protilátky proti bazální membráně glomerulů glomerulonefritida, zejména rychle progredující forma.

Protilátky proti acetylcholinovému receptoru neuromuskulární ploténky myastenia gravis

➤ Jejich průkaz je obtížný, metodiky RIA. Pro stanovení diagnózy m.g. není jejich průkaz většinou nutný.

protilátky proti cytoplazmě granulocytů (ANCA)

- diagnostickým znakem pro Wegenerovu granulomatózu
- Typy ANCA
 - c – ANCA (cytoplazmatická ANCA, protilátky proti granulocytární proteináze 3), nález je pro Wegenerovu granulomatózu poměrně specifický
 - p – ANCA (perinukleární ANCA, protilátky proti leukocytární myeloperoxidáze)
 - vyskytuje se:
 - u rychle progredující glomerulonefritidy
 - u některých typů systémových vaskulitid (polyarteritid nodosa, Churgův – Straussův syndrom)
 - x- ANCA, která bývá pozitivní u nemocných s colitis ulcerosa

Ab proti retikulinu a endomysiu hladkého svalstva u nemocných s celiakií s kožní chorobou dermatitis herpetiformis (Dühring)

Při těchto onemocnění má význam i stanovení třídy, v níž je uvedená autoprotilátky, přítomnost IgA protilátek svědčí o aktivitě zmíněných chorob.

V období remise autoprotilátky třídy AgA postupně mizí, zatímco IgG autoprotilátky přetrvávají velmi dlouho po vymizení příznaků, někdy až celý život.

Obdobný diagnostický význam má i vyšetření Ab proti gliadinu, což je jedna z frakcí bílkoviny obliných zrn – lepku (glutenu)

Ab proti erytrocytům se vyšetřují přímým a nepřímým Coombsovým testem, indikací je podezření na hemolytickou anémii

- Další vyšetření:
 - chladové aglutininy a chladové hemolyziny, jež vyvolávají aglutinaci a hemolýzu v závislosti na teplotě, při níž reakce probíhá.

Antitrombocytární Ab

- u některých nemocných s autoimunitní idiopatickou trombocytopenickou purpurou

Protilátky proti granulocytům

autoimunitní granulocytopenie

Vyšetření: provádí se na hematologických nebo transfúzních odděleních.

protilátky proti parietálním buňkám žaludku

u atrofické gastritidy a perniciózní anemie

protilátky proti beta buňkám pankreatu

u diabetes mellitus, inzulin – dependentní diabetes, DM-1 není ve srovnání s metodikami biochemickými diagnosticky příliš přínosné.

protilátky proti nadledvinkám

u autoimunitní adrenalitidy

příčně pruhovanému svalstvu a mnoha dalším tkáním nebo orgánům. Klinický přínos těchto vyšetření je v současné době omezený, stále však probíhá intenzivní výzkum, snažící se nalézt diagnosticky cenné autoprotilátky,

význam:

- pomohly by v laboratorní diagnostice autoimunitních chorob,
- stanovily by pravděpodobnou závažnost postižení, prognózu či pravděpodobnou odpověď na léčbu.

Vyšetření cirkulujících IK

Má většinou význam pouze při monitorování zánětlivého procesu

zvýšení

- v subakutním,
- chronickém či
- rekonvalescentním stadiu různých zánětlivých procesů
- **Význam** pro diagnózu imunokomplexových chorob je velmi omezený, u nemocných s těmito chorobami je možno nalézt poměrně často normální hladiny IK
- Pro diagnózu imunokomplexového postižení je mnohem důležitější průkaz deponovaných IK v postižených tkáních pomocí přímé imunofluorescence