

PŘÍRODNÍ POLYMERY

POLYSACHARIDY III KYSELINA HYALURONOVÁ

RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc.

POLYMER INSTITUTE BRNO

spol. s r.o.


LEKCE	datum	téma
1	19.IX.	Úvod do předmětu - Struktura a názvosloví přírodních polymerů, literatura
2	26. IX.	Deriváty kyselin, - přírodní pryskyřice, vysýchavé oleje, šelak
3	3. X.	Vosky
4	10. X.	Přírodní gumy.
5	10. X.	Polyterpeny – přírodní kaučuk, získávání, zpracování a modifikace
6	17. X.	Polyfenoly – lignin, huminové kyseliny, třísloviny
7	24. X.	Polysacharidy I – škrob
8	31. X.	Polysacharidy II – celulóza
9	7. XI.	Kasein, syrovátka, vaječné proteiny
10	14. XI.	Identifikace přírodních látek
11	21. XI.	Laboratorní metody hodnocení přírodních polymerů
12	29. XI.	EXKURZE – KLIHÁRNA
13	5. XII.	Bílkovinná vlákna I
14	12. 12.	Bílkovinná vlákna II
15	19. 12.	Bílkovinná vlákna III - ELASTIN Polysacharidy III – KYSELINA HYALURONOVÁ

- Ing. J. Dvořáková: **PŘÍRODNÍ POLYMERY**, VŠCHT Praha, Katedra polymerů, skripta 1990
- A. Blažej, V. Szilvová: **Prírodné a syntetické polymery**, SVŠT Bratislava, skripta 1985

KYSELINA HYALURONOVÁ (KH) 1

je přirozeně se vyskytující glykosaminoglykan, čili lineární polysacharid, o velké molekulové hmotnosti. Je složena z opakujících se disacharidových jednotek (kyselina D-glukuronová a N-acetylglukosamin).

Navzdory jednoduché primární struktuře vykazuje KH velmi rozdílné biologické účinky v závislosti na velikosti molekuly a jejím prostorovém uspořádání.



KYSELINA HYALURONOVÁ (KH) 2

- Původně získávána extrakcí z kohoutích hřebíneků
- Dnes jsou vyvinuty syntetické biotechnologické postupy, čímž byly rozšířeny možnosti používání
- KH má schopnost vázat až 1000 % vody, tedy cca. 100 g vody na 1 g KH – těžko uvěřitelné!
- KH je schopna NANOZVLÁKŇOVÁNÍ

KYSELINA HYALURONOVÁ (KH) BIOFUNKCE

- brání prostupu virů a bakterií k buňce
- moduluje zánět indukcí uvolňování cytokinů a chemokinů, zháší volné kyslíkové radikály, ovlivňuje proliferaci a diferenciaci buněk
- brání ukládání kolagenu a tím podporuje bezjizevnaté hojení tkáně (bylo popsáno, že vyšší hladiny KH v ráně fetální tkáně jsou zodpovědné za bezjizevnaté hojení).
- popsaný je rovněž analgetický účinek
- v synoviální tekutině slouží KH díky svým

KYSELINA HYALURONOVÁ (KH) POUŽITÍ

- lokální léčbě popálenin a kožních vředů
- v oční chirurgii
- intraartikulární aplikace (tzv. viskosuplementace) u pacientů s osteoartrózou
- v plastické chirurgii (vyplň vrásek, vtažených jizev, zvětšení prsou)
- V přípravcích pro podporu hojení ran
- v kombinaci s jódem při hojení chronických ran, diabetických nohou a běrcových vředů
- při léčbě nemocí kloubů koní, psů a koček
- jako lubrikační látka v očních kapkách nebo v roztocích na kontaktní čočky