



Centrum pro výzkum  
toxicických látek  
v prostředí

# Účinky toxicických látek 1

## - Molekulární mechanismy -

Luděk Bláha, PřF MU

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.



EVROPSKÁ UNIE



esf



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenčeschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

# Co by si měl student odnést z této přednášky?


- Chápat a dokázat vysvětlit základní pojmy toxikodynamiky
  - receptor, interakce, afinita, účinnost
- Vysvětlit molekulární principy interakcí mezi toxickými látkami a cílovými místy (receptory)
- Vysvětlit a popsat principy nespecifického a specifického působení toxicích látek
- Znát principy a příklady látek, které působí nejdůležitějšími mechanismy toxicity, tj.
  - narušení přirozené fluidity membrány
  - interakce látek s DNA
  - inhibice enzymových aktivit
  - narušení redox-potenciálu
  - narušení gradientů na membránách
  - kompetice se substráty / přirozenými ligandy
- Poznat ve struktuře vybraných modelových látek strukturní znaky, které jsou odpovědné za konkrétní mechanismy působení

# **TOXIKODYNAMIKA**

## **- základní *principy* -**



# Vztah mezi toxikokinetikou a toxikodynamikou



# Toxikodynamika

vychází z propracované „farmakodynamiky“ a přejímá její koncepty popisuje procesy na molekulárni úrovni

V místě kontaktu toxikantu s cílovým místem („receptorem“) dochází k interakci **toxikant-receptor**

## Interakce mezi dvěma chemickými látkami

### Cílové struktury = základní makromolekuly:

Proteiny

STRUKTURNÍ (tubulin apod.)

ENZYMY

TRANSPORTÉRY (v membráně, hemoglobin)

PROTEINOVÉ RECEPTORY


(v membráně i v cytoplasmě)

Nukleové kyseliny

Fosfolipidy

(Sacharidy)

Illustrace –příklady funkcí proteinů  
(jen membránové)



Centrum pro výzkum  
toxicických látek  
v prostředí

# Interakce látek s proteiny: klíčové procesy

## A RECEPTORS

Agonist



- Direct  
Transduction mechanisms
- Ion channel opening/closing
  - Enzyme activation/inhibition
  - Ion channel modulation
  - DNA transcription

Antagonist



- No effect  
Endogenous mediators blocked

(eg beta blockers, 17 $\alpha$ -ethinylestradiol)

## B ION CHANNELS

Blockers



- Permeation blocked

Modulators



- Increased or decreased opening probability

(eg local anaesthetics, cypermethrin)

● Agonist/normal substrate

● Antagonist/inhibitor

● Abnormal product

● Pro-drug

Note – a few drugs target DNA rather than proteins (eg mitomycin C).

## C ENZYMES

Inhibitor



- Normal reaction inhibited

False substrate



- Abnormal metabolite produced

Pro-drug




- Active drug produced

(eg aspirin, ketoconazole)

## D TRANSPORTERS

Normal transport



Inhibitor



- Transport blocked

False substrate




- Abnormal compound accumulated

(eg fluoxetine, omeprazole)

# Interakce toxicických látek s receptory

- interakce pozitivní → indukce odpovědi (**agonista**)  
(nahrazuje efekt ligandu, *mimic effect, hormone-like effect*)
- interakce negativní → kompetice: nevyvolává reakci (**antagonista**)  
(blokuje navázání a efekt přirozeného ligandu, *př. anti/estrogenita*)



# Příklady cílových struktur

(receptor = jakákoli biomolekula, kterou může ovlivnit toxikant)

- buněčná membrána

*narkotická toxicita - dosažení takové koncentrace, že dochází k blokaci fluidity membrány a tím její funkce*

- acetylcholinesteráza

*enzym - inhibice v aktivním místě organofosfátovými pesticidy (substrate mimics)*

- Arylhydrocarbon **receptor** (AhR), estrogenní receptor (ER)

*specifické mechanismy toxicity, xenoestrogenity*

- další ....



# Typy interakcí („vazby“) mezi toxikantem a receptorem

-nekovalentní (viz příklad na následujícím snímku)

*vodíkové můstky*

*hydrofobní interakce*

*iontové interakce*

*van der Waalsovy interakce*

(reverzibilní)

-kovalentní


- *inhibice*

*acetylcholinesterázy*


*organofosfátem...*

- vazba látky na DNA

(zpravidla ireverzibilní)



# Interakce mezi „receptory“ a malými molekulami (toxikanty)




**Figure 2** Rationale behind the classification of chemicals according to mechanism: target sites and type of interaction.



# Typy interakcí mezi látkami

(příklad – interakce mezi proteiny)



Copyright (c) by W. H. Freeman and Company



Cen  
toxic  
v prostředí

# Rychlosť a síla interakcie

Rychlosť a síla interakcie závisí na:


- koncentraci obou interagujúcich látiek  
*(určujúci je zpravidla koncentrace toxikantu - ta je dána toxokinetikou)*

→ **Afinita** vazby „ligand-receptor“

: Hodnocení - disociačné konstanty:

Kd (pro účinné látky cca v rozmezí  $10^{-8}$  M až  $10^{-3}$  M)  
(koncentrace která stačí k navázání z 50%  
na příslušný receptor)

Afinita - vyjadruje se často jako převrácená hodnota ( $1/Kd$ )



→ Toxicita (efekt) je pak dán schopností **Účinnosti (efficacy)**  
látky vyvolat příslušný efekt



# **TOXIKODYNAMIKA - základní principy -**

Jedná látka může reagovat s více „receptory“ !!!

Která interakce bude preferována (která se projeví toxicky) ?  
Významné faktory

**Konzentrace vs. rychlosť toxického projevu interakcie**

*dioxin: vysoké dávky → akutná chlorakne, smrť,  
nízké dávky, dlouhodobě → karcinogenita, imunosuprese ...*

**Prostorové umístění a kontakt s receptory**

**embryo vs. dospělec**

*insekticid: vysoká dávka - akutná toxicita -> žábry / smrť  
nízká dávka je distribuovaná v těle a působí chronicky -> imunotoxicita*

**Kd - jednotlivých interakcií**

*organofosfát: specifická inhibice AcChE, velmi nízké Kd  
→ specifické působení*





# TOXIKODYNAMIKA - základní principy -


Látka může reagovat s více receptory !!!

## Příklad - 2,3,7,8-TCDD

- indukce AhR (thymus, játra Kd  $10^{-12} - 10^{-15}$  M)  
-> nádor/měsíce – roky (karcinogenita, imunotoxicita)
- indukce estrogenity (pohlavní orgány Kd  $10^{-9} - 10^{-12}$  M)  
-> reprodukční poruchy/měsíce - roky
- narkotická toxicita ( $10^{-6}$  M)  
-> akutní rychlá intoxikace



# Akutní (!) toxicita TCDD a ostatních látok (potkan LD50 mg/kg ž.v.)



Chemical	LD <sub>50</sub> Value (mg/kg ž.v.)
TCDD (a form of dioxin)	0.01
Tetrodotoxin (globefish toxin)	0.01
Saxitoxin (shellfish poison)	0.8
Carbofuran (a pesticide)	10
Phosphamidon (an insecticide)	24
Nicotine	50
Caffeine	200
DDT (an insecticide)	200
2,4-D (an herbicide)	370
Mirex (an insecticide)	740
Acetylsalicylic acid (aspirin)	1,700
Malathion (an insecticide)	2,000
Sodium chloride (table salt)	3,750
Glyphosate (an herbicide)	4,300
Ethanol (drinking alcohol)	13,700
Sucrose (table sugar)	30,000
Botulotoxin (enzym)	0,00000003



# Toxikodynamika - otázky

Jaké makromolekuly jsou cílem toxických látek?

Jaké existují interakce mezi toxickými látkami a makromolekulami?

Jaký typ interakce bude nejpravděpodobnější mezi

- \* hexachlorhexanem ... a hemoglobinem? ... a fosfolipidem?
- \* formaldehydem ... a tubulinem? ... a nukleovou kyselinou?

Co je to toxikodynamická disociační konstanta?

Ke které makromolekule má TCDD vyšší afinitu? U které interakce bude vyšší Kd?  
K receptoru AhR nebo k hemoglobinu?

Co je agonista? Co je antagonist?



# **Účinky látek na molekulární úrovni: mechanismy působení**




# Co by si student(ka) měl(a) odnést ?

- 1) ZNÁT a dokázat vysvětlit hlavní Molekulární a Biochemické mechanismy toxicity
- 2) Dokázat přiřadit ke každému mechanismu toxicity některé z významných environmentálních toxikantů
- 3) Vysvětlit, jak se jednotlivé BIOCHEMICKÉ MECHANISMY toxicity projeví na vyšších úrovních  
(příklad – inhibice receptoru pro hormon → projev: porušení reprodukce)

# Připomenutí:

## mechanistický koncept od molekuly k populacím

### (V literatuře: „Adverse Outcome Pathway“)



→ Arrows indicate a causal relationship

See also: Ashauer & Escher JEM (2010), Rubach *et al.* IEAM (2011), Jager *et al.* ES&T (2011), Ashauer *et al.* ET&C (2011)

# Základní typy ekotoxicity organických látek

1) Všechny organické látky mají toxicke efekty pro membránové fosfolipidy  
= nepolární narkotická toxicita (bazální toxicita, membránová toxicita)  
projevy při relativně vysokých koncentracích, závisí na logKow (viz dále)



# Základní typy ekotoxicity organických látek

1) Všechny organické látky mají toxicke efekty pro membránové fosfolipidy

= nepolární narkotická toxicita (bazální toxicita, membránová toxicita)

projevy při relativně vysokých koncentracích, závisí na logKow (viz dále)

2) Kromě základní toxicity, mohou polárnější látky přímo působit

na membránové proteiny = polární narkotická toxicita

projevy při nižších koncentracích než by odpovídalo logKow



# Základní typy ekotoxicity organických látek

1) Všechny organické látky mají toxické efekty **pro membránové fosfolipidy**

= nepolární narkotická toxicita (bazální toxicita, membránová toxicita)

projevy při relativně vysokých koncentracích, závisí na logKow (viz dále)

2) Kromě základní toxicity, mohou polárnější látky přímo působit

**na membránové proteiny** = polární narkotická toxicita

projevy při nižších koncentracích než by odpovídalo logKow

3) Kromě obou nahoře uvedených mechanismů, mohou látky, které jsou reaktivní

**napadat reaktivně makromolekuly** a působit tzv. reaktivní toxicitu

- projevy ještě při nižších koncentracích než odpovídá narkóze

-toxicité látky spíše elektrofily, vyhledávají nukleofilní zbytky = „elektrony-bohatá místa“  
(nukleotidy, SH-, NH<sub>2</sub>- a další skupiny – nukleové kyseliny, proteiny, fosfolipidy)



# Základní typy ekotoxicity organických látek

1) Všechny organické látky mají toxicke efekty **pro membránové fosfolipidy**

= nepolární narkotická toxicita (bazální toxicita, membránová toxicita)

projevy při relativně vysokých koncentracích, závisí na logKow (viz dále)

2) Kromě základní toxicity, mohou polárnější látky přímo působit **na membránové proteiny** = polární narkotická toxicita

projevy při nižších koncentracích než by odpovídalo logKow

3) Kromě obou nahoře uvedených mechanismů, mohou látky, které jsou reaktivní napadat reaktivně makromolekuly a působit tzv. **reaktivní toxicitu**

- projevy ještě při nižších koncentracích než odpovídá narkóze
- toxicke látky spíše elektrofily, vyhledávají nukleofilní zbytky = „elektrony-bohatá místa“ (nukleotidy, SH-, NH<sub>2</sub>- a další skupiny – nukleové kyseliny, proteiny, fosfolipidy)

4) Jen některé vybrané skupiny látek vykazují **specifické typy toxicity**

- inhibice enzymů (př. Insekticidy, léky), interakce s receptory (estrogeny, dioxinová toxicita ...)
- projevy při velmi nízkých koncentracích, mohou mít chronické projevy

**1-3 = nespecifické typy** toxicity (u velkých skupin látek, nemají specifický cíl , reakce se všemi makromolekulami),


**4 – specifická toxicita** (účinky na určité cíle, proteiny nebo NK)

→ Viz také dříve: *toxikodynamika*

NESPECIFICKÉ mech.



# Základní typy ekotoxicity organických látek



# Membránová toxicita



Centrum pro výzkum  
toxických látek  
v prostředí


# Mechanismus 1: Interakce s membránou

## Narušení membrány


- základní toxicita (baseline toxicity) = narkoza (narcosis)  
*(nejde o narkozu farmakologickou, kde se uvažuje velmi specifické působení na receptory na membránách)*

## Zásadní význam v ekotoxicitě většiny organických polutantů

- efekty závislé na **HYDROFOBICITĚ (Kow / logP)**
- při vyšších koncentracích akumulace látek v membránách  
→ narušení zásadních životních funkcí  
(přenos nervových signálů, tvorba ATP atd atd)



# Plasma membrane




*Poznámka: cholesterol - strukturně „velikostí“ obdobný jako jiné organické látky (PAHs, neutrální toxikanty...)*



# Narkotická (membránová toxicita) → důsledky a projevy

## AKUTNÍ EKOTOXICITA

Přímá korelace mezi logP a EC50 u vodních organismů (*Daphnia*, ryby, planktonní řasy ...)



Obrázek:

Neutrální organické látky  
→ Nepolární narkoza

Aminy, fenoly

→ Polární narkoza

(při stejném logP je pozorována vyšší toxicita – tj. vyšší hodnoty 1/EC50 než u neutrálních látek)



# Mutagenita a genotoxicita




## - Mutagenita a genotoxicita -

### DNA - klíčová molekula života

- pečlivá kontrola struktury (a funkce)

### DNA všech organismů často mutuje:

- základ přirozené variability, adaptací, evoluc




Naprostá většina případných mutací je opravena

### Neopravitelné změny

- 99.9% řízená smrt buňky (apoptoza)
- minimum změn zůstane zachováno
  - projevy (adaptace, evoluce ... genotoxicita)



# - Mutagenita a genotoxicita -



© Prometheus 2004



## - Mutagenita a genotoxicita -

**Chemické látky mohou indukovat poškození DNA**

**mutageny** = látky způsobující mutace  
(změny/alterace na DNA a chromosomech)

**genotoxiny** = látky poškozující DNA

**klastogeny** = látky vyvolávající chromosomální zlomy

- terminologie není jednotná / přechody ...



# - Mutagenita a genotoxicita – TYPY MUTACÍ 1

## 1) Bodové mutace (interakce toxikantu s nukleotidem)


### : záměny

změna jednoho tripletu, jedné aminokyseliny → “úprava” funkce enzymu

NEBO nefunkční enzym → apoptoza

### : delece, adice

zpravidla změna čtecího rámce → vždy nefunkční enzym → smrt apoptozou



### Záměna T (Purin) → C (Pyrimidin)

#### wild-type

T **A** C G

A **T** G C

#### wild-type

A **T** G C

T **A** C G

**A** = amino

**A'** = imino



**transition (T→C)**



# - Mutagenita a genotoxicita – TYPY MUTACÍ 2

## 2) Zlomy + chromozomové mutace

(toxikant interahuje s “páteří” DNA – cukr-fosfátový řetězec)



# Mutageny – hlavní skupiny / příklady

## 1) Ionizující záření

- \* přímá interakce s DNA (zlomy)
- \* nepřímo → štěpení vody → ROS (viz také dále)

## 2) elektrofilní malé molekuly

- \* deriváty kyslíku, vody (m.j. také po ozáření)  
(viz také dále – „oxidativní stres“)
- \* vyhledávají nukleofilní/bazická místa ... např. v NK


## 3) další reaktivní látky - alkylující, acylující nebo arylující látky → kovalentní adukty s nukleotidy v DNA

→ 1+2+3: „nespecifické“ reaktivní mechanismy

## 3) interkalátory DNA → cross-linking řetězců DNA

→ 3: „specifický“ mechanismus genotoxicity  
(jen látky s definovanou strukturou, velikostí...)

# Mutagenita – ionizující záření



# Mutagenita – volné radikály / oxidační stres

## Produkty vznikající z vody a kyslíku


Voda - chemikálie s nejvyšší koncentrací,

Kyslík – silné oxidační činidlo

→ ROS

reactive oxygen species

viz dále – mechanismus "oxidativní stres"



# Mutagenita – reaktivní látky (alkylace / arylace)

Kontaminanty, jejich metabolity, toxiny

PAHs

Plísňové toxiny atd.

Reaktivní organické toxikanty

epoxydy, episulfidy, laktony, aminy  
chinony

azo-látky (heterocyklické PAHs)  
aromatické nitro-látky (NO<sub>2</sub>-PAHs)

Adukty (arylace) po aktivaci CYP














Aflatoxin B1 (po aktivaci CYP)

BaP (po aktivaci CYP)


Alkylace

Nitrosomočovina

Cyklofosfamid



# Mutagenita benzo[a]pyren – “arylace” (vznik aduktu) po aktivaci CYP450




Scheme 5.5. Interaction of 7,8-dihydrodiol-9,10-epoxide of benzo[a]pyrene with the amino group of guanine.




## „Alkylace“ – cyklofosfamid

(protinádorové cytostatikum, prokázaný mutagen)



→ adukty + cross-linky mezi řetězci



# Interkalační činidla

Využití v experimentální biologii – značení DNA (*ethidium bromid*)






Chart 5.8. Examples of intercalating agents. Key: 1, acriflavine; 2, ethidium bromide; 3, actinomycin; 4, quinacrine.



Interkalace: **psoralen**





# Ethidium bromide

## INTERKALACE DO DNA



### Example 1 – ETHIDIUMBROMIDE

- experimental dye – visualization of DNA
- intercalation → sharing of electrons with bases → high fluorescence



# REPARAČNÍ MECHANISMY DNA

- v organismu existuje rozsáhlý soubor reparačních mechanismů
- reparační enzymové aparáty
  - některé jsou exprimovány **konstitutivně** (nízké úrovně)
  - některé jsou indukovány **změnami v DNA** (mutace)  
*SOS repair, excisní reparace ...*



# Důsledky mutací / genotoxicity

## 1) Důsledky u lidí a zvířat

### Mutace tělních buněk (somatické mutace)

→ první krok **karcinogeneze a dalších patologií**  
(karcinogeneze, teratogenita: viz další přednášky)

### Mutace pohlavních buněk

→ přenost mutací na další generace (evoluce?)

## 2) Důsledky pro ekosystémy


- > změny genomu/genofondu přírodních organismů
- > **adaptace** na změny v prostředí → **evoluce**

Příklady:


*Pesticidy → vznik rezistentního hmyzu  
Antibiotika → ATB-rezistentní bakterie*




# Mutace – základ evoluce populací




The first individuals with reduced susceptibility to a given insecticide appear as a result of a random mutation



All susceptible individuals are killed by the insecticide, leaving only resistant insects in the population



Resistant individuals multiply, eventually becoming numerous enough to cause economically significant damage



# Inhibice enzymových aktivit



# Inhibice enzymových aktivit

Řada (eko)toxikantů působí jako specifické inhibitory řady enzymů  
inhibice reverzibilní (nekovalentní)  
ireverzibilní (kovalentní)


## inhibice **kompetitivní**

(v aktivním místě, na úrovni substrátu: viz příklady dále)


## inhibice **nekompetitivní/alosterické**

(kovalentní vazby na jiném místě

→ nespecifická změna struktury/funkce



(a) Competitive inhibition






(b) Noncompetitive inhibition



# Specifické inhibice enzymů - příklady

## acetylcholinesteráza



- klíčový enzym v přenosu nervových signálů  
(mezi neurony, mezi neuronem a svalem)
- Inhibice Ach (**organofosfátové pesticity, karbamáty**)  
→ křeče, udušení



# Specifické inhibice enzymů - příklady

## Inhibice enzymů respiračních řetězců

- Respirace & tvorba ATP - klíčový metabolický proces
- **Kyanid** ( $\text{C}\equiv\text{N}$ ), **CO** vazba na hemový komplex
  - nejrychlejší toxicita – mitochondrie
  - také v hemoglobinu, CYP450 atd.



# Nespecifické mechanismy (reaktivní): denaturace







## Účinky látek na sekundární a terciární strukturu proteinů (včetně enzymů)

Narušení H-můstků  
Iontové vazby



alkoholy, aminy  
kyseliny (COOH), zásady (aminy)  
toxické (těžké) kovy -  $Hg^{+2}$ ,  $Pb^{+2}$ ,  $Cd^{+2}$ ,  $Ag^{+1}$   $Tl^{+1}$ ,  
toxické kovy (reakce se sírou HS-)

S-S můstky

Detailly (domácí úkol): <http://www.elmhurst.edu/~chm/vchembook/568denaturation.html>



C. Ophardt, c. 2003



Join two chains

C. Ophardt, c. 2003

# Změny redox-potenciálu Oxidativní stres



# Změny redox potenciálu / oxidativní stres

## Redox-potenciál

- v buňce se přirozeně udržuje určitý stav redox-potenciálu
- rovnováha **oxidanty/antioxidanty**

- narušení rovnováhy → oxidační stres


### - Antioxidanty:

endogenní syntéza – **glutathion (!)**

dietární beta-karoten, **kys. askorbová (vitamin C)**

### - Zdroje “pro-oxidantů” (viz dále)

- přirozené procesy (metabolismus)
- záření
- xenobiotika (přímá reaktivita, reaktivita po aktivaci)



# METABOLISMUS a oxidativní stres

## Metabolismus - mitochondrie


kyslík = terminální akceptor elektronů

fyziologicky:  $O_2 + \text{glukoza} \rightarrow \text{voda} + CO_2$

patologie:  $O_2 \rightarrow \text{ROS (reactive oxygen species)}$


### Hlavní ROS

- Superoxid ( $O_2^-$ )
- Peroxid vodíku ( $H_2O_2$ )
- Hydroxylový radikál ( $\cdot OH$ )  
→ poškození molekul



# Respirační řetězec v mitochondriích

- zdroj elektronů → zdroj ROS



# Další zdroje „oxidantů“ v buňce - záření


Ionizující záření

reakce s vodou v buňkách


→ produkce ROS (OH-radikál)

→ základní mechanismus toxicity způsobené zářením !


## A Water radiolysis




## B Subsequent reactions



## C DNA damage




## D Damage fixation



# XENOBIOTIKA A OXIDAČNÍ STRES

- přímo reaktivní látky (např. epoxidu a další ...)
- metabolity vznikající při transformacích a detoxifikaci
  - Reakce s "antioxidanty" → narušení redox rovnováhy
- toxické kovy (Fentonova reakce – katalýza rozkladu H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> → OH<sup>\*</sup>)
- redoxní cyklátory – např. chinony
  - Indukce radikálů (viz příklad dole: kovy → ROS)



# Oxidativní stres = narušení rovnováhy oxidanty/antioxidanty

Oxidační stres vzniká:


- Zvýšením koncentrací oxidantů a/nebo
- Odstraněním antioxidantů

- velmi obecný mechanismus vyvolaný toxickými látkami  
- důsledky: chronické efekty – **nemoci, rakovina, stárnutí ...**

Pozn: Druhý extrém narušení rovnováhy:

? **Snížení koncentrací oxidantů** - málo prostudováno (anoxie - častý stav v nádorech)






## ROS a oxidace na molekulární úrovni

- DNA
- proteiny
- fosfolipidy

## Důsledky:

→ Přímá toxicita, stárnutí, nemoci



## Další specifické mechanismy

- intracelulární receptory
- specifické modulace gradientů na membránách



# Kompetice toxických látek s přirozenými ligandy

Interakce chemických látek s receptory pro přirozené ligandy  
= reakce **s proteinovými receptory**


## PROTEINOVÉ RECEPTORY

### A) Membránové receptory

- přirozené ligandy
  - velké hormony (inzulin): menší význam toxických látek
  - malé signální molekuly (neurotransmittere strukturně blízké malým mk toxikantů (spíše farmakologie)


### B) Intracelulární receptory

**Velký význam v ekotoxicitě**  
→ viz dále




# Intracelulární (nukleární) receptory

Nukleární receptory  
- přímo interagují s DNA  
(transkripční faktory)




Copyright © 2001 Benjamin Cummings, an imprint of Addison Wesley Longman, Inc.

Figure 1. Nuclear Receptors:  
Ligand Dependent Transcription Factors



Centrum pro výzkum  
toxicických látek  
v prostředí

# Toxické látky interferují s ligandy nukleárních receptorů



Nukleární receptory



# Intracelulární (jaderné) receptory - velký význam v ekotoxikologii !

Ligandy nukleárních receptorů – řada nízkomolekulárních hormonů

estrogeny, androgeny, thyroidní hormony ...


**Organické toxicke látky: strukturní podobnost s hormony (!)**

→ Specifické mechanismy a účinky (efekty při nízkých koncentracích)


**Důsledky: chronická toxicita velmi významných polutantů**

- persistentní látky - PCBs, PCDDs/Fs, DDT,
- ftaláty a další aditiva (bisfenol A)
- detergenty (nonylfenol)
- nové typy pesticidů atd.


**Cortisol (Hydrocortisone)**



**Testosterone**



**Thyroxine**



# Nukleární receptory významné v ekotoxicitě

AhR – receptor pro aromatické uhlovodíky (arylhydrocarbon receptor)

ER – estrogenní receptor

(také AR – androgenní receptor a další: prostudováno méně)

## Aktivace AhR :

- není znám přirozený ligand, nejsilnějším ligandem TCDD (!)
- aktivace AhR vyvolává →
  - indukce detoxikačních enzymů (CYP1A1)
  - **hyperfosforylace** regulačních enzymů
    - proliferace (! nádory), apoptoza (*imunotoxicita*) ...

## Aktivace ER


- přirozeným ligandem ER jsou estrogeny (17beta-estradiol atp.)
- efekty jsou závislé na typu buněk
  - proliferace (nádory), produkce hormonů, změny aktivit ...
- nefyziologická hyperaktivace ER
  - **xenoestrogenita** (významný proces *endokrinní disrupte*)

# Změny gradientů na membránách – IONOFORY

- v buňce se přirozeně udržují gradienty iontů  
(plazmatická membrána, ER, mitochondrie)


## Význam gradientů:

- zajištění semipermeability
- zajištění správného signálování ( $\text{Na}^+/\text{K}^+$ ,  $\text{Ca}^{2+}$ )
- gradienty  $\text{H}^+$  pro tvorbu ATP



## Toxicke látky narušující gradienty

- **ionofory** - usnadněný přenos iontů (např. antibiotika)
- **další mechanismy** – viz dříve
  - rozpojování toku elektronů z respiračních řetězců (chinony)
  - blokace přenosu v respiračních řetězcích (kyanidy)



# Shrnutí

## Přehled mechanismů:

*ke každému znát principy, důsledky, příklady chemických láték*

### Základní typy toxicity

#### Nespecifická toxicita

- nepolární narkotická toxicita (bazální toxicita)
- polární narkotická toxicita
- toxicita vyvolaná reaktivními látkami
- inhibice enzymů, interakce s receptory apod.

#### Specifická toxicita

### Konkrétní příklady

- narušení přirozené fluidity membrány
- interakce látok s DNA
- inhibice enzymových aktivit
- narušení redox-potenciálu
- narušení gradientů na membránách
- kompetice se substráty / přirozenými ligandy



# Příkladové otázky

- Co se rozumí pod pojmem receptor v toxikodynamice? Uveďte příklady
- Jaké molekulární interakce nastávají mezi toxicou látkou a cílovým místem? Popište princip hydrofobní interakce (atp.)
- Co je to agonista a antagonist? Co je to specifická a nespecifická inhibice enzymu?
- Vysvětlete na jakých vlastnostech látky závisí nepolární narkoza, genotoxicita atp.
- Popište co to je oxidativní stres, jak vzniká, jaké jsou jeho důsledky?
- Co je to acetylcholinesteráza? Jakou má funkci v organismu? Jaké jsou důsledky její inhibice? Jaké látky ji inhibují?
- Co je to estrogenní receptor? Vysvětlete proč je v toxicitě významnější než např. receptor pro inzulin?
- Jaké jsou důsledky mutagenity u člověka? Jaké jsou důsledky mutagenity u přírodních organismů?