

MUTAGENEZE INDUKOVANÁ TRANSPOZONY (TRANSPOZONOVÁ MUTAGENEZE)

Nejrozšířenější použití transpozonů je mutageneza za účelem lokalizace genů a jejich charakterizace.

Výhody:

1. vyšší frekvence mutace než při klasické mutagenezi
2. úplná blokáda transkripce a translace zasažených genů – dosažení plně mutantního fenotypu
3. silný polární účinek (zejména na operony)
4. ve většině případů jen jediná mutace na buňku (inzerce jediného transpozoru)
5. možnost přímé selekce mutant (geneticky podle markeru na transpozoru, nebo s využitím sekvence transpozoru jako sondy)

Inzerce transpozoru pro účely mutageneze **nemohou být směrovány do určitého genu**. Technika využívá jen skutečnosti, že inzerční místa transpozoru jsou víceméně náhodná. Požadované mutace jsou skrínovány mezi větším počtem inzerčních mutant normálním způsobem.

Vlastnosti transpozoru vhodného pro mutagenezu:


- a) začleňování do náhodných míst (Tn5, Tn7, Mu)
- b) stabilita inzerce (odstranění genu pro transponázu)

Charakteristika mutací způsobených transpozony

- 1. Transpozony mohou být začleněny do velkého počtu různých míst na bakteriálním chromozomu a plazmidech (prakticky v každém genu nebo v jeho blízkosti).
- 2. Geny se začleněným transpozonem ztrácejí plně svou funkci (nulové mutace).
- 3. Fenotyp inzerčních mutací je doprovázen rezistencí k antibiotikum podmíněnou genem transpozonu (snadná selekce mutace v novém hostiteli selekcí AntR).
- 4. Inzerční mutanty lze po transpozonové mutagenezi detektovat s vysokou frekvencí (kmeny s více mutacemi jsou vzácné).
- 5. Inzerční mutace revertují přesnou excizí transpozonu, doprovázenou ztrátou transpozonu (frekvence zpětné mutace je ale velmi nízká).

- 6. Inzerce v operonech jsou silně polární. Lze určit, zda geny jsou součástí operonu (a jejich pořadí).
- 7. Transpozony mohou vyvolat delece v okolí svého začlenění. Lze tak připravit deleční mutanty vhodné pro mapování genů.
- 8. Transpozony představují přenosné oblasti homologie. Lze pomocí nich vnést do genomu další genetické elementy rekombinací.
- 9. Inzerce se při genetickém mapování chovají jako bodové mutace (transdukční křížení).
- 10. Lze získat specifické inzerce poblíž genu zájmu, nikoliv v něm samém (vnesení promotorů a dalších sekvencí na transpozonu – **reportérové geny**)

Mutace vyvolané transpozony



1. Inzerční inaktivace genu, do něhož se transpozon začlenil
(negativní mutace) – změna fenotypu
2. Nabytí rezistence k antibiotiku (pozitivní mutace) – změna fenotypu
3. Polární mutace ovlivňující expresi sousedních genů – změna fenotypu
4. Označení místa, do něhož se transpozon začlenil

SITUACE VHODNÉ PRO VYUŽITÍ TRANSPOZONOVÉ MUTAGENEZE


- a. hledaná mutace má obtížně selektovatelný fenotyp
 - snížení počtu klonů, které nutno prověřit (mutanty Nif- deficientní v symbióze s rostlinou: genotyp může být *nod-* nebo *nif-*), identifikace genů, které jsou zapínány při poškození DNA nebo po vystavení buněk specifickým faktorům (transpozony s reportérovými geny)
- b. studovaný druh (kmen) je klasické mutagenezi nepřístupný
 - mutanty v metabolických drahách, např. auxotrofní
- c. kmen má několik podobných aktivit, znemožňujících přímý skrining na fenotyp
 - gen je nejdříve klonován v jiném hostiteli (*E. coli*) a po mutagenezi je přenesen do původního kmene, kde se alely zamění homologní rekombinací („reverzní genetika“ - u druhů dosud geneticky málo prostudovaných)

SEBEVRAŽEDNÉ VEKTORY

Vektory používané pro dopravení transpozonus do buněk, v nichž mají navodit mutaci

- A. Vektory odvozené od fága lambda obsahující mutace *sus* - replikují se v buňkách *E. coli* obsahujících supresory; v buňkách *sup-* se chovají sebevražedně
- B. Vektory odvozené z promiskuitních plazmidů (konjugativních nebo mobilizovatelných) – po přenosu do cílové buňky se nereplikují
- C. Vektory s *ts* mutacemi v replikačním aparátu (při vyšší teplotě se nereplikují)
- D. Inkompatibilní plazmidy: první plazmid nese transpozon, po přenosu je z buňky vytěsněn druhým plazmidem

Použití sebevražedných vektorů k přenosu transpozonů



Vysvětlivky:

AB^r = ANT rezistence na T

M = marker na vektoru

X = gen, který má být mutován


vektor se vyředil

Tn začleněný mimo gen X


Tn začleněný do genu X

Využití inkompatibility pro vnášení transpozonů do chromozomu


selekce s využitím markerů antibiotikové rezistence nesených na plazmidu a na transpozoru



MUTAGENEZE POMOCÍ TRANSPOZONU Tn5




Náhodná mutageneze plazmidů - Vnesení Tn5 do buňky na sebevražedném vektoru




Transpozonová mutageneza genu nif u Rhizobium meliloti

1. Klonování genu nif v E. coli, provedení mutageneze (gen je přerušen transpozonom)



Izolace mutanty v genu pro pektátlyázu (*pelA*) *Erwinia chrysanthemi*

(a)




Klonování genu *pelA* z erwinie do *E. coli*, selekce fenotypu *PelA⁺*

vysokokopiový plazmid (pBR322)


mutageneze transpozonem Tn5 (Km^r) neseným fágem lambda

(b)



Lambda
„Hopper“


(c)



Selekce klonu v němž se Tn5 začlenil do plazmidu (pII) (vysoká konc. kanamycinu)


(eliminace buněk, v nichž je Tn5 začleněn do chromozomu)

(d)



přenos plazmidu pII do erwinie, pII se vyředí (neschopen replikace), selekce klonů KmR (tj těch, v nichž došlo k homologní rekombinaci a geny pelA+/pelA- se zaměnily)

PŘENOS ALELY recA- PO OZNAČENÍ TRANSPOZONEM



STANOVENÍ FYZICKÉ LOKALIZACE GENŮ NA REPLIKONECH A MAPOVÁNÍ GENŮ


Zjištění, zda geny s určitou funkcí jsou umístěny na plazmidu nebo na chromozomu nebo zda jsou distribuovány na více replikonech není snadná úloha. „Transpozon targeting“ (cílené začlenění transpozónů) do genů napomáhá v řešení těchto úloh, jak dokresluje tento příklad:

- Předpokládalo se, že funkce (geny) týkající se onkogeneze u rostlin infikovaných *A. tumefaciens* se nacházejí na Ti plazmidu. Bylo izolováno 37 inzerčních mutant Tn5 v kmenech obsahujících Ti plazmid a vykazujících změněnou virulenci. V každém z mutantních kmén byly transpozony fyzicky lokalizovány na replikonech.
- Plazmidová a chromozomová DNA z těchto mutant byla separována za užití standardních technik (rozdíl ve velikosti a nebo GC obsahu). Každá DNA byla hybridizována se značeným Tn5. Dvanáct mutací bylo chromozomálních a 25 nesených na plazmidu.

TRANSPOZONOVÁ MUTAGENEZE *IN VITRO*

- **Nevýhody mutageneze *in vivo*:**
 - částečná životaschopnost sebevražedných vektorů --- falešně pozitivní výsledky
 - omezená velikost cílového genu --- nutný rozsáhlý skríning nebo selekce mutant
 - u některých bakteriálních druhů nejsou k dispozici vhodné transpozony
- **Průběh mutageneze *in vitro*:**
- **Výchozí předpoklad:** transponáza je schopna provést většinu reakcí též *in vitro*
 - k cílové DNA je přidána donorová DNA s transpozonem a enzym transponáza
 - lze použít mutovanou transponázu se zvýšenou účinností transpozice
 - lze použít transpozony postrádající gen pro transponázu (stabilní inzerce)
 - cílovou DNA mohou být replikony nebo lineární úseky DNA, které lze pak zavést do buněk, kde se rekombinací začlení do chromozomu
- **Použití tranpozozomů**
- **Transpozozom :** transpozon, na nějž byl *in vitro* navázán enzym transponáza
- Transpozozom se připraví *in vitro* v prostředí bez Mg-iontů, čímž dojde k rozštěpení donorové DNA, ale transponáza zůstává přichycena na koncích. Tento meziprodukt - transpozozom - se do buněk přenese elektroporací, v nichž transponáza katalyzuje transpozici transpozonu do cílového místa. Enzym je brzy rozložen, takže k další transpozici nemůže docházet. Následně proběhne selekce pro vyhledání žádaných klonů.


Transpozon vyštěpený z donorové molekuly pomocí vhodné RE



*In vivo integrace Mu-transpozozomu sestaveného *in vitro*. Tetramer transponázy MuA a konce mini-Mu-transpozoru vytvoří *in vitro* stabilní komplex protein–DNA. Po přenosu do buňky elektroporací se za přítomnosti Mg-ionů transpozon začlení do chromozomu bakterie.*

Využití Tn pro izolaci genů

Inverzní PCR. Transpozon nese na svých koncích místa pro připojení PCR-primerů orientovaných do okolní sekvence. Štěpením chromozomové DNA RE (neštěpící Tn), ligací fragmentů vzniká „plazmid“, PCR amplifikuje sekvenci chromozomu obklopující transpozon.



Tn5 gen REP




Varianta PCR bez klonování a ligace

- jeden primer je odvozen z Tn5, druhý je komplementární k REP (repetitivní extragenové palindromy), které se nacházejí v počtu 500 kopií mezi chromozomovými geny u E. coli a dalších bakteriích (~1% genomu).

Po amplifikaci je amplifikován jediný úsek genomové DNA, z něhož lze připravit sondy a vyhledat gen, který je poblíž transpozoru (nebo do něhož se Tn začlenil)

primery

Klonování (vyprošt'ování) genů mutovaných transpozony



„plasmid rescue“ – vyproštění genu

Využití

Klonování dosud neznámých genů, jejichž mutace vedou ke změně fenotypu, zvláště u bakterií, které se obtížně kultivují nebo udržují v laboratoři (analýza projevu genů se provádí po přenosu do *E. coli*)

Přenos do *E. coli*



Příprava sondy pro vyhledání wt genu v původním hostiteli

Figure 9.21 Cloning genes mutated by insertion of a transposon. A transposon used for mutagenesis of a chromosome contains a plasmid origin of replication (*ori*), and the chromosome is cut with the restriction endonuclease *EcoRI* and religated. If the ligation mix is used to transform *E. coli*, the resulting plasmid in the *Amp^r* transformants will contain the sequences that flanked the transposon insertion in the chromosome. Chromosomal sequences are shown in black, and transposon sequences are shown in gold.

MODIFIKACE TRANSPOZONŮ ROZŠIŘUJE MOŽNOSTI JEJICH POUŽITÍ

- 1. Náhrada genů pro rezistence k antibiotikům: deriváty Tn5 nesoucí sadu různých rezistencí k antibiotikům. Jsou vhodné v kmenech, kde rezistence ke kanamycinu není účinně exprimována.
- 2. Přidání *oriV* z plazmidu Sel01 do Tn5 přeměnila tento transpozon na plazmid, který se může replikovat v *E. coli*.
- 3. Zavedení *oriT (mob)* sekvence z RK2 dovoluje mobilizaci chromozomu, do něhož je modifikovaný transpozon inzertován, za předpokladu, že v donorové buňce je přítomen pomocný konjugativní plazmid RK2. Možnost křížení kmenů konjugaci.
- 4. Do blízkosti konců transpozonus lze zavést *in vitro* sekvence odpovídající místům pro RE. Jestliže je takto modifikovaný transpozon integrován do plazmidu, který tato restrikční místa nemá, představují pak koncové sekvence transpozonus jedinečná místa pro klonování a restrikční mapování.
- 5. **Fyzikální separaci transponázového genu** od zbytku elementu se vytváří minitranspozon. Když jsou tyto dvě části přítomny ve stejné buňce (na stejném nebo různých vektorech), exprese transponázy (obvykle pod kontrolou jiného, inducibilního promotoru) dovoluje transpozici minitranspozonus do cílového místa nebo místa - transponovaný element (minitranspozon) v místě začlenění se sám nemůže dále transponovat a tak představuje stabilní marker a irreverzibilní mutaci.

TABLE 4. Examples of Genetically Engineered Transposons

Element	Marker(s)	Size (kb)	Special feature(s)	Use
Tn3-ApKm	ApKm	11.7	Carries replication region of R1	Mobile origin of replication
Tn1725	Cm	8.9	Tn1722 with Cm ^r determinant of plasmid Sa; EcoRI sites in both IR sequences	Tn-mutagenesis; Tn can be excised to leave 35 bp insert with EcoRI site
Tn1732	Km	6.7	Tn1722 with Km ^r determinant of Tn2680	As for Tn1725
Tn1737Km	Km (<i>lac</i>)	9.8	Tn1722 with Km ^r determinant and promoterless <i>lacZ</i> gene at one end	Promoter probe; β-galactosidase production requires external promoter; type I operon fusions formed
Tn1737Cm	Cm (<i>lac</i>)	11.1	Tn1722 with Cm ^r determinant and promoterless <i>lacZ</i> gene at one end	Promoter probe; alternative to Tn1737Km.
Tn5-lac	Km (<i>lac</i>)	12	Tn5 with promoterless <i>lacZ</i> gene replacing most of IS50L	Promoter probe; type I operon fusions formed
Tn50RFlac	Km (<i>lac</i>)		Tn5 with <i>lacZ</i> gene lacking transcription and translation signals replacing most of IS50L	Generates protein fusions; can be used to investigate translation control of gene expression
TnphoA	Km (<i>phoA</i>)	7.7	Tn5 with alkaline phosphatase gene (<i>phoA</i>) lacking transcription and translation signals replacing most of IS50L	Generates protein fusions; used to study structure of membrane proteins and mechanisms of secretion of exported proteins
Tn5oriT	Km (<i>oriT</i>)	6.5	Tn5 with conjugal transfer origin from RK2	Mobile transfer origin; chromosome insertions generate conditional Hfr strains (require IncP plasmid for transfer)
Tn5luxAB	Km (<i>lux</i>)		Tn5 with <i>luxAB</i> genes lacking transcription signal replacing most of IS50L	Promoter probe; alternative to Tn5lac; operon fusions detected by bioluminescence
Tn10kan	Tc	8.2	Carries Km ^r determinant of Tn5	Alternative to Tn10
MupApl	Ap	37.5	Mu derivative formed by acquisition of Tn3 followed by deletion of nonessential Mu and Tn3 sequences	Plaque forming, marked alternative to Mu
Mudl1	Ap (<i>lac</i>)	37	Derivative of Mu with promoterless <i>lacZ</i> gene near S end of phage	Forms type I operon fusions to express β-galactosidase activity
Mudl1770-1	ApKm (<i>lac</i>)		Derivative of Mudl1 with Km ^r gene	As Mudl1 with alternative selection
Mudl1678	Ap (<i>lac</i>)		Mini Mu, i.e., deleted derivative of Mudl1770-1	As Mudl1, but insertion smaller
Tn917cam	EryCm	6.5	Contains promoterless <i>cat</i> gene as a promoter probe	Forms type I operon fusions to express Cm resistance

Data from Berg et al. (1989).

Table 3. Tn5 derivatives carrying portable promoters, alternative marker genes, and useful sites

použití	Designation in original reference	Antibiotic resistance and novel sequences	Length (kb)
Outward reading promoters	Tn5-tac1 Tn5-B50 Tn5-B60 Tn5-B61	Kmr, ptac Tcr, pnp _I I Kmr, ptac Gmr, ptac	4.6 5.0 5.0 5.5
Replication/mobilization origins	TnV Tn5-onT Tn5-Mob Tn5-B11 Tn5-B12 Tn5-B13	Kmr, ori pSC101 Kmr, oriT(RK2) Kmr, oriT(RP4) Gmr, oriT(RP4) Gmr, Sp _r , oriT(RP4) Tcr, oriT(RP4)	~6 6.5 7.8 8.4 10.2 9.4
Sequencing primer sites	Tn5seq1 Tn5supF	Kmr, pT7, pSP6 supF	3.2 0.3
Novel antibiotic resistance genes	Tn5-Tc2 Tn5-Cm Tn5-Gm Tn5-Tp Tn5-Sm Tn5-Ap Tn5-7 Tn5-233 Tn5-235 Tn5-GmSpSm Tn5-751 Mini-Tn5 Sm/Sp Mini-Tn5 Tc Mini-Tn5 Cm Mini-Tn5 Km	Tcr Cmr Gmr Tp ^r Sm ^r Apr ^r Tp ^r , Sm ^r , Sp ^r Gmr/Kmr, Sm ^r /Sp ^r Kmr, lacZY Gmr, Sp ^r , Sm ^r Kmr, Tp ^r Sm ^r , Sp ^r Tcr Cmr Kmr	5.1 3.9 7.5 5.2 5.2 5.0 7.6 6.6 10.0 6.8 9.0 2.1 2.2 3.5 2.3
Other marker genes	Tn5-Bgl ^{+a} Tn5-Amy ^{+b} Tn5-tox ^c Tn5-Lux ^d Mini-Tn5 bar ^e Mini-Tn5 mer ^f Mini-Tn5 ars ^g	Kmr, bgl Kmr, amy Kmr, tox Kmr, luxAB bar mer ars	11.3 8.7 10.5 6.6 2.5 4.5 5.0
Restriction mapping	Tn5cos	Kmr, Nmr	6.2
Plasmid curing	Tn5-rpsL Tn5-B12S Tn5-B13S	Kmr, Nmr Kmr, Nmr, sacBR Kmr, Nmr, Tcr, sacBR	7.6 9.9 13.2
Multiple unique restriction sites	Tn5-K20 Tn5-K28	Kmr, Nmr, Tcr Sm ^r , Tcr	9.5 7.4

^aBgl⁺, ability to ferment cellobiose.

^bAmy⁺, ability to degrade starch.

^ctox, delta endotoxin gene from *Bacillus thuringiensis*.

^dLux, bioluminescence.

^ebar, resistance to the herbicide bialaphos; vector designated as pUT/PTT by Herrero et al. (48).

^fmer, resistance to mercuric salts and organomercural compounds; vector designated as pUT/Hg by Herrero et al. (48).

^gars, resistance to arsenite; vector designated as pUT/Ars by Herrero et al. (48).

BAKTERIOFÁG Mu - GENETICKÁ MAPA




Fig. 12. A schematic representation of bacteriophage Mu. SVH, short (150 bp), variable host sequence; LVH, long (approx. 1.5 kb), variable host sequence; attL, attR, ends of Mu required for transpositional integration and replication; inv. seg., 3 kb invertible segment (also called G-loop) determining tail-fiber production and, hence, phage host range; gin, gene for invertase that mediates inversion of inv. seg.

Fág Mu infikuje široké spektrum G- bakterií

MINITRANSPOZONY = INZERČNĚ-DELEČNÍ DERIVÁTY FÁGA Mu

Table 5.1 Properties of Commonly Used Mud Derivatives

Element ^a	AKA ^b	Fusion ^c	kb ^d	Marker ^e	Genes ^f	Reference
Mud1(<i>Ap</i> ^r , <i>lac</i>)	Mud1	O	37.2	Ap	cts <i>A</i> ⁺ <i>B</i> ⁺	1
Mud301(<i>Ap</i> ^r , <i>lac</i>)	Mud2	G	35.6	Ap	cts <i>A</i> ⁺ <i>B</i> ⁺	2
Mud1-8	MudA	O	37.2	Ap	cts <i>A</i> (Am) <i>B</i> (Am)	3
Mud2-8	MudB	G	35.6	Ap	cts <i>A</i> (Am) <i>B</i> (Am)	3
MudI1734	MudJ	O	11.3	Km	cts Δ (AB)	4
MudII1734	MudK	G	9.7	Km	cts Δ (AB)	4

^aOriginal designation.

^b"Also known as"; alternate designation.

^cO, operon (transcriptional) fusion; G, gene (translational; protein) fusion.

^dLength of element DNA in kilobases.

^eSelectable antibiotic resistance marker

^fGenotype of repressor (*c*) and transposase (AB) genes.


GENOVÉ FÚZE IN VIVO

- Využití modifikovaných transpozonů pro přípravu genových fúzí**
- Mud(ApR, lacZ) je modifikovaný fág Mu, u něhož byly deletovány geny pro lytické funkce a nahrazeny genem bla (AmpR)(**selekce**) z Tn3 a lacZ (**reportér**) z E. coli K12. Byly připraveny dvě serie Mud (Ap, lacZ):**
- 1 . U první serie byly zachovány translační signály (rbs) genu *lacZ*, ale byl deletován promotor tohoto genu. Gen *lacZ* může být exprimován, když se Mud inzertuje distálně od jiného promotoru ve správné orientaci. Pozorování změn hladiny exprese β-galaktozidázy po změnách podmínek prostředí umožňuje studovat způsob regulace daného genu (nebo operonu). Tento způsob, zvaný operonové fúze, byl intenzívнě využíván při studiu exprese genů, jejichž fenotyp se obtížně monitoruje.

GENOVÉ FÚZE IN VIVO

- 2. U druhé serie Mud je gen *lacZ* zbaven místa rbs a též prvních nukleotidů kódující sekvence. Gen může být exprimován jen tehdy, když je transpozon Mud inzertován ve správném čtecím rámci ve směru transkripce od kompletních expresních signálů jak pro transkripci, tak pro translaci (promotor a rbs). Transpozon v tomto případě navozuje translační fúze.
- 3. Pro vyhledávání genů, jejichž produkty jsou **exportovány do periplazmy nebo do prostředí**, byl zkonstruován **TnPho**. Tento transpozon nese gen *pho*, který kóduje alkalickou fosfatázu (protein *E. coli* exportovaný do periplazmatického prostoru). Je aktivní jen jako dimer. Translaci vzniká dlouhý prekurzor se signálním peptidem, který je při transportu do periplazmatického prostoru odštěpen. **Selekce pomocí XP (5-bromo-4-chloro-3-indolylfosfát)**

(a) (i)




operonová fúze pomocí Mud

Transkripční (operonová) fúze


jeden transkript, dva produkty

(ii)



operonová fúze pomocí Mud
(v obrácené orientaci)

(b)




genová fúze
(vznik fúzního proteinu)

Translační (proteinová) fúze

jeden transkript, jeden produkt

(c)




TnPhoA
M = sekretovaný protein

MudI = operonové fúze, MudII = genové fúze

- Reportérové transkripční (operonové) a translační (genové) fúze mají řadu využití, např. mohou být použity ke stanovení, zda regulace genové exprese probíhá na transkripční nebo translační úrovni.
 - Když je gen regulován na transkripční úrovni, bude β -galaktozidáza exprimována jak v případě operonových tak i genových fúzí a indukována nebo reprimována v podobném rozsahu jako gen, do něhož je transpozon začleněn.
 - Jestliže je gen regulován na úrovni translace, nebude v případě operonové fúze β -galaktozidáza ani indukována ani reprimována, ale v případě genové fúze bude exprese β -galaktozidázy regulována.


Využití transpozonových fúzí ke sledování způsobu regulace genů

A. Regulace genu X na úrovni transkripce




= indukce a represe genu lacZ bude v obou případech probíhat stejně

Exprese lacZ je řízena signály pro transkripcí genu X




B. Regulace genu X na úrovni translace



= tvorba B-galaktozidázy nebude indukována ani reprimována

Transkripční fúze


Translační fúze



= tvorba fúzního proteinu a tedy i aktivita B-galaktozidázy budou ovlivněny translačními signály působícími na gen X

Tvorba galaktozidázy je ovlivněna translačními signály genu X

Signální sekvence genu *vir*



Sekretovaný fúzní protein
- *pho* je aktivní

periplazmatický fúzní protein
- *pho* je aktivní

cytoplazmatický fúzní protein
- *pho* je inaktivní








Figure 6-8 Using protein fusions with alkaline phosphatase (PhoA fusions) to identify genes encoding bacterial surface or extracellular proteins. A, PhoA translational fusion. B, Various types of PhoA fusions. PhoA is active outside the cytoplasm (*PhoA*⁺) and inactive inside the cytoplasm (*PhoA*⁻).

IZOLACE GENOVÝCH FÚZÍ PO NÁHODNÉM ZAČLENĚNÍ Mud(AmpR; lac)

Buňka kmene
obsahující
Mud/lac a Mu
(pomocný fág)




Buňky rostou na Amp a mohou exprimovat β -galaktozidázu



Select Amp^r transductants

Na plotnách s X-gal se selektují klony s Mud začleněným za promotor specificky regulovaného genu

DOČASNÁ CIS-KOMPLEMENTACE; ZPŮSOB, JAK ZAČLENIT TRANSPOZON STABILNĚ DO REPLIKONU



Kmen *Salmonella typhimurium*
zdroj MudJ

Nespecifická transdukce pomocí fága P22

Chromozom recipienta


stabilní začlenění

Frekvence mutací v konkrétním genu 1:3 000


Vyhledání neznámého genu, jehož regulace je specificky řízena



Vnesení Mud do buňky a jeho náhodné začlenění do genu X



vyběr klonů, které vykazují změnu v regulaci a exprese lacZ za různých podmínek (např. různá konc. Fe, různá teplota)



Klonování neporušeného genu, jehož exprese je ovlivněna změnou podmínek


Identifikace genů *din* aktivovaných po poškození DNA

din = damage inducible

1. Přenos Mud (AmpR, lac) do *E. coli*



2. Izolace transduktantů AmpR



KLONOVÁNÍ IN VIVO POMOCÍ MINI-MU

A. Po infekci buněk pomocným fágem Mu se mini-Mu z plazmidu transponuje do náhodných míst na chromozomu.

B. Do fágových hlav jsou zabalovány dva sousední mini-Mu spolu s částí chromozomu

C. Po přenosu do další buňky dochází k rekombinaci mezi mini-Mu za tvorby kružnicové DNA, která má charakter plazmidu, v němž je „naklonován“ úsek chromozomu

