

Repetitorium vyšších rostlin 2

Vít Grulich

Ranunculace

- součást větve bazálních trikolopátních dvouděložných
- dříve podtřída Magnoliidae
 - někdy oddělovány Helleboraceae

Ranunculaceae – příbuzní

- Berberidaceae
 - Nepočetná čeled' keřů, vz. bylin




Epimedium alpinum
www.mailbag.com



Berberis vulgaris
www.ispb.univ-lyon1.fr

Joël Reynaud

Achlys triphylla



Ranunculaceae

- převažují byliny, výjimečně dřeviny
 - dřevité liány
 - Clematis
- vzácně vodní rostliny
 - Batrachium



Batrachium penicillatum

Ranunculaceae

- listy většinou střídavé
 - zřídka vstřícné
 - Clematis
- bez palistů
 - vzácně palisty přítomny
 - Thalictrum
- jednoduché, celistvé
 - např. Caltha, Ficaria
- členěné až složené
 - např. Aconitum, Anemone, Ranuculus, Adonis

Ranunculaceae

- květenství hroznovité
 - někdy květy jednotlivé
- květy spirální až spirocyklické
 - oboupohlavné
 - jednopohlavné jen vzácné cizokrajné typy
 - zdánlivě aktinomofní
 - *Caltha*, *Anemone*, *Ranunculus*
 - zgomorfní
 - *Aconitum*, *Delphinium*

Ranunculaceae

- květní obaly v podobě okvětí
 - Caltha, Pulsatilla, Anemone
- někdy rozlišené
 - často nevýrazně
 - Ficaria
- někdy koruna prchavá
 - Thalictrum
- často s ostruhou



Aquilegia vulgaris

Ranunculaceae

- nektaria
 - často staminodiálního původu
- tyčinek zpravidla hodně
 - někdy korunovitě zbarvené
 - *Thalictrum*
- gyneceum většinou početné
 - řidčeji redukce až na G1

Ranunculaceae

- vypouklé květní lůžko
- někdy výrazně prodloužené
 - za plodu se protahuje
 - *Myosurus*, *Ranunculus sceleratus*



Ranunculaceae

- vajíček mnoho - plod měchýřek
 - Helleborus, Caltha, Aconitum, Isopyrum
- vajíčko jediné – plod apokarpní nažka
 - Anemone, Ranunculus, Adonis, Thalictrum
- výjimečně plod bobule
 - Actaea

Actaea spicata



Ranunculaceae

- apomixe
 - *Ranunculus auricomus*
- autogamie
 - *Batrachium trichophyllum*



Batrachium trichophyllum
www.atlas-roslin.pl



Ranunculus auricomus
www.botanik.uni-karlsruhe.de

Ranunculaceae

- kosmopolitní čeleď
 - 50 rodů, 1800 druhů
- převaha v mírném a chladném pásu severní polokoule

Ranunculaceae


- Stanoviště rozmanitá
 - hory
 - V Himálaji vystupují až do 5700 m
 - stepi
 - plevele
 - mokřady
 - vody

Ranunculaceae

- využití člověkem
 - okrasné rostliny
 - léčivé rostliny



Trollius laxus



Trollius altissimus

Ranunculaceae

- benzylizochinolinové alkaloidy
 - často velmi prudce jedovaté
 - *Aconitum*
- laktózové glykosidy
 - *Ranunculus*, *Adonis*

Helleborus

- znožené listy
- spirální květy



Helleborus niger



Helleborus purpurascens
www.botany.cz

Caltha

- mokřadní rostliny
- bipolární disjunkce



Caltha palustris



Caltha leptosepala

Aconitum

- velmi jedovaté
- okrasný význam



Aconitum lycocotonum



Aconitum plicatum

Delphinium

Delphinium elatum



- horské druhy
- ve Středozemí i plevelu

Delphinium nuttallianum



© - josef hlasek
www.hlasek.com
Delphinium oxysepalum 4730

Delphinium oxysepalum
www.hlasek.com

Aquilegia

- většinou horské druhy
- vnější lístky okvětí s ostruhou



Aquilegia formosa



Aquilegia flavescens



Aquilegia vulgaris



Aquilegia atrata

Actaea

- jediný rod s bobulemi
 - (přetvořený měchýřek)
- G1



Actaea spicata



Actaea rubra



Isopyrum thalictroides

- lesní druh, připomínající sasanky



Myosurus minimus

- drobná rostlina
- prodloužené květní lůžko
- kališní lístky ostruhaté



Anemone

- početný různorodý rod



Anemone

- početný různorodý rod



Anemone coronaria

Anemone sylvestris



Anemone narcissiflora



Pulsatilla

- ochmýřené přívěsky nažek
- velké květy
- stepní druhy



Pulsatilla vulgaris



Pulsatilla grandis

Pulsatilla

Pulsatilla hungarica



- druhy s nicími květy



Pulsatilla zimmermannii



Pulsatilla pratensis

Pulsatilla

- bory



Pulsatilla patens



Pulsatilla vernalis

Pulsatilla

- hory




Pulsatilla occidentalis



Pulsatilla alpina




Pulsatilla alba



Ranunculus

- žluté květy
- jednoduché listy



Ranunculus gramineus



Ranunculus flammula



Ranunculus

- žluté květy
- dělené listy

Ranunculus brevifolius



Ranunculus lanuginosus



Ranunculus hybridus



Ranunculus



Ranunculus peruvianus

Ranunculus

- bílé květy

Ranunculus alpestris




Ranunculus aconitifolius




Ranunculus glacialis

Batrachium

- převážně vodní rostliny
- v humidních oblastech i na mokřadech
- výrazná heterofylie



Batrachium aquatile agg.




Batrachium hederaceum
www.british-wild-flowers.co.uk



Batrachium

- tekoucí vody

Batrachium penicillatum



Batrachium fluitans

Adonis

- listy bohatě členěné
- velmi jedovatý



Adonis distorta



Adonis vernalis



Adonis aestivalis



Adonis palaestina

Callianthemum

- eurasíjské montánní druhy
 - často endemiti malých území
 - v Evropě 3 druhy



Callianthemum



C. anemonoides



C. hondoense
www.hanamist.sakura.ne.jp



C. kerneranum

Clematis

- bylinky
- dřevité liány



Clematis integrifolia
www.gardenvines.com



Clematis alpina



Clematis

Clematis ligusticifolia




Clematis recta



Clematis cirrhosa



Clematis flammula



Clematis



Clematis mauritiana




Clematis hirsuta

Thalictrum

- prchavá koruna

Thalictrum foetidum



Thalictrum aquilegiifolium





Trautvetteria caroliniensis

Papaveraceae

- byliny
 - často jednoleté
- výjimečně dřeviny
 - *Bocconia*



Bocconia frutescens
www.answers.com

Papaveraceae

- v pletivech mléčnice s latexem nebo idioblasty
- listy zpravidla členěné
 - bez palistů
 - střídavé

Papaveraceae


- květenství hrozen
 - listeny chybějí
- květy oboupohlavné
 - podle čísla 2 nebo 3
 - někdy květní části pomnožené
 - aktinomorfní
 - květní obaly volné



Papaver rhoeas

Papaveraceae

- nektaria chybějí
- tyčinky většinou pomnožené
- gyneceum srostlé
 - parakarpní
 - placenta parietální
 - někdy druhotné přehrádky
 - semeník svrchní



Eschscholtzia californica

Papaveraceae

- plody většinou tobolky
 - vzácně struk
 - *Hypecoum*

Hypecoum grandiflorum
www.odu.edu



Hypecoum imberbe
home.tele2.es



Papaveraceae

- kosmopolitní čeled'
- 26 rodů, 250 druhů
- převaha v mírném pásu severní polokoule



Glaucium flavum



Argemone mexicana

Papaveraceae

- stanoviště
 - často plevelo
 - vazba na dusíkem dobře zásobená stanoviště
 - hory

Papaver lapponicum



Papaver aurantiacum

Papaveraceae

- alkaloidy
 - obsahují opiáty
- využití člověkem
 - okrasné rostliny
 - léčivé rostliny

Meconopsis grandis
www.stauder.net



Foto: Bjørn Thon

Papaveraceae




Romneya coulteri

Fumarioideae

- bylinky
 - jednoleté nebo vytrvalé
 - někdy popínavé
- některé druhy tvoří hlízky
 - *Corydalis*
- v pletivech idioblasty
- listy členěné, bez palistů
 - střídavé

Fumarioideae

- květenství hrozen
 - listeny přítomny
- květy oboupohlavné
 - podle čísla 2
 - zygomorfní
 - bisymetrické
 - *Corydalis*
 - květní obaly volné



Dicentra eximia



Corydalis cava

Fumarioideae

- tyčinky 4
- gyneceum srostlé z 2 plodolistů
 - semeník svrchní
 - vajíček více
 - *Corydalis*
- vajíčko jediné
 - *Fumaria*

Fumarioideae

- alkaloidy
 - v malém množství
- využití člověkem
 - okrasné rostliny



Dicentra spectabilis
www.mytho-fleurs.com

Fumaria

- plevele
 - někdy pnoucí



Fumaria officinalis
www.plant-identification.co.uk



Fumaria capreolata
www.nature-diary.co.uk

Corydalis

- hájové bylinky s hlízkami
- listeny nedělené



Corydalis intermedia

Corydalis cava



Corydalis

- hájové bylinky s hlízkami
- listeny dělené



Corydalis solidago



Corydalis pumila

Corydalis

- byliny skal a sutí bez hlízek



Corydalis lutea



Corydalis ochroleuca