



Úvod do diatomologie – Rozsivky bez raphe, rozsivky s raphe na jedné valvě, historie diatomologie


2. Přednáška







Morfologické pojmy

- Lineolátní – *lineolate*: prodloužené (areoly)




- Kapitátní, hlavatý – *capitate*: kulovité zakončení






Morfologické pojmy

- *Porefield* (apical): „koncové pole“: oblast velmi jemných póru na koncích frustul, slouží k protlačování mukopolysacharidových stopek skrz valvu. V mikroskopu se jeví jako hyalinní oblast



- Lanceolátní – *lanceolate*: kopinatý, tvar listu






Rozsivky bez raphe


- Valvy dvoustraně souměrné
- Nemají raphe (postrádají aktivní pohyb)
- Občas mají rimoportuly (diagnostický znak)



Diatoma sp.




Tabellaria sp.




Rozsivky bez raphe


- Fragilariales
 - *Fragilaria*
 - *Synedra*
 - *Asterionella*
 - *Diatoma*
 - *Meridion*
 - *Hannaea*
- Tabellariales
 - *Tabellaria*
 - *Tetracyclus*



Fragilaria


- Tvoří kolonie spojené pomocí trnů
- 1 rimoportula na každé valvě
- Valvy rovné až lanceolátní (kopinaté)
- Centrální oblast expandovaná (na jednu či obě strany)





Fragilaria


- Kosmopolitní
- Převážně planktonní
- Problémy s určováním *Fragilaria*? *Ulnaria*? *Synedra*?
- Platné jméno možné najít na <http://www.algaebase.org/>



Fragilaria versus *Synedra*

1. pohled na věc:


- *Fragilaria* se od rodu *Synedra* odlišuje dlouhými pásovitými koloniemi
- *Synedra* tvoří vějířovité kolonie



Fragilaria sp.



Synedra sp.



Fragilaria versus *Synedra* II

2 pohled na věc:

- Některé sladkovodní druhy rodu *Synedra* jsou zařazeny do rodu ***Ulnaria***


Synedra ulna, *S. acus*, *S. radians* a pod. nyní v rodu ***Ulnaria***

- Zbytek rodu *Synedra* rozdělen takto:

S. fasciculata, *S. truncata* nyní řazeny do rodu ***Tabularia***


Synedra pulchella = ***Ctenophora pulchella***

- Z toho vyplývá, že *Synedry* jsou nyní pouze mořské a brakické. Dělení podle tvaru kolonií funguje, ale již to není *Synedra*, ale *Ulnaria*



Fragilaria versus *Ulnaria*


- Sladkovodní druhy rodu *Synedra* = *Ulnaria*



Fragilaria sp.




Ulnaria sp.



Ulnaria versus *Fragilaria*

= problém


| | <i>Fragilaria</i> | <i>Ulnaria</i> |
|-------------|-------------------|--------------------------|
| striae | Vždy střídavé | Střídavé i protistojné |
| rimoportuly | Jedna na valvu | 2 na valvu |
| kolonie | Převážně pásovitě | Vějířovité, hvězdicovité |



Ulnaria sp.



Fragilaria sp.



Fragilaria

- *Fragilaria* sensu stricto (bez krátkých forem- *Fragilariaforma* a podobné, Williams and Round (1987), v této prezentaci)
- *Fragilaria* sensu lato – vše určeno jako *Fragilaria* (Süßwasserflora von Mitteleuropa) – platné jméno lze dohledat v algaebase




Fragilaria se rozpadla na:

- ***Fragilaria sensu stricto*** (např. *F. vaucheriae*, *F. crotonensis*)

+ odpadlíci:


- *Fragilariforma* (původní *Fragilaria virescens*)
- *Stauroforma* (malé variety *Fragilaria virescens*)
- *Punctastriata* (původní *Fragilaria pinnata*)
- *Pseudostaurosira* (původní *Fragilaria brevistriata*)
- *Staurosira* (původní *Fragilaria construens*)
- *Staurosirella* (původní *Fragilaria lapponica*)



Staurosira



- Striae většinou rovné, ve středu se nepotkávají
- Často tvoří kolonie spojené trny
- Od rodu *Fragilaria* se liší absencí rimoportuly (tak to pěkně děkujem...☺)
- Příklad: *Staurosira construens* (dříve *Fragilaria construens*)




Staurosira construens



Staurosira construns var. *venter*




Staurosira construns var. *binodis*




Pseudostaurosira


- Velmi široké osové pole
- Striae zkrácené
- Může tvořit kolonie (spojení valva na valvu)



Pseudostaurosira brevistriata




Pseudostaurosira parasitica




Stauroforma



- Strie se potkávají uprostřed valvy
- Centrální oblast chybí
- Vznikla odtrhnutím menších forem *Fragilaria virescens*
- Rimoportula chybí (tím se odlišuje od rodu *Fragilariforma*)





Stauroforma exiguiformis



Ctenophora

- Dříve *Synedra*
- Frustuly prodloužené
- Lineární až lanceolátní
- V centrální oblasti fascia, s „ghost striae“
- Fascia: křemíkem vyztužená oblast v centrální oblasti, mírně se vydouvající







Hannaea




- Valvy zahnuté
- Uprostřed na ventrální straně tumidní, okolo „ghost“ (velmi jemné, až průhledné) striae
- Konce kapitátní
- Především arktický a vysokohorský druh






Asterionella



- Dlouhé frustuly souměrné podle apikální osy, nesouměrné podle transapikální osy (jeden konec širší než druhý)
- Buňky spojené širším apexem pomocí slizu do hvězdčovitých kolonií
- Širší konec s koncovým polem
- Konce frustul hlavaté – kapitátní
- Kosmopolitní (lehce se šíří – antropochorie, eutrofní vody)






Diatoma

- Frustuly eliptické až lineární
- Konce někdy mírně kapitátní
- Transapikální (příčná) žebra- costae
- Na koncích jsou koncová pole (apical pore fields) – sekrece slizu
- Kolonie rovné či uspořádané „cik-cak“







Meridion




- Frustuly asymetrické k transapikální ose, symetrické k apikální ose (podle osového pole)
- Žebra- costae
- Frustuly z pleurálního pohledu klínovité
- Z valvárního pohledu kyjovité
- Tvoří vějířovité nebo kruhové kolonie
- Stenotermní






Staurosirella

- Písečné substráty
- Strie tvořené lineolátními areolami (*Staurosira* oválné)
- Koncové pole na obou pólech (*Staurosira* je nemá)
- Tvoří kolonie spojené valvami
- Může tvořit slizové stopky
- Hrubší strie než *Staurosira*
- Příklad: *Staurosirella leptostauron*
- Dříve *Fragilaria*






Fragilariforma

- Velmi jemná striace
- Tvar lineární, lanceolátní či eliptický
- Striae se téměř potkávají
- Kapitátní konce
- Pásovité kolonie







Tabularia



- Dříve patřila do rodu *Synedra*
- Široké zkrácené strie – uprostřed valvy široké sternum
- Koncová pole na obou pólech
- Především mořské a brakické vody




Tabularia fasciculata




Tabellaria



- Valvy uprostřed zduřelé
- Konce kapitátní
- Koncová pole na obou pólech
- Jemné striae
- Planktonní
- „Cik-cak“ kolonie







Tetracyclus




- Výrazná žebra
- Velmi vzácný
- *Tetracyclus rupestris*






Vynález mikroskopu


- kolem roku 1590, holandský brusič čoček a výrobce brýlí **Zacharias Jansen**
- Velké zdokonalení **Anthony Van Leeuwenhoek** (1632-1723), holandský obchodník s látkami






Historie diatomologie


- 1703 první zmínka o rozsivkách
- Autor neznámý
- Pravděpodobně pozoroval *Tabellaria flocculosa*
- Své pozorování předvedl na schůzce Royal Society of London.






Historie diatomologie


- První mikrofotografie rozsivek vznikla kolem roku 1860 ve Frankfurtu nad Mohanem
- József Pantocsek, kvalitní historické fotografie (kolem roku 1884), maďarský vědec






Historie diatomologie

- 1932 Objev životního cyklu rozsivek (Geitler)
- 1988 První použití molekulárních metod v diatomologii (Medlin)
- 2005 Polyfázický nebo holistický přístup ke studiu druhů (Johansen & Cassamata) – propojení morfologie, fyziologie, cytologie, reprodukčních bariér, molekulárních markerů, specifických parazitů, ekologie a/nebo biogeografie





Morfologické pojmy

- Stauros: zesílená oblast bez strií, v centrální oblasti valvy



- Rostrátní: podobné jako kapitátní (hlavatý), rostrátní konce nejsou tak expandované – nejsou širší než ostatní části valvy





Rozsivky s raphe na jedné valvě

- Redukce raphe na jedné valvě, vyplněno křemíkem (pseudoraphe)
- Odlišná striace na valvě s raphe a bez raphe
- Bilaterálně symetrické

- Řád Achnanthes

Achnanthes

Cocconeis

Psammothidium

Planothidium


Karayevia


Lemnicola

Achnanthidium


Eucoconeis

Psammothidium curtissimum
heterovalvární







Achnanthes




- Valva s raphe má vyvinutou fascii/stauros
- Valva bez raphe nemá centrální oblast
- Areoly ve striích zřetelné
- Valvy jsou z bočního pohledu zahnuté a prohloubené



Achnanthes coarctata





Achnanthes

- Odštěpily se od něj rody:


Achnanthidium

Psammothidium


Planothidium

Karayevia

Lemnicola




Achnanthis





- Valvy zahnuté (patrné z pleurálního pohledu)
- Valva s raphe je konkávní, valva bez raphe je konvexní
- Občas přítomna fascia/stauros
- Malých rozměrů (30 μm na délu, 5 μm na šířku)
- Velmi jemné a početné strie
- Kapitátní či rostrátní konce
- Může tvořit slizové stopky
- Běžné říční druhy

Achnanthis exiguum



Achnanthis minutissimum





Planothidium





- Strie na valvě s raphe radiální
- Centrální oblast může být asymetrická
- Na valvě bez raphe výrazná oblast bez strií (cavum), často ve tvaru podkovy, může být i dutá
- Valvy eliptické až lanceolátní
- Konce mohou být rostrátní nebo kapitátní

Planothidium lanceolatum



Planothidium frequentissimum







Psammothidium



- Valva s raphe je konkávní, valva bez raphe je konvexní
- Více eliptické než *Planothidium*
- Konce zakulacené
- Hustější striace (až 30 striae na 10 μm)
- Strie podobné na obou valvách
- Terminální konce raphe zahnuté opačným směrem
- Výrazná centrální oblast
- Často vázáno na písčité substráty


Psammothidium subatomoides







Karayevia

- Valva s raphe radiální strie
- Valva bez raphe má téměř paralelní striae
- Valvy eliptické až lanceolátní
- Terminální konce raphe zahnuté na stejnou stranu
- *Karayevia oblongella*: druh popsán jako *Achnanthes clevei*, později přeřazen do rodu *Planothidium*- synonymum *Planothidium oblongellum*






Cocconeis





- Valvy eliptické až kulaté
- Valvy s raphe mají po obvodu hyalinní oblast
- Valvy zahnuté
- Terminální konce raphe rovné
- Velmi běžný epifyt

Cocconeis pediculus



Cocconeis placentula








Eucocconeis



- Osové pole sigmoidní - zahnuté do S
- Celkem vzácný
- Litorál oligotrofních jezer, smáčené zdi






Lemnicola



- Valva s raphe má asymetrický stauros
- Konce mohou být subrostrátní
- Valvy lineární až lineárně eliptické
- Žije epifyticky (*Lemna*, *Wolfia*)



Lemnicola hungarica

Děkuji za pozornost!

