

Evoluce lidského skeletu


Jak se formoval skelet rodu Homo



Doc. Václav Vančata
katedra biologie a ekologické Ped F UK

Základní období třetihor a evoluce primátů

Archonta jsou polyfyletickou skupinou. Letouni nejsou příbuzní primátů ani poletuch a tan (*Tupaidae*). Novou skupinu **Euarchonta** tvoří primáti, tany a poletuchy



Homo

Hominidae

Dryopithecidae

Homoidea

Hominidea

Platyrrhina/Catarrhina

**Anthropoidea
a Tarsiiformes**

Purgatorius
a vznik primátů ve svrchní křídě

**Archiprimates a
Euprimates**

Znaky typické pro primáty

Znaky charakterizující řád
Primates a euprimáty:



- 1. Prodloužený třetí molár se současným zvětšením hypoconulidu;
- 2. postprotocingulum na horních molárech,
- 3. Prodloužení článků prstů ruky

U euprimátů k tomu vzniká

- I. Prodloužení tarzů,
- II. Zvětšení processus peronaeus na prvním metatarsu (halluxu),
- III. Dopředu směřující alespoň částečně uzavřené orbita a krátké splanchnocranum.


Archaičtí savci předci primátů

Nejstarší archaičtí křídoví primáti








Nehty až u euprimátů ?


Archiprimáti - Plesiadapiformes




Archicebus achilles - antropoid 55 milionů - Čína



Eocénní *Anthropoidea* - Fayum




Catopithecus



Serapia


Adapidae a první zástupci nadčeledi Hominoidea

Parapithecoidea čeled' Parapithecidae




Apidium

Hominoidea čeled' Propliopithecidae



Aegyptopithecus





Propliopithecus


Tribus *Afropithecini*

Raní afropitéci - kombinace archaických a moderních znaků

Afropithecus




Morotopithecus





Ranní afropitéci mají podivuhodnou kombinaci archaických, propliotékům podobných znaků, a poměrně velmi moderní morfologie premolářů a molářů


Kenyapitéci



Kenyapithecus wickeri



- Kenyapitéci jsou nejstarší skupinou dryopitékovitých, s mnoha starobylými znaky podobnými rodu *Equatorius*.
- V mnoha případech je jejich taxonomie nejasná, ale je již patrná diferenciace končetin a progresivní změny na chrupu
- Jejich nejbližší příbuzný je *Griphopithecus* ze středního miocénu Evropy a záp. Asie.



Kenyapithecus (Nacholapithecus)

Oreopithecus - bipedie ??










FIG. 3. Comparative site-specific structural morphology of the hip bone in *Oreopithecus* (IGF 11778), *Homo* (SCR 352), *Pan* (PVA 2706), *Piliocolobus* (AIZIU 1726), and *Papio* (AIZIU PAL 309). Iliac blade posterosuperior margin (a), internosuperior margin (b), internofemoral margin (c), and supracetabular area (d) are shown. Because specimens are not reproduced to scale, the sizes of the trabecular mesh are not directly comparable.

Pierolapithecus catalaunicus



ze středního miocénu je praprapředek homininů Evropy,
Afriky i Asie







Dryopitéci - hominidé před hominidy






Dryopitéci měli velký mozek
podle 3D rekonstrukce samice - 320 cm^2
Měli diferencovanou funkci končetin
D. laietanus měl velmi dlouhé paže
a velké ruce jako orangutani
Stejně jako Ouranopithecus měli již některé
znaky na lebce i skeletu podobné hominidům






Porovnání lebky ardipitéka, sahelantropa a šimpanze




Porovnání lebky archaických hominínů a australopitéků




Srovnání ardipitéka a australopitéců









(a)



(b)



Sterkfontain - Jacovec - 4,2 milionu let na skeletu neexistují žádné znaky související se šplháním



AL 333-160 *A. afarensis* - 3.2 milionu let archaičtí australopítéci byli jednoznačně bipední






Fig. 1. AL 333-160 left fourth metatarsal in dorsal, lateral, medial, plantar, and proximal views.



Skelet KSD-VP-1/1 - A. afarensis

Woranso-Mille, Ethiopia - 3.58 Ma






Figure S1. Satellite imagery location map of the Woranso-Mille study area. Korsi Dora is the locality where the partial skeleton (KSD-VP-1/1) was found. Other fossil collection areas are indicated.



Bushidima
pánev *Homo erectus*




Fig. 1. Anatomically arranged elements of KSD-VP-1/1. A list of all elements is provided in [SI Appendix](#), Table S1.

Výška postavy – 153 – 157 cm

Australopitéci s člověku podobnými znaky

- Mezi 3 a 2,6 miliony lety se začal výrazně měnit klimat, ochlazovalo se a snižovalo se množství srážek. Začínají se objevovat rozsáhlé oblasti pokryté savanovými a stepními formacemi. Objevuje se *mnoho nových* druhů pozemních opic, většinou zástupců tribu *Papionini*.
- Hominini v tomto období prodělali další adaptivní radiaci, v jejímž průběhu se u některých druhů australopitéků poprvé objevují typicky lidské znaky na lebce, zubech i postkraniálním skeletu.
- Objevují se „gracilní“ australopitéci s některými znaky podobnými rodu *Homo* (*A. sediba*, některé nálezy připisované *Homo habilis*) a různé formy rodu *Homo*. Moderní formy spodně pleistocénních homininů vyvinuly z afarských australopitéků, a mají mnoho společných znaků. Robustní australopitéci velmi pravděpodobně vznikli ze svrchně pliocéního *A. aethiopicus*, druhu s mnoha archaickými znaky.

Australopithecus garhi – dlouhoruký předčlověk???



- *A. garhi* měl dlouhé dolní končetiny
- Velmi dlouhé horní končetiny
- Dlouhé čelisti, obsah mozkovny $450 - 500 \text{ cm}^3$
- Byl vysoký asi $130 - 140 \text{ cm}$
- Jedl maso, vyráběl kamenné nástroje

Australopithecus sediba – Malapa, Jižní Afrika








Fig. 1. Craniodontal elements of *Au. sediba*. UW88-50 (MH1) juvenile cranium in (A) superior, (B) frontal, and (C) left lateral views. (D) UW88-8 (MH1) juvenile mandible in right lateral view, (E) UW88-54 (MH2) adult mandible in right lateral view, (F) UW88-8 mandible in occlusal view, (G) UW 88-54 mandible in occlusal view, and (H) UW 88-50 right maxilla in occlusal view (scale bars are in centimeters).

A. sediba – skelet nohy talus a tibiae lidská – calcaneus skoro šimpanzí



Right distal tibia, talus, and calcaneus of MH2. Separation of talus and calcaneus, bottom. All anterior views. (B) Tibia views from left to right: superior, inferior, lateral, medial; talus views from left to right: superior, inferior, lateral (top), medial (bottom), posterior.

A. sediba – pánev neuvěřitelně moderní







Fig. 4. Representative ossa coxae, in lateral view, from left to right, of *Au. afarensis* (AL 228-1), *Au. africanus* (Sts 14), *Au. sediba* (MH1), and *H. erectus* (KNM-WT 15000). The specimens are oriented so that the iliac blades all lie in the plane of the photograph (which thus leads to differences between specimens in the orientation of the acetabula and ischial tuberosities). MH1 possesses derived, *Homo*-like morphology compared to other australopithecines, including a relative reduction in the weight transfer distance from the sacroiliac (yellow) to hip (circle) joints; expansion of the retroauricular surface of the ilium (blue arrows) (determined by striking a line from the center of the sphere representing the femoral head to the most distant point on the posterior ilium; the superior arrow marks the terminus of this line, and the inferior arrow marks the intersection of this line with the most anterior point on the auricular face); narrowing of the tuberoacetabular sulcus (delimited by yellow arrows); and pronunciation of the acetabulocristal (green arrows) and acetabulosacral buttresses.

Homo habilis – paralelní druh nebo australopiték ?






Homo habilis

Dlouhý humerus
Krátký femur



OH-62 - australopiték??




Lake Turkana



Velmi malá lebka KNM-ER 42700 - *H. ergaster* – 1,55 m.y.

KNM-ER 42703 pravá maxilla *H. habilis* ?? – 1,44 m.y.


**Homo habilis vznikl paralelně s Homo ergaster/erectus
rod Homo se objevuje až před 2 miliony let**






Homo ergaster - nejstarší skutečný člověk



- *Homo ergaster* měl vysokou štíhlou postavu, možná i 180 cm. Byl větší než *Homo habilis*.
- Měl malý mozek ($600 - 900 \text{ cm}^3$), velikost se mohla pohybovat od 500 do 950 cm^3 . Některé znaky skeletu se výrazně liší od *H. erectus* a připomínají *H. habilis*.
- Nálezy z Dmanisi prokazují, že tento druh homininů migroval z Afriky těsně po svém vzniku a měl ještě málo vyspělou kamennou kulturu.



Dmanisi – archaické znaky prokazují nezávislý vznik moderních forem rodu Homo na Homo habilis a to již na počátku pleistocénu



- Lebky mají řadu archaických znaků a malý mozek
- Postkrania mají mozaiku pokročilých, archaických a specifických znaků
- Tito zástupci „Homo ergaster“ jsou poměrně malí a rozhodně nemají tropickou adaptaci postavy


Homo heidelbergensis/archaický Homo sapiens





- Lebka si zachovává zpočátku některé starobylé znaky, ale prokazatelně se zvětšuje mozek.
- Kostra končetin i pánev je tvarem i proporcemi velmi podobná anatomicky modernímu měl však užší vchod pánevní a obecně robustnější kosti než AMČ. Byl vysoký a měl poměrně robustní stavbu těla.
- Lovec, používal kompozitní nástroje, oštěpy, ašelén – pěstní klíny



První skutečná kolonizace Evropy




Atapuerca - Sima de los Huesos (Jeskyně kostí) epochální nález v historii paleoantropologie







Kosterní pozůstatky staré nikoliv 350, ale 500 tisíc let. Jde o nejméně 32 jedinců, kteří zemřeli v jednom okamžiku. Máme tedy údaje o první skutečně pravěké populaci.

Sima de los Huesos - nečekaná variabilita






Tento jedinec byl od raného dětství hluchý


Populace z jeskyně Sima de los Huesos představuje podivuhodnou směs znaků od znaků *Homo heidelbergensis* přes neandrtálské až po jedince s překvapivě moderní morfologií. Tito lidé byli velcí a robustní a měli relativně malý mozek



Klimatické změny a evoluce rodu Homo



Vznik moderních forem člověka



U neandrtálců velmi pravděpodobně došlo k mutaci HOX genů a RUNX2 genu
- projevily ve změnách stavby těla
Začala se uplatňovat funkce ACPI*A genu
- významně ovlivnila nárůst svalové hmoty a oddolnost proti chladu.
Působení genů ovlivňujících růst mozkové kůry se v počátečních fázích významně nelišilo od anatomicky moderního člověka.





Fig. 5. Schematic representation of the relationship between the population history of humans and Neanderthals and mtDNA genealogy highlighting the likelihood that the time of mtDNA coalescence between a Neanderthal and modern lineages preceded population vicariance, whereas the time of coalescence of human mtDNA, Y-chromosome loci, and microsatellites could coincide with the demographic bottleneck that separated early modern humans from late archaic African hominids.

Situace v Evropě před 150 a 120 tis. lety - Riss



Neandrtálci a anatomicicky moderní člověk

Proč vznikly dvě vysoce intelligentní ale ekologicky zcela odlišné lidské formy?








Fig. 10.9. Some distinguishing features of the Neandertal postcranial skeleton (143) in comparison to modern *H. sapiens* (right).



- Kdy obě skupiny vznikly?
- Kde a proč vznikly?
- Jak jsou si příbuzné a mohly se navzájem křízit?
- Proč měly podobnou kulturu, ale velmi odlišnou stavbu těla?



V čem se lišila lebka neandrtálců a anatomicky moderního člověka?



Jak se lišila stavba těla neandrtálců od anatomicky moderního člověka?






Fig. 10.9. Some distinguishing features of the Neandertal postcranial skeleton (143) in comparison to modern *H. sapiens* (right).

Výbuch supervulkánu Toba

- Výbuch supervulkánu Toba – 72 000 let b.p.
- The dense rock equivalent (DRE) tedy objem vulkanického popela vypuštěného do atmosféry byl odhadnut na 800 km^3 (Huff et al., 1992), Krakatau - 15 km^3
- Genetický bottleneck efekt po výbuchu zahrnoval minimálně 20 generací, ale možná i přes 500 generací – podobný ekvivalent platí i u dalších druhů velkých a středních savců – pokud nevyhynuli

Genetika neandrtálců – čím se lišíme?

- Odlišnosti ve genech se týkají především specificky lidských funkcí mozku, metabolismu a růstu



SEPARATING THEM FROM US

Some genes that differ between modern humans and Neandertals

Gene	Significance
<i>RPTN</i>	Encodes the protein repetin, expressed in skin, sweat glands, hair roots, and tongue papillae
<i>TRPM1</i>	Encodes melastatin, a protein that helps maintain skin pigmentation
<i>THADA</i>	Associated with type 2 diabetes in humans; evolutionary changes may have affected energy metabolism
<i>DYRK1A</i>	Found in an area critical for causing Down syndrome
<i>NRG3</i>	Mutations associated with schizophrenia
<i>CADPS2</i> / <i>AUTS2</i>	Mutations implicated in autism
<i>RUNX2</i> (CBRA1)	Causes cleidocranial dysplasia, characterized by delayed closure of cranial sutures, malformed clavicles, bell-shaped rib cage, and dental abnormalities
<i>SPAG17</i>	Protein important for the beating of the sperm flagellum





Genetika neandrtálců – co sdílíme?


- Sdílíme 85% genomu typického pro AMČ
 - některé geny mají neandrtálci v tzv. ancestrální formě,
 - jiné vznikly už u předků obou skupin, některé jsou totožné
- Sdílíme FOXP2 (vývoj jazyka a řeči) a to v moderní „lidské“ formě – tento gen ale vznikl téměř jistě již u archaických forem Homo sapiens - cca před 300000 lety
- Některé „ne-africké“ haplotypy – hybridizace ??

Co vlastně jedli neandrtálci?

- Poměr stabilních C a N isotopů v kolagenech jasně ukazuje, že neandrtálci jedli „červené“ netučné maso,
- zatímco první lidé (AMČ) měli pestrou potravu, ve které byly také ryby



První pionýři - Anatomicky moderní člověk - Palestina




100 - 90 000 let



Anatomicky moderní člověk

- byl vysoký
- poměrně robustně stavěný
- měl mousterskou kulturu


Qafseh




Skhul



Grotta di Cavallo – 43 -45 tisíc let kamenná kultura - uluzzian



Kent's Cavern site, UK, maxilla KC4, aurignacién



Pestera cu Oase, Rumunsko


nejstarší evropský nález AMH – 42 – 35 tisíc let




Oase 1 – 42 tisíc let



Oase 2 – 36 tisíc let



Oase 3



Aurignacien a nejstarší moderní evropané


Aurignacien 45 – 38 tisíc let

(podle franc. Naleziště Aurignac)

nejstarší evropská čepelová kamenná industrie,

 která prokazatelně patřila
 anatomicky modernímu člověku.


**Aurignačtí lidé i kultura měli některé
starobylé znaky. Žili v záp. a zvláště ve stř. Evropě**




Kelsterbach

Mladeč 35 – 38 tisíc let

Gravetién – kromaňonci – 38 – 22 tisíc let




Cro-Magnon




Vedle čepelových měli lidé z obdodí gravetiénu industrií měli moderní lidé řadu nových zbraní i technologií, například vrhače oštěpů, keramiku, látky a běžné bylo umění; sošky, rytiny do kostí a skály i malby


Středoevropský gravetién




Předmostí





- 1 - Dolní Věstonice II - západní svah: DV 16
- 2 - Dolní Věstonice II: trojhrob - DV 13, 14 a 15
- 3 - Předmostí: společný hrob
- 4 - Pavlov I: Pavlov 1
- 5 - Dolní Věstonice I: 5a) hrob DV 3 překrytý mamutí lopatkou, 5b) odkrytý hrob DV 3




Dolní Věstonice (a Pavlov) - pavlovién



DV 15 - žena??



Trojhrob velká variabilita podobnost DV 15 a Sungir 2



Magdalenien - evropská deprese



Kostěnki - Markina Gora



Zlatý kůň - Koněprusy



San Teodoro - Sicilie



Jak vypadal člověk ve svrchním paleolitu a mezolitu?

	Výška těla	Hmotnost	BMI	Rother. index	Femur	Tibia	Humerus	Radius
Neandertáldi - muži	166,0	65,2	23,69	1,429	443,0	352,4	311,4	243,9
Neandertáldi - ženy	155,3	54,2	22,44	1,446	399,3	310,0	299,0	226,8
Raný anat. moderní člověk-muži	181,9	69,3	20,91	1,150	495,0	429,5	338,3	240,2
Raný anat. moderní člověk-ženy	166,2	53,5	19,30	1,165	441,3	378,5	337,0	253,0
Gravetské populace AMČ-muži	179,0	67,4	21,08	1,181	477,7	403,4	347,0	268,1
Gravetské populace AMČ-ženy	158,3	54,5	22,11	1,401	416,1	361,2	306,4	242,5
Magdalénské populace AMČ-muži	166,5	61,9	21,89	1,319	443,5	379,8	308,8	242,8
Magdalénské populace AMČ-ženy	157,3	52,5	21,21	1,348	416,7	343,9	289,4	236,1
Mesolit-muži	168,8	63,4	21,73	1,292	447,9	372,7	324,9	251,1
Mesolit-ženy	157,5	52,7	21,14	1,342	417,0	349,3	293,8	225,2