


# PTÁCI


## 1.část




# AVES

Původ: bipední theropodní plazi s prodlouženou přední končetinou a 3 prstou nohou



3prstá stopa theropoda i u Červeného Kostelce (HK) - 90. léta 20. st.




## Systém Aves




# Systém ptáků



# Systém ptáků






(Prum et al. 2015)

# AVIFAUNA

- dnes známo asi 10 000 druhů
- u nás 394 druhů ptáků (k 15.3.2015)
- asi 200 hnízdících druhů

## ORNITOLOGIE v ČR

- Česká společnost ornitologická  
([www.cso.cz](http://www.cso.cz))
- (Faunistická komise: <http://fkcsco.cz/>)







# LITERATURA

- SVENSSON, L., GRANT, P. J., MULLARNEY, K. & ZETTERSTRÖM, D., 2000: Collins Bird Guide. *Harper Collins, London.* (v roce 2012 české vydání!)
- BALÁT, F., 1986: Klíč k určování našich ptáků v přírodě. *Academia, Praha.*
- ČERNÝ, W. & DRCHAL, K., 1996: Ptáci. Průvodce přírodou. (2. vydání). *Aventinum, Praha.*
- DUNGEL, J. & HUDEC, K., 2001: Atlas ptáků České a Slovenské republiky. *Academia, Praha.*
- del HOYO, J., ELLIOTT, A., SARGATAL, J. & CHRISTIE, D. A. (eds.), 1992 – 2004: Handbook of the Birds of the World. Vol. 1 – 9. *Lynx, Barcelona.*
- HAGEMEIJER, W. J. M. & BLAIR, M. J. (eds.), 1997: The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance. *T. & A. D. Poyser, London.*
- ŠŤASTNÝ, K., BEJČEK, V. & HUDEC, K., 2006: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001 - 2003. *Aventinum.*
- MARTIŠKO, J. (ed.), 1994: Hnízdní rozšíření ptáků. Jihomoravský region. Část 1. Nepěvci. *MZM Brno & ZO ČSOP Pálava, Brno.*
- HUDEC, K. (ed.), 1994: Fauna ČR a SR. Ptáci – Aves, Díl I. (2. přepracované a doplněné vydání). *Academia, Praha.*

# Řád: VRUBOZOBI (Anseriformes)

- středně velcí až velcí ptáci, krátký plochý zobák (rohovité lamely k cezení potravy), dlouhý krk
- plovací noha – přední 3 prsty s plovací blánou
- vodní
- dobří letci (úzká špičatá křídla) – tah
- častý pohlavní dimorfismus (samci pestří, samice sedí na vejcích)
- během pelichání neschopní letu
- nidifugní ml., potravou rostliny, bezobratlí, ryby
- u nás 40 druhů (asi 15 hnízdí)



*Čeledi:*

Kamišovití – Anhimidae

Husovcovití - Anseranatidae

Kachnovití - Anatidae

Labuť velká (*Cygnus olor*)



Labuť malá (*Cygnus columbianus bewickii*)



Labuť zpěvná (*Cygnus cygnus*)





Husa velká (*Anser anser*)



Husa tundrová (*Anser serrirostris*)

Husa polní (*Anser fabalis*)






Husa malá (*Anser erythropus*)

Husa běločelá (*Anser albifrons*)






Berneška rudokrká (*Branta ruficollis*)



Berneška bělolící (*Branta leucopsis*)


## Husice liščí (*Tadorna tadorna*)



## Husice rezavá (*Tadorna ferruginea*)



Kachnička mandarinská  
(*Aix galericulata*)



Kachnička karolínská  
(*Aix sponsa*)



Husice nilská  
(*Alopochen aegyptiaca*)


# Kachna divoká (*Anas platyrhynchos*)



© Francois Bourgeot




© Francois B



# Kopřivka obecná (*Anas strepera*)



# Lžíčák pestrý (*Anas clypeata*)






Čírka obecná (*Anas crecca*)

Čírka modrá (*Anas querquedula*)



# Hvízdák eurasijský (*Anas penelope*)



# Ostralka štíhlá (*Anas acuta*)



# Zrzohlávka rudozobá (*Netta rufina*)

© Don DesJardin




# Polák velký (*Aythya ferina*)



© - lubomir hlasek  
[www.hlasek.com](http://www.hlasek.com)  
Aythya ferina 4092



# Polák chocholačka (*Aythya fuligula*)



# Polák malý (*Aythya nyroca*)

# Hohol severní (*Bucephala clangula*)



# Morčák velký (*Mergus merganser*)






© John White

Morčák bílý  
(*Mergellus albellus*)

Morčák prostřední (*Mergus serrator*)



Kajka mořská (*Somateria mollissima*)



Hoholka lední (*Clangula hyemalis*)



Polák kaholka  
(*Aythya marila*)



Turpan černý (*Melanitta nigra*)



Turpan hnědý (*Melanitta fusca*)

# Řád: HRABAVÍ (*Galliformes*)

- zavalití ptáci, pozemní (ale spí na větvích)
- noha anizodaktylní (kráčivá), silná – hrabavá, silné tupé drápy, často ostruha
- krátký zobák, na hlavě časté kožené výrůstky
- pohlaví často odlišně zbarvená (samci větší)
- někdy polygamie (ritualizace toku)
- hnízdí většinou na zemi, nidifugní ml.
- všežraví
- u nás 7 druhů

**čeledi:** někdy Craciformes

Hokovití - Cracidae




Tabonovití – Megapodiidae

**Bažantovití – Phasianidae**

Krocanovití – Meleagrididae

Perličkovití – Numididae

Křepelovití - Odontophoridae



# Č: Bažantovití – Phasianidae, podč.: Tetřevovití – Tetraoninae

- lesní kurové, husté opeření, běhák opeřený až po prsty, mimo tok solitérní



Tetřev hlušec (*Tetrao urogallus*)



Jeřábek lesní (*Tetrastes bonasia*)



Tetřívek obecný (*Tetrao tetrix*)

## Č: Bažantovití – Phasianidae, podč.: Phasianinae

- kurové otevřené krajiny (synantropní), běhák lysý, někdy prodloužená ocasní pera, někdy ostruhy



Bažant obecný  
(*Phasianus colchicus*)



Koropec polní (*Perdix perdix*)




Křepelka polní (*Coturnix coturnix*)





Bažant královský (*Syrmaticus reevesi*)

Aequorhito mithes



# Řád: POTÁPKY (*Podicipediformes*)

- potápicí ptáci, husté opeření
- nohy hodně vzadu na těle, 4 prsty lemované plovací blánou
- špičatý zobák – masožraví (bezobratlí, ryby), polykání peří
- ritualizace toku, některé druhy koloniální
- plovoucí hnízda, seminidifugní ml.
- u nás 5 druhů (4 hnízdí)



# Č: Potápkovití – Podicipedidae

Potápka malá (*Tachybaptus ruficollis*)



Potápka roháč (*Podiceps cristatus*)

# Potápka rudokrká (*Podiceps grisegena*)



## Potápka černokrká (*Podiceps nigricollis*)




## Potápka žlutorohá (*Podiceps auritus*)

(Photo credit: Various sources)

# Řád: PLAMEŇÁCI (*Phoenicopteriformes*)

- velcí vodní ptáci, dlouhé nohy a krk
- silný zobák s filtrovacími lamelami – potravou plankton
- přední prsty s plovací blánou, palec redukován
- v letu natažený krk, relativně krátká křídla
- kolonie – slaná i sladká jezera
- hnízda z hlíny na zemi, nidikolní ml.
- u nás vzácně 1 druh

Č: Plameňákovití - Phoenicopteridae



Plameňák růžový (*Phoenicopterus ruber*)

# Řád: BAHŇÁCI (=DLOUHOKŘÍDLÍ) (*Charadriiformes*)

- různorodá skupina, většinou vázáni na vodu
- většinou plovací noha (redukce palce)
- masožravci (hlavně bezobratlý) – různě modifikované zobáky
- dlouhá špičatá křídla – výborní letci, nejdelší taly
- hnízdo většinou na zemi, nidifugní ml.
- u nás 85 druhů (hnízdí asi 17)

*čeledi:*

Slukovití – Scolopacidae

Slučicovití – Rostratulidae

Ostnákovití – Jacanidae

Písečníkovití – Thinocoridae

Dropíkovití – Pedionomidae

Perepelovití – Turnicidae

Dytíkovití – Burhinidae

Štítonosovití – Chionidae

Pluvianellidae

Srpatkovití – Ibidorhynchidae

Tenkozobcovití – Recurvirostridae

Ústřičníkovití – Haematopodidae

Kulíkovití – Charadriidae

Ouhoríkovití – Glareolidae

Pluvianidae

Pobřežníkovití – Dromadidae


Rackovití – Laridae

(Zobounovití – Rhynchosidae)

(Rybákovití – Sternidae)

Alkovití – Alcidae

Chaluhovití – Stercorariidae



# Č: Slukovití – Scolopacidae

- malí až velcí ptáci, dlouhý zobák a nohy, palec částečně vyvinut
- otevřené i lesní biotopy, hnízdo na zemi či na stromech, 4 vejce



Bekasina otavní  
(*Gallinago gallinago*)



Sluka lesní  
(*Scolopax rusticola*)



Slučka malá (*Lymnocryptes minimus*)

# Břehouš černoocasý (*Limosa limosa*)



Copyright © 2004 KK Hui

Koliha velká  
(*Numenius arquata*)

# VODOUŠI – rod *Tringa* (u nás 7 druhů)



Vodouš tmavý  
(*Tringa erythropus*)



Vodouš rudonohý (*Tringa totanus*)



Vodouš šedý (*Tringa nebularia*)




Vodouš štíhlý (*Tringa stagnatilis*)

# Vodouš kropenatý (*Tringa ochropus*)



# Vodouš bahenní (*Tringa glareola*)



# Pisík obecný (*Actitis hypoleucus*)

## JESPÁCI – rod *Calidris* (u nás 11 druhů)



Jespák obecný (*Calidris alpina*)



Jespák křivozobý (*Calidris ferruginea*)




Jespák malý (*Calidris minuta*)



Jespák šedý (*Calidris temminckii*)

# Jespák bojovný (*Philomachus pugnax*)



Kameňáček pestrý (*Arenaria interpres*)



Koliha malá (*Numenius phaeopus*)



Lyskonoh úzkozobý (*Phalaropus lobatus*)

# Č: Dytíkovití – *Burhinidae*

- středně velcí ptáci, velká hlava s velkýma žlutýma očima, na prstech částečně plovací blána
- otevřená krajina (step), noční aktivita, 2 vejce

Dytík úhorní (*Burhinus oedicnemus*)



# Č: Tenkozobcovití – Recurvirostridae

- dlouhé štíhlé nohy, na prstech částečně plovací blána, někdy kolonie, 4 vejce



Tenkozobec opačný  
(*Recurvirostra avosetta*)

Pisila čáponohá  
(*Himantopus himantopus*)

# Č: Ústřičníkovití – Haematopodidae

- silné dlouhé červené zobáky – otvírání schránek měkkýšů
- zavalité tělo, černobílé či černé zbarvení
- hlavně mořská pobřeží



Ústřičník velký (*Haematopus ostralegus*)

# Č: Kulíkovití – Charadriidae

- menší ptáci, krátký zobák, krátký krk, velké oči, palec silně redukován či chybí, kratší nohy, 4 vejce
- otevřená krajina, nejčastěji mělčiny a břehy vod



Kulík říční  
(*Charadrius dubius*)



Kulík písečný  
(*Charadrius hiaticula*)

# Kulík hnědý (*Charadrius morinellus*)



# Kulík bledý (*Pluvialis squatarola*)



# Kulík zlatý (*Pluvialis apricaria*)

# Čejka chochlatá (*Vanellus vanellus*)



# Č: Ouhorlíkovití – Glareolidae


- krátké nohy a zobák, obratní letci – lov hmyzu v letu
- dlouhý vykrojený ocas
- otevřené stepní mokřady, kolonie



Ouhorlík stepní (*Glareola pratincola*)

# Č: Rackovití – Laridae

- většinou světlé zbarvení, plovací noha (3 prsty s plovací blánou)
- výborní letci a plavci, silný hákovitý zobák – všežravci, mrchožrouti
- kolonie, mokřady a moře



Racek bělohlavý (*Larus cachinnans*)

Racek středomořský (*Larus michahellis*)

Racek stříbřitý (*Larus argentatus*)

Racek bouřní (*Larus canus*)

Racek chechtavý (*Chroicocephalus ridibundus*) Racek malý (*Hydrocoleus minutus*)



Racek černohlavý  
(*Ichthyaetus melanocephalus*)

# Č: Rybákovití – *Sternidae* (dnes někdy pod Laridae)

- štíhlí ptáci, vidličnatě ukončený ocas, krátké nohy, úzká křídla – výborní letci
- úzký špičatý zobák, lov ryb, většinou světlí s tmavým temenem
- kolonie, mokřady a moře



Rybák obecný (*Sterna hirundo*)



Rybák černý  
(*Chlidonias niger*)



Rybák bahenní (*Chlidonias hybrida*)



Rybák velkozobý  
(*Hydroprogne caspia*)



Rybák malý (*Sternula albifrons*)



Rybák bělokřídlý (*Chlidonias leucopterus*)

# Č: Alkovití - *Alcidae*

- krátká křídla, silné tělo a zobáky, nohy hodně vzadu s plovací blánou, potápicí (lov ryb)
- severní polární oblasti, smíšené kolonie



Alkoun úzkozobý (*Uria aalge*)



Alka malá (*Alca torda*)

Alkoun obecný (*Cephus grylle*)



Alkoun malý (*Alle alle*)

# Č: Chaluhovití - *Stercorariidae*

- vzhled větších racků, převážně tmavé zbarvení, cirkumpolární, kleptoparazitismus či dravci

Chaluha pomořanská (*Stercorarius pomarinus*)



Chaluha velká  
(*Stercorarius skua*)



Chaluha malá  
(*Stercorarius longicaudus*)

# Řád: POTÁPLICE (*Gaviiformes*)

- velcí potápicí ptáci, husté opeření, dlouhý špičatý zobák, masožravci
- plovací noha – tři prsty s plovací blánou, umístěná hodně vzadu
- rychlí letci – přistávají na prsa
- severská jezera, dvě vejce, seminidifugní ml.
- u nás 4 druhy (zimní hosté)



# Č: Potáplíkovití - Gaviidae

Potáplice malá (*Gavia stellata*)



Potáplice severní (*Gavia arctica*)

Neoaves: Aequorlitornithes: Procellariimorphae

# Řád: TRUBKONOSÍ (*Procellariiformes*)

- mořští ptáci, rourkovité nozdry, hákovitý zobák (na konci)
- dlouhá štíhlá křídla (nejdelší loketní část)
- plovací noha (3 prsty s plovací blánou)
- často koloniální (útesy, ostrovy), nidikolní ml., masožraví
- u nás zjištěny 3 druhy

*čeledi:*

Albatrosovití – Diomedeidae

Buřňákovití – Procellariidae

(Buřníkovití – Pelecanoididae)


Buřňáčkovití – Hydrobatidae  
(+ Oceanitidae)



Buřňák lední (*Fulmarus glacialis*)



Buřňáček malý  
(*Hydrobates pelagicus*)



Buřňák šedý (*Calonectris diomedea*)

# Řád: ČÁPI (*Ciconiiformes*)

- štíhlí vodní ptáci, dlouhý zobák, krk a nohy
- brodivá noha (dlouhá noha s dobře vyvinutým palcem, s částečnou plovací blánou na předních prstech)
- dlouhý silný zobák – lov drobných obratlovců
- hnízda na stromech či antropogenních substrátech, někdy kolonie, nidiklní ml.
- tažní na dlouhé vzdálenosti, v letu natažený krk
- u nás 2 hnízdící druhy




# Č: Čápotví – Ciconiidae



Čáp bílý (*Ciconia ciconia*)

Čáp černý (*Ciconia nigra*)





Suliformes




Pelecaniformes

# Řád: BRODIVÍ a PELIKÁNI (*Pelecaniformes*)

- větší vodní ptáci, veslovací noha (4 prsty spojené plovací blánou) nebo brodivá noha (dlouhá noha s dobře vyvinutým palcem bez nebo s náznakem plovacích blan)
- roztažitelný krční vak (rybožraví), různé modifikace zobáku (včetně pro lov bezobratlých)
- nidiklní ml., hnízda na stromech či v rákosinách, kolonie
- u nás 12 druhů (6 hnízdí)

*čeledi:*


pelikánovití – Pelecanidae  
volavkovití – Ardeidae  
člunozobcovití – Balaenicipitidae  
kladivoušovití – Scopidae  
ibisovití - Threskiornithidae



# Č: Pelikánovití – Pelecanidae

- dlouhý zploštělý zobák, velký krční vak, dlouhá široká křídla (plachtění), pobřeží a vnitrozemské mokřady – kolonie (hnízda na zemi)

Pelikán bílý (*Pelecanus onocrotalus*)



P. kadeřavý – *P. crispus*

# Č: Volavkovití – Ardeidae

- prsty bez plovacích blan, krk v letu esovitě prohnutý, smíšené kolonie



Bukač velký (*Botaurus stellaris*)

Bukáček malý (*Ixobrychus minutus*)

# Kvakoš noční (*Nycticorax nycticorax*)



Volavka stříbřitá (*Egretta garzetta*)



Volavka bílá  
(*Ardea alba*)



Volavka vlasatá (*Ardeola ralloides*)

# Volavka popelavá (*Ardea cinerea*)



Volavka červená  
(*Ardea purpurea*)



# Č: Ibisovití – Threskiornithidae

- výrazně modifikované zobáky, v letu natažený krk, u kořene prstů plovací blána

Ibis hnědý (*Plegadis falcinellus*)



Kolpík bílý  
(*Platalea leucorodia*)



# Řád: VESLONOZÍ (*Suliformes*)

- větší vodní ptáci, veslovací noha (4 prsty spojené plovací blánou)
- rybožraví – různé techniky lovу
- nidikolní ml., kolonie na stromech, skalách apod.
- u nás 4 druhy (1 hnízdí)



*čeledi:*

anhingovití – Anhingidae

kormoránovití – Phalacrocoracidae

fregatkovití – Fregatidae

terejovití – Sulidae



# Č: Kormoránovití – *Phalacrocoracidae*

- na konci zobáku hák, dlouhý ocas a krk, tmavé zbarvení, dobrí plavci (potápění), nemastné peří, kolonie na stromech či skalách



Kormorán velký (*Phalacrocorax carbo*)



K. malý  
(*P. pygmeus*)

## Neoaves

### Gruiformes



*Columba*  
*Heliois*  
*Sarothrura*  
*Rallus*  
*Micropygia*  
*Porphyrio*  
*Psophia*  
*Aramus*  
*Balearica*  
*Grus*

4



# Řád: KRÁTKOKRÍDLÍ (*Gruiformes*)

- různorodá skupina, převážně vodní ptáci
- anizodaktylní noha (palec vysoko postavený či chybí) – běhavá, brodivá či lemovaná
- hnízdí na zemi či v rákosinách, nidifugní ml.
- většinou býložravci či všežravci
- u nás 8 druhů (hnízdí 7)

čeledi:

Chřástalovití – Rallidae




Sarothruridae

Chřástalcovití – Heliornithidae

Jeřábovití – Gruidae

Kurlanovití – Aramidae

Trubačovití – Psophiidae



# Č: Chřástalovití – *Rallidae*

- malí až středně velcí, často skrytí, v blízkosti vod
- tělo zploštělé ze stran, často dlouhé nohy s dlouhými prsty (lyska lemované)
- kožní štítek na čele – lysky, při pelichání neschopní letu
- všežravci, hnízda v rákosinách či na loukách



Chřástal vodní (*Rallus aquaticus*)

# Chřástal kropenatý (*Porzana porzana*)




nir hlasck  
sek.com  
porzana 8709




# Chřástal malý (*Porzana parva*)

# Chřástal polní (*Crex crex*)



Lyska černá (*Fulica atra*)




Slípka zelenonohá  
(*Gallinula chloropus*)



# Č: Jeřábovití – *Gruidae*

- velcí, podobní brodivým (dlouhé nohy a krk - v letu natažený), lysá barevná místa na hlavě, dobří letci, samci nápadné ruční letky (přesahují ocas)
- rovinaté mokřady, ritualizovaný tok, všežravci



Jeřáb popelavý  
(*Grus grus*)





# Řád: STEPOKUROVÉ (*Pterocliformes*)

- podobní kurům, krátké nohy, dlouhý ocas, úzká křídla, holubí zobák
- přizpůsobení stepím a polopouštím
- napájení mláďat vodou zachycenou na opeření břicha, nidiklní ml.
- u nás historicky 1 druh (invaze)


Č: Stepokurovití – Pteroclidae

Stepokur kirgizský (*Syrrhaptes paradoxus*)



# Řád: MĚKKOZOBÍ (*Columbiformes*)

- zavalití ptáci, dlouhá špičatá křídla – dobrí letci
- měkké lysé ozobí (v něm nozdry), kráčivé nohy (anizodaktylní)
- umí pít vodu sáním, drobivé prachové peří
- mělká hnízda z větviček či dutiny, nidikolní ml. (krmí výměškem volete)
- hlavně rostlinná potrava
- u nás 5 druhů (všechny hnízdí)




# Č: Holubovití – Columbidae

Holub hřivnáč (*Columba palumbus*)



Holub doupňák (*Columba oenas*)

# Holub domácí (*Columba livia fa.domestica*)




# Hrdlička zahradní (*Streptopelia decaocto*)



# Hrdlička divoká (*Streptopelia turtur*)


# Řád: KUKAČKY (*Cuculiformes*)

- úzký špičatý zobák, dlouhá špičatá křídla, dlouhý ocas
- vratiprst, potravou hmyz, nidíkolní ml.
- hnízdní parazitismus (jen u některých druhů), netvoří páry
- u nás 1 hnízdící druh



# Č: Kukačkovití – Cuculidae

## Kukačka obecná (*Cuculus canorus*)



# Řád: DROPI (Otidiformes)

## Č: Dropovití – *Otididae*

- velcí pozemní ptáci, nejtěžší evropský létající pták (až 20 kg!)
- zcela chybí palec, 3 prsty se zploštělými drápy, bez kostrční žlázy
- ritualizovaný tok, samci větší, hnízdo na zemi, všežravci



Drop velký (*Otis tarda*)



# Řád: LELKOVÉ (*Caprimulgiformes*)

- noční, skrytě žijící ptáci, kryptické zbarvení a chování
- plochá hlava, zobák krátký široký s vibrisy, velké oči
- krátké nohy s částečným vratiprstem
- dlouhá špičatá křídla, měkké peří, let připomíná netopýry
- loví hmyz v letu, hnízdo na zemi, nidikolní ml.
- u nás 1 hnízdící druh

*Čeledi:*

Gvačarovití – Steatornithidae



Lelčíkovití – Aegothelidae

(někdy v Apodiformes)

Lelkounovití – Podargidae

Potuovití – Nyctibiidae

Lelkovití - Caprimulgidae



# Č: Lelkovití – Caprimulgidae

## Lelek lesní (*Caprimulgus europaeus*)



# Řád: SVIŠŤOUNI (*Apodiformes*)

- extrémní letoví specialisti s mohutnou létací svalovinou, dlouhá ruční část křídla s dlouhými letkami, slabé nohy, potravu získávají v letu, nidikolní ml.
- u nás 2 druhy (1 hnízdí)


*Čeledi:*

Rorýsovité – *Apodidae*

Klechovité – *Hemiprocnidae*

Kolibříkovité – *Trochilidae*

(někdy do dvou řádů –  
*Apodiformes* a *Trochiliformes*)




## Č: Rorýsovité – *Apodidae*

- dlouhá srpovitá křídla, krátký vidličnatý ocas, velmi krátké nohy s drápy – závěsné (pamprodaktylní – všechny 4 prsty dopředu)
- krátký rozeklaný zobák – lov hmyzu v letu
- v letu kopulují i spí, kolonie (skály, budovy)

# Rorýs obecný (*Apus apus*)





# Řád: DRAVCI (*Accipitriformes*)

- denní predátoři či mrchožrouti (vývržky)
- skvělý zrak, ostře zahnutý silný zobák, nozdry v lysém ozobí
- nohy se zahnutými drápy – spáry
- výborní letci – široká křídla s prstíky (plachtění, obratní letci)
- samice větší, velká hnízda (stromy, skály), nidikolní ml.
- u nás 27 druhů (hnízdí 12)



*čeledi:*

Kondorovití - Cathartidae

Orlovcovití – Pandionidae


Jestřábovití – Accipitridae

Hadilovovití – Sagittariidae



# Č: Orlovcovití – Pandionidae

- velký rybožravý dravec, vratiprst (4. prst obratitelný dozadu)



Orlovec říční (*Pandion haliaetus*)

# Č: Jestřábovití – Accipitridae




Včelojed lesní  
(*Pernis apivorus*)

# Luňák červený (*Milvus milvus*)



# Luňák hnědý (*Milvus migrans*)

# Orel mořský (*Haliaeetus albicilla*)



Sup bělohlavý  
(*Gyps fulvus*)




Orlík krátkoprstý (*Circaetus gallicus*)

Moták pochop (*Circus aeruginosus*)



Moták pilich (*Circus cyaneus*)

# Moták lužní (*Circus pygargus*)



# Moták stepní (*Circus macrourus*)

# Jestřáb lesní (*Accipiter gentilis*)



# Krahujec obecný (*Accipiter nisus*)

# Káně lesní (*Buteo buteo*)



# Káně rousná (*Buteo lagopus*)

# Orel skalní (*Aquila chrysaetos*)



# Orel královský (*Aquila heliaca*)



# Orel křiklavý (*Aquila pomarina*)



# Orel nejmenší (*Aquila pennata*)



# Řád: SOVY (*Strigiformes*)

- predátoři s noční aktivitou, velké oči směřující dopředu, výborný sluch
- opeřené nohy se silnými drápy – spáry, vratiprst
- měkké obrysové peří, speciálně upravená první letka – neslyšný let
- krátký hákovitý zobák, vývržky, hnízda na stromech, v dutinách či na skalách, nidikolní ml., samice větší
- u nás 12 druhů (9 hnízdí)

*Čeledi:*


Sovovití – Tytonidae

Puštíkovití - Strigidae



# Č: Sovovití – Tytonidae

- srdčitý závoj, noční aktivita, běháky opeřené, ale chodidla lysá
- široká zaoblená křídla, ocas kratší než nohy



Sova pálená (*Tyto alba*)



# Č: Puštíkovití – *Strigidae*

- noční nebo denní aktivita, běháky i prsty opeřené, ocas delší než nohy

## Výr velký (*Bubo bubo*)



# Puštík obecný (*Strix aluco*)



# Puštík bělavý (*Strix uralensis*)



Bohumir hlasek


[hlasek.com](http://hlasek.com)

*Strix uralensis* d331

# Kalous ušatý (*Asio otus*)



# Kalous pustovka (*Asio flammeus*)



# Sýc rousný (*Aegolius funereus*)



© Jaromír Hlasek  
[www.hlasck.cz](http://www.hlasck.cz)  
*Aegolius funereus*



# Sýček obecný (*Athene noctua*)



# Kulíšek nejmenší (*Glaucidium passerinum*)



Varpuspööri

# Výreček nejmenší (*Otus scops*)



# Řád: SROSTLOPRSTÍ (*Coraciiformes*)

- různorodý řád masožravých ptáků, pestré zbarvení, dlouhý zobák
- 2 přední prsty při bázi srostlé – syndaktylní noha
- tuhé peří, hnízdí hlavně v dutinách, nidikolní ml.
- u nás 3 druhy (2 hnízdí)

*Čeledi:*

Ledňáčkovití – Alcedinidae

(+ někdy Halcyonidae a Cerylidae)


Todiovití – Todidae

Momotovití – Momotidae

Vlhovití – Meropidae

Mandelíkovití – Coraciidae

Kurolcovití – Brachypteraciidae



# Č: Ledňáčkovití – *Alcedinidae*

- dlouhý silný špičatý zobák, krátká křídla a ocas, srůst prostředních prstů po celé délce, hnízdí v břehových norách, lov rybek či jiných živočichů

Ledňáček říční (*Alcedo atthis*)



# Č: Vlhovití – *Meropidae*

- štíhlí ptáci, dlouhý špičatý zobák a křídla, dlouhý ocas, protažené střední rýdováky, koloniální, břehové nory, lov hmyzu v letu (hlavně blanokřídlí)



Vlha pestrá  
(*Merops apiaster*)

# Č: Mandelíkovití – Coraciidae

- mohutnější, silný široký zobák – lov bezobratlých i obratlovců
- dlouhá špičatá křídla, krátké nohy, hnízdí v dutinách

Mandelík hajní (*Coracias garrulus*)



# Řád: ZOBOROŽCI (*Bucerotiformes*)

- pestré zbarvení, dlouhý, často masivní zobák
- syndaktylní noha
- tuhé peří, hnízdí hlavně v dutinách, nidikolní ml.
- u nás 1 hnízdící druh


*Čeledi:*

Dudkovití – Upupidae

Dudkovcovití – Phoeniculidae

Zoborožcovití – Bucerotidae

Bucorvidae



# Č: Dudkovití – *Upupidae*

- dlouhý zahnutý zobák, výrazná chocholka, polootevřená krajina, hnízdí v dutinách, potravu hledá na zemi (bezobratlí i obratlovci)

Dudek chocholatý (*Upupa epops*)



© - lubomir hlasek  
[www.hlasek.com](http://www.hlasek.com)  
Upupa epops 2577



nir hlasek  
[www.hlasek.com](http://www.hlasek.com)  
Upupa epops 11006

# Řád: ŠPLHAVCI (*Piciformes*)

- stromoví ptáci, šplhavá (zygodaktylní) noha – dva prsty dopředu a dva dozadu, tuhé opeření, hnízdění v dutinách, nidikolní ml.
- u nás 10 druhů (všechny hnízdí)

*Čeledi:*

Lenivkovití – Bucconidae

Leskovicovití – Galbulidae

Vousákovití – Capitonidae

Megalaimidae


Lybiidae

Semnornithidae

Tukanovití – Ramphastidae


Medozvěstkovití – Indicatoridae

Datlovití – Picidae



## Č: Datlovití – *Picidae*

- dlouhý špičatý zobák, zpevněná lebka
- dlouhý jazyk se štětičkou
- tuhý ocas (podpora šplhu), obloukovitý let
- pestré zbarvení, akustická komunikace
- vydlabávají stromové dutiny
- potravou hmyz, rostlinné části



# Krutihlav obecný (*Jynx torquilla*)



© David Nichols  
wildlife-photographer.co.uk



# Žluna zelená (*Picus viridis*)



# Žluna šedá (*Picus canus*)



© Jan Ševčík



# Datel černý (*Dryocopus martius*)

Josef hlasek  
hlasek.com  
*Dryocopus martius* 8585



© - lubomir hlasek  
[www.hlasek.com](http://www.hlasek.com)  
*Dryocopus martius* 6180

# Strakapoud velký (*Dendrocopos major*)



# Strakapoud jižní (*Dendrocopos syriacus*)



© - lubomír hlasek  
www.hlasek.com  
*Dendrocopos syriacus* 2413



© - lubomír hlasek



© - lubomír hlasek  
*Dendrocopos syriacus* 2412



# Strakapoud bělohřbetý (*Dendrocopos leucotos*)



# Strakapoud prostřední (*Leiopicus medius*)



© Jan Ševčík



© - Josef Hlasek  
[www.hlasek.com](http://www.hlasek.com)  
Dendrocopos medius 2414

# Strakapoud malý (*Dryobates minor*)



chlasek  
com  
minor 8107


Pic épeichette  
(*Dendrocopos minor*)

# Datlík tříprstý (*Picoides tridactylus*)



- josef hlasek  
www.hlasek.com  
*Picoides tridactylus* 108

Inopinaves



# Řád: SOKOLI (*Falconiformes*)

- denní predátoři (vývržky)
- skvělý zrak, ostře zahnutý silný zobák se zejkem, nozdry v lysém ozobí
- nohy se zahnutými drápy – spáry
- výborní letci – zašpičatělá úzká křídla (rychlý let a lov)
- samice větší, hnízda na stromech, skalách, antrop. substrátech, nidikolní ml.
- u nás 9 druhů (hnízdí 4)



# Č: Sokolovití – Falconidae

Sokol stěhovavý (*Falco peregrinus*)




Ostříž lesní (*Falco subbuteo*)

# Raroh velký (*Falco cherrug*)



# Dřemlík tundrový (*Falco columbarius*)

# Poštolka obecná (*Falco tinnunculus*)



## Poštolka rudonohá (*Falco vespertinus*)



## Poštolka jižní (*Falco naumannni*)