

METODY FAGOCYTÓZY

- vyšetření zahrnuje:

- revní diferenciál - % zastoupení LEU
- zolace LEU
- stanovení funkce LEU

4 skupiny testů na fagocytózu:


test na schopnost fagocytů odpovídat na chemotaktické stimuly /CHTS/


testy na sílu ADHEZE a INGESCE

testy na mikrobicidní aktivitu LEU

testy na metabolickou aktivitu LEU

test na schopnost fagocytů odpovídat na chemotaktické stimuly /CHTS/

- **test migrace pod agarózou - postup:** nalití agaru na misku a vyrezání otvorů
 - plnění otvorů látkami
 - kultivace, usmrcení BB, barvení
 - odstranění agaru, mikroskopování
 - **princip**
 - **CHEMOTAKTICKÝ STIMUL**
 - **vnitřní** – produkty vlastních BB – *komplement, imunokomplex, IL, prostaglandiny*
 - **vнější** – produkty ze stěn mikrobů – *lipopolysacharid, GLP, manan*
 - **CHEMOTAKTICKÝ INDEX :**
 - aktivní pohyb
 - difuze
 - $\text{CHI} = A/B$
- 


CTHS
LEU
⊗
Fyziol. roztok
- 

aktivní pohyb
difuze
 $\text{CHI} = A/B$
⊗
fyziologický
roztok

testy na sílu ADHEZE a INGESCE

A) test s metakrylátovými částicemi

LEU (popř. krev) + ⊖ MSHP /inertní metakrylátové částice/



na povrchové receptory fagocytu se naváží
MSHP

necháme kultivovat, barvíme


-počítá se: *fagocytární index (FI)* a *procenta fagocytózy (%F)*

FI = počet fagocytovaných částic na povrchu, uvnitř/

lomeno počtem fagocytujících BB

%F = počet fagocytujících BB / celkový počet BB x 100

B) test s kadmium-albuminovými částicemi



-počítá se: *fagocytární index (FI)* a *procenta fagocytózy (%F)*



FI = počet fagocytovaných částic na povrchu, uvnitř/lomeno počtem fagocytujících BB

%F = počet fagocytujících BB / celkový počet BB x 100

- Testy na mikrobicidní aktivitu LEU

Test na počet přeživších bakterií

- *kultivace*



-hodnocení:

bakterie se vysejí na plotny
spektrofotometricky, úbytek zákalu

KANDIDATIVNÍ test – test na počet přeživších kvasinek

LEU+Candida \longrightarrow úbytek kvasinek, Trypanová modř - mn. přeživších buněk mikroskop


Testy na metabolickou aktivitu LEU, NBT test



hodnocení: - pod vlivem CHTS při kultivaci dojde k **fagocytóze**, jejíž součástí je oxidativní vzplanutí
- Redukce vlivem oxidačních pochodů v buňce. **NBT nitroblue tetrazolium chlorid** bezbarvý se změní na **modrý formazán** – stanovení **SPEKTROFOTOMETREM**
- **Touto metodou se prokazuje hlavně schopnost fagocytů tvořit kyslíkové radikály aktivací NADPH oxidázy**

- **CHEMILUMINISCENČNÍ test**

- pro kvantitativní hodnocení oxidativního vzplanutí



Vznikají elektronově excitované stavy, které emitují fotony. Emitované fotony zachycovány tzv. luminoforem (luminol, izoluminol nebo lucigenin), spontánní a aktivovaná CL (pomocí zymozanu), luminometr

Metody fagocytózy

- **VYUŽITÍ v praxi :**

- zjištění : nedostatečnosti či poruch jednotlivých fází fagocytózy
- aktivity fagocytů u pacientů s opakovanými infekcemi, opakovanou léčbou antibiotiky, nádorovým onemocněním, artritidou či revmatoidními onemocněními, při zátěžových situacích