

Gerber - Jabir ibn Hayyan
(721 - 815)

Alchymisté – tepelný rozklad zelené skalice, ledek + síra → H_2SO_4

Gerber - příprava z H_2SO_4 a solí: HNO_3 , HCl a *aqua regia*, izolace kyseliny citronové, octové a vinné

Libavius - příprava HCl a *aqua regia* (rozpouští Au)

Chemická látka produkovaná na světě v největším množství za rok:

H_2SO_4 150 Mt / rok

Atmosféra Venuše

Kyseliny a baze



Andreas Libau (Libavius)
(1540 - 1616)

Kyseliny a baze

R. Boyle (1627 - 1691): Změny barvy laku

L. Lavoisier (1743 - 1794) : Oxygenium = kyselinotvorný


Oxidy nekovů reagují s vodou na kyseliny

H. Davy (1779 - 1829)

J. Liebig (1803 - 1873)

Při reakci kyselin s kovy se uvolňuje vodík = H určuje kyselé vlastnosti

Arrheniova teorie kyselin a zásad



Kyseliny:

Chutnají kysele

Uvolňují H^+ ve vodném roztoku

Reagují s kovy (neušlechtilými) za vývoje H_2

K, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb

Barví lakkmus červeně (R. Boyle)

Neutralizují baze

Svante Arrhenius
(1859 - 1927)


Baze:

Chutnají hořce

Uvolňují OH^- ve vodném roztoku

Barví lakkmus modře

Neutralizují kyseliny



Silné a slabé kyseliny podle Arrhenia

Silné kyseliny: **zcela** ionizované ve vodě (disociace 100%)



HCl, HNO₃, H₂SO₄, HClO₄, HI, HBr, HClO₃, HBrO₃,

Slabé kyseliny : **částečně** ionizované ve vodě

(0% < disoc. stupeň <100%)



Organické kyseliny, H₂CO₃, H₃BO₃, H₃PO₄, H₂S, H₂SO₃, ...

Silné baze podle Arrhenia

Silné baze: zcela ionizované ve vodě (disociace 100%) :



Hydroxidy alkalických kovů, kovů alkalických zemin,
další rozpustné hydroxidy

Slabé baze: slabé Arrheniovské baze neexistují

Brønsted - Lowryho kyseliny a zásady

Širší definice, není omezena na vodné prostředí

Kyselina = donor protonu = Arrheniova kyselina

Baze = akceptor protonu

H_3SO_4^+	H_3O^+
H_2SO_4	H_2O
HSO_4^-	HO^-
SO_4^{2-}	O^{2-}

Autoionizace (autoprotoľza) vody




$$K_C = [\text{H}_3\text{O}^+] [\text{OH}^-] / [\text{H}_2\text{O}]^2$$

$$a(\text{H}_2\text{O(l)}) = 1$$

$$K_w = [\text{H}_3\text{O}^+] [\text{OH}^-] \quad \text{iontový součin vody}$$

$$pK_w = 14 \quad (25^\circ\text{C}, 101,325 \text{kPa})$$



$$K_a = [\text{H}_3\text{O}^+] [\text{OH}^-] / [\text{H}_2\text{O}] = K_w \quad \text{konstanta kyselosti}$$

$$pK_a = 14 \quad \text{Voda je slabá kyselina}$$

$$\mathbf{K_a = K_w} \quad 7$$

Proton H⁺

H⁺ hydronium = H₃O⁺ oxonium




doba života H₃O⁺ 1 - 4 ps



Protonace rozpouštědla (S) je exothermní
H⁺ + n S → H(S)_n⁺ ΔH < 0




Manfred Eigen (1927)
NP za chemii 1967



Vysoká mobilita protonu H⁺

Extrémně rychlý pohyb H⁺ ve srovnání s jinými kationty





Grotthusův mechanismus
Proton se neputuje prostředím
Molekuly vody si předávají
sousední protony přes H-můstky

Neutralizace



(Co je poměr k_d / k_n ?)



Brønsted - Lowryho silné a slabé kyseliny



Rovnovážná konstanta disociace protonu
= ionizační (disociační) konstanta kyseliny
= konstanta kyselosti

$$K_C = [\text{H}_3\text{O}^+] [\text{SO}_4^{2-}] / [\text{HSO}_4^-] [\text{H}_2\text{O}]$$

$$a(\text{H}_2\text{O}) \sim 1$$

voda je reagent i rozpouštědlo

$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{SO}_4^{2-}]}{[\text{HSO}_4^-]}$$

$$\text{pK}_a = -\log K_a$$

Síla kyselin



Síla
kyseliny
roste

Kyselina	pK _a
NH ₃	35
ROH	15 – 18
H ₂ O	14.0
CF ₃ CH ₂ OH	12.4
PhOH	10.0
NH ₄ ⁺	9.2
HCN	9.1
CH ₃ COOH	4.75
HF	3.2
H ₃ O ⁺	0
HCl	-7
HClO ₄	-10

$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$



Slabé
kyseliny
pK_a kladné

$$\text{pK}_a = -\log K_a$$

Silné
kyseliny
pK_a záporné

$$K_a = \frac{[H_3O^+][A^-]}{[HA]}$$

Síla kyselin a ΔG




$$K_a = [H_3O^+] [A^-] / [HA]$$

$$pK_a = -\log K_a$$

$$\Delta G = -RT \ln K_a = 2.3 RT pK_a$$

	K_a	pK_a	ΔG
Slabá kyselina	< 1	> 0	> 0
Silná kyselina	> 1	< 0	< 0

Brønsted - Lowryho silné báze




$$pK_a(NH_3) > pK_a(H_2O)$$

Brønsted - Lowryho slabé baze



Rovnovážná konstanta protonace baze vodou
= ionizační (disociační) konstanta baze
= konstanta bazicity



$$K = [\text{NH}_4^+] [\text{OH}^-] / [\text{NH}_3] [\text{H}_2\text{O}]$$


$$K_b = [\text{NH}_4^+] [\text{OH}^-] / [\text{NH}_3] \quad \text{konstanta bazicity}$$

$$\text{p}K_b = -\log K_b$$

Lewisovy kyseliny a baze

Lewisova kyselina – akceptor elektronového páru

Lewisova baze – donor elektronového páru



HSAB = teorie tvrdých a měkkých kyselin a bazí

Tvrdé kyseliny

Ti^{4+} , Cr^{3+} , Fe^{3+} , Co^{3+} , H^+

Tvrdé baze


NH_3 , NH_2R , N_2H_4 , H_2O ,
 OH^- , O^{2-} , ROH , RO^- , OR_2 ,
 CO_3^{2-} , SO_4^{2-} , OCLO_3^- , Cl^- ,
 F^- , NO_3^- , PO_4^{3-} , OCOMe

Měkké kyseliny

Cu^+ , Ag^+ , Hg^+ , Hg^{2+} , Pd^{2+} , Pt^{2+}

Měkké baze

H^- , R^- , C_2H_2 , C_6H_6 ,
 CN^- , CO , SCN^- , PR_3 ,
 $\text{P}(\text{OR})_3$, AsR_3 , SR_2 ,
 SHR , SR^- , I^-



Brønsted – Lowryho nebo Lewisova kyselina ?



Konjugované páry kyselin a bazí

Silná baze

Slabá kyselina

Baze



Konjugovaná kyselina



Kyselina


Konjugovaná baze

Silná kyselina

Slabá baze

Konjugovaný pár kyseliny a baze je svázán výměnou protonu

Konjugované páry kyselin a bazí




Konjugovaný pár kyseliny a baze je svázán výměnou protonu

Acidobazické vlastnosti vody

Autoionizace vody



Voda je velmi slabý elektrolyt



$$K_C = [\text{H}^+][\text{OH}^-] / [\text{H}_2\text{O}]^2$$

Voda je amfoterní – chová se jako kyselina i báze

$$K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-]$$

K_w = iontový součin vody

$$K_w = 1 \times 10^{-14}$$

$$[\text{H}^+] = [\text{OH}^-] = 1 \times 10^{-7} \text{ mol l}^{-1}$$

$$\text{p}K_w = 14 \text{ v čisté vodě při } 25^\circ\text{C a } 101,325 \text{ kPa}$$

Stupnice pH a pOH

$$\text{pH} = -\log [\text{H}^+]$$

1909

S. P. L. Sørensen vaření piva

V čisté vodě

$$[\text{H}^+] = 1 \times 10^{-7} \text{ mol l}^{-1}$$

$$[\text{OH}^-] = 1 \times 10^{-7} \text{ mol l}^{-1}$$

$$\text{pH} = -\log [1 \times 10^{-7}]$$

$$\text{pOH} = -\log [1 \times 10^{-7}]$$

$$\text{pH} = 7$$

$$\text{pOH} = 7$$

$$[\text{H}^+][\text{OH}^-] = K_w$$

**Konstanta pro vodné roztoky
(Iontový součin vody)**

$$\text{pH} + \text{pOH} = \text{pK}_w = 14.00$$

$\text{pH} < 7$	Roztok je kyselý
$\text{pH} = 7$	Roztok je neutrální
$\text{pH} > 7$	Roztok je bazický




pH a pOH stupnice



pH = 0,5

Kawah Ijen Lake, Indonesie

pH a pOH stupnice



K_a a K_b konjugovaného páru



$$K_a = [\text{H}_3\text{O}^+] [\text{NH}_3] / [\text{NH}_4^+] \quad \text{konstanta kyselosti } \text{NH}_4^+$$



$$K_b = [\text{NH}_4^+] [\text{OH}^-] / [\text{NH}_3] \quad \text{konstanta bazicity } \text{NH}_3$$

$$K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-] \quad \text{iontový součin vody}$$

$$K_a \times K_b = [\text{H}_3\text{O}^+] [\text{NH}_3] / [\text{NH}_4^+] \times [\text{NH}_4^+] [\text{OH}^-] / [\text{NH}_3] = K_w$$

$$K_a \times K_b = K_w$$

K_a oxoniového kationtu H₃O⁺(aq)



$$K_C = [\text{H}_3\text{O}^+] [\text{H}_2\text{O}] / [\text{H}_3\text{O}^+] [\text{H}_2\text{O}]$$

$$K_a = [\text{H}_3\text{O}^+] [\text{H}_2\text{O}] / [\text{H}_3\text{O}^+] [\text{H}_2\text{O}] = 1$$

$$\text{p}K_a = 0$$

Oxoniový kation je silná kyselina

$$K_a \times K_b = K_w \quad pK_a + pK_b = 14$$

Kyselina	Konjugovaná báze	pK_a
$HClO_4$	ClO_4^-	-10
HCl	Cl^-	-7
H_3O^+	H_2O	0
HF	F^-	3.2
CH_3COOH	CH_3COO^-	4.75
HCN	CN^-	9.1
NH_4^+	NH_3	9.2
PhOH	PhO^-	10.0
CF_3CH_2OH	$CF_3CH_2O^-$	12.4
H_2O	HO^-	14.0
ROH	RO^-	15 – 18
NH_3	NH_2^-	35

↑ Síla kyseliny roste

↓ Síla konjug. báze roste

Reakční rovnováha

Reakce je posunuta na stranu slabé kyseliny a báze

Silnější kyseliny vytěsňují slabší

Silnější báze vytěsňují slabší



Rovnováha posunuta doleva



Rovnováha posunuta doprava

Nivelizující účinek vody

Kyselina	Konjugovaná báze	pK _a
HClO ₄	ClO ₄ ⁻	-10
HCl	Cl ⁻	-7
H ₃ O ⁺	H ₂ O	0
HF	F ⁻	3.2
CH ₃ COOH	CH ₃ COO ⁻	4.75
HCN	CN ⁻	9.1
NH ₄ ⁺	NH ₃	9.2
PhOH	PhO ⁻	10.0
CF ₃ CH ₂ OH	CF ₃ CH ₂ O ⁻	12.4
H ₂ O	HO ⁻	14.0
ROH	RO ⁻	15 – 18
NH ₃	NH ₂ ⁻	35

Kyseliny silnější než H₃O⁺ jsou ve vodě zcela disociovány

Báze silnější než HO⁻ jsou ve vodě zcela protonovány

pH silných kyselin a bazí



$$[\text{H}^+] = 0.001 \quad \text{pH} = -\log[0.001] = 3$$



$$[\text{OH}^-] = 0.1 \quad \text{pOH} = -\log[0.1] = 1 \quad \text{pH} = 14 - \text{pOH} = 13$$



~~$$[\text{H}^+] = 1 \times 10^{-9} \quad \text{pH} = -\log(1 \times 10^{-9}) = 9$$~~





pH slabých kyselin

$$K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

$$pK_a = -\log(K_a)$$

$[\text{H}^+]$ velmi malá u slabých kyselin
pak $[\text{HA}] = [\text{HA}]_0$

$$[\text{H}^+] = [\text{A}^-]$$

$$[\text{HA}] = [\text{HA}]_0 - [\text{H}^+] \approx [\text{HA}]_0 = c_{\text{HA}}$$

Výchozí koncentrace kyseliny

$$K_a = \frac{[\text{H}^+]^2}{[\text{HA}]_0}$$

$$[\text{H}^+] = \sqrt{K_a [\text{HA}]_0}$$

$$\text{pH} = \frac{1}{2} \text{pK}_a - \frac{1}{2} \log c_{\text{HA}}$$



$$K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

$$pK_a = -\log(K_a)$$

Roztok 0.10 mol l^{-1} kyseliny mravenčí, $K_a = 1.74 \cdot 10^{-4}$. Jaké je pH ?
(relativně koncentrovaný)



	HCOOH	H^+	HCOO^-
Počáteční	0.10	0	0
Změna	$-x$	x	x
Rovnováha	$0.10 - x$	x	x
	0.10	$4.12 \cdot 10^{-3}$	$4.12 \cdot 10^{-3}$

$$K_a = \frac{x \cdot x}{0.1 - x} = 1.7 \cdot 10^{-4}$$

$$x^2 = 1.7 \cdot 10^{-5}$$

$$x = 4.12 \cdot 10^{-3}$$

$$[0.1 - x] \approx 0.1$$

x velmi malé
pak $[\text{HA}] = [\text{HA}]_0$

$$\text{pH} = -\log(4.12 \cdot 10^{-3}) = 2.39$$

$$\text{pH} = \frac{1}{2} \text{p}K_a - \frac{1}{2} \log c_{\text{HA}}$$

Roztok 0.01 mol l⁻¹ kyseliny mravenčí (zředěný)

	HCOOH	H ⁺	HCOO ⁻
Počáteční	0.010	0	0
Změna	- x	x	x
Rovnováha	0.010 - x	x	x
	0.010	1.22 10 ⁻³	1.22 10 ⁻³

$$K_a = \frac{[x][x]}{[0.01-x]} = 1.7 \times 10^{-4}$$

$$x^2 + 1.7 \times 10^{-4} x - 1.76 \times 10^{-6}$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-1.7 \times 10^{-4} \pm \sqrt{1.7 \times 10^{-4} - 4(-1.76 \times 10^{-6})}}{2}$$

$$x = 1.22 \times 10^{-3}$$

Když x není velmi malé vůči c_{HA}
pak řešíme kvadratickou rovnici

$$\text{pH} = -\log(1.22 \times 10^{-3}) = 2.9$$

Faktory určující sílu kyseliny



Disociační energie vazby, D(HA)



Ionizační energie H, IE(H)




Elektronová afinita A, EA(A)




Protonová afinita A⁻ AP(A)



Hydratační (solvatační) enthalpie



Faktory určující sílu kyseliny



Slabá kyselina

Nejvíce záporného náboje na O
= nejvíce přitahuje H^+



Silná kyselina

= nejméně přitahuje H^+

Kyselost roste v periodě doprava

Hydrydy = sloučeniny prvků s vodíkem

S rostoucí elektronegativitou prvku roste kyselost, lepší stabilizace záporného náboje

Hydrid	H-CH ₃	H-NH ₂	H-OH	H-F
pK _a	55	35	15.7	3.2



Kyselost roste

NaH = bazický hydrid:



HCl = kyselý hydrid:



Kyselost roste ve skupině dolů

HX	pK _a	HX	pK _a
HF	3.2	ROH	15-16
HCl	-7	RSH	10
HBr	-9	RSeH	-
HI	-9.5	RTeH	7

Síla vazby
roste ↑

↓ Kyselost
roste

Kyslíkaté kyseliny

Kyslíkaté nebo oxokyseliny = OH skupiny vázány k elektronegativnímu centrálnímu atomu




Kyslost roste

n	pK _a	Síla
0	7	Velmi slabé
1	2	Slabé
2	-3	Silné
3	-8	Velmi silné



Kyslíkaté kyseliny



- Stabilizace aniontů mezomerním efektem (rezonanční struktury)
- Rostoucí náboj na Y
 - oxidační číslo* centrálního atomu
- Snížení nábojové hustoty na O
 - elektronegativita* centrálního atomu
- Odsávání e. hustoty dalšími O atomy (-I)

usnadňují disociaci H^+ = zvyšují sílu kyseliny

Oxidační číslo centrálního atomu

Kyselina	Vzorec	Ox.č.	pK _a
Chloristá	O ₃ Cl-O-H	7	-10
Chlorečná	O ₂ Cl-O-H	5	-3
Chloritá	O Cl-O-H	3	2.00
Chlorná	Cl-O-H	1	7.53

Elektronegativita centrálního atomu

Kyselina	Vzorec E-O-H	Elnegativita E	pK _a
Chlorná	Cl-O-H	3.2	7.53
Bromná	Br-O-H	3.0	8.69
Jodná	I-O-H	2.7	10.64

Kyslíkaté kyseliny

NaOH Mg(OH)_2 Al(OH)_3 Si(OH)_4 OP(OH)_3 $\text{O}_2\text{S(OH)}_2$ O_3ClOH




Roste síla kyseliny



M-O iontová
= slabé kyseliny (= hydroxidy)

M-O kovalentní = silné kyseliny

pK_a vody vázané v komplexech



Kyselost protonu roste

Table 24.1 The pK_a of Metal-Bound Water

M^{2+}	pK_a	M^{2+}	pK_a
Ca^{2+}	12.7	Co^{2+}	8.9
Mg^{2+}	11.8	Zn^{2+}	8.7
Cd^{2+}	11.6	Fe^{2+}	7.2
Mn^{2+}	10.6	Cu^{2+}	6.8
Ni^{2+}	9.4	Be^{2+}	5.7



Při zmenšujícím se iontovém poloměru

Kyselost vody hydratovaných kationů

Kation	Iontový poloměr, Å	pK _a
Be ²⁺	0,27	5,6
Mg ²⁺	0,74	11,4
Ca ²⁺	1,00	12,7
Sr ²⁺	1,18	13,2
Ba ²⁺	1,36	13,4

Kyselost vody hydratovaných kationů


Kation	Iontový poloměr, Å	pK _a
Na ⁺	1,02	14,1
Ca ²⁺	1,00	12,7
La ³⁺	1,03	8,5
Th ⁴⁺	0,94	3,2

Kyselosť vody hydratovaných kationov

Kation	M–O, Å	pK _a
[Al(H ₂ O) ₆] ³⁺	1.89	4.9
[Ga(H ₂ O) ₆] ³⁺	1.90	2.6
[In(H ₂ O) ₆] ³⁺	2.16	3.9
[Tl(H ₂ O) ₆] ³⁺	2.23	0.6

Reakce roztoků solí

Soli silné kyseliny – silné báze



Silná kyselina – slabá báze - hydrolýza




Kyselá reakce roztoku

$$\text{pH} = 7 - \frac{1}{2} \text{pK}_b - \frac{1}{2} \log c$$

Reakce roztoků solí

Silná báze – slabá kyselina - hydrolyza



Zásaditá reakce roztoku

$$\text{pH} = 7 + \frac{1}{2} \text{pK}_a + \frac{1}{2} \log c$$

Slabá báze – slabá kyselina - hydrolyza



$$\text{pH} = 7 + \frac{1}{2} (\text{pK}_a - \text{pK}_b)$$

Pufry = tlumivé roztoky

Modelový pufr: 1.0 mol l⁻¹ kyseliny octové (HAc) a 1.0 mol l⁻¹ octanu sodného (NaAc) v roztoku. Přídavek NaAc sníží kyselost roztoku HAc.



Funkce pufru = udržet konstantní pH

1. Přídavkem H⁺ se vytvoří nové molekuly HAc
2. Přídavkem OH⁻ se vytvoří nové molekuly Ac⁻
3. pH je konstantní

Pufry

Henderson-Hasselbalchova rovnice

Slabá kyselina a její sůl

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log ([\text{A}^-] / [\text{HA}])$$

Slabá baze a její sůl

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log ([\text{B}] / [\text{BH}^+])$$

$$= 14 - \text{p}K_b + \log ([\text{B}] / [\text{BH}^+])$$


Table 16.4 Typical buffer systems

Composition	pK _a
Acid buffers	
CH ₃ COOH/CH ₃ CO ₂ ⁻	4.74
HNO ₂ /NO ₂ ⁻	3.37
HClO ₂ /ClO ₂ ⁻	2.00
Base buffers	
NH ₄ ⁺ /NH ₃	9.25
(CH ₃) ₃ NH ⁺ /(CH ₃) ₃ N	9.81
H ₂ PO ₄ ⁻ /HPO ₄ ²⁻	7.21

Výpočty acidobazických rovnováh

1. Iontový součin $K_w = [H^+][OH^-]$
2. Disociační konstanta $K_a = [H_3O^+] [A^-] / [HA]$
3. Podmínka elektroneutrality $[H_3O^+] = [A^-] + [OH^-]$
4. Látková bilance $[HA]_0 = [A^-] + [HA]$

Titrace – řízená acidobazická reakce



Titrace silné kyseliny (HCl)
silnou bazí (KOH)

Bod ekvivalence
= stechiometrie reakce dosažena

Titrace slabé kyseliny silnou bazí

$$\text{pH} = 7 + \frac{1}{2} \text{pK}_a + \frac{1}{2} \log c$$


pH = vzniklé soli

$$\text{pH} = \text{pK}_a + \log ([\text{A}^-] / [\text{HA}])$$

$$\text{pH} = \text{pK}_a$$

pH of solution of weak acid

$$\text{pH} = \frac{1}{2} \text{pK}_a - \frac{1}{2} \log [\text{HA}]$$



Objem přidaného činidla, cm³

Titrace slabé kyseliny silnou bazí



Na počátku titrace : $\text{pH} = \frac{1}{2} \text{pK}_a - \frac{1}{2} \log [\text{HA}]$

V polovině titrace

v bodě $[\text{A}^-] = [\text{HA}]$, tj. 50% zneutralizováno (slabá kys. + sůl):

$$\text{pH} = \text{pK}_a + \log ([\text{A}^-] / [\text{HA}])$$

$$\text{pH} = \text{pK}_a$$


V bodě ekvivalence, kde $[\text{A}^-] = 100 [\text{HA}]$

NIKDÝ $[\text{HA}] = 0$


$$\text{pH} = \text{pK}_a + \log (100 / 1) = \text{pK}_a + 2$$

Indikátory

Látky, jejichž kyselina a konjugovaná báze mají rozdílnou barvu




Fenolftalein



pH = 7.0 8.5 9.4 9.8 12.0

Fenolftalein



Bezbarvý

Červený




Table 16.3 Indicator color changes

Indicator	Color of acid form	pH range of color change	$\text{p}K_{\text{in}}$	Color of base form
thymol blue	red	1.2 to 2.8	1.7	yellow
	yellow	8.0 to 9.6		blue
methyl orange	red	3.2 to 4.4	3.4	yellow
bromophenol blue	yellow	3.0 to 4.6	3.9	blue
bromocresol green	yellow	3.8 to 5.4	4.7	blue
methyl red	red	4.8 to 6.0	5.0	yellow
bromothymol blue	yellow	6.0 to 7.6	7.1	blue
litmus	red	5.0 to 8.0	6.5	blue
phenol red	yellow	6.6 to 8.0	7.9	red
thymol blue	yellow	8.0 to 9.6	8.9	blue
phenolphthalein	colorless	8.2 to 10.0	9.4	pink
alizarin yellow R	yellow	10.1 to 12.0	11.2	red
alizarin	red	11.0 to 12.4	11.7	purple

Indikátory




$$K_{\text{IN}} = [\text{H}_3\text{O}^+] [\text{In}^-] / [\text{HIn}]$$

Poznáme barevnou změnu, je-li jedné formy alespoň 10%


$$[\text{H}_3\text{O}^+] = K_{\text{IN}} ([\text{HIn}] / [\text{In}^-]) \quad \text{od 10:1 do 1:10}$$

$$\text{pH} = \text{p}K_{\text{IN}} \pm 1$$

Titrace silné baze silnou kyselinou




Titrace slabé baze silnou kyselinou




$$\begin{aligned}[B] &= [BH^+] \quad pH = pK_a + \log ([B] / [BH^+]) \\ &= 14 - pK_b + \log ([B] / [BH^+]) = 14 - pK_b\end{aligned}$$

$$\text{Ekvivalence pH} = 14 - pK_b + \log ([1] / [100]) = 14 - pK_b - 2$$



Solvoteorie kyselin a bází

Autoionizace



Autoionizační konstanta (jako K_w v vodě)

$$K = [\text{NH}_4^+] [\text{NH}_3^-] = 2 \cdot 10^{-33} \text{ (při } -50^\circ\text{C})$$



$$K = [H_3SO_4^+] [HSO_4^-] = 1 \cdot 10^{-5} \text{ (při } 25^\circ C)$$

Solvoteorie kyselin a bazí

Kyselina = zvyšuje konc. **lyoniového** iontu, kationtu

Báze = zvyšuje konc. **lyátového** iontu, aniontu



Titrace v kapalném NH₃



V kapalném NH₃ je HAc silnější kyselina než ve vodě

Aprotické solvokyseliny a baze

Výměna částice rozpouštědla



Výměna O²⁻ solvokyselina SOCl₂ - báze MgSO₃




Výměna F⁻ solvokyselina SbF₅

Superkyseliny



Magická kyselina

Protonace methanu



Hammetova funkce



$$H_0 = pK_{BH} - \log [BH] / [B]$$

$$K_{BH} = [B] [H^+] / [BH]$$

$$H_0 = pH$$

HF	-11
H ₂ SO ₄	-12.1
HSO ₃ F	-15
HF + SbF ₅	-21.1
HSO ₃ F + SbF ₅	-26.5

Superkyseliny

Nejsilnější známá kyselina $\text{H}(\text{CHB}_{11}\text{Cl}_{11})$

Velmi malá afinita k protonu

Záporný náboj delokalizován na velkém aniontu

Halogeny odsávají e-hustotu

