

KOMPLEXNÍ ČÍSLA

(Seminář z matematiky I - M1130/02 2016)

(1) Zapište v algebraickém tvaru čísla:

(a) $\frac{2-i}{-3+i} - \frac{1+2i}{1-3i}$ $\left[-\frac{1}{5} - \frac{2}{5}i \right]$
 (b) $2 + \frac{1}{3i} - \frac{3}{i^3}$ $\left[2 - \frac{10}{3}i \right]$
 (c) $\left(\frac{1-i}{1+i} \right)^{-2} + \left(\frac{1-i}{1+i} \right)^2$ [-2]

(2) Vypočtěte:

(a) $\left| 1-i + \frac{1+2i}{3-i} \right|$ $\left[\frac{\sqrt{130}}{10} \right]$
 (b) $\left| \frac{i}{\sqrt{3}+i\sqrt{2}} \right|$ $\left[\frac{\sqrt{5}}{5} \right]$
 (c) $\left| |2+3i|^2 + (2+3i)^2 \right|$ [$4\sqrt{13}$]
 (d) $\left| \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} + \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}i \right|$ [1]
 (e) $\left| \sqrt{2+\sqrt{3}} + i\sqrt{2+\sqrt{3}} \right|$ [$1+\sqrt{3}$]
 (f) $\left| \frac{3-4i}{5i} \right| + \left| \frac{2+i}{1-2i} \right|$ $\left[\frac{2}{5} - \frac{4}{5}i \right]$

(3) Řešte rovnice v oboru \mathbb{C} :

(a) $|z| - z = 1 + 2i$ $\left[\frac{3}{2} - 2i \right]$
 (b) $z^2 + |z| = 0$ [0; i; -i]
 (c) $\left(2 - \frac{1}{i} \right) \bar{z} + 2z = 10i$ [$10 - 40i$]
 (d) $\bar{z}(z-1) = |z-1|^2$ [1]

(4) Určete všechna ryze imaginární čísla z , pro něž platí:

(a) $|z-1+i| = z$ [neexistují]

(b) $|z+1| = |z-2i|$ $\left[\frac{3}{4}i \right]$

(5) Rozhodněte, která z následujících čísel jsou komplexní jednotky:

$$\frac{\sqrt{3}-i}{2}, \frac{1+i}{2}, \frac{(2+i)^2}{3-4i}, -i^{30}, \frac{1-i}{\sqrt{2}}, \cos \frac{\pi}{10} + i \sin \frac{\pi}{10}$$
[A, N, A, A, A, A]

(6) V Gaussově rovinně znázorněte všechna komplexní čísla z , pro něž platí:

(a) $|z+i| \geq |z+1|$

(b) $\left| z - \frac{1}{1+i} \right| < |z|$

(c) $\left| z + \frac{i}{1+i} \right| > |z-1|$

(d) $\left| z - \frac{1-2i}{i} \right| \leq \left| z + \frac{1-2i}{i} \right|$

(7) V goniometrickém tvaru vyjádřete čísla:

(a) $\frac{2}{-1+i}$

$\left[\sqrt{2} \left(\cos \frac{5\pi}{4} + i \sin \frac{5\pi}{4} \right) \right]$

(b) $\frac{-3+i}{2+i}$

$\left[\sqrt{2} \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right) \right]$

(c) $|3+2i|$

$[\sqrt{13}(\cos 0 + i \sin 0)]$

(d) i^{80}

$[\cos 0 + i \sin 0]$

(e) $1 + \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}$

$\left[\sqrt{2+\sqrt{2}} \left(\cos \frac{\pi}{8} + i \sin \frac{\pi}{8} \right) \right]$

(f) $1 + \cos \varphi + i \sin \varphi$

$\left[2 \cos \frac{\varphi}{2} \left(\cos \frac{\varphi}{2} + i \sin \frac{\varphi}{2} \right) \right]$

(g) $\sin \varphi + i \cos \varphi$

$\left[\cos \left(\frac{\pi}{2} - \varphi \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{2} - \varphi \right) \right]$

(h) $\frac{\cos \alpha + i \sin \alpha}{\cos \beta + i \sin \beta}$

$[\cos(\alpha - \beta) + i \sin(\alpha - \beta)]$

(8) Vypočtěte:

(a) $(-1+i)^{66} - i(1+i)^{80}$ $[-129 \cdot 2^{33} \cdot i]$

(b) $\left(1 + \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)^{12}$ $[3^6]$

(c) $(\sqrt{3} - i)^{-8}$ $\left[2^{-8} \left(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) \right]$

(d) $\left(\frac{1+i}{1-i} \right)^{-25}$ $[-i]$

(e) $(\operatorname{tg} 1 - i)^4$ $\left[\frac{\cos 4 + i \sin 4}{\cos^4 1} \right]$

(9) Určete argument φ tak, aby platila rovnost:

(a) $\left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right) (\cos \varphi + i \sin \varphi) = i$ $\left[-\frac{\pi}{6} \right]$

(b) $\left(\cos \frac{7\pi}{4} + i \sin \frac{7\pi}{4} \right) (\cos \varphi + i \sin \varphi) = -1$ $\left[-\frac{3\pi}{4} \right]$

(c) $\frac{\cos \frac{7\pi}{6} + i \sin \frac{7\pi}{6}}{\cos \varphi + i \sin \varphi} = 1$ $\left[\frac{7\pi}{6} \right]$

(d) $\frac{\cos \frac{\pi}{8} + i \sin \frac{\pi}{8}}{\cos \varphi + i \sin \varphi} = -i$ $\left[-\frac{11\pi}{8} \right]$

(10) V oboru komplexních čísel řešte rovnice:

(a) $(x^2 + x + 1)(x^2 + x - 1) = 0$ $\left[\frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}; \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2} \right]$

(b) $\frac{x+2}{x-3} + \frac{x-1}{x+1} = 0$ $\left[\frac{1 \pm i\sqrt{39}}{4} \right]$

(c) $2x^2 + x + 1 = 0$ $\left[\frac{-1 \pm i\sqrt{7}}{4} \right]$

(11) Určete, pro které hodnoty $p \in \mathbb{R}$ mají rovnice dva reálné kořeny, resp. jeden dvojnásobný reálný kořen, resp. imaginární kořeny:

(a) $px^2 + 2(p-1)x + p - 5 = 0$ $\left[\left(-\frac{1}{3}, \infty \right) \wedge p \neq 0; -\frac{1}{3}; \left(-\infty, -\frac{1}{3} \right) \right]$

(b) $(p+3)x^2 + 3(p-6)x + 5 - 18p = 0$ [pro $p \neq -3$ má rovnice 2 reálné kořeny]

(c) $px^2 + (2p-1)x + p = 0$ $\left[\left(-\infty, \frac{1}{4} \right) \wedge p \neq 0; \frac{1}{4}; \left(\frac{1}{4}, \infty \right) \right]$

(12) Rozložte na součin lineárních dvojčlenů:

(a) $x^2 + x + 1$ $\left[\left(x + \frac{1}{2}(1 - i\sqrt{3}) \right) \left(x + \frac{1}{2}(1 + i\sqrt{3}) \right) \right]$

$$\begin{aligned}
 \text{(b)} \quad & 3x^2 + 2x + 2 & \left[3 \left(x + \frac{1}{3} (1 - i\sqrt{5}) \right) \left(x + \frac{1}{3} (1 + i\sqrt{5}) \right) \right] \\
 \text{(c)} \quad & x^2 - 3x + 5 & \left[\left(x - \frac{1}{2} (3 + i\sqrt{11}) \right) \left(x - \frac{1}{2} (3 - i\sqrt{11}) \right) \right]
 \end{aligned}$$

(13) Řešte v \mathbb{C} binomické rovnice:

$$\begin{aligned}
 \text{(a)} \quad & x^3 - i = 0 & \left[\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i; -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i; -i \right] \\
 \text{(b)} \quad & x^6 + 64 = 0 & [\pm\sqrt{3} \pm i; \pm 2i] \\
 \text{(c)} \quad & x^8 + 1 = 0 & \left[\cos \frac{\pi + 2k\pi}{8} + i \sin \frac{\pi + 2k\pi}{8}, k = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 \right] \\
 \text{(d)} \quad & x^5 - 1 - i\sqrt{3} = 0 & \left[\sqrt[5]{2} \left(\cos \frac{\frac{\pi}{3} + 2k\pi}{5} + i \sin \frac{\frac{\pi}{3} + 2k\pi}{5} \right), k = 0, 1, 2, 3, 4 \right] \\
 \text{(e)} \quad & x^3 - 1 + i = 0 & \left[\sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{\frac{7\pi}{4} + 2k\pi}{3} + i \sin \frac{\frac{7\pi}{4} + 2k\pi}{3} \right), k = 0, 1, 2 \right]
 \end{aligned}$$

(14) V množině \mathbb{C} řešte rovnice:

$$\begin{aligned}
 \text{(a)} \quad & x^2 - 2x + 9 + 6i = 0 & [3i; 2 - 3i] \\
 \text{(b)} \quad & x^2 + (2 - 3i)x - 5(1 + i) = 0 & [1 + 2i; -3 + i] \\
 \text{(c)} \quad & x^2 - 4 = 3i & \left[\frac{3\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}; -\frac{3\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2} \right] \\
 \text{(d)} \quad & x^2 = \left(\frac{4}{-1 + i\sqrt{3}} \right)^{12} & [\pm 64] \\
 \text{(e)} \quad & x^2 - \frac{(1+i)^{100}}{(1-i)^{96} - i(1+i)^{98}} = 0 & \left[\pm i\frac{2\sqrt{3}}{3} \right]
 \end{aligned}$$