


Buněčný metabolismus a jeho adaptace

Jan Vondráček

Buněčný metabolismus




Adaptace buněčného metabolismu

- ▶ buňky v těle se **rychle metabolicky adaptují na okolní prostředí** – např. změny hladiny kyslíku, hypoxie, zdroje živin a **zároveň na potřeby organismu – specifické signální dráhy**;
- ▶ **buněčná proliferace a diferenciace** významným způsobem určuje typ buněčného metabolismu;
- ▶ patologické stavy – např. **nádorová transformace** - buněk vedou k **unikátním adaptacím buněčného metabolismu**;
- ▶ **kmenové buňky** jsou adaptovány na prostředí niky (niche) kmenových buněk a zároveň metabolické faktory mohou ovlivňovat jejich kmenovost (stemness) a diferenciaci;

Hepatocyt jako příklad diferencované buňky s velmi intenzívním metabolismem

- řada biochemických principů – vznikla na základě studia metabolismu hepatocytů – vynikající model;
- játra slouží jako **zprostředkovatel přenosu látek a energie mezi dietárními zdroji a ostatními orgány v těle;**
- v poměru ke své velikosti spotřebovávají největší množství O_2 – 20 – 30% přijatého O_2 je spotřebováno v játrech – velmi **intenzívní energetický metabolismus;**
- **hepatocyt – příklad diferencované buňky v dospělém organismu, která většinu energie získává díky aktivitě mitochondrií – oxidativní fosforylace;**
- buňka musí zajistit dostatek energie a udržovat redoxní rovnováhu;

Hepatocyt jako příklad diferencované buňky s velmi intenzívním metabolismem



Hepatocyt jako příklad diferencované buňky s velmi intenzívním metabolismem

- to je spojeno s významnou úlohou jaterních buněk v:
- metabolismu cukrů (**tvorba a odbourávání glykogenu, glukoneogeneze**);
- metabolismu tuků (**β -oxidace mastných kyselin, tvorba lipoproteinů, přeměna živin na mastné kyseliny a triglyceridy, syntéza cholesterolu a fosfolipidů**);
- kritická úloha v **deaminaci a transaminaci aminokyselin, syntéza neesenciálních aminokyselin** a proteinů krevní plazmy, **tvorba močoviny** – metabolismus dusíkatých sloučenin;
- **tvorba a sekrece žluči, odbourávání zplodin metabolismu, eliminace hemu a bilirubinu, odbourávání řady endogenních látek a xenobiotik**;
- **to vše jsou procesy vyžadující energii ve formě ATP, tvorbu NADPH, apod.;**

Základní zdroje energie

➤ oxidace MK




Figure 2-56c Molecular Biology of the Cell 6e (© Garland Science 2015)

➤ glykolýza





Figure 2-46 Molecular Biology of the Cell 6e (© Garland Science 2015)

➤ za normálních podmínek tvoří hepatocyty většinu ATP prostřednictvím oxidace MK – mnohem méně pochází z oxidace pyruvátu (vznikajícího buď glykolýzou nebo z laktátu ze svalových a krevních buněk)

Využití energie


- ▶ **téměř 50% dostupné energie je využito na aktivní transport** – ionty, substráty a produkty, udržování osmotické rovnováhy, apod.;
- ▶ **část je využita k tvorbě zásob** – tvorba glykogenu, syntéza glukózy (glukoneogeneze), syntéza triglyceridů, apod.;
- ▶ **syntéza specifických produktů** – lipoproteiny, proteiny krevní plazmy, atd.;
- ▶ aktivita metabolických drah v játrech je řízena v rámci celého organismu – **hormonální regulace** (inzulin, glukagon), **nervová regulace**, ale i jako reakce na příjem potravy – dostatek živin v portálním oběhu;

Propojení anabolických a katabolických drah metabolismu v hepatocytu



➤ glykolýza vs. glukoneogeneze

Compr Physiol.
2014, 4: 177–197.




➤ lipogeneze

Adaptace metabolismu na základě vnějšího podnětu – potřeby organismu

- ▶ **typ metabolické dráhy, která je v daném hepatocytu převážně aktivní, závisí na vnějších** (hormony, cytokiny a další regulační molekuly, hladina glukózy, apod.) **i vnitřních faktorech** (transkripční faktory kontrolující diferenciaci hepatocytů a jaterní zonaci);
- ▶ rychlá adaptace metabolismu v závislosti na potřebách organismu;
- ▶ nicméně stále platí klasické schéma – hepatocyty v podmínkách dostatku kyslíku představují **normální diferencované buňky, které využívají k tvorbě ATP oxidativní fosforylaci**;


Metabolismus diferencovaných buněk v klidovém stavu a metabolismus buněk proliferujících nebo nediferencovaných – významné odlišnosti

- ▶ při dostatečné hladině kyslíku diferencované buňky primárně využívají ke tvorbě ATP oxidativní fosforylaci; příjem živin je spíše limitovaný – bazální metabolismus;
- ▶ pouze v hypoxických podmínkách využívají diferencované buňky anaerobní glykolýzu, spojenou s tvorbou laktátu;



Adaptace metabolismu u proliferujících buněk

- ▶ **proliferující buňky vyžadují nejen energii, ale i velké množství substrátů pro anabolické reakce;**
- ▶ **intenzivní aerobní glykolýza - podpora syntézy buněčných makromolekul, kofaktorů apod. – komplexní přestavba buněčného metabolismu;**





Adaptace (přestavba) metabolismu u proliferujících buněk

- ▶ v mnohobuněčném organismu mají **buňky obvykle ve svém okolí dostupné dostatečné množství živin, které umožňují nepřetržitý růst a proliferaci; růst a proliferace buněk ale musí být kontrolovány** pro zajištění udržení **homeostázy tkání a orgánů**;
- ▶ **proto není metabolismus řízen autonomně v rámci jedné buňky** – buňky tkání jsou kontrolovány signály z okolního prostředí – **teprve na základě signálu stimulujícího proliferaci dojde** nejen ke spuštění mechanismů zodpovědných za přechod buňky do dalších fází buněčného cyklu, ale zároveň i **ke spuštění specifických signálních drah a dalších mechanismů kontrolujících zvýšený příjem živin a přestavbu metabolismu proliferující buňky**;
- ▶ pro zajištění správné **koordinace** správného **příjmu živin** (zda je jich dostatek) a zároveň **schopnosti buněk je zpracovávat** je nezbytná **zpětná vazba** – některé **metabolity** proto, např. prostřednictvím **kontroly posttranslačních modifikací** (glykosylace, acetylace) **signálních proteinů** nebo **aktivit klíčových (rate-limiting) enzymů** mohou kontrolovat **aktivitu signálních drah** řídících proliferaci nebo intenzitu **jednotlivých metabolických drah**;


Adaptace (přestavba) metabolismu u proliferujících buněk

- signalizace růstových faktorů indukuje jak proliferaci, tak změny metabolismu;




- zvýšený příjem živin (glukóza, glutamin) – syntéza lipidů, proteinů a nukleotidů; přebytečný uhlík – vyloučen jako laktát, zvýšená spotřeba ATP udržuje glykolýzu (glycolytic flux);

Klíčové signální dráhy – PI3K/Akt – metabolismus glukózy a tvorba buň. makromolekul





- ▶ stimulace exprese a translokace **transportéru glukózy (GLUT1)**;
- ▶ **zvyšuje aktivitu enzymů – hexokináza, fosfofruktokináza 1 (PFK1)**;
- ▶ **aktivace ATP citrát lyázy (ACL) – klíčový enzym tvorby cytosolového acetylkoenzymu A – syntéza MK**;
- ▶ **aktivace transkripčních faktorů SREBP – exprese genů podílejících se na syntéze MK a cholesterolu**;

Klíčové signální dráhy – mTOR komplex 1 a Myc – metabolismus aminokyselin (a nukleotidů)



- **růstové faktory** (prostřednictvím MAPkináz) **aktivují transkripční faktor Myc** – transport glutaminu, tvorbu glutamátu – využíván v Krebsově cyklu (nahradí odebírané komponenty – anapleróza) a **pro syntézu nukleotidů/AA**;
- dochází k **aktivaci komplexů mTOR** – výsledkem je **zvýšená exprese ribozomálních proteinů**, aktivace S6 kinázy (podpora translace) a inaktivace 4E-BP (blokuje translaci) – **podpora proteosyntézy**;


mTOR komplex 1 a jeho role



Cell 2017, 168: 960 - 976


- **mTOR** (mammalian target of rapamycin) – **kináza, součást multiproteinového komplexu;**
- Raptor, mLST8;
- vedle podpory proteosyntézy **podporuje také syntézu lipidů, nukleotidů a glykolýzu;**
- mTORC1 je **aktivován růstovými faktory, hormony (inzulin), aminokyselinami; inhibován nedostatkem energie** (glukózová deprivace) – prostřednictvím AMPK, **nedostatkem kyslíku nebo po poškození DNA;**

Metabolity a meziprodukty enzymových reakcí – zpětná vazba




- ▶ alosterická kontrola enzymatické aktivity;
- ▶ **intracelulární metabolity často kontrolují post-translační modifikace** (aktivitu) klíčových proteinů – **signální proteiny i metabolické enzymy**
- ▶ **glukóza je substrátem** pro tvorbu UDP-N-acetylglukosaminu (UDP-GlcNac) – nezbytná pro **glykosylaci receptorů** (folding, transport) růstových faktorů; tvorba acetylkoenzymu A (aktivita ACL) je klíčová pro acylaci histonů – tvorba klíčových enzymů a kofaktorů;
- ▶ hladina **esenciálních aminokyselin** kontroluje aktivitu mTOR komplexu 1;

Produkty, meziprodukty a enzymy – kontrola metabolické signalizace



AMP-aktivovaná protein kináza – významný senzor kontrolující energetický metabolismus




- ▶ rovnováha tvorby a spotřeby ATP – **AMPK – senzor adeninových nukleotidů**;
- ▶ pokles ATP – aktivace AMPK – stimulace katabolismu;
- ▶ 1 katalytická a 2 regulační podjednotky;
- ▶ **nízká hladina ATP, stres – vazba AMP/ADP - aktivační fosforylace + fosforylace některými specifickými kinázami**;
- ▶ **kontroluje metabolismus** jak prostřednictvím **kontroly transkripce**, tak **přímou kontrolou metabolických enzymů - fosforylace**;

Metabolismus nádorových buněk – příklad patologické adaptace metabolismu – model proliferující buňky

- ▶ specifickým příkladem rychle proliferujících buněk jsou buňky nádorové;
- ▶ pozorujeme u nich řadu **mutací a epigenetických změn** (či změn transkripční regulace) spojených nejen s narušením **signálních drah zapojených do kontroly metabolismu**, ale i **řady enzymů** kontrolujících základní anabolické metabolické dráhy – syntéza MK, AA a nukleotidů či aktivita enzymů podílejících se na metabolismu glukózy;
- ▶ tyto poznatky nám umožňují nejen hledání **potenciálního využití v terapii** nádorů, ale zároveň i **identifikaci signálních drah podílejících se na kontrole metabolismu za fyziologických podmínek** v normálních proliferujících buňkách;


Metabolismus nádorových buněk – příklad patologické adaptace metabolismu – model proliferující buňky



Cell Metabol. 2016, 23: 27 - 47.

- ▶ deregulovaný příjem glukózy a aminokyselin (hlavně Gln);
- ▶ specifické adaptace na oportunistický příjem živin;
- ▶ využití meziproductů glykolýzy a Krebsova cyklu pro syntetické reakce a tvorbu NADPH;
- ▶ zvýšené požadavky na příjem dusíku;
- ▶ změny vlivu metabolitů na regulaci genové exprese;
- ▶ tvorba/příjem metabolitů, ovlivňujících jak vlastní nádorové buňky, tak buňky tvořící nádorové mikroprostředí;

1) Zvýšený příjem glukózy a glutaminu (aminokyselin)




Cell Metabol. 2016, 23: 27 - 47.

- rychlá proliferace – zvýšené nároky na příjem živin – především glukóza a Gln;
- energetický metabolismus (ATP, NADH, FADH₂, NADPH) + poskytují intermediáty pro syntézu aminokyselin, nukleotidů a lipidů;

- **Gln – zdroj uhlíku i dusíku –** syntéza nukleotidů, G-6-P, neesenciální AA; ale také import esenciálních AA pomocí LAT1 (vyžaduje současný export glutaminu); **kultivované nádorové buňky vyžadují nadbytek Gln;**
- deregulace aktivity signálních drah růstových faktorů a kontaktu s ECM – mutace, epig. změny:
- **zvýšený příjem glukózy** souvisí s mutacemi komponent a **aberrantní aktivitou PI3K/Akt dráhy;**
- zvýšená exprese a translokace **GLUT1**, aktivace hexokinázy, fosfofruktokinázy;
- **zvýšený příjem Gln** - další onkogeny – **Ras, Myc;**


2) Alternativní (oportunistické) zdroje živin



Cell Metabol. 2016, 23: 27 - 47.

- **nedostatek** glukózy, Gln a dalších AA – alternativní zdroje – především proteiny;
- některé mutace (Ras, c-Src) – **lysozomální degradace extracelulárních proteinů** (plazma, intersticiální tekutina) – **makropinocytóza**;
- fagocytóza apoptických tělísek;
- nádorové buňky mohou také importovat lysofosfolipidy (s jedním řetězcem MK) či přijímat lipidy uvolňované okolními buňkami;

3) Využití meziproduktů glykolýzy (Krebsova cyklu) pro syntetické reakce a tvorbu NADPH



NADPH, nukleotidy
 syntéza N-acetylgukosaminu (GlcNac), kus. hyaluronová;


biosyntéza fosfolipidů

biosyntéza AA, serin jako substrát pro folátový cyklus – tvoří substráty pro syntézu purinů, tymidinu a S-adenosylmethionin – donor methylové skupiny; syntéza NADPH;

potenciální nadbytek pyruvátu je eliminován jako laktát (udržení nízkého poměru NADH/NAD⁺);


nadbytek citrátu je v cytoplasmě štěpen na acetylkoenzym A (syntéza lipidů) a malát – (zpět do mitochondrií – anapleróza);

Zvýšená syntéza lipidů a mastných kyselin



- ▶ **aberrantní aktivita PI3K/Akt** – zvýšení cytoplazmatického **acetylkoenzymu A** – zdroj pro **syntézu MK**;
- ▶ indukce ACL (**ACLY**), ale i dalších enzymů podílejících se na syntéze MK – acetylkoenzym A karboxyláza (**ACC**) – syntéza malonylkoenzymu A a syntézy mastných kyselin - **FASN**; zdroj pro syntézu lipidů;

4) Zvýšené nároky na příjem dusíku




EMBO J. 2017, 36:1302-1315

- rychle proliferující **nádorové buňky** potřebují **syntetizovat velké množství molekul obsahujících dusík *de novo***;
- **zvýšený příjem Gln – základní molekula transportující redukovaný dusík v organismu**;
- U, T (1 Gln); C, A (2 Gln); G (3 Gln); navíc katabolity Gln slouží pro syntézu purinů a pyrimidinů (a také jako zdroj pro anaplerotické reakce);
- tvorba asparaginu a glutamátu – zdroj dusíku pro transaminační reakce – syntéza neesenciálních AA;

5) Metabolity a regulace genové exprese

- produkované **metabolity slouží také jako kofaktory nebo substráty** pro nejrůznější **enzymatické reakce** zapojené do tvorby a odstraňování epigenetických značek – **acetylace a methylace histonů, methylace DNA;**



HAT, histone acetyltransferase;
 SAM, S-adenosylmethionine;
 DNMT, DNA methyltransferase;
 HMT, histone methyltransferase;
 5^{me}Cyt, 5-methylcytosine;
 5^{hm}Cyt, 5-hydroxymethylcytosine;
 TET1/2, ten eleven translocation methylcytosine dioxygenase 1/2;
 α-KG, α-ketoglutarate;
 SDH, succinate dehydrogenase;
 FH, fumarate hydratase;
 IDH1/2, isocitrate dehydrogenase 1/2


Specializované buněčné typy mohou mít alternativní metabolismus

- **využití alternativního metabolismu – např. glykolýzy – není typické pouze pro buňky proliferující;**
- **diferenciace a aktivace řady typů imunitních buněk je spojen s přestavbou metabolismu – např. naivní T buňky primárně využívají oxidativní fosforylaci, zatímco jejich aktivace vede k indukci glykolýzy; podobně i aktivace makrofágů a dendritických buněk je spojená s aktivací glykolýzy;**
- **některé kmenové buňky v dospělém organismu –např. hematopoetické kmenové buňky – primárně využívají glykolýzu jako zdroj ATP a uhl. substrátů; naopak v průběhu diferenciace např. nervových buněk dochází k přechodu z aerobní glykolýzy na oxidativní fosforylaci;**
- změna metabolismu může být nejen důsledkem, ale i příčinou nebo podpůrným mechanismem vedoucím k diferenciaci?

Kmenové buňky a jejich metabolismus

- ▶ embryonální kmenové buňky (ESC) mají **méně mitochondrií** – jejich membrána je méně členěná, **menší množství mitochondriálních krist**;
- ▶ to umožňuje např. **snižovat tvorbu reaktivních kyslíkových metabolitů (ROS)**, které mohou negativně ovlivňovat funkce kmenových buněk;
- ▶ **transkripční regulátory kmenovosti** (např. OCT4) **kontrolují řadu metabolických genů**;
- ▶ inhibice mitochondriální aktivity posiluje expresi markerů kmenových buněk v ESC – **má přepnutí metabolismu i regulační účinky na kmenovost a schopnost sebeobnovy?**

Kmenové buňky využívají k tvorbě ATP zejména glykolýzu – to může souviset i s nízkou hladinou O_2 v nice kmenových buněk



Kmenové buňky a jejich metabolismus

- ▶ využívání glykolýzy pro tvorbu ATP není jediný druh adaptace;
- ▶ využití Thr jako zdroje pro tvorbu acetylkoenzymu A;
- ▶ změny metabolismu lipidů – indukce syntézy mastných kyselin je např. spojena s indukcí proliferace nervových kmenových buněk;
- ▶ signální regulátory zapojené do vnímání metabolitů a živin jsou zapojeny také do kontroly funkcí kmenových buněk - insulin-forkhead box O factors (**FOXO**), mammalian target of rapamycin (**mTOR**), AMP-activated protein kinase (**AMPK**) a další; metabolismus by tedy mohl být důležitým faktorem kontrolujícím diferenciaci kmenových buněk;
- ▶ do budoucna zbývá řada otevřených otázek;

K zamyšlení

- ▶ **metabolismus buněk ve tkáních je regulován** nejen na základě dostupných živin, ale zejména **specifickými signálními dráhami**, které **koordinují udržování homeostázy** (hormony, cytokiny); to umožňuje buňkám ve tkáních **rychlé adaptace na změny v prostředí i potřeby celého organismu**;
- ▶ **metabolismus je často tkáňově specifický** a závisí také na faktorech jako je např. **hladina kyslíku**;
- ▶ **diferencované buňky** využívají jako zdroj tvorby ATP primárně **oxidativní fosforylaci**;
- ▶ naproti tomu **proliferující buňky** využívají **aerobní glykolýzu** nejen jako **zdroj energie (ATP) ale také jako zdroj uhl. substrátů a NADPH** pro syntetické reakce a udržení redoxní rovnováhy;

K zamyšlení

- **podobně jako proliferující buňky, i buňky nádorové využívají aerobní glykolýzu nejen jako zdroj energie (ATP) ale také jako zdroj substrátů a NADPH;** zároveň ale mají řadu dalších adaptačních mechanismů umožňujících jim přežití a proliferaci v případě nedostatku živin nebo kyslíku – deregulace příjmu glukózy a aminokyselin, oportunistický příjem živin, apod.;
- **glutamin je významným zdrojem uhlíku a zejména dusíku pro proliferující buňky,** zejména pro extrémně rychle proliferující buňky nádorové;
- **u nádorových buněk byla identifikována celá řada mutací a epigenetických změn vedoucích k deregulaci metabolismu a podpoře proliferace;**

K zamyšlení

- ▶ **metabolismus v nádorových buňkách hraje i úlohu regulační** – změny regulace transkripce (epigenetické změny chromatinu), interakce s nádorovým mikroprostředím;
- ▶ specifické typy buněk jako jsou např. **kmenové buňky** často také využívají glykolýzu jako **základní dráhu pro syntézu ATP**; ne univerzální!
- ▶ **metabolické procesy** pravděpodobně souvisejí s regulací kmenovosti a schopnosti sebeobnovy kmenových buněk – mohou tedy **aktivně ovlivňovat buněčnou proliferaci a diferenciaci buněk**;