

# Obecná chemie C1020

Jiří Pinkas

Ústav chemie – Univerzitní kampus Bohunice

Budova A12, 2. patro, místnost 224

Tel. 54949 6493

[jpinkas@chemi.muni.cz](mailto:jpinkas@chemi.muni.cz)

# Obecná chemie C1020

Přednáška - A11/132

- Út 12:00 – 14:00 a Čt 10:00 – 12:00
- Materiály z přednášky budou vystaveny v ISu
- Řešené úlohy v ISu
- Zkouška písemná - leden a únor 2019
- Každý týden jeden zkouškový termín
- Nebudou předtermíny
- Poslední opravný termín – květen 2018
- Seminář C1040 - Test 0 (0 - 100 %)
- Konzultace: Pondělí od 11 – 12:00 v A12/311 (od října)

# Obecná chemie C1020

Příhoda - Toužín. *Pomůcka pro seminář z obecné chemie.*

Brno : Masarykova univerzita, 2012.

KUK – 225 ks a v ISu jako pdf

Klikorka - Hájek - Votinský. *Obecná a anorganická chemie*  
1989 a. 2. nezměn. vyd. Praha : SNTL

Hála. *Pomůcka ke studiu obecné chemie.*


Brno : Masarykova univerzita, 1993.

Růžička - Toužín. *Problémy a příklady z obecné chemie.*

*Názvosloví anorganických sloučenin*

Brno : Masarykova univerzita, 2000 - 2010.

# Obecná chemie C1020



## Anorganická chemie

Catherine E. Housecroft  
Alan G. Sharpe

Vydavatel VŠCHT Praha  
(1. vydání, 2014)

ISBN 978-80-7080-872-6

Počet stran 1152

Cena 1350 Kč  
950 Kč (pro studenty VŠCHT)

# Obecná chemie C1020

KUK

C. E. Housecroft, A. G. Sharpe  
**Anorganická chemie**

S. S. Zumdahl, S. A. Zumdahl  
**Chemistry**

J. W. Hill  
**General Chemistry**

B. E. Bursten, C. Murphy, H. E. LeMay, H. E. LeMay Jr., P.  
Woodward, T. E. Brown, T. L. Brown  
**Chemistry The Central Science**



# Počátky chemie

První písemná zmínka o chemii

Mezopotámie 1200 př. n. l.

**Tapputi-Belatekallim** - výrobkyně parfémů



# Věda a výzkum

**Technologie** – aplikace znalostí k přeměně okolí,  
výrobky k prodeji a použití

**Aplikovaný výzkum** – krátkodobý, používá poznatky  
základního výzkumu, praktické aplikace

**Základní výzkum** – dlouhodobý, cílem nejsou aplikace ale  
objevování nových přírodních zákonů a získávání nových  
poznatků a principů – výzkumné skupiny Ústavu chemie,  
biochemie, RECETOX, NCBR a CEITEC

# Věda a vědecká metoda

**Věda** – Kvantitativní studium přírody a přírodních zákonů.  
Proces, při kterém se získávají nové **poznatky** a formulují **zákony** popisující přírodní jevy.  
**Empirické** postupy řešení problému - pokusy a pozorování.

Zabývá se pouze **racionálními** výroky, které lze potvrdit nebo vyvrátit pozorováním nebo experimenty.



Sir Francis Bacon  
(1561 - 1626)

*Zakladatel  
empirismu*




# Věda

- Systematizovaný soubor **znalostí, vědomostí a zobecnění**, které jsou považovány za pravdivé
- Vědecká metoda, jíž jsou tyto znalosti získávány - **pozorování, pokus, dedukce** – vedoucí k objektivním zákonům
- Vědecký jazyk - přesně definované **pojmy**


1605 - Francis Bacon

The Proficiency and Advancement of Learning

Formulace vědecké metody



# Věda a vědecká metoda



Správně navržený pokus (např. měřit jednu proměnnou, ostatní konstantní) potvrdí nebo vyvrátí pravdivost hypotézy.  
Hypotéza, která neobstojí musí být odmítnuta. Pokusy potvrzující hypotézu musí být reprodukovatelné.

## Pozorování a vysvětlení

První vysvětlení přírodního jevu – hypotéza úspěšně testovaná vyplněnou předpovědí:

**Tháles Milétský** (624 - 543 př. n. l.)




**Vysvětlil** zatmění Slunce – měsíc v novu přejde přes sluneční kotouč

**Předpověď** dalšího zatmění Slunce 585 př. n. l.

**10. června 2021**

Počátek vědeckého myšlení, racionální přístup bez mystiky a náboženských představ

**Chemie** - Základní prvek je **Voda**



1543 Mikoláš Koperník



## Pozorování a vysvětlení

Johann Joachim Becher  
(1635 - 1682)

První konzistentní vysvětlení několika souvisejících přírodních jevů:



Georg Ernst Stahl  
(1660 - 1734)  
**Flogiston**

- 1) Hoření uhlí = uvolnění **flogistonu**
- 2) Hoření kovů = uvolnění **flogistonu** + vznik oxidu
- 3) Reakce uhlí s oxidy kovů (rudy) = redukce na kov  
přenos **flogistonu** z uhlí na oxid (kov = oxid + flogiston)

Počátky **kvantitativních** experimentů  
PROBLÉM: Kov hoří = oxid + **flogiston**  
Při oxidaci kovů je hmotnost produktů **vyšší** = flogiston má<sub>13</sub>  
negativní hmotnost ☺

## Pozorování a vysvětlení

Vyvracením **flogistonové teorie** se vytvářela moderní chemie.  
Nesprávná teorie je postupně vyvracena na základě experimentů,  
které odpovídají nové teorii.

hoření = slučování s  $O_2$   
vyšší hmotnost produktů - **vážení**

### Zákon zachování hmoty

**flogiston** =  $-O_2$

### Zahřívání $HgO$

(redukce na kov bez flogistonu z uhlíku)



Antoine Laurent Lavoisier  
(1743 – 1794)

## Tři objevitelé kyslíku



Carl Wilhelm Schelle  
(1742 – 1786)  
1771 připravil O<sub>2</sub>  
publikoval až 1777  
(ochutnával chemikálie)



Joseph Priestley  
(1733 – 1804)  
přípravu publikoval  
1774, plyn nazval  
deflogistonovaný  
vzduch

Zahřívání HgO, Ag<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, Mg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, NaNO<sub>3</sub>



Antoine Lavoisier  
(1743 – 1794)  
1783  
Oxygen = **prvek**

# Přírodní zákony a teorie

## Přírodní zákon

– tvrzení, které sumarizuje opakovaná pozorování přírodních jevů, mění se jen zřídka (Coulombův zákon, Periodický zákon, ~~Trestní~~)  
Pravdivý, univerzální, absolutní, stabilní, reverzibilní, jednoduchý.

## Teorie

– tvrzení, které vysvětluje známá fakta a zákony z nich vyplývající, jsou produktem **lidského myšlení** a mohou se měnit nebo být úplně odmítnuty pod vlivem vývoje nových experimentálních metod, přesnějších měření

**Objektivita** – platí vždy při splnění potřebných podmínek

**Schopnost předpovědi** – předpoví existenci dosud nepozorovaných jevů

# Periodický zákon

1 1 <b>H</b> hydrogen 1.008 [1.0078, 1.0082]	2 3 <b>Li</b> lithium 6.94 [6.938, 6.997]	4 <b>Be</b> beryllium 9.0122	11 <b>Na</b> sodium 24.305 [24.304, 24.307]	12 <b>Mg</b> magnesium 24.305 [24.304, 24.307]	13 <b>B</b> boron 10.811 [10.806, 10.821]	14 <b>C</b> carbon 12.011 [12.009, 12.012]	15 <b>N</b> nitrogen 14.006 [14.005, 14.006]	16 <b>O</b> oxygen 16.000 [15.999, 16.000]	17 <b>F</b> fluorine 18.998 [18.996, 19.000]	18 2 <b>He</b> helium 4.0026							
<b>IUPAC Periodic Table of the Elements</b>																	
19 <b>K</b> potassium 39.098 40.079(4)	20 <b>Ca</b> calcium 44.966 44.966	21 <b>Sc</b> scandium 47.867 50.942	22 <b>Ti</b> titanium 50.942 51.996	23 <b>V</b> vanadium 51.996 54.938	24 <b>Cr</b> chromium 54.938 55.845(2)	25 <b>Mn</b> manganese 54.938 55.933	26 <b>Fe</b> iron 55.933 56.845(2)	27 <b>Co</b> cobalt 58.933 58.603	28 <b>Ni</b> nickel 58.603 63.546(3)	29 <b>Cu</b> copper 63.546(3) 65.38(2)	30 <b>Zn</b> zinc 65.38(2) 69.723	31 <b>Ga</b> gallium 69.723 72.630(8)	32 <b>Ge</b> germanium 72.630(8) 74.022	33 <b>As</b> arsenic 74.022 76.971(8)	34 <b>Se</b> selenium 76.971(8) 78.974 78.974 79.901 83.798(2)	35 <b>Br</b> bromine 78.974 83.798(2)	36 <b>Kr</b> krypton 83.798(2)
37 <b>Rb</b> rubidium 85.468 87.62	38 <b>Sr</b> strontium 87.62 88.906	39 <b>Y</b> yttrium 88.906 91.224(2)	40 <b>Zr</b> zirconium 92.906 95.95	41 <b>Nb</b> niobium 95.95 95.95	42 <b>Mo</b> molybdenum 95.95 96.07(2)	43 <b>Tc</b> technetium 96.07(2) 101.97(2)	44 <b>Ru</b> ruthenium 102.91 102.91	45 <b>Rh</b> rhodium 106.42 106.42	46 <b>Pd</b> palladium 106.42 107.87	47 <b>Ag</b> silver 107.87 112.41	48 <b>Cd</b> cadmium 112.41 114.82	49 <b>In</b> indium 114.82 118.71	50 <b>Sn</b> tin 118.71 121.76	51 <b>Sb</b> antimony 121.76 127.60(3)	52 <b>Te</b> tellurium 127.60(3) 126.90	53 <b>I</b> iodine 126.90 131.29	54 <b>Xe</b> xenon 131.29
55 <b>Cs</b> caesium 132.91 137.33	56 <b>Ba</b> barium 137.33 137.33	57-71 <b>Lanthanoids</b> lanthanoids 178.49(2) 180.95	72 <b>Hf</b> hafnium 180.95 183.84	73 <b>Ta</b> tantalum 183.84 186.21	74 <b>W</b> tungsten 186.21 190.23(3)	75 <b>Re</b> rhenium 190.22 195.08	76 <b>Os</b> osmium 195.08 196.97	77 <b>Ir</b> iridium 196.97 200.68	78 <b>Pt</b> platinum 200.68 207.2	79 <b>Au</b> gold 207.2 208.98	80 <b>Hg</b> mercury 208.98 214.38	81 <b>Tl</b> thallium 214.38 204.38	82 <b>Pb</b> lead 204.38 204.39	83 <b>Bi</b> bismuth 204.39 208.98	84 <b>Po</b> polonium 208.98 212.2	85 <b>At</b> astatine 212.2 216.90	86 <b>Rn</b> radon 216.90
87 <b>Fr</b> francium 223.01 223.01	88 <b>Ra</b> radium 223.01 223.01	89-103 <b>Actinoids</b> actinoids 232.04 232.04	104 <b>Rf</b> rutherfordium 232.04 232.04	105 <b>Db</b> dubnium 232.04 232.04	106 <b>Sg</b> seaborgium 232.04 232.04	107 <b>Bh</b> bohrium 232.04 232.04	108 <b>Hs</b> hassium 232.04 232.04	109 <b>Mt</b> meitnerium 232.04 232.04	110 <b>Ds</b> darmstadtium 232.04 232.04	111 <b>Rg</b> roentgenium 232.04 232.04	112 <b>Cn</b> copernicium 232.04 232.04	113 <b>Nh</b> nihonium 232.04 232.04	114 <b>Fl</b> flerovium 232.04 232.04	115 <b>Mc</b> moscovium 232.04 232.04	116 <b>Lv</b> livemorium 232.04 232.04	117 <b>Ts</b> tennessine 232.04 232.04	118 <b>Og</b> oganesson 232.04 232.04



57 <b>La</b> lanthanum 138.91	58 <b>Ce</b> cerium 140.12	59 <b>Pr</b> praseodymium 140.91	60 <b>Nd</b> neodymium 144.24	61 <b>Pm</b> promethium 150.36(2)	62 <b>Sm</b> samarium 151.98	63 <b>Eu</b> europium 157.25(3)	64 <b>Gd</b> gadolinium 158.93	65 <b>Tb</b> terbium 162.50	66 <b>Dy</b> dysprosium 164.93	67 <b>Ho</b> holmium 167.26	68 <b>Er</b> erbium 166.93	69 <b>Tm</b> thulium 167.05	70 <b>Yb</b> ytterbium 174.97	71 <b>Lu</b> lutetium 174.97
89 <b>Ac</b> actinium 223.01	90 <b>Th</b> thorium 232.04	91 <b>Pa</b> protactinium 231.04	92 <b>U</b> uranium 238.03	93 <b>Np</b> neptunium 238.03	94 <b>Pu</b> plutonium 239.00	95 <b>Am</b> americium 243.00	96 <b>Cm</b> curium 247.00	97 <b>Bk</b> berkelium 247.00	98 <b>Cf</b> californium 251.00	99 <b>Es</b> einsteinium 252.00	100 <b>Fm</b> fermium 253.00	101 <b>Md</b> mendelevium 255.00	102 <b>No</b> nobelium 259.00	103 <b>Lr</b> lawrencium 259.00

For notes and updates to this table, see [www.iupac.org](http://www.iupac.org). This version is dated 28 November 2016.  
Copyright © 2016 IUPAC, the International Union of Pure and Applied Chemistry.

# Vědecký jazyk - přesná definice pojmu



Joachim Jungius  
(1587 - 1657)

Zakladatel vědeckého jazyka  
Potřeba přesné definice pojmu

Základem vědy je experiment  
a závěry z něho vyvozené

- Chemické názvosloví (jména prvků, obecné a systematické názvy sloučenin)
- Názvy laboratorního nádobí a přístrojů (Bunsenův kahan, Erlenmeyerova baňka, Soxletův extraktor)
- Jmenné reakce (Grignard, Wittig, Heck, Suzuki)
- Názvy zákonů, rovnic a principů (Boyle, Schroedinger, Boltzman, Avogadro, Arrhenius)

# Vědecký jazyk - přesná definice pojmu

Guyton de Morveau 1782

Počátky systematického chemického názvosloví

Lavoisier, Berthollet, de Fourcroy, Berzelius, Werner

Jan Svatopluk Presl - Lučba čili chemie zkuská  
(1791–1849)

P = Kostík, Cr = Barvík

English

IUPAC

**Red Book** – názvosloví anorganické chemie

**Blue Book** – názvosloví organické chemie

**Green Book** – názvosloví fyzikální chemie

**White Book** – názvosloví biochemie

**Gold Book** – kompendium chemické terminologie


## Model

**Reálný svět** existuje. (Matrix)



**Model** je pokus popsat reálné objekty pomocí myšlených ideálních objektů. Vysvětlit přírodní jevy na mikroskopické úrovni (např. atomy) pomocí pozorování a zkušeností na makroskopické úrovni.

**Model** je zjednodušený obraz skutečnosti, který usnadní vysvětlení problému. Používá **idealizace** a **aproximace**.




**Model není totožný s realitou**, je to lidský výtvor založený na nedokonalém poznání a pochopení přírody.




**Modely** se stávají komplikovanějšími a podrobnějšími s vývojem našeho poznání.

**Nový přesnější model** s příchodem přesnějších metod měření.

## Model



**Pokročilejší model** obsahuje předešlé (správné) modely jako zvláštní případy (poloměr H atomu).




## Model


Jednoduché modely obsahují mnoho **zjednodušujících a omezujících** podmínek a předpokladů, mohou tedy poskytnout jen kvalitativní informace

Atom H – Bohrův model

Pro efektivní použití modelu je nutno znát jeho předpoklady a omezení, jeho přednosti a slabiny. Lze klást jen takové otázky, na které může daný model odpovědět.




I když je model užitečný pro vysvětlení velkého počtu jevů, nelze předpokládat, že bude fungovat v každém případě.




# Model

*"Jediné, co mě zajímá, je najít soubor pravidel, která by souhlasila s chováním přírody, a nezkoušet jít příliš daleko za to. Zjistil jsem, že většina filozofických diskuzí je psychologicky užitečná, ale nakonec, když se podíváte zpátky do historie, zjistíte, že to, co bylo kdysi řečeno s takovou pádností, je téměř vždy - do jisté míry - nesmyslné!"*

Richard P. Feynman  
(1918 – 1988)  
NP za fyziku 1965  
Manhattan Project  
Nanotechnologie



# Teorie a experiment




Ubi materia, ibi geometria  
Kde je hmota, tam je geometrie  
**měření**

Johannes Kepler  
(1571 – 1630)

Aby byl experiment přijat za pravdivý,  
musí být **nezávisle** verifikovaný, zopakovaný.  
**Samočisticí vlastnost vědecké metody**

# Experiment

Příběh o šesti slepých bratrech



Elementární analýza

# Experiment


RTG strukturní analýza

NMR

UV-vis

Hmotnostní spektrometrie, MS

Vibrační spektroskopie, IR, RA<sub>26</sub>



# Kvantitativní experiment

Johann Baptista van Helmont  
(1579 - 1644)

**Měření**

Robert Boyle  
(1627 - 1691)



Joseph Black  
(1728 - 1799)

Objemy plynů

Hmotnost reaktantů a produktů

Henry Cavendish  
(1731 - 1810)


# Kvantitativní experiment = měření

## Hmotnost, délka, čas - od paměti

Teplota - 1592 Galileo, 1724 Daniel Fahrenheit


### Messen heist Wissen

"When you can measure what you are speaking about, and express it in numbers, you know something about it; but when you cannot measure it, when you cannot express it in numbers, your knowledge is of a meagre and unsatisfactory kind. It may be the beginning of knowledge, but you have scarcely, in your thoughts, advanced to the stage of science."



Lord Kelvin  
(William Thomson)  
(1824–1907)

# Kvantitativní experiment = měření



## Fyzikální vlastnosti

**Aditivní** - závisí na počtu a druhu atomů v molekule  
molekulová hmotnost, ....

**Konstitutivní** - závisí na uspořádání atomů v molekule  
optická rotace, dipolový moment,.....

**Koligativní** - závisí jen na počtu atomů nebo molekul v soustavě  
tlak plynu, osmotický tlak,.....

# Veličiny, Rozměry, Jednotky

Příklad:

<http://www.labo.cz/mftabulky.htm>

Veličina:  $E$ , energie

Rozměr:  $\text{kg m}^2 \text{ s}^{-2}$

Jednotka: J, eV, kalorie,....

Základní rozměry: délka, čas, hmotnost, elektrický náboj, mol,...

Složené rozměry: rychlosť = délka  $\times$  (čas) $^{-1}$

Frekvence?

Bezrozměrné veličiny:

Poměry dvou stejných veličin (např. molární zlomek)

Argumenty ln, exp, sin, cos, tan

## Základní jednotky SI

Veličina	Jednotka	Zkratka
Hmotnost	Kilogram	kg
Délka	Metr	m
Čas	Sekunda	s
Teplota	Kelvin	K
Elektrický proud	Amper	A
Látkové množství	Mol	mol
Svítivost	Kandela	cd

## Základní jednotky SI

**1 m = délka dráhy, kterou proběhne světlo ve vakuu za 1/299 792 458 sekundy**

**1 kg = hmotnost mezinárodního prototypu kilogramu uloženého v Mezinárodním úřadě pro váhy a míry v Sénvres u Paříže (jediná jednotka definovaná na materiálním objektu)**

**1 s = doba rovnající se 9 192 631 770 periodám záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia-133**

## Základní jednotky SI

**1 A = stálý elektrický proud, který při průchodu dvěma přímými rovnoběžnými nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu umístěnými ve vakuu ve vzájemné vzdálenosti 1 metr vyvolá mezi nimi stálou sílu  $2 \cdot 10^{-7}$  newtonu na 1 metr délky vodiče**

**1 K =  $1/273.16$  termodynamické teploty *trojného bodu vody***

## Základní jednotky SI

**1 mol = látkové množství soustavy, která obsahuje právě tolik částic (atomů, molekul, elektronů, nebo jiných entit), kolik je atomů v 0,012 kilogramu (přesně) nuklidu uhlíku  $^{12}\text{C}$  tj. .... $6,022 \times 10^{23}$**


**Počítání atomů vážením**

**1 cd = svítivost zdroje, který v daném směru vysílá monochromatické záření o kmitočtu 540  $10^{12}$  hertzů a jehož zářivost v tomto směru je 1/683 wattu na steradián**

## ALL CHANGE

Under the revised SI system, every unit will be defined in relation to a constant, whose value will become fixed. Many of the units will be defined in relation to each other: for example, definition of the kilogram requires Planck's constant, and definitions of the second and metre.\*

→ Dependency



\*Final values for the constants will be published later this month.  
Definitions do not represent the exact text of the new SI.

## Násobky – předpony

<b>Y</b>	<b>Yotta</b>	$10^{24}$
<b>Z</b>	<b>Zetta</b>	$10^{21}$
<b>E</b>	<b>Exa</b>	$10^{18}$
<b>P</b>	<b>Peta</b>	$10^{15}$
<b>T</b>	<b>Tera</b>	$10^{12}$
<b>G</b>	<b>Giga</b>	$10^9$
<b>M</b>	<b>Mega</b>	$10^6$
<b>k</b>	<b>kilo</b>	$10^3$
<b>1</b>		$10^0$

<b>1</b>		$10^0$
<b>m</b>	<b>mili</b>	$10^{-3}$
<b><math>\mu</math></b>	<b>mikro</b>	$10^{-6}$
<b>n</b>	<b>nano</b>	$10^{-9}$
<b>p</b>	<b>piko</b>	$10^{-12}$
<b>f</b>	<b>femto</b>	$10^{-15}$
<b>a</b>	<b>atto</b>	$10^{-18}$
<b>z</b>	<b>zepto</b>	$10^{-21}$
<b>y</b>	<b>yokto</b>	$10^{-24}$

## Násobky – předpony

**% = 0,01 = 1 v  $10^2$**

**‰ = 0,001 = 1 v  $10^3$**

**ppm = 1 g v 1 t nebo 1 atom v  $10^6$  atomech  
(part per million)**

**Obsah Li v rudách na Cínovci**


**ppb = 1 mg v 1 t nebo 1 atom v  $10^9$  atomech**

**Obsah Au v mořské vodě**

**ppt = 1 µg v 1 t nebo 1 atom v  $10^{12}$  atomech**

## Hmotnost $m$ / kg

1 kg – jediná jednotka, která je definovaná fyzickým objektem



A. Einstein: hmotnost tělesa v pohybu je větší než hmotnost v klidu

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Rychlosť tělesa  $v$

Klidová hmotnost tělesa  $m_0$

Rychlosť světla  $c = 2,9979 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$

## Budoucí definice 1 kg ?



**Koule z velmi čistého  $^{28}\text{Si}$**   
**Objem koule změřen laserovou interferometrií**  
**Objem na jeden atom Si z rtg. difrakce**  
**Počet atomů v kouli**  
**Avogadrova konstanta**

## Hmotnost *m* / kg


Atomová hmotnostní jednotka

**$\frac{1}{12}$**


1/12 hmotnosti atomu **nuklidu  $^{12}\text{C}$**

$$1 \text{ } u = (1 \text{ amu}) = 1,6606 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

1 atom



1 mol



## Látkové množství $n$ / mol

**Avogadrova konstanta** = počet atomů uhlíku  
v 0,012 kg (12 g) nuklidu  $^{12}\text{C}$

$$N_A = 6,022\ 140\ 78\ (18) \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

Látkové množství  $n$ , jednotka mol

$n$  = podíl počtu částic N (atomů, molekul, elektronů,...) a  $N_A$

$$n = \frac{N}{N_A}$$

$$n = \frac{m}{M_r}$$

## Atomová a molární hmotnost

Atomová  $A_m$  a molární hmotnost  $M_m$

Hmotnost 1 molu látky,  $\text{kg mol}^{-1}$

$$A_m(^{12}\text{C}) = 12 \times u \times N_A =$$

$$= 12 \times 1,6606 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \times 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1} =$$

$$= 0,01200 \text{ kg mol}^{-1} = 12,00 \text{ g mol}^{-1}$$

## Délka $l$ / m


1 Ångström =  $10^{-10}$  m  
**(není SI jednotka)**

$$1 \text{ \AA} = 100 \text{ pm} = 0,1 \text{ nm}$$

Bohrův poloměr  
 $a_0 = 5,3 \cdot 10^{-11} \text{ m} = 0,53 \text{ \AA}$

Délky vazeb v molekulách 1 až 4 Å  
Průměr atomu Cu je 2,55 Å

Průměr vesmíru: 17 miliard světelných let =  $1,6 \cdot 10^{26}$  m  
Průměr atomového jádra =  $10^{-15}$  m



Anders Jonas Ångström  
(1814 - 1874)

## Vazebné vzdálenosti

Vazebné vzdálenosti (v Å)

Vazba	CC	CN	CO	CH	NH	OH
Jednoduchá	1.53	1.47	1.42	1.09	1.00	0.96
Dvojná	1.34	1.27	1.21			
Trojná	1.20	1.15				


Kolik pm?



H 37							He 32
<b>Li</b> <b>Be</b> <b>B</b> <b>C</b> <b>N</b> <b>O</b> <b>F</b> <b>Ne</b>							
152	113	88	77	70	66	64	69
<b>Na</b>	<b>Mg</b>	<b>Al</b>	<b>Si</b>	<b>P</b>	<b>S</b>	<b>Cl</b>	<b>Ar</b>
186	160	143	117	110	104	99	97
<b>K</b>	<b>Ca</b>	<b>Ga</b>	<b>Ge</b>	<b>As</b>	<b>Se</b>	<b>Br</b>	<b>Kr</b>
227	197	122	122	121	117	114	110
<b>Rb</b>	<b>Sr</b>	<b>In</b>	<b>Sn</b>	<b>Sb</b>	<b>Te</b>	<b>I</b>	<b>Xe</b>
247	215	163	140	141	143	133	130
<b>Cs</b>	<b>Ba</b>	<b>Tl</b>	<b>Pb</b>	<b>Bi</b>	<b>Po</b>	<b>At</b>	<b>Rn</b>
265	217	170	175	155	167	140	145

$$1 \text{ \AA} = 100 \text{ pm} = 0,1 \text{ nm}$$


**TEM = transmisní elektronová mikroskopie**



## Objem $V$

$$1 \text{ pm}^3 = 10^{-6} \text{ \AA}^3$$

Objem molekuly fullerenu C<sub>60</sub>  
asi 500 Å<sup>3</sup>



Molární objem ideálního plynu = objem 1 molu plynu

při teplotě 0 °C a tlaku 101 325 Pa (STP)

$$V_M = \mathbf{22.414} \text{ l mol}^{-1}$$

při teplotě 0 °C a tlaku 100 000 Pa (1 bar)

$$V_M = \mathbf{22.71} \text{ l mol}^{-1}$$

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$\text{g cm}^{-3}$

Hustota závisí  
na teplotě a tlaku

## Hustota $\rho$

Látka	Hustota při 20 °C / $\text{g cm}^{-3}$	Stav
Kyslík	0.00133	g
Benzen	0.880	l
Lithium	0.535	s
Voda	0.9982 (1.00 pro lab. výpočty)	l
Hliník	2.70	s
Železo	7.87	s
Olovo	11.34	s
Rtuť	13.6	l
Zlato	19.32	s
Iridium	22.65	s

$$\rho = \frac{m}{V}$$

g cm<sup>-3</sup>

## Měření hustoty



Hustota závisí na teplotě

**Pyknometr**

Při 20 °C

**Nádoba na dolití IN  
Nádoba na vylití EX**



# Čas

## Kinetika dějů, chemických reakcí

$t / \text{s}$	Událost
$10^{-21}$	Jaderné srážky
$10^{-15}$	Excitace elektronu fotonem, femtosekundová spektroskopie
$10^{-12}$	Radikálové reakce, přenos energie, valenční vibrace
$10^{-9}$	Fluorescence, rotace, přenos protonu
$10^{-6}$	Fosforescence, difuze, konformační
$10^{-3}$	Rychlé bimolekulární reakce
$10^0$	Úder srdce, pomalé bimolekulární reakce


# Rychlosť $v$

## Rychlosť svetla ve vakuu

$$c = 2,99792458 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$$

(presně)

$$3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$$
$$300\,000 \text{ km s}^{-1}$$



Albert Abraham Michelson  
(1852 - 1931)  
NP za fyziku 1907


$$E = m c^2 \quad v \lambda = c$$

# Frekvence, vlnová délka, vlnočet

Počet periodických dějů za časový interval

$$\text{Frekvence } \nu = 1/t, \text{ Hz} = \text{s}^{-1}$$

- Kmity
- Vibrace
- Rotace
- Srážky molekul



Vzdálenost mezi dvěma maximy

Vlnová délka  $\lambda$ , m

$$\nu \lambda = c$$
$$c = 2.998 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$$

Počet vln na jednotku délky


$$\text{Vlnočet } \tilde{\nu} = 1/\lambda, \text{ cm}^{-1}$$

# Frekvence, vlnová délka, vlnočet

$$\nu \lambda = c$$

$$c = 2.998 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$$

Vlnová délka, m




Energie fotonu, J

$$E = h \nu$$

$$h = 6.626 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$$

## Síla $F$

1 Newton = gravitační síla působící na jablko



$$F = m \ g$$

$$g = 9,80665 \text{ m s}^{-2}$$

Isaac Newton  
(1642 - 1727)


# Čtyři základní síly - interakce

**Gravitační**

**Elektromagnetická - CHEMIE**  
(e-e repulze, p-e přitažlivost)

**Silné interakce**  
(jaderné, drží protony pohromadě)

**Slabé interakce**  
(drží p a e pohromadě v neutronu)



LIGO - Laser Interferometer  
Gravitational-Wave  
Observatory 2015

# Elektrický náboj $q$

Elementární náboj,  $e$

$$e = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C} \quad 1 \text{ C} = 1 \text{ A s}$$

Všechny náboje jsou celistvým násobkem  $e$   
 $q = Z e$

Coulombův zákon

Přitažlivá síla  $F$  mezi dvěma náboji  
opačného znaménka je nepřímo  
úměrná druhé mocnině vzdálenosti  $r$   
mezi nimi a přímo úměrná velikosti  
nábojů  $q$ .



Charles Augustin Coulomb  
(1736 - 1806)

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

## Tlak $p$

1 Pascal = tlak kterým působí jablko na 1 m<sup>2</sup>

$$1 \text{ Pa} = 1 \text{ N m}^{-2}$$

$$1 \text{ atm} = 101\ 325 \text{ Pa} = 760 \text{ mm Hg (Torr)} = 1,01325 \text{ bar}$$

$$1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa} = 100 \text{ kPa}$$

**Standardní tlak = 1 bar = 100 000 Pa**

## Teplota $T$

Kelvin, K

Absolutní nula 0 K je nedosažitelná  
Entropie dosahuje minima


- 273,15 °C

Současný rekord: ~100 pK  
Kvantové efekty

Celsius, °C

0 °C = 273,15 K

$$T[\text{°C}] = T[\text{K}] - 273,15$$



Lord Kelvin  
(William Thomson)  
(1824 - 1907)

Standardní teplota (termodynamika) = 25 °C = 298 K

1592 Galileo

## Teploměr

1629 teploměr plněný brandy  
Joseph Solomon Delmedigo, lékař a rabín

1724 Daniel Fahrenheit (1686–1736) Hg

Změna fyzikální vlastnosti závislé na teplotě:

- Objemová roztažnost rtuti
- Délková roztažnost kovů
- Elektrický odpor kovů
- Stav kapalných krystalů
- Radiace IČ záření



Definice Celsiusovy stupnice  
Teplota tání ledu při 1 atm = 0 °C  
Teplota varu vody při 1 atm = 100 °C  
Rozděl na 100 dílků

ITS-90 Mezinárodní teplotní stupnice  
Trojný bod vody = 273,16 K

# ITS-90

T, K

ITS-90 Mezinárodní teplotní stupnice

T = Trojný bod

Interpolace


Kalibrace

e-Hydrogen (T)	13,8033
Neon (T)	24,5561
Oxygen (T)	54,3584
Argon (T)	83,8058
Mercury (T)	234,3156
Water (T)	273,16
Gallium	302,9146
Indium	429,7485
Tin	505,078
Zinc	692,677
Aluminium	933,473
Silver	1234,93
Gold	1337,33
Copper	1357,77

# Teplota tání

## Kapalné prvky

### Teploty tání prvků



# Energie *E*

1 Joule = energie úderu lidského srdce


**Zákon ekvivalence mechanické práce a tepla**

$$1 \text{ cal} = 4,184 \text{ J}$$

1 eV = kinetická energie elektronu,  
který je urychljen potenciálem 1 V

$$\begin{aligned} E &= e U = 1,60210 \cdot 10^{-19} \text{ C} \times 1 \text{ V} = \\ &= 1 \text{ eV} = 1,60210 \cdot 10^{-19} \text{ J} \end{aligned}$$

$$1 \text{ eV (molekula)}^{-1} = 1 \text{ eV} \times N_A = 96\,485 \text{ J mol}^{-1}$$



James Prescott Joule  
(1818 - 1889)  
žák J. Daltona

## Energie $E$

$$E = m c^2 = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \times (3,00 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1})^2 = 1,49 \cdot 10^{-10} \text{ J}$$

1 amu = 931,4 MeV

$$E_{\text{kin}} = \frac{1}{2} m v^2$$

$$E_{\text{kin}} = \frac{3}{2} k T$$

$$k = 1,380662 \cdot 10^{-23} \text{ J K}^{-1} \quad \text{Boltzmannova konstanta}$$

$kT$  = 1 zJ pro laboratorní teplotu

$$E = h \nu$$

$$h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J s} \quad \text{Planckova konstanta}$$



## Energie *E*

$$E_{\text{celk}} = E(\text{elektronová}) + E(\text{vibrační}) + E(\text{rotační}) + E_{\text{ost}}$$

*E*(elektronová)  $100 \text{ kJ mol}^{-1}$


*E*(vibrační)  $1,5 - 50 \text{ kJ mol}^{-1}$

*E*(rotační)  $0,1 - 1,5 \text{ kJ mol}^{-1}$



## Vazebné energie, $\text{kJ mol}^{-1}$ (jednoduché vazby)

	H	C	N	O	S	F	Cl	Br	I
H	432								
C	411	346							
N	386	305	167						
O	459	358	201	142					
S	363	272	---	---	226				
F	565	485	283	190	284	155			
Cl	428	327	313	218	255	249	240		
Br	362	285	---	201	217	249	216	190	
I	295	213	---	201	---	278	208	175	149




Vazebná vzdáenosť v molekule  $\text{H}_2$

# Vazebná energie N<sub>2</sub>

$$E_{\text{vaz}} = 942 \text{ kJ mol}^{-1}$$



Použití  
80% hnojiva  
10% plasty  
5% výbušniny



1909 Fritz Haber  
 $\mathbf{N}_2(\mathbf{g}) + \mathbf{H}_2(\mathbf{g}) \rightarrow \mathbf{NH}_3$  exo  
500 °C, 250 atm, Fe katalyzátor  
výtěžek 20%

NP za chemii 1918