

# V. skupina PS, $ns^2np^3$

Dusík, fosfor, arsen, antimon, bismut

- ❖ N a P jsou nekovy (tvoří kovalentní vazby), As, Sb jsou polokovy, Bi je typický kov
- ❖ pro N je charakteristická tvorba  $\pi_p$  vazeb
- ❖ P má vakantní 3d-orbitaly a je schopen se silně elektronegativními prvky (F, O) vytvářet  $\pi_{pd}$  interakce
- ❖ je schopen tyto orbitaly použít pro tvorbu vyšších koordinačních čísel (5 a 6) v uspořádání trigonální bipyramidy a oktaedru
- ❖ As a Sb jsou amfotery, v oxidačním stupni V mají oxidační vlastnosti.
- ❖ As upřednostňuje koordinační číslo 4,
- ❖ Sb v antimoničnanech má většinou koordinační číslo 6
- ❖ vůči vodíku jsou všechny prvky ve formálním oxidačním stupni -III, stabilita tohoto oxidačního stupně se stoupajícím atomovým číslem klesá, což souvisí s klesající energií vazby M—H

# Vlastnosti prvků V. sk. PS

	N	P	As	Sb	Bi
atomové číslo	7	15	33	51	83
hustota [g.cm <sup>-3</sup> ]	1,027	1,828 (bílý)	5,73	6,68	9,80
teplota tání °C	- 210	44,1	816 (4 MPa)	630,7	271,4
teplota varu °C	- 195,8	280,5	615 (subl.)	1587	1564
Kov. poloměr [pm]	70	110	121	141	146
Ion. energie [eV] I <sub>1</sub>	14,53	10,488	9,81	8,639	7,287
I <sub>2</sub>	29,60	19,72	18,63	16,5	16,68
I <sub>3</sub>	47,43	30,16	28,34	25,3	25,56
I <sub>4</sub>	77,5	51,4	50,1	44,1	45,3
I <sub>5</sub>	97,9	65,0	62,3	56	56
oxidační stupně	-III až +V	-III až +V	-III, +III, +V	-III +III +V	-III +III +V
elektronegativita	3,07	2,06	2,20	1,82	1,9

# Dusík

## Výskyt

- je součástí zemské atmosféry (cca 78 %)
- chilský ledek  $\text{NaNO}_3$
- amonné soli
- jako biogenní prvek je amidickou součástí bílkovin

❖ Molekula dusíku je **izostrukturní** a **izoelektronová** s některými jinými molekulami eventuálně ionty:



❖ Rozdělení elektronové hustoty je však v molekule  **$\text{N}_2$**  symetrické, čímž si (také vzhledem k vysoké vazebné energii) vysvětlujeme nízkou chemickou reaktivitu molekulárního dusíku.




# Vazebné možnosti dusíku

Typ hybridizace	Typ vazby	Příklady
$sp^3$	$4\sigma$	$\text{NH}_4^+$ , $(\text{CH}_3)_3\text{NO}$ , $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$
	$3\sigma + 1 \text{ vp}$	$\text{NH}_3$ , $\text{NF}_3$ , $\text{NH}_2\text{-NH}_2$
	$2\sigma + 2 \text{ vp}$	$\text{Na}^+\text{NH}_2^-$
	$1\sigma + 3 \text{ vp}$	$\text{Li}_2^{2+}\text{NH}^{2-}$
$sp^2$	$3\sigma + 1\pi \text{ delok.}$	$\text{HNO}_3$ , $\text{NO}_2\text{Cl}$ , $\text{NO}_3^-$
	$2\sigma + 1 \text{ vp} + 1 \text{ delok.}$	$\text{NOF}$ , $\text{NO}_2^-$
$sp$	$2\sigma + 2\pi \text{ delok.}$	$\text{NO}_2^+$
	$1\sigma + 1 \text{ vp} + 2\pi$	$\text{NNO}$ (koncový atom N)


vp – volný elektronový pár

# Reaktivita dusíku

- ❖ Dusík reaguje pouze s malým počtem látek, většinou až za vysoké teploty, příp. přítomnosti katalyzátorů (Fe, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>):




- ❖ S kovy tvoří za vysokých teplot nitridy: Mg, Ca, Sr, Ba, B, Al, Si a Ti.
- ❖ Průmyslový význam má reakce, při které vzniká kyanamid vápenatý




# Příprava, výroba a užití dusíku

## Příprava



## Příprava velmi čistého dusíku



azid barnatý

## Výroba frakční destilací zkapalněného vzduchu

	t. v. ( C )
N <sub>2</sub>	- 196
O <sub>2</sub>	- 183

## Užití

- výroba amoniaku, kyseliny dusičné, kyanamidu vápenatého CaCN<sub>2</sub>
- jako ochranná atmosféra proti oxidaci látek vzdušným kyslíkem.

# Sloučeniny dusíku a vodíku

Baze:                    amoniak  $\text{NH}_3$                     hydrazin  $\text{N}_2\text{H}_4$

Kyselina:                    azoimid  $\text{HN}_3$

Soli:                    azid amonný  $\text{NH}_4\text{N}_3$     azid hydrazinia(1+)  $\text{N}_2\text{H}_5\text{N}_3$

Nestabilní:                    diazen (diimid)  $\text{HN}=\text{NH}$  (-180 °C)    tetrazen  $\text{H}_2\text{N}-\text{N}=\text{N}-\text{NH}_2$  (-30 °C)

**Neexistuje:**                    hydrid amonný  $\text{NH}_4\text{H}$

# Sloučeniny dusíku a vodíku - amoniak

NH<sub>3</sub>

Bezbarvý plyn, charakteristického zápachu,  
teplota tání -77,7 °C, teplota varu - 33,4 °C

Příprava



příprava deuterovaného amoniaku

Výroba

ze čpavkových vod (odpadní produkt výroby v plynárnách a koksovnách) reakcí s Ca(OH)<sub>2</sub>

přímou syntézou dle Habera a Bosche




ΔH = - 92 kJ mol<sup>-1</sup>, 20-100 MPa

# Sloučeniny dusíku a vodíku - amoniak


## Reakce amoniaku

s vodou




amoniak se výborně se rozpouští ve vodě

amoniak jako redukční činidlo





rozdíl ve výsledku termického rozkladu amonných solí



# Sloučeniny dusíku a vodíku - amoniak


Reakce v kapalném amoniaku



$$K \approx 10^{-30}$$

tj. pH stupnice je  
v rozsahu 1-30

Amonolýza vede k amidům, imidům nebo nitridům




# Sloučeniny dusíku a vodíku - amoniak

## Použití amoniaku

- ❖ v podobě amonných solí slouží jako dusíkaté hnojivo
- ❖ je výchozí surovinou pro výrobu kyseliny dusičné
- ❖ výroba sody Solvayovou metodou
- ❖ cirkulační kapalina v chladicích zařízeních
- ❖ do prodeje přichází jako 25% vodný roztok nebo zkapalněný v ocelových lahvích
- ❖ celosvětová roční produkce amoniaku se pohybuje v řádu 100 milionů tun



# Sloučeniny dusíku a vodíku – amidy, imidy

Průmyslově se vyrábí **amid sodný**  
(používá se v organické syntéze)




Amidy

Ve vodě a roztocích alkálií podléhají hydrolyze



Imidy



Imidů kovů je známo jen několik, např.  $\text{Li}_2\text{NH}$ ,  $\text{CaNH}$  apod.  
Vznikají obvykle (spontánním) termickým rozkladem amidů.



# Sloučeniny dusíku a vodíku - nitridy

Nitridy

## Příprava



## Rozdělení nitridů

Iontové ( $\text{Li}_3\text{N}$ ,  $\text{Mg}_3\text{N}_2$ ,  $\text{Be}_3\text{N}_2$ ,  $\text{Ca}_3\text{N}_2$ )

Intersticiální  $\text{XN}$  ( $\text{X} = \text{Ti}, \text{Zr}, \text{V}, \text{Nb}, \text{U}$ ),  $\text{X}_2\text{N}$  ( $\text{X} = \text{Mo}, \text{W}$ ), .. ( $\text{Mn}_3\text{N}_2$ ,  $\text{U}_2\text{N}_3$ )

Kovalentní ( $\text{AlN}$ ,  $\text{BN}$ ,  $\text{S}_x\text{N}_y$ )

S vodou hydrolyzují



# Sloučeniny dusíku a vodíku - hydrazin

Hydrazin

$N_2H_4$

Bezbarvá, na vzduchu dýmající kapalina

teplota tání 1,4 C, teplota varu 113,5 C

Zahříváním na vyšší teplotu se rozkládá (někdy s výbuchem).

Výroba:



Meziprodukt  
chloramin



Hydrazin se izoluje v podobě málo rozpustného hydrogensíranu hydrazinia  $N_2H_5^+HSO_4^-$ .

Hydrazin se mísí s vodou v libovolném poměru. Podobně jako amoniak vytváří hydrát  $N_2H_4 \cdot H_2O$  a takto přichází obvykle do prodeje.

# Sloučeniny dusíku a vodíku - hydrazin

Reakce  
hydrazinu



disproporcionace

Pozn.:

Redukční účinky hydrazinu se využívají při výrobě drahých kovů

Hydrazidy

Vodík v hydrazinu je "kyselý"  $\Rightarrow$  lze připravit hydrazidy



S chloridy kyseliny lze získat hydrazidy kyselin



# Sloučeniny dusíku a vodíku - hydrazin

## Použití hydrazinu

- ❖  $\text{N}_2\text{H}_4$  a jeho methylderiváty se využívají jako raketová paliva
- ❖ Samotný hydrazin je vynikající redukční činidlo (jeho oxidační zplodiny jsou plynný dusík a voda)
- ❖ Řada derivátů má použití v zemědělství, medicíně aj.

## Příprava tetrafluorohydrazinu



# Sloučeniny dusíku a vodíku – azoimid


kyselina azidovodíková

Azoimid

$\text{HN}_3$

Bezbarvá kapalina, teplota tání - 80 °C, teplota varu 35,7 °C,  
úderem vybuchuje

Vodné roztoky reagují kysele ( $K_a = 1,8 \cdot 10^{-5}$ ).



Výroba




Reakce s jodem



# Sloučeniny dusíku a vodíku – azidy

## Azidy

Stálejší jsou alkalické soli :



Azidy alkalických kovů a alkalických zemin jsou stálé, ve vodě rozpustné, teplem se rozkládají za vzniku dusíku a kovu bez výbuchu.

Využití do patron pro airbagy

Azidy těžkých kovů jsou explozivní,  $\text{AgN}_3$ ,  $\text{Pb}(\text{N}_3)_2$  a  $\text{Hg}(\text{N}_3)_2$  se používají do roznětek (lze je získat srážením).



# Sloučeniny dusíku a vodíku – hydroxylamin


Hydroxylamin  
 $\text{NH}_2\text{OH}$

Bílá krystalická látka (t. tání 32 °C), dobře rozpustná ve vodě.

V bezvodém stavu disproporcionuje (zahřátím s výbuchem).

Je slabší zásadou než amoniak,  $K_b = 6,6 \cdot 10^{-9}$ .

Má redukční i oxidační účinky, podléhá i disproporcionaci.




tautomerní rovnováha

Jeden z mnoha způsobů výroby



v praxi



# Sloučeniny dusíku a vodíku – hydroxylamin


Existují hydroxylamonné soli, např.  $[\text{NH}_3\text{OH}]\text{Cl}$ ,  $[\text{NH}_3\text{OH}]_2\text{SO}_4$  aj.

Tvoří komplexy typu  $[\text{Zn}(\text{NH}_2\text{OH})_2\text{Cl}_2]$ .


**S** aldehydy a ketony reaguje za vzniku **oximů**



$\alpha$  - oxim




diacetyldioxim ( $\text{R} = \text{CH}_3$ ) (**Čugajevovo činidlo**) se používá ke gravimetrickému stanovení  $\text{Ni}^{2+}$ ,  $\text{Pd}^{2+}$   
(tvorba jasně červené sraženiny)



cyklohexanonoxim – prekurzor pro výrobu polymerů na bázi  $\epsilon$  – kaprolaktamu (polyamidy jako silon, nylon, perlon)


# Kyslíkaté sloučeniny dusíku

Dusík tvoří oxidy v oxidačních stupních I – V, ne vždy známe odpovídající kyseliny.




**Azoxid ≡ oxid dusný**

Bezbarvý plyn (t. tání -90,8 °C, t. varu -88,5 °C)



↔



**Výroba**



Chemicky reaktivní, za zvýšené teploty se však rozkládá na dusík a kyslík a vykazuje pak oxidační vlastnosti.



Používal se jako „rajský plyn“ při narkózách a rovněž jako hnací plyn bombiček na výrobu šlehačky.

# Kyslíkaté sloučeniny dusíku

## Oxid dusnatý NO

Bezbarvý paramagnetický plyn  
(teplota tání -163,6 °C, varu - 151,8 °C).





+II


Nepárový elektron je delokalizován po celé molekule, čímž je zabráněno tvorbě dimeru  $\text{N}_2\text{O}_2$ .

Oxid dusnatý je neutrálním oxidem, nereaguje s vodou.

## Příprava



## Výroba



Oxidace silnými oxidačními  
činidly  $\Rightarrow \text{HNO}_3$

Redukce vede k  $\text{NH}_3$ ,  $\text{NH}_2\text{OH}$ ,  $\text{N}_2\text{O}$


Pozn.: Oxid dusnatý je velmi jedovatý !

# Kyslíkaté sloučeniny dusíku

**Sloučeniny nitrosylu NOX** (X = F, Cl, Br)



kovalentní sloučenina



příprava esterů kyseliny dusitě

**Sloučeniny s nitrosylovým kationtem NO<sup>+</sup>**

Oxid dusnatý celkem snadno odštěpuje nepárový elektron za vzniku nitrosylového kationtu NO<sup>+</sup>.





Kation NO<sup>+</sup> je izoelektronový s CO, CN<sup>-</sup>, N<sub>2</sub>.

Vytváří komplexy, např. nitroprussid sodný Na<sub>2</sub>[Fe(CN)<sub>5</sub>NO] – kvalitativní důkaz přítomnosti železa

# Kyslíkaté sloučeniny dusíku

## Oxid dusitý $N_2O_3$

Existuje jako chemické individuum pouze při velmi nízkých teplotách v pevném stavu jako světle modrá látka (t. t. -102 °C).



V kapalném stavu, tím spíše nad teplotou varu (~ 3 °C) dochází ke zřetelné disproporcionaci:



⇒ Jako oxid dusitý se chová i ekvimolární směs NO + NO<sub>2</sub>, resp. směs NO + O<sub>2</sub> v náležitém poměru.

# Kyslíkaté sloučeniny dusíku

Oxid dusitý považujeme za anhydrid kyseliny dusité



V alkalickém prostředí poskytuje  $\text{N}_2\text{O}_3$  dusitan




Se silnými kyselinami reaguje  $\text{N}_2\text{O}_3$  za vzniku kationtů  $\text{NO}^+$




# Kyslíkaté sloučeniny dusíku

**Kyselina dusitá  $\text{HNO}_2$**



**Středně silná kyselina ( $K_a = 6 \cdot 10^{-4}$ )**

**Vznik**



**Příprava**




**Kyselina dusitá je nestálá**, už při pokojové teplotě disproporcionuje



**Redoxní vlastnosti  $\text{HNO}_2$**

# Kyslíkaté sloučeniny dusíku

Soli (**dusitany**) jsou  
v pevném stavu stálé



**NaNO<sub>2</sub>** pro průmyslové účely se připravuje absorpcí nitrózních plynů



Oxidace dusitanu silnými oxidačními činidly



**permanganatometrické stanovení dusitanů**

Pozn.: **Dusitany jsou jedovaté !**

# Kyslíkaté sloučeniny dusíku

+IV



## Oxid dusičitý $\text{NO}_2$ , resp. $\text{N}_2\text{O}_4$



21,2 °C	0,1 %
100 °C	90 %
140 °C	100 %


bezbarvá diamagnetická forma

hnědá paramagnetická forma



resonanční struktury

### Příprava



neobvykle dlouhá vazba N-N

### Výroba



# Kyslíkaté sloučeniny dusíku

Reaktivita **oxidu dusičitého** je značná a je důsledkem přítomnosti jednak nepárového elektronu, jednak  $\pi_p$  vazeb

Disproporcionace



následuje:



princip průmyslové výroby kyseliny dusičné

V alkalickém prostředí, v němž jsou dusitany stálé, probíhá také disproporcionační reakce



Za vysoké teploty (nad 150 °C) se rozkládá




Pozn. : Rozklad je úplný při asi 650 °C. Tím si vysvětlujeme mohutné oxidační vlastnosti  $\text{NO}_2$  při vyšších teplotách (v atmosféře  $\text{NO}_2$  hoří uhlík, fosfor, síra a řada kovů).

# Kyslíkaté sloučeniny dusíku

+V

## Oxid dusičný $N_2O_5$

Výroba opatrnnou dehydratací




Je anhydridem  
kyseliny dusičné



Má mohutné  
oxidační účinky




$NO_2$  podléhá iontové disociaci a poskytuje  
soli nitrylu



(t. tání 30 °C)

# Kyslíkaté sloučeniny dusíku

## Kyselina dusičná $\text{HNO}_3$




V krystalickém stavu bezbarvá,  
v kapalném stavu je zbarvena žlutě  
(teplota tání - 41,6 °C, teplota varu 84 °C)

Vytváří hydráty  $\text{HNO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$  a  $\text{HNO}_3 \cdot 3 \text{H}_2\text{O}$

Do prodeje přichází jako 68% azeotrop  
(t. varu 121,9 °C)

## Schema výroby



# Kyslíkaté sloučeniny dusíku

Výroba bezvodé  $\text{HNO}_3$  – původní výroba  $\text{HNO}_3$  z chilského ledku



resp. vakuovou destilací konc.  $\text{HNO}_3$  s konc.  $\text{H}_2\text{SO}_4$ , popř.  $\text{Mg}(\text{ClO}_4)_2$

Rozpuštěním  $\text{NO}_2$  v bezvodé  $\text{HNO}_3$  se získává tzv. dýmová kyselina dusičná, používaná v organické chemii pro nitrace.

Autoprotolýza


nitratacidium



zásada

# Kyslíkaté sloučeniny dusíku

Rozdíly v chování zředěné (pod 5 %) a koncentrované  $\text{HNO}_3$



průběh závisí na koncentraci  $\text{HNO}_3$

Z ušlechtilých kovů takto nereagují pouze Au, Pt, Rh a Ir, reaguje však stříbro i rtuť.

Konc.  $\text{HNO}_3$  sloužila k oddělování (odlučování) zlata a stříbra, odtud historický název „lučavka“.

Lučavka královská

směs konc.  $\text{HCl}$  a konc.  $\text{HNO}_3$  (3 : 1)

Má mnohem silnější oxidační vlastnosti  
reaguje i se Au a Pt



Pozn.: Podobné vlastnosti má i směs  $\text{H}_2\text{SeO}_4 + \text{HCl}$ .


# Kyslíkaté sloučeniny dusíku

Oxidační vlastnosti konc.  $\text{HNO}_3$  se projevují i vůči nekovovým prvkům:  
např. fosfor je oxidován až na  $\text{H}_3\text{PO}_4$ , síra na  $\text{H}_2\text{SO}_4$ , jod na  $\text{HIO}_3$ .

**Dusičnany** Jsou všechny rozpustné, není-li barevný kation, jsou bezbarvé.

## Možnosti přípravy dusičnanů

neutralizace



podvojný rozklad



rozpuštění kovů v kyselině

# Kyslíkaté sloučeniny dusíku


Vodné roztoky dusičnanů postrádají oxidační vlastnosti.

V taveninách jsou však dusičnany silná oxidační činidla (historická výroba černého střelného prachu).

Všechny dusičnany jsou termicky nestálé, rozklad probíhá různě podle druhu kationtu.



# Halogenidy nitrylu



# Kyslíkaté sloučeniny dusíku

## Použití HNO<sub>3</sub>

Použití HNO<sub>3</sub> je obrovské.

výroba průmyslových hnojiv (ledek sodný, draselný, vápenatý, amonný)

výroba dusitanů má HNO<sub>3</sub>

výroba nitrosloučenin, organických barviv, léčiv

jako základní chemikálie

Pozn. Existuje i kyselina orthodusičná H<sub>3</sub>NO<sub>4</sub>



# Sloučeniny s vazbou dusík - halogen

Výchozí látka	F	Cl	Br	I
$\text{NH}_3$	$\text{NH}_2\text{F}$	$\text{NH}_2\text{Cl}$	$\text{NH}_2\text{Br}$ expl.	$\text{NH}_2\text{I}$ expl.
	$\text{NHF}_2$	$\text{NHCl}_2$	$\text{NHBr}_2$ expl.	
	$\text{NF}_3$ velmi stálý	$\text{NCl}_3$	$\text{NBr}_3 \cdot 6\text{NH}_3$ expl.	$\text{NI}_3 \cdot \text{NH}_3$ expl.
$\text{N}_2\text{H}_4$	$\text{N}_2\text{F}_4$			
$\text{HN}_3$	$\text{FN}_3$ expl.	$\text{ClN}_3$ expl.	$\text{BrN}_3$ expl.	$\text{IN}_3$ expl.

Halogenderiváty amoniaku nemají s výjimkou **chloraminu  $\text{NH}_2\text{Cl}$**  (důležitý meziprodukt při výrobě hydrazinu) praktické použití.

# Sloučeniny s vazbou dusík - halogen

**fluoridy**

$\text{NH}_n\text{F}_{3-n}$  ( $n = 0 - 2$ ) elektrolýzou taveniny  $\text{NH}_4\text{HF}_2$  (vzniká i  $\text{N}_2\text{F}_2$ )




**chloridy**

$\text{NH}_n\text{Cl}_{3-n}$  ( $n = 0 - 2$ ) zaváděním chloru do roztoku chloridu amonného

$\text{NH}_2\text{Cl}$  pH > 8.5    $\text{NHCl}_2$  pH ≈ 5    $\text{NCl}_3$  pH < 4.5

## Reakce halogenidů dusitých



**jodidy**

$\text{NI}_3 \cdot \text{NH}_3$       “jododusík”

jeho vznik je možný při reakcích  
amoniaku se sloučeninami jodu –  
je silně explozivní

# Sloučeniny s vazbou dusík - síra

Jednoduchá vazba N-S je velmi pevná.

Běžně se vyskytuje v amidech sulfonových kyselin

Př. **sulfonamidy** (farmaceutika) R-SO<sub>2</sub>-NR<sub>2</sub>

**cyklamaty** (umělá sladidla) C<sub>6</sub>H<sub>11</sub>NH-SO<sub>3</sub>Na

## Binární sloučeniny dusíku a síry

**Tetranitrid tetrasíry S<sub>4</sub>N<sub>4</sub>**

Oranžové krystaly (t. t. je 178 °C), záhřevem, třením, úderem snadno vybuchující.



Existuje celá řada **thiazenových sloučenin** obsahujících  
vazebné seskupení **S – N - halogen**