



## 6. JADERNÉ REAKCE

Jadernou reakcí se rozumí **binukleární proces přeměny jádra**.




Zkrácený zápis jaderných reakcí umožňuje snadné členění reakcí na reakce typu: **(α,p); (α,n); (n,γ); (d,p)**, aj.

**Platí zákony zachování :**

nábojového, nukleonového, protonového čísla  
energie  
hybnosti

## Energetika jaderných reakcí




Rozhodující pro určení energie procesu je porovnání klidových hmotností častic před reakcí a po ní:

$$Q = -931,5 \Delta m \text{ (v MeV)}$$

**(energie 931,5 MeV je ekvivalentní hmotnostní jednotce)**

Reakce proběhne, jestliže má projektil tzv. prahovou energii – (její velikost lze odvodit ze zákona zachování hybnosti)

- výtěžek jaderné reakce při prahové energii projektilu je malý
- prakticky se reakce provádí s jaderným projektilem o vyšší energii, než je energie prahová
- výtěžek jaderné reakce je funkcí energie jaderného projektilu (excitační funkce)



Excitační funkce jaderných reakcí: a – endoergická reakce; b – exoergická reakce kladných projektilů; c – exogická reakce neutronů; d – reakce s rezonancemi.

- exoergické reakce nemívají prahovou energii
- u kladných projektilů je však nutná jistá kinetická energie, aby se překonalo coulombická bariéra
- exoergické reakce neutronů probíhají s největším výtěžkem při nulové kinetické energii neutronů

- někdy se pravděpodobnost reakce zvyšuje – rezonance (odpovídá např. energetickým hladinám nukleonů apod.)

## B) Charakteristiky jaderných reakcí

**Okamžitá rychlosť jaderné reakcie** = časová změna (přírůstek) počtu atomů vznikajícího nuklidu ( $N^*$ )

$$R = \frac{dN^*}{dt} \sigma \phi N$$

$\phi$  - tok častic (počet projektilů dopadajících na plošnou jednotku terče za časovou jednotku)

$N$  - počet terčových jader

$\sigma$  - účinný průřez [ $m^2$ ], stará jednotka 1 Barn =  $10^{-28} m^2$   
- vyjadřuje pravděpodobnost zásahu terč. jádra, zpravidla se liší svou hodnotou od geometrického průřezu

Závisí:

- na energii projektilu,
- na typu jaderné reakce
- na excitační funkci

Reakce	$\sigma (m^2)$	Pozn.
$^{10}\text{B}(n,\alpha)^7\text{Li}$	$3,8 \cdot 10^{-25}$	pomalé neutrony
$^{238}\text{U}(n,\gamma)^{239}\text{U}$	$2,7 \cdot 10^{-28}$	pomalé neutrony
$^{249}\text{Cf}(^{15}\text{N},4n)^{260}\text{Rf}$	$3 \cdot 10^{-33}$	vliv coulombické bariéry

**Výtěžek jaderné reakce B** = poměr počtu vznikajících atomů k počtu projektilů dopadajících na terč (plocha terče je S)

$$B = \frac{dN^*}{dt} \cdot \frac{1}{\phi S} = \frac{\sigma N}{S}$$

- velké výtěžky jsou typické pro exoergické reakce pomalých neutronů
- výtěžek reakce se zpravidla vyjadřuje aktivitou vzniklého radionuklidu

**Kinetika jaderné reakce** = závislost počtu atomů vzniklých jadernou reakcí ozařováním ( $N^*$ ) na době ozařování, R je „rychlostní“ konstanta

$$N^* = Rt = \sigma\phi Nt$$

Vzniká-li radioaktivní nuklid, dochází během ozařování k jeho rozpadu

$$\frac{dN^*}{dt} = R - \lambda N^*$$

---

$N^* = \frac{R}{\lambda}((1 - e^{-\lambda t}))$	$A = R(1 - e^{-\lambda t})$
---	-----------------------------

---

- aktivita vznikajícího nuklidu roste zpočátku poměrně rychle
- během delšího ozařování člen  $(1 - e^{-\lambda t}) \rightarrow 1$  a aktivita limituje ke konstantní hodnotě – **nasycená aktivita  $A_s$**  (obdoba trvalé radioaktivní rovnováhy)


$$A_s = \sigma\phi N$$

- delším ozařováním nelze získat delší aktivitu
- $A_s$  je dána typem ozařovacího zařízení, terčem, druhem projektlu a jeho energií
- pokud vzniká radionuklid s dlouhým poločasem rozpadu (tj. rychlosť jeho přeměny je ve srovnání s rychlosťí jeho vzniku malá), pak se soustava chová jakoby vznikal stabilní nuklid – delší ozařování se tedy projeví větším výtěžkem

## Průběh jaderné reakce

Složené jádro (vychází z kapkového modelu jádra)

Vzniká při pohlcení jaderného projektlu terčovým jádrem



- excitační energie pochází z kinetické energie projektlu a z vazebné energie, která se uvolní při zachycení projektlu
- tato energie se rovnoměrně rozdělí mezi nukleony
- energie nukleonů se při vzájemných srážkách neustále přerozděluje
- může se stát, že některý nukleon získá takovou energii, která mu umožní opustit složené jádro  $\Rightarrow$  nastává druhá fáze procesu (**rozpad složeného jádra**)




- excitační energie složeného jádra se zmenší o vazebnou a kinetickou energii emitované částice
- je-li excitační energie složeného jádra značná, může se uvolnit i více nukleonů

reakce typu ( $\alpha$ , pn), (n,2n), (těžký ion, 4n)

- nadbytečná energie, která již nestačí k emisi nukleonu, se vyzáří jako fotony  $\gamma$ -záření (jediný způsob deexcitace u nízkých excitačních energií ... reakce typu (n,  $\gamma$ )
- doba života složeného jádra je  $10^{-16} - 10^{-14}$  s – doba dostatečná k přerozdělení energie

- osud složeného jádra nezávisí na jeho vznik a při rozpadu složeného jádra mohou vznikat různé produkty



- různými reakcemi může vznikat tentýž nuklid

