

M U N I

M E D



**M U N I**  
**M E D**

**12**

# **Motorika II**

# Úvod

Reflexní pohyb  
Rytmický pohyb  
Volní pohyb



[http://www.frontiersin.org/files/Articles/42416/fnhum-07-00085-HTML/image\\_m/fnhum-07-00085-g001.jpg](http://www.frontiersin.org/files/Articles/42416/fnhum-07-00085-HTML/image_m/fnhum-07-00085-g001.jpg)

# Subkortikální (kmenové) dráhy pro kontrolu dolních motoneuronů

## Mediální systém


- Kontrola axiálních svalů
- Tr. Vestibulospinalis
  - Reflexní kontrola rovnováhy a posturální motoriky
- Tr. Reticulospinalis
  - Regulace svalového tonu (posturální motorika)
- Tr. Tectospinalis
  - Koordinace pohybu hlavy a očí

## Laterální systém

- Kontrola distálních svalů
- „Reflexní“ motorika končetin
- Původní funkce nahrazena tr. corticospinalis
- Tr. Rubrospinalis
- Tr. Rubrobulbaris

# Pohybové vzorce a rytmické pohybové vzorce


- Fixed action patterns (např. polykání)
  - Neuronové sítě zajišťující komplexní motorickou akci
- Central pattern generator (např. chůze, dýchání)
  - Neuronové sítě produkující rytmickou aktivitu
  - „Spontánně opakované fixed action patterns“
  - Zpětná vazba není nutná



<http://www.slideshare.net/drpsdeb/presentations>

# Pohybové vzorce a rytmické pohybové vzorce

- Fixed action patterns (např. polykání)
  - Neuronové sítě zajišťující komplexní motorickou akci
- Central pattern generator (např. chůze, dýchání)
  - Neuronové sítě produkující rytmickou aktivitu
  - „Spontánně opakované fixed action patterns“
  - Zpětná vazba není nutná
- Lokalizace
  - Chůze – mozkový kmen, dolní hrudní a lumbální mícha
  - Dýchání – mozkový kmen
  - Polykání - prodloužená mícha/kmen
- Různě vyjádřená kortikální modulace
  - Chůze (možno plně kontrolovat)
  - Dýchání (možno částečně kontrolovat)
  - Polykání (možno zahájit)



<http://www.slideshare.net/drpsdeb/presentations>

# Pohybové vzorce a rytmické pohybové vzorce





Fig. 1. Neural control of locomotion. A) Increments in the intensity of stimulation of the MLR in the high decerebrate cat increased the cadence (step cycles/sec) of locomotion. Adapted from Shik et al. 1966.<sup>[22]</sup> B) Schematic of the velocity command hypothesis: a command signal specifying increasing body velocity descends from deep brain nuclei via the MLR to the spinal cord and drives the timing element of the spinal locomotor CPG to generate cycles of increasing cadence. Extensor phase durations change more than flexor phase durations. The command signal also drives the pattern formation layer to generate cyclical activation of flexor and extensor motoneurons. Loading of the activated muscles (e.g. supporting the moving body mass) is resisted by the muscles' intrinsic spring-like properties. This is equivalent to displacement feedback. Force and displacement sensed by muscle spindle and Golgi tendon organ afferents reflexly activate motoneurons. A key role of these afferents is to adjust the timing of phase transitions, presumably by influencing or overriding the CPG timer. Adapted from Prochazka & Ellaway 2012.<sup>[23]</sup>

# Pohybové vzorce a rytmické pohybové vzorce

Whelan PJ. Shining light into the black box of spinal locomotor networks. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London B: Biological Sciences*. 2010;365:2383–2395.

Figure 1. Schematic of model by Rybak & McCrea. The populations of interneurons are indicated by spheres, while the motoneurons are represented by diamonds. This three-layer model consists of a rhythm-generating layer of extensor (RG-E) and flexor (RG-F) interneurons. Both populations have recurrent excitatory connections (see also figure 2). These interneurons in turn receive mutually inhibitory input (Inrg cells). The drive projects to a pattern formation layer (PF), which acts through mutually inhibitory connections (Inpf cells) to sculpt the pattern, which is then output to the extensor and flexor motoneurons. The final output of the motoneurons is modulated by a final layer of Ia inhibitory interneurons (Ia-E, Ia-F) and Renshaw cells (R-E, R-F). Arrows indicate excitatory drive, while the filled circles indicate inhibitory drive. Reproduced with permission.






# Kortikální dráhy pro kontrolu dolních motoneuronů

**Tractus corticospinalis**

**Tractus corticobulbaris**

Volní motorika


# Volní motorika



<http://www.slideshare.net/drpsdeb/presentations>

# Volní motorika


- Výsledek součinnosti horního a dolního motoneuronu
- Bazální ganglia
  - Motorický „gating“ – iniciace žádoucích a inhibice nežádoucích pohybů
- Mozeček
  - Koordinace pohybu



<http://www.slideshare.net/drpsdeb/presentations>


# Pyramidová dráha

- Horní motoneuron
  - Primární motorický kortex
- Dolní motoneuron
  - Přední roh míšni
- Tractus corticospinalis lateralis
  - 90% vláken
- Tractus corticospinalis anterior
  - 10% vláken
  - Nejkaduálnější vlákna zasahují do horních thorakálních segmentů
- Tractus corticobulbaris



[http://images.slideplayer.com/14/4330915/slides/slide\\_34.jpg](http://images.slideplayer.com/14/4330915/slides/slide_34.jpg)


# Primární motorický kortex



Copyright © Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings.

# Kortikální motorické oblasti


- Primární motorická oblast (area 4)
  - Somatotopické uspořádání
  - Kontrola dolních motoneuronů
- Premotorický kortex (area 6 laterálně)
  - Příprava strategie pohybu pohybu
    - Sensorimotorická transformace
    - Výběr pohybových vzorců
- Suplementární motorická oblast (area 6 mediálně)
  - Podílí se na plánování komplexních pohybů
    - Pohyby pomocí obou končetin
    - Složité pohybové sekvence
  - Aktivována i při představení si komplexního pohybu



<http://www.slideshare.net/CsillaEgri/presentations>


# Bazální ganglia

- Corpus striatum
  - Nucleus caudatus
  - Putamen
- Globus pallidus (Pallidum)
  - Externum
  - Internum
- Nucleus subthalamicus
- Substantia nigra
  - Pars compacta
  - Pars reticulata
- Motorická jádra thalamu



# Bazální ganglia

- Corpus striatum
  - Nucleus caudatus
  - Putamen
- Globus pallidus (Pallidum)
  - Externum
  - Internum
- Nucleus subthalamicus
- Substantia nigra
  - Pars compacta
  - Pars reticulata
- Motorická jádra thalamu






# Bazální ganglia - vstup <sup>Cerebrum</sup>

## Corpus striatum

- Kromě primární zrakové a primární sluchové kůry dostává informace ze všech korových oblastí
- Nejvíce informací
  - Z asociačních oblastí (frontální a parietální)
  - Z motorických oblastí



# Bazální ganglia

Řízení motoriky realizováno dvěma okruhy



## ✓ Přímá dráha

Aktivace motorického kortexu

## ✓ Nepřímá dráha

Inhibice motorického kortexu


# Přímá dráha



<http://www.slideshare.net/drpsdeb/presentations>


# Přímá dráha

- Motorická jádra thalamu aktivují motorický kortex




# Přímá dráha

- Motorická jádra thalamu aktivují motorický kortex
- GPi tonicky tlumí motorická jádra thalamu




# Přímá dráha


- Motorická jádra thalamu aktivují motorický kortex
- GPi tonicky tlumí motorická jádra thalamu
- Aktivované corpus striatum pulsně inhibuje GPi, což přechodně desinhibuje motorická jádra thalamu



# Nepřímá dráha




(B) Indirect and direct pathways



<http://www.slideshare.net/drpsdeb/presentations>

# Nepřímá dráha


- NS aktivuje GPi






# Nepřímá dráha

- NS aktivuje GPi
- GPe tonicky tlumí NS



# Nepřímá dráha

- NS aktivuje GPi
- GPe tonicky tlumí NS
- Corpus striatum pulsně inhibuje GPe




<http://www.slideshare.net/drpsdeb/presentations>

# Nepřímá dráha

- NS aktivuje GPi
- GPe tonicky tlumí NS
- Corpus striatum pulsně inhibuje GPe

↓  
Desinhibice NS  
↓  
Aktivace Gpi




<http://www.slideshare.net/drpsdeb/presentations>

# Nepřímá dráha

- NS aktivuje GPi
- GPe tonicky tlumí NS
- Corpus striatum pulsně inhibuje GPe

↓  
Desinhibice NS  
↓  
Aktivace Gpi

(B) Indirect and direct pathways



<http://www.slideshare.net/drpsdeb/presentations>

# Nepřímá dráha

- NS aktivuje GPi
- GPe tonicky tlumí NS
- Corpus striatum pulsně inhibuje GPe




Desinhibice NS



Aktivace Gpi


- Existuje také méně významná přímá inhibice Gpi z GPe

(B) Indirect and direct pathways



# Rozdíl mezi přímou a nepřímou dráhou


- Přímá dráha
  - Aktivace motorického kortexu
- Nepřímá dráha
  - Inhibice motorického kortexu



# Rozdíl mezi přímou a nepřímou dráhou

- Přímá dráha
  - Aktivace motorického kortexu
- Nepřímá dráha
  - Inhibice motorického kortexu


(B) Indirect and direct pathways



**Nepřímá dráha může být považována za „brzdu“, která doladuje „akcelerační efekt“ přímé dráhy**

# Dopaminergic projections

- Pro činnost corpus striatum je stěžejní dopaminergní projekce ze s. nigra pars compacta






# Dopaminergic projections


- Pro činnost corpus striatum je stěžejní dopaminergní projekce ze s. nigra pars compacta
- Aktivace přímé dráhy
  - D1 receptory
- Inhibice nepřímé dráhy
  - D2 receptory

(B) Indirect and direct pathways




# Bazální ganglia

- Vedle motorické smyčky existují i další smyčky, které jdou přes jiná thalamická jádra
- „Gating“ jiného druhu informace
- Asociační smyčka
- Limbická smyčka
- Bazální ganglia hrají významnou roli v procesu myšlení
- Spojky corpus striatum jsou plastické, což umožňuje učení a toto mělo nesmírný evoluční význam



# Mozeček

- Koordinace
- Podobně jako bazální ganglia hraje i mozeček nezastupitelnou roli nejen při koordinaci pohybu, ale i při „koordinaci“ myšlenek



## 80. Hierarchická organizace motorického systému – reflexní vs. volní pohybová aktivita

- Hierarchie pohybové aktivity
  - Reflex – ekonomický, uniformní, rychlý
  - Rytmický – ekonomické řešení pro uniformní komplexní pohyby (dýchání chůze...)
  - Volní – neekonomický, unikátní, relativně pomalý
- Klasifikace a základní popis reflexů
- Fixed action pattern rytmický pohyb (definice, příklady)
- Volní pohybová aktivita
  - Přehled struktur zapojených do plánování a realizace volní pohybové aktivity
  - Organizace motorického kortexu (primární, premotorický a suplementární...)
  - Základní popis pyramidové dráhy

## 81. Základní funkce bazálních ganglií

- Stručný popis funkce bazálních ganglií (smyčky, motorická, nemotorická)
- Přehled jader a spojů bazálních ganglií
- Popis přímé a nepřímé dráhy

M U N I

M E D