



Důležité fosílie

STRATIGRAFICKÉ ROZŠÍŘENÍ DŮLEŽITÝCH ŽIJÍCÍCH



A VYHYNULÝCH SKUPIN ŽIVOČICHŮ



Dírkovci (Foraminifera)


Prvoci s vnější schránkou různých tvarů

Většinou mikroskopická velikost a planktonní způsob života.

V některých případech (karbonské fussuliny a paleogenní nummuliti) i makroskopická velikost a bentózní způsob života.



FORAMINIFERA








Trilobiti

Kambrium-perm – vůdčí (indexová) mořská fosílie paleozoika

Členovci, vnější krunýř rozdělen na **hlavový štít** (cephalon), **trupový štít** (thorax) a **ocasní štít** (pygidium).

Pohyblivý bentos (život na dně, ovšem nepřisedle), filtrátoři, dravci.





Ramenonožci (Brachiopoda)




Kambrium - recent

Bezobratlí se schránkou tvořenou dvěma **nestejnými miskami**. Rovina souměrnosti schránky probíhá podélně napříč miskami. Přisedlý bentos, upevňování ke dnu stvolem, Uvnitř spirálně stočená ramena s brvami - filtrování potravy.



Graptoliti

Koloniální polostrunatci. Vnější schránka složena z dílčích větví s komůrkami.
V každé komůrce jeden živočich.
Kambrium-karbon, silur – významná složka planktonu (graptolitové břidlice).




Tentakuliti


Měkkýši s jehlicovitou schránkou.
Ordovik-devon

V devonu významná složka planktonu
- tentakulitové břidlice.







Drsnatí koráli (Rugosa)
Kambrium-perm



Deskatí koráli (Tabulata)
Kambrium-perm





Ostnokožci (Echinodermata)



Lilijice (ordovik-recent) – kořeny, stonky, koruna s rameny. Přisedlý bentos i plankton. Stonky s kruhovitých článků.


Ježovky (kambrium-recent)





Loděnkovití hlavonožci (Nautiloidea)
 Kambrium-recent (dnes loděnka-Nautilus)
 Draví měkkýši, nektonní způsob života.
 Vnější schránka různého tvaru.
Uvnitř schránka rozdělena přepážkami (septy) na komůrky obsahující plyn.
 Ordovik, silur – důležití mořští predátoři –
 hlavonožcové (ortocerové) vápence.





C



Amoniti

způsobem života podobní loděnkovitým hlavonožcům,
rozdíl ve tvaru přepážek ve schránce.

Devon-křída

**Amoniti s nejvíce zprohýbanými přepážkami a nejkomplikovaněji
zprohýbanými švy pouze v juře a křídě.**



Rozdíl mezi nautiloidy a amonity ve stavbě sept

NAUTILOID



Přepážky (septa) mají tvar jednoduše vypouklých obloučků.

AMONIT



Přepážky (septa) jsou složitě zprohýbané.




Kvůli jednoduchosti sept mají švy (sutury) plynulý, téměř rovný průběh.



Kvůli zprohýbanosti sept mají švy (sutury) složitě klikatý průběh.

Měkkýši



Mlži

Dvě stejně velké misky rovina souměrnosti probíhá mezi miskami – rozdíl oproti ramenonožcům.

Plži a mlži

Dominantní složka mezozoických a kenozoických moří. Maximum diverzity v recentu



Plži

Jedna schránka nejčastěji ve tvaru prostorové spirály

Belemnitida - belemniti


Dvoužábří hlavonožci (devon – křída). Podle otisků měli 10 ramen s háčky, velké oči, sépiový vak, ploutve, rohovité čelisti – podobali se recentním sépiím.

Vnitřní schránka má 3 části:


proostrakum (štít) - zachovává se výjimečně.

fragmokon (kužel) - hydrostatické komůrky, sifonální trubice.


rostrum (hrot) - zachovává se nejčastěji.



Obr. 239. Vnitřní schránka rádu *Belemnitida*: a osová linie, b protokoncha, c kamerální uloženiny, d sifonální trubice, e septa, f konotéka (SPAETH 1976).



Převzato z Kvačka et al. (2007).



Kambrium




Ordovik-perm




Mezozoikum-recent

Psilofytní rostliny

Nejstarší suchozemská flóra.
Nerozlišeny kořeny, stonek a listy.
Rozdělují se do pěti oddělení.
Svrchní silur – spodní karbon,
maximum rozvoje – spodní devon.




Odd. **Zosterophyllophyta**
Telomy pokryté ostnitými výrůstky
- evoluční základ
mikrofylního olistění plavuní.



Kaprad' samec
www.garten.cz



Odd. **Trimerophytophyta**
Zploštění a srůst telomů
- evoluční základ
makrofylního olistění kapradin.



Plavuň vidlačka.
Foto J. Barvínek.

Pteridofytní rostliny – kapradorosty

Redukovaný gametofyt, **sporofyt již má rozlišeny kořeny, stonek, listy** a výtrusnice se sporami.

Dnes převážně bylinné formy, ve svrchním paleozoiku a triasu hojně stromovité formy.

Dnes mají stromovitý charakter jen některé tropické kapradiny.

Rozdělení:


Lycopodiophyta (Lycophyta) – **plavuně** (spodní devon – recent)

Polypodiophyta (Pterophyta) – **kapradiny** (střední devon – recent)

Equisetophyta (Sphenophyta) – **přesličky** (svrchní devon – recent)

Progymnospermophyta – **prvosemenné rostliny** (střední devon – svrchní karbon)

Stromovité plavuně



Lepidodendron

Stromovité plavuně

Kmeny – 85 % kůra, výška až 30 m.


Horní část kmene – asimilační listy – **listové polštářky**.

Lepidodendron – spirálovité uspořádání, vřetenovitý tvar.

Sigillaria – svislé řady, 6-ti boký tvar.

Odpladlé kusy kůry – **dekortikáty**.


Kořenový systém –**stigmarie** s kořeny (**appendices**).




Cleal, Thomas 2009




listové polštářky
- jizvy po odpadlých listech




Sigillaria



Kvaček et al. 2007



Stromovité přesličky




Výška až 20 m.
Podzemní oddenky a nadzemní kmeny.
Kmeny článkované – články (internodia)
a uzly (nody).
Kalamity – výplně dřeňových dutin kmenů
s otisky cévních svazků (podélné rýhy).
Dřeňovou dutinu obklopovalo druhotné dřevo,
narozdíl od bylinných přesliček.
Větve vyrůstaly přeslenitě z nodů.
Samotné větve porostlé přesleneny
jednožilných listů – např. *Annularia*



kalamit



Průřez stonkem recentní přesličky.
Foto: J. Kameníček



Annularia – límečkovitě srostlé přeslenité
listy na větvích přesliček




Přeslička největší. Foto: P. Vobořil.

Stromovité kapradiny



Recentní stromovité kapradiny, Jáva.
Foto V. Patrovská-Vernerová

Výška až 10 m
Mineralizované kmeny
- *Psaronius*
Listy - *Pecopteris*





Tropická až subtropická bioprovincie, Brandovská pánev (reliktní výskyt karbonu a permu v Krušných horách). Rekonstrukce Jiřího Svobody a Stanislava Opluštila.
L – *Lepidodendron*, **S** – *Sigillaria*, **C** – *Calamites*, **sk** – stromovité kapradiny,
Co – *Cordaites* (nahosemenná rostlina)

Gymnospermické (nahosemenné) rostliny

Vajíčko je opyleno pylovou láčkou. **Vajíčka nejsou skryta v semeníku, ale jsou volně přístupná** jednotlivě na listech nebo na stopkách.

Částečně mohou být skryta v šišticích. Po oplození vajíčka vzniká **semeno**.

Rozdělení:

Lyginodendrophyta (Pteridospermophyta) – **kapardosemenné** (svrchní devon – křída)

Cycadophyta – **cykasovité** (vlastní cykasovité: svrchní karbon – recent, benetity: trias – křída)



Ginkgophyta – **jinanovité** (perm – recent, maximum v mesozoiku)

Pinophyta – **jehličnaté** (karbon – recent, v jejich rámci třída Pinopsida – jehličnany)

Gnetophyta - **gnetovité** (hlavně v mesozoiku)

Pinopsida – jehličnany

Velikostní redukce původně megafylních listů do podoby **jehlic** – adaptace na aridizaci klimatu během permu (zvětšování plochy souší po konsolidaci Pangei). Konec **paleofytika** (dominance psilofyt a kapraďorostů) a počátek **mezofytika** (dominance nahosemenných méně závislých na vodním prostředí).



Walchia. Rekonstrukce Zdeňka Buriana.



Walchia

Dříve označována i rodovým názvem *Lebachia*.
Menší stromy, větvení v plochých přeslenech.
Větve porůstají šroubovitě uspořádané,
slabě odstávající jehlice.
Větvičky walchií – hojně fosílie v permských
prachovcích – **walchiové lupky** (Boskovická brázda,
vnitrosudetská a podkrkonošská pánev aj.).

Miocenní úhlotvorné jehličnany

Mělké pánve zatopené jezery. Zarůstání jezer vegetací – vznik rašeliniště – sloje **hnědého uhlí**. Hlavní rostliny: tisovce, patisovce a pasekvoje.
Např. severočeské pánve oherského riftu, hlavně **mostecká pánev**.



Tisovec pochybný
(Taxodium dubium)
Koncové větve s dvouřadě
sestavenými jehlicemi.
Dýchací kořeny k přijímání
vzdušného kyslíku

Pasekvoj Couttsiové
(Quasisequoia couttsiae)
Kmeny s průměrem až v 2 m



Hnědouhelný močál mostecké pánve. Rekonstrukce Karla Macha.



Recentní močál s tisovci. Foto: Steven J. Baskauf.

Cycadophyta - cykasovité

Málo rozvětvené i nevětvené, s nevysokými, někdy až soudečkovitými kmeny s chocholem zpeřených listů podobných listům palem.

Cykasy (sv. karbon – recent, maximum trias, jura).

Benetity (trias – křída)




cykas indický, Havaj,
Foto: F. a K. Starr



Cykasovité + jehličnaté araukárie – typická flóra mesozoika, především triasu a jury. Mezofytikum (sp. perm – křída). Rekonstrukce Zdeňka Buriana.



Listy benetitů - *Pterophyllum*



Bentity – rekonstrukce stromu,
šištice připomínající květy

Angiosperimické (krytosemenné) rostliny

Vajíčko je ukryto v **semeníku** – spodní části pestíku. Oplození prostřednictvím pylové láčky. Objevují se ve svrchní juře a od svrchní křídy se začínají značně rozvíjet (**neofytikum**). Tento vývoj pokračuje do recentu.



Credneria bohemica
svrchní křída,
perucké vrstvy
Kunštát



Magnolia, sv. křída, perucké vrstvy, Maletín




Olše
Alnus julianiformis,
miocén, mostecká pánev



Skořicovník
Daphnogene
miocén, mostecká pánev



Vřesna voskonosnovitá
Myrica ceriferiformis,
miocén, mostecká pánev




Paleofytikum

Psilofytová flóra


Brakické a sladkovodní prostředí Laurussie
a dalších rovníkových pevnin.



Orig. Zdeněk Burian



Paleofytikum Karbon – v tropech pralesy stromových kapraďorostů, v mírných šírkách nahosemenné rostliny. Během permu zvětšení rozlohy Pangei – aridizace, začátek dominance nahosemenných – **mezofytikum**.




Karbonská flóra


Orig. Zdeněk Burian



Permská flóra



Mezozoická flóra



Triasový prales, mezofytikum

Orig. Zdeněk Burian

Perm – křída – **mezofytikum** – jehličnany, cykasy, benetity, jinany aj.

V křídě vznik krytosemenných rostlin – neofytikum.
Neofytikum trvá dodnes.

Kenozoická flóra (neofytikum)

