

## 2. domácí úkol – MIN301 – podzim 2020 – odevzdat do **11.11.2020**

Uvažme kruh  $D \subset \mathbb{R}^2$  se středem  $[1, 1]$  a poloměrem 1 a dále množinu

$$A = \{[x, y] \in D \mid y \leq e^x, y \leq \frac{3}{2}, y \geq x\}$$

a integrál  $I = \iint_A f(x, y) dx dy$  pro spojitou funkci  $f(x, y)$  dvou proměnných. Popište meze pro jednotlivé souřadnice při výpočtu  $I$  při obou možných pořadích integrace, tj.

- (a) napište  $I$  jako integrál  $\int_*^* \int_*^* f(x, y) dx dy$  (nebo součet více takových integrálů), kde místo \* doplníte vhodné meze,
- (b) napište  $I$  jako integrál  $\int_*^* \int_*^* f(x, y) dy dx$  (nebo součet více takových integrálů), kde místo \* doplníte vhodné meze.

Dále určete extrémy funkce  $g(x, y) = x - y$  na množině  $A$ . (Jako nápovědu poznamenejme, že  $A$  je kompaktní množina.)

**Řešení:** Hranice oblasti  $A$  je tvořena částí přímky  $y = x$ , částí kružnice (hranice kruhu  $D$ ), částí křivky  $y = e^x$  a částí přímky  $y = 3/2$ , přičemž „vrcholy“ jsou  $[3/2, 3/2]$ ,  $[-\frac{\sqrt{2}}{2} + 1, -\frac{\sqrt{2}}{2} + 1]$ ,  $[0, 1]$  a  $[\ln(3/2), 3/2]$ . (Nakreslete si obrázek!) Hranice kruhu  $D$  je dána grafem křivek  $y = 1 \pm \sqrt{x(2-x)}$ . Tedy na jednu stranu máme

$$I = \int_0^{-\frac{\sqrt{2}}{2}+1} \int_{1-\sqrt{x(2-x)}}^{e^x} f(x, y) dy dx + \int_{-\frac{\sqrt{2}}{2}+1}^{\ln(3/2)} \int_x^{e^x} f(x, y) dy dx + \int_{\ln(3/2)}^{3/2} \int_x^{3/2} f(x, y) dy dx$$

a na druhou stranu máme

$$I = \int_{-\frac{\sqrt{2}}{2}+1}^1 \int_{1-\sqrt{y(2-y)}}^y f(x, y) dx dy + \int_1^{3/2} \int_{\ln y}^y f(x, y) dx dy.$$

Na kompaktní množině nabývá funkce  $g(x, y)$  svého maxima a minima. Tato funkce  $g(x, y)$  nemá lokální extrémy, tedy se maximum a minimum realizuje na hranici  $A$ . Podobnou úvahou pro jednotlivé hraniční křivky dojdeme k tomu, že maximum a minimum se realizuje v některém z výše uvedených „vrcholů“ na hranici. Máme

$$g\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right) = 0, \quad g\left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + 1, -\frac{\sqrt{2}}{2} + 1\right) = 0, \quad g(0, 1) = -1, \quad g\left(\ln\left(\frac{3}{2}\right), \frac{3}{2}\right) = \ln\left(\frac{3}{2}\right) - \frac{3}{2}$$

kde  $\ln\left(\frac{3}{2}\right) - \frac{3}{2} < -1 < 0$ . První dvě hodnoty na předchozím řádku také napovídají, že  $g(x, y) = 0$  pro všechny body na přímce  $y = x$ . Tedy funkce  $g(x, y)$  má na množině  $A$  minimum v bodě  $[\ln(\frac{3}{2}), \frac{3}{2}]$  a maximum ve všech bodech úsečky  $y = x$  mezi body  $[\frac{3}{2}, \frac{3}{2}]$  a  $[-\frac{\sqrt{2}}{2} + 1, -\frac{\sqrt{2}}{2} + 1]$ .