

# **Spojitost a limita funkce**

M1030 Matematika pro biochemiky  
22. 10. 2020

## **Spojité funkce**

Spojitost

Spojitost v bodě

Exkurs: výroky s kvantifikátory

Operace se spojitými funkcemi

Spojitost na intervalu

Funkce spojité na uzavřeném intervalu

Limita funkce

---

# **Spojité funkce**

# **Spojitost**

Funkce je spojitá, pokud

# **Spojitost**

Funkce je spojitá, pokud

- její graf lze nakreslit bez přerušení kontaktu psacího nástroje s podložkou,

# **Spojitost**

Funkce je spojitá, pokud


- její graf lze nakreslit bez přerušení kontaktu psacího nástroje s podložkou, tj. její graf je souvislá křivka;

# Spojitost


Funkce je spojitá, pokud

- její graf lze nakreslit bez přerušení kontaktu psacího nástroje s podložkou, tj. její graf je souvislá křivka;
- malá změna nezávisle proměnné vyvolá malou změnu závisle proměnné.


# Spojitost v bodě




# Spojitost v bodě




# Spojitost v bodě



## Spojitost v bodě




# Spojitost v bodě







# Spojitost v bodě

Funkce spojité v bodě  $x_0$




Funkce nespojité v bodě  $x_0$




# Spojitost v bodě

Funkce  $f$  je spojitá v bodě  $x_0$ :




# Spojitost v bodě



Funkce  $f$  je spojité v bodě  $x_0$ :

- Funkce  $f$  je v bodě  $x_0$  definována,  $x_0 \in D(f)$ .


# Spojitost v bodě



Funkce  $f$  je spojitá v bodě  $x_0$ :

- Funkce  $f$  je v bodě  $x_0$  definována,  $x_0 \in D(f)$ .
- Je-li  $x$  „blízko“  $x_0$  pak je  $f(x)$  „blízko“  $f(x_0)$ .


# Spojitost v bodě



Funkce  $f$  je spojité v bodě  $x_0$ :

- Funkce  $f$  je v bodě  $x_0$  definována,  $x_0 \in D(f)$ .
- Je-li  $x$  „blízko“  $x_0$  pak je  $f(x)$  „blízko“  $f(x_0)$ .
- Zvolíme-li „měřítko blízkosti“  $\varepsilon$  závisle proměnné  $\varepsilon$ , lze k němu najít „měřítko blízkosti“  $\delta$  nezávisle proměnné takové, že když je  $x$  „blízko“ k  $x_0$  „podle měřítka“  $\delta$ , tak je  $f(x)$  „blízko“  $f(x_0)$  „podle měřítka“  $\varepsilon$ .

# Spojitost v bodě




Funkce  $f$  je spojité v bodě  $x_0$ :

- Funkce  $f$  je v bodě  $x_0$  definována,  $x_0 \in D(f)$ .
- Je-li  $x$  „blízko“  $x_0$  pak je  $f(x)$  „blízko“  $f(x_0)$ .
- Zvolíme-li „měřítko blízkosti“  $\varepsilon$  závisle proměnné  $\varepsilon$ , lze k němu najít „měřítko blízkosti“  $\delta$  nezávisle proměnné takové, že když je  $x$  „blízko“ k  $x_0$  „podle měřítka“  $\delta$ , tak je  $f(x)$  „blízko“  $f(x_0)$  „podle měřítka“  $\varepsilon$ .

$$x \in D(f) \quad |x - x_0| < \delta \quad |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

# Spojitost v bodě




Funkce  $f$  je spojité v bodě  $x_0$ :

- Funkce  $f$  je v bodě  $x_0$  definována,  $x_0 \in D(f)$ .
- Je-li  $x$  „blízko“  $x_0$  pak je  $f(x)$  „blízko“  $f(x_0)$ .
- Zvolíme-li „měřítko blízkosti“  $\varepsilon$  závisle proměnné  $\varepsilon$ , lze k němu najít „měřítko blízkosti“  $\delta$  nezávisle proměnné takové, že když je  $x$  „blízko“ k  $x_0$  „podle měřítka“  $\delta$ , tak je  $f(x)$  „blízko“  $f(x_0)$  „podle měřítka“  $\varepsilon$ .
- Ke každému kladnému číslu  $\varepsilon$

$$(\forall \varepsilon > 0) \quad x \in D(f) \quad |x - x_0| < \delta \quad |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

# Spojitost v bodě




Funkce  $f$  je spojitá v bodě  $x_0$ :

- Funkce  $f$  je v bodě  $x_0$  definována,  $x_0 \in D(f)$ .
- Je-li  $x$  „blízko“  $x_0$  pak je  $f(x)$  „blízko“  $f(x_0)$ .
- Zvolíme-li „měřítko blízkosti“  $\varepsilon$  závisle proměnné  $\varepsilon$ , lze k němu najít „měřítko blízkosti“  $\delta$  nezávisle proměnné takové, že když je  $x$  „blízko“ k  $x_0$  „podle měřítka“  $\delta$ , tak je  $f(x)$  „blízko“  $f(x_0)$  „podle měřítka“  $\varepsilon$ .
- Ke každému kladnému číslu  $\varepsilon$  existuje kladné číslo  $\delta$

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0) \quad x \in D(f) \quad |x - x_0| < \delta \quad |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

# Spojitost v bodě




Funkce  $f$  je spojitá v bodě  $x_0$ :

- Funkce  $f$  je v bodě  $x_0$  definována,  $x_0 \in D(f)$ .
- Je-li  $x$  „blízko“  $x_0$  pak je  $f(x)$  „blízko“  $f(x_0)$ .
- Zvolíme-li „měřítko blízkosti“  $\varepsilon$  závisle proměnné  $\varepsilon$ , lze k němu najít „měřítko blízkosti“  $\delta$  nezávisle proměnné takové, že když je  $x$  „blízko“ k  $x_0$  „podle měřítka“  $\delta$ , tak je  $f(x)$  „blízko“  $f(x_0)$  „podle měřítka“  $\varepsilon$ .
- Ke každému kladnému číslu  $\varepsilon$  existuje kladné číslo  $\delta$ , že pro jakékoli  $x \in D(f)$

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in D(f)) |x - x_0| < \delta \quad |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

# Spojitost v bodě




Funkce  $f$  je spojitá v bodě  $x_0$ :

- Funkce  $f$  je v bodě  $x_0$  definována,  $x_0 \in D(f)$ .
- Je-li  $x$  „blízko“  $x_0$  pak je  $f(x)$  „blízko“  $f(x_0)$ .
- Zvolíme-li „měřítko blízkosti“  $\varepsilon$  závisle proměnné  $\varepsilon$ , lze k němu najít „měřítko blízkosti“  $\delta$  nezávisle proměnné takové, že když je  $x$  „blízko“ k  $x_0$  „podle měřítka“  $\delta$ , tak je  $f(x)$  „blízko“  $f(x_0)$  „podle měřítka“  $\varepsilon$ .
- Ke každému kladnému číslu  $\varepsilon$  existuje kladné číslo  $\delta$ , že pro jakékoliv  $x \in D(f)$  z  $\delta$ -blízkosti  $x$  k  $x_0$  nutně vyplýne  $\varepsilon$ -blízkost  $f(x)$  k  $f(x_0)$ .

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in D(f)) |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

## Spojitost v bodě

Funkce  $f$  je spojitá v bodě  $x_0$ :



$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in D(f)) |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$


## **Spojitost v bodě**

*Funkce  $f$  je nespojitá v bodě  $x_0$ :*


## Spojitost v bodě

Funkce  $f$  je nespojitá v bodě  $x_0$ :

- \* Funkce není v  $x_0$  definována;  $x_0 \notin D(f)$ .




## Spojitost v bodě



Funkce  $f$  je nespojitá v bodě  $x_0$ :

- \* Funkce není v  $x_0$  definována;  $x_0 \notin D(f)$ .
- \* Pokud  $x_0 \in D(f)$ , pak
  - Přestože  $x$  „je blízko“ k  $x_0$ , tak  $f(x)$  je od  $f(x_0)$  „daleko“.


# Spojitost v bodě



Funkce  $f$  je nespojitá v bodě  $x_0$ :

- \* Funkce není v  $x_0$  definována;  $x_0 \notin D(f)$ .
- \* Pokud  $x_0 \in D(f)$ , pak
  - Přestože  $x$  „je blízko“ k  $x_0$ , tak  $f(x)$  je od  $f(x_0)$  „daleko“.
  - Při nějakém „měřítku dalekosti“ jsou funkční hodnoty nějakých nezávisle proměnných libovolně „blízkých“ k  $x_0$  „daleko“ od funkční hodnoty  $f(x_0)$ .

# Spojitost v bodě




Funkce  $f$  je nespojitá v bodě  $x_0$ :

- \* Funkce není v  $x_0$  definována;  $x_0 \notin D(f)$ .
- \* Pokud  $x_0 \in D(f)$ , pak
  - Přestože  $x$  „je blízko“ k  $x_0$ , tak  $f(x)$  je od  $f(x_0)$  „daleko“.
  - Při nějakém „měřítku dalekosti“ jsou funkční hodnoty nějakých nezávisle proměnných libovolně „blízkých“ k  $x_0$  „daleko“ od funkční hodnoty  $f(x_0)$ .

$$|x - x_0| < \delta \quad |f(x) - f(x_0)| \geq \varepsilon$$

# Spojitost v bodě




Funkce  $f$  je nespojitá v bodě  $x_0$ :

- \* Funkce není v  $x_0$  definována;  $x_0 \notin D(f)$ .
- \* Pokud  $x_0 \in D(f)$ , pak
  - Přestože  $x$  „je blízko“ k  $x_0$ , tak  $f(x)$  je od  $f(x_0)$  „daleko“.
  - Při nějakém „měřítku dalekosti“ jsou funkční hodnoty nějakých nezávisle proměnných libovolně „blízkých“ k  $x_0$  „daleko“ od funkční hodnoty  $f(x_0)$ .
  - Existuje takové „měřítko dalekosti“  $\varepsilon$

$$(\exists \varepsilon > 0)$$

$$|x - x_0| < \delta \quad |f(x) - f(x_0)| \geq \varepsilon$$

# Spojitost v bodě




Funkce  $f$  je nespojitá v bodě  $x_0$ :

- \* Funkce není v  $x_0$  definována;  $x_0 \notin D(f)$ .
- \* Pokud  $x_0 \in D(f)$ , pak
  - Přestože  $x$  „je blízko“ k  $x_0$ , tak  $f(x)$  je od  $f(x_0)$  „daleko“.
  - Při nějakém „měřítku dalekosti“ jsou funkční hodnoty nějakých nezávisle proměnných libovolně „blízkých“ k  $x_0$  „daleko“ od funkční hodnoty  $f(x_0)$ .
  - Existuje takové „měřítko dalekosti“  $\varepsilon$ , že pro libovolné „měřítko blízkosti“  $\delta$

$$(\exists \varepsilon > 0)(\forall \delta > 0)$$

$$|x - x_0| < \delta \quad |f(x) - f(x_0)| \geq \varepsilon$$

# Spojitost v bodě




Funkce  $f$  je nespojitá v bodě  $x_0$ :

- \* Funkce není v  $x_0$  definována;  $x_0 \notin D(f)$ .
- \* Pokud  $x_0 \in D(f)$ , pak
  - Přestože  $x$  „je blízko“ k  $x_0$ , tak  $f(x)$  je od  $f(x_0)$  „daleko“.
  - Při nějakém „měřítku dalekosti“ jsou funkční hodnoty nějakých nezávisle proměnných libovolně „blízkých“ k  $x_0$  „daleko“ od funkční hodnoty  $f(x_0)$ .
  - Existuje takové „měřítko dalekosti“  $\varepsilon$ , že pro libovolné „měřítko blízkosti“  $\delta$  lze najít hodnoty  $x$  nezávisle proměnné

$$(\exists \varepsilon > 0)(\forall \delta > 0)(\exists x \in D(f)) |x - x_0| < \delta \quad |f(x) - f(x_0)| \geq \varepsilon$$

# Spojitost v bodě




Funkce  $f$  je nespojitá v bodě  $x_0$ :

- \* Funkce není v  $x_0$  definována;  $x_0 \notin D(f)$ .
- \* Pokud  $x_0 \in D(f)$ , pak
  - Přestože  $x$  „je blízko“ k  $x_0$ , tak  $f(x)$  je od  $f(x_0)$  „daleko“.
  - Při nějakém „měřítku dalekosti“ jsou funkční hodnoty nějakých nezávisle proměnných libovolně „blízkých“ k  $x_0$  „daleko“ od funkční hodnoty  $f(x_0)$ .
  - Existuje takové „měřítko dalekosti“  $\varepsilon$ , že pro libovolné „měřítko blízkosti“  $\delta$  lze najít hodnoty  $x$  nezávisle proměnné „ $\delta$ -blízké k  $x_0$ “, jejichž příslušné funkční hodnoty jsou „ $\varepsilon$ -vzdálené“ od funkční hodnoty  $f(x_0)$ .

$$(\exists \varepsilon > 0)(\forall \delta > 0)(\exists x \in D(f)) |x - x_0| < \delta \ \& \ |f(x) - f(x_0)| \geq \varepsilon$$

# Spojitost v bodě

Funkce  $f$  je nespojitá v bodě  $x_0 \in D(f)$ :



$$(\exists \varepsilon > 0)(\forall \delta > 0)(\exists x \in D(f)) |x - x_0| < \delta \text{ } \& \text{ } |f(x) - f(x_0)| \geq \varepsilon$$

## Exkurs: výroky s kvantifikátory

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in D(f)) |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

Funkce  $f$  je spojitá v  $x_0 \in D(f)$ .

$$(\exists \varepsilon > 0)(\forall \delta > 0)(\exists x \in D(f)) |x - x_0| < \delta \ \& \ |f(x) - f(x_0)| \geq \varepsilon$$

Funkce  $f$  je nespojitá v  $x_0 \in D(f)$ .

## Exkurs: výroky s kvantifikátory

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in D(f)) |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

Funkce  $f$  je spojitá  $\vee x_0 \in D(f)$ .

$$(\exists \varepsilon > 0)(\forall \delta > 0)(\exists x \in D(f)) |x - x_0| < \delta \ \& \ |f(x) - f(x_0)| \geq \varepsilon$$

Funkce  $f$  je nespojitá  $\vee x_0 \in D(f)$ . (Funkce  $f$  není spojitá  $\vee x_0 \in D(f)$ .)

## Exkurs: výroky s kvantifikátory

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in D(f)) |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

Funkce  $f$  je spojitá  $\vee x_0 \in D(f)$ .

$$(\exists \varepsilon > 0)(\forall \delta > 0)(\exists x \in D(f)) |x - x_0| < \delta \ \& \ |f(x) - f(x_0)| \geq \varepsilon$$

Funkce  $f$  je nespojitá  $\vee x_0 \in D(f)$ . (Funkce  $f$  není spojitá  $\vee x_0 \in D(f)$ .)

Není pravda, že funkce  $f$  je spojitá  $\vee x_0 \in D(f)$ .)

## Exkurs: výroky s kvantifikátory

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in D(f)) |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

Funkce  $f$  je spojitá v  $x_0 \in D(f)$ .

$$(\exists \varepsilon > 0)(\forall \delta > 0)(\exists x \in D(f)) |x - x_0| < \delta \ \& \ |f(x) - f(x_0)| \geq \varepsilon$$

Funkce  $f$  je nespojitá v  $x_0 \in D(f)$ . (Funkce  $f$  není spojitá v  $x_0 \in D(f)$ .)

Není pravda, že funkce  $f$  je spojitá v  $x_0 \in D(f)$ .)

$$(\exists \varepsilon > 0)(\forall \delta > 0)(\forall x \in D(f)) |x - x_0| \geq \delta \ \& \ |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

## Exkurs: výroky s kvantifikátory

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in D(f)) |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

Funkce  $f$  je spojitá v  $x_0 \in D(f)$ .

$$(\exists \varepsilon > 0)(\forall \delta > 0)(\exists x \in D(f)) |x - x_0| < \delta \ \& \ |f(x) - f(x_0)| \geq \varepsilon$$

Funkce  $f$  je nespojitá v  $x_0 \in D(f)$ . (Funkce  $f$  není spojitá v  $x_0 \in D(f)$ .)

Není pravda, že funkce  $f$  je spojitá v  $x_0 \in D(f)$ .)

$$(\exists \varepsilon > 0)(\forall \delta > 0)(\forall x \in D(f)) |x - x_0| \geq \delta \ \& \ |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

Funkce  $f$  je ohrazená.

## Exkurs: výroky s kvantifikátory

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in D(f)) |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

Funkce  $f$  je spojitá v  $x_0 \in D(f)$ .

$$(\exists \varepsilon > 0)(\forall \delta > 0)(\exists x \in D(f)) |x - x_0| < \delta \ \& \ |f(x) - f(x_0)| \geq \varepsilon$$

Funkce  $f$  je nespojitá v  $x_0 \in D(f)$ . (Funkce  $f$  není spojitá v  $x_0 \in D(f)$ .)

Není pravda, že funkce  $f$  je spojitá v  $x_0 \in D(f)$ .)

$$(\exists \varepsilon > 0)(\forall \delta > 0)(\forall x \in D(f)) |x - x_0| \geq \delta \ \& \ |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

Funkce  $f$  je ohrazená.

$$(\forall \varepsilon > 0)(\forall \delta > 0)(\forall x \in D(f)) |x - x_0| \geq \delta \ \& \ |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

## Exkurs: výroky s kvantifikátory

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in D(f)) |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

Funkce  $f$  je spojitá v  $x_0 \in D(f)$ .

$$(\exists \varepsilon > 0)(\forall \delta > 0)(\exists x \in D(f)) |x - x_0| < \delta \ \& \ |f(x) - f(x_0)| \geq \varepsilon$$

Funkce  $f$  je nespojitá v  $x_0 \in D(f)$ . (Funkce  $f$  není spojitá v  $x_0 \in D(f)$ .)

Není pravda, že funkce  $f$  je spojitá v  $x_0 \in D(f)$ .)

$$(\exists \varepsilon > 0)(\forall \delta > 0)(\forall x \in D(f)) |x - x_0| \geq \delta \ \& \ |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

Funkce  $f$  je ohrazená.

$$(\forall \varepsilon > 0)(\forall \delta > 0)(\forall x \in D(f)) |x - x_0| \geq \delta \ \& \ |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

Funkce  $f$  je konstantní.

## Operace se spojitými funkcemi

Nechť funkce  $f$  a  $g$  jsou spojité v bodě  $x_0 \in D(f) \cap D(g)$ . Pak také funkce

$$f + g, \quad f - g, \quad fg$$

jsou spojité v bodě  $x_0$ . Pokud navíc  $g(x_0) \neq 0$ , pak je také funkce

$$\frac{f}{g}$$

spojitá v bodě  $x_0$ .

## Operace se spojitými funkcemi

Nechť funkce  $f$  a  $g$  jsou spojité v bodě  $x_0 \in D(f) \cap D(g)$ . Pak také funkce

$$f + g, \quad f - g, \quad fg$$

jsou spojité v bodě  $x_0$ . Pokud navíc  $g(x_0) \neq 0$ , pak je také funkce

$$\frac{f}{g}$$

spojitá v bodě  $x_0$ .

Nechť funkce  $g$  je spojitá v bodě  $x_0$  a  $g(x_0) \in D(f)$ . Je-li funkce  $f$  spojitá v bodě  $g(x_0)$ , pak je složená funkce  $f \circ g$  spojitá v bodě  $x_0$ .

## Operace se spojitými funkcemi

Nechť funkce  $f$  a  $g$  jsou spojité v bodě  $x_0 \in D(f) \cap D(g)$ . Pak také funkce

$$f + g, \quad f - g, \quad fg$$

jsou spojité v bodě  $x_0$ . Pokud navíc  $g(x_0) \neq 0$ , pak je také funkce

$$\frac{f}{g}$$

spojitá v bodě  $x_0$ .

Nechť funkce  $g$  je spojitá v bodě  $x_0$  a  $g(x_0) \in D(f)$ . Je-li funkce  $f$  spojitá v bodě  $g(x_0)$ , pak je složená funkce  $f \circ g$  spojitá v bodě  $x_0$ .

Nechť funkce  $f$  je spojitá v bodě  $x_0$ . Pokud existuje inverzní funkce  $f^{-1}$ , pak je tato funkce spojitá v bodě  $f(x_0)$ .

## Spojitost na intervalu

Funkce  $f$  je spojitá na intervalu  $J \subseteq D(f)$ , pokud je spojitá v každém bodě tohoto intervalu.

$$(\forall x_0 \in J)(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in J) |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

## Spojitost na intervalu

Funkce  $f$  je spojitá na intervalu  $J \subseteq D(f)$ , pokud je spojitá v každém bodě tohoto intervalu.

$$(\forall x_0 \in J)(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in J) |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

Každá elementární funkce je spojitá na každém intervalu, který je částí jejího definičního oboru.

## Funkce spojité na uzavřeném intervalu

Nechť funkce  $f$  je spojitá na intervalu  $\langle a, b \rangle \subseteq D(f)$ . Pak platí:

## Funkce spojité na uzavřeném intervalu

Nechť funkce  $f$  je spojitá na intervalu  $\langle a, b \rangle \subseteq D(f)$ . Pak platí:

- Funkce  $f$  je ohraničená na intervalu  $\langle a, b \rangle$ .

$$(\exists k \in \mathbb{R})(\forall x \in \langle a, b \rangle) |f(x)| < k$$

## Funkce spojité na uzavřeném intervalu

Nechť funkce  $f$  je spojitá na intervalu  $\langle a, b \rangle \subseteq D(f)$ . Pak platí:

- Funkce  $f$  je ohraničená na intervalu  $\langle a, b \rangle$ .

$$(\exists k \in \mathbb{R})(\forall x \in \langle a, b \rangle) |f(x)| < k$$

- Funkce  $f$  nabývá na intervalu  $\langle a, b \rangle$  své nejmenší a největší hodnoty.

$$(\exists c, d \in \langle a, b \rangle)(\forall x \in \langle a, b \rangle) f(c) \leq f(x) \leq f(d)$$

# Funkce spojité na uzavřeném intervalu

Nechť funkce  $f$  je spojitá na intervalu  $\langle a, b \rangle \subseteq D(f)$ . Pak platí:

- Funkce  $f$  je ohraničená na intervalu  $\langle a, b \rangle$ .

$$(\exists k \in \mathbb{R})(\forall x \in \langle a, b \rangle) |f(x)| < k$$

- Funkce  $f$  nabývá na intervalu  $\langle a, b \rangle$  své nejmenší a největší hodnoty.

$$(\exists c, d \in \langle a, b \rangle)(\forall x \in \langle a, b \rangle) f(c) \leq f(x) \leq f(d)$$



Karl Theodor Wilhelm Weierstraß 1815–1897

## Funkce spojité na uzavřeném intervalu

Nechť funkce  $f$  je spojitá na intervalu  $\langle a, b \rangle \subseteq D(f)$ . Pak platí:

- Pokud mají funkční hodnoty v krajních bodech intervalu  $\langle a, b \rangle$  opačná znaménka, pak uvnitř tohoto intervalu existuje kořen rovnice  $f(x) = 0$ .

$$f(a)f(b) < 0 \Rightarrow (\exists c \in (a, b)) f(c) = 0$$

## Funkce spojité na uzavřeném intervalu

Nechť funkce  $f$  je spojitá na intervalu  $\langle a, b \rangle \subseteq D(f)$ . Pak platí:

- Pokud mají funkční hodnoty v krajních bodech intervalu  $\langle a, b \rangle$  opačná znaménka, pak uvnitř tohoto intervalu existuje kořen rovnice  $f(x) = 0$ .

$$f(a)f(b) < 0 \Rightarrow (\exists c \in (a, b)) f(c) = 0$$

- Funkce  $f$  nabývá na intervalu  $\langle a, b \rangle$  všech hodnot mezi svou největší a nejmenší hodnotou.

$$(\exists c, d \in \langle a, b \rangle)(\forall x \in \langle a, b \rangle) f(c) \leq f(x) \leq f(d)$$

$$\& (\forall y \in \langle f(c), f(d) \rangle)(\exists \xi \in \langle a, b \rangle) f(\xi) = y$$

# Funkce spojité na uzavřeném intervalu

Nechť funkce  $f$  je spojitá na intervalu  $\langle a, b \rangle \subseteq D(f)$ . Pak platí:

- Pokud mají funkční hodnoty v krajních bodech intervalu  $\langle a, b \rangle$  opačná znaménka, pak uvnitř tohoto intervalu existuje kořen rovnice  $f(x) = 0$ .

$$f(a)f(b) < 0 \Rightarrow (\exists c \in (a, b)) f(c) = 0$$

- Funkce  $f$  nabývá na intervalu  $\langle a, b \rangle$  všech hodnot mezi svou největší a nejmenší hodnotou.

$$(\exists c, d \in \langle a, b \rangle)(\forall x \in \langle a, b \rangle) f(c) \leq f(x) \leq f(d)$$

$$\& (\forall y \in \langle f(c), f(d) \rangle)(\exists \xi \in \langle a, b \rangle) f(\xi) = y$$



Bernard Bolzano 1781–1848

## Spojité funkce

### **Limita funkce**

Představa a pojem limity

Nevlastní limita

Limita v nevlastním bodě

Výpočet limit

Příklady

# **Limita funkce**

## Představa a pojem limity

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$$

Funkce  $f$  má v bodě  $x_0$  limitu  $a$ :

## Představa a pojem limity

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$$

Funkce  $f$  má ve vlastním bodě  $x_0$  vlastní limitu  $a$ :

## Představa a pojem limity




$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$$

Funkce  $f$  má v bodě  $x_0 \in \mathbb{R}$  limitu  $a \in \mathbb{R}$ :

# Představa a pojem limity

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$$




Funkce  $f$  má v bodě  $x_0 \in \mathbb{R}$  limitu  $a \in \mathbb{R}$ :



# Představa a pojem limity

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$$

Funkce  $f$  má v bodě  $x_0 \in \mathbb{R}$  limitu  $a \in \mathbb{R}$ :






Když se s hodnotami nezávisle proměnné se přibližujeme k  $x_0$  tak se funkční hodnoty přibližují k  $a$ .

# Představa a pojem limity

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$$

Funkce  $f$  má v bodě  $x_0 \in \mathbb{R}$  limitu  $a \in \mathbb{R}$ :






Když se s hodnotami nezávisle proměnné se přibližujeme k  $x_0$  tak se funkční hodnoty přibližují k  $a$ .

# Představa a pojem limity

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$$

Funkce  $f$  má v bodě  $x_0 \in \mathbb{R}$  limitu  $a \in \mathbb{R}$ :






Když se s hodnotami nezávisle proměnné se přibližujeme k  $x_0$  tak se funkční hodnoty přibližují k  $a$ .

Při jakémkoliv přibližování se nezávisle proměnné k hodnotě  $x_0$  se příslušné hodnoty nutně přiblíží k hodnotě  $a$ .

# Představa a pojem limity

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$$

Funkce  $f$  má v bodě  $x_0 \in \mathbb{R}$  limitu  $a \in \mathbb{R}$ :



Když se s hodnotami nezávisle proměnné se přibližujeme k  $x_0$  tak se funkční hodnoty přibližují k  $a$ .




Při jakémkoliv přibližování se nezávisle proměnné k hodnotě  $x_0$  se příslušné hodnoty nutně přiblíží k hodnotě  $a$ .

$$(\forall \{x_n\}_{n=0}^{\infty} \subseteq D(f)) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = a$$

# Představa a pojem limity

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$$

Funkce  $f$  má v bodě  $x_0 \in \mathbb{R}$  limitu  $a \in \mathbb{R}$ :






Pokud je funkce  $f$  spojitá v  $x_0$ , tak  $a$  se rovná funkční hodnotě  $f(x_0)$ .

# Představa a pojem limity

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$$

Funkce  $f$  má v bodě  $x_0 \in \mathbb{R}$  limitu  $a \in \mathbb{R}$ :






Pokud je funkce  $f$  spojitá v  $x_0$ , tak  $a$  se rovná funkční hodnotě  $f(x_0)$ .

Pokud funkce  $f$  není spojitá v  $x_0$ , tak  $a$  je taková hodnota, že dodefinování nebo změna funkční hodnoty v  $x_0$  splňující rovnost  $f(x_0) = a$ , změní funkci  $f$  na funkci spojitou v  $x_0$ .

# Představa a pojem limity

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$$

Funkce  $f$  má v bodě  $x_0 \in \mathbb{R}$  limitu  $a \in \mathbb{R}$ :



Pokud je funkce  $f$  spojitá v  $x_0$ , tak  $a$  se rovná funkční hodnotě  $f(x_0)$ .

Pokud funkce  $f$  není spojitá v  $x_0$ , tak  $a$  je taková hodnota, že dodefinování nebo změna funkční hodnoty v  $x_0$  splňující rovnost  $f(x_0) = a$ , změní funkci  $f$  na funkci spojitou v  $x_0$ .

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in D(f)) \ 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - a| < \varepsilon$$

## Představa a pojem limity

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$$

Funkce  $f$  má v bodě  $x_0 \in \mathbb{R}$  limitu  $a \in \mathbb{R}$ :

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in D(f)) \quad 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - a| < \varepsilon$$

$$(\forall \{x_n\}_{n=0}^{\infty} \subseteq D(f)) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = a$$

## Představa a pojem limity

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$$

Funkce  $f$  má v bodě  $x_0 \in \mathbb{R}$  limitu  $a \in \mathbb{R}$ :

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in D(f)) \quad 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - a| < \varepsilon$$

$$(\forall \{x_n\}_{n=0}^{\infty} \subseteq D(f)) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = a$$

Předpokládáme, že definiční obor funkce  $f$  je takový, že posloupnost

$$\{x_n\}_{n=0}^{\infty} \subseteq D(f), \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$$

existuje, tj. že v každém ryzím okolí bodu  $x_0$  jsou hodnoty z definičního oboru funkce  $f$ .

## Představa a pojem limity

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$$

Funkce  $f$  má v bodě  $x_0 \in \mathbb{R}$  limitu  $a \in \mathbb{R}$ :

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in D(f)) \quad 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - a| < \varepsilon$$

$$(\forall \{x_n\}_{n=0}^{\infty} \subseteq D(f)) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = a$$

Předpokládáme, že definiční obor funkce  $f$  je takový, že posloupnost

$$\{x_n\}_{n=0}^{\infty} \subseteq D(f), \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$$

existuje, tj. že v každém ryzím okolí bodu  $x_0$  jsou hodnoty z definičního oboru funkce  $f$ .

$x_0$  je *hromadný bod* definičního oboru.

## Představa a pojem limity

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$$

Funkce  $f$  má v bodě  $x_0 \in \mathbb{R}$  limitu  $a \in \mathbb{R}$ :

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in D(f)) \quad 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - a| < \varepsilon$$

$$(\forall \{x_n\}_{n=0}^{\infty} \subseteq D(f)) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = a$$



$x_0$  je *hromadný bod* definičního oboru.

# Nevlastní limity

$x_0 \in \mathbb{R}$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty: \quad (\forall H \in \mathbb{R})(\exists \delta > 0)(\forall x \in D(f)) \ 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow f(x) > H$$
$$(\forall \{x_n\}_{n=0}^{\infty} \subseteq D(f)) \ \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty: \quad (\forall H \in \mathbb{R})(\exists \delta > 0)(\forall x \in D(f)) \ 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow f(x) < H$$
$$(\forall \{x_n\}_{n=0}^{\infty} \subseteq D(f)) \ \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = -\infty$$



# Limita v nevlastním bodě



Vlastní limity v nevlastním bodě:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a: (\forall \varepsilon > 0)(\exists h \in \mathbb{R})(\forall x \in D(f)) x > h \Rightarrow |f(x) - a| < \varepsilon$$

$$(\forall \{x_n\}_{n=0}^{\infty} \subseteq D(f)) \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = a$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = a: (\forall \varepsilon > 0)(\exists h \in \mathbb{R})(\forall x \in D(f)) x < h \Rightarrow |f(x) - a| < \varepsilon$$

$$(\forall \{x_n\}_{n=0}^{\infty} \subseteq D(f)) \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = a$$



## Limita v nevlastním bodě

Nevlastní limity v nevlastním bodě:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty: (\forall H \in \mathbb{R})(\exists h \in \mathbb{R})(\forall x \in D(f)) x > h \Rightarrow f(x) > H$$
$$(\forall \{x_n\}_{n=0}^{\infty} \subseteq D(f)) \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty: (\forall H \in \mathbb{R})(\exists h \in \mathbb{R})(\forall x \in D(f)) x > h \Rightarrow f(x) < H$$
$$(\forall \{x_n\}_{n=0}^{\infty} \subseteq D(f)) \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty: (\forall H \in \mathbb{R})(\exists h \in \mathbb{R})(\forall x \in D(f)) x < h \Rightarrow f(x) > H$$
$$(\forall \{x_n\}_{n=0}^{\infty} \subseteq D(f)) \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty: (\forall H \in \mathbb{R})(\exists h \in \mathbb{R})(\forall x \in D(f)) x < h \Rightarrow f(x) < H$$
$$(\forall \{x_n\}_{n=0}^{\infty} \subseteq D(f)) \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = -\infty$$

# Výpočet limit

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x), \quad x_0 \in \mathbb{R}^*$$

# Výpočet limit

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x), \quad x_0 \in \mathbb{R}^*$$

- $f$  spojitá v  $x_0 \in \mathbb{R} \rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

# Výpočet limit

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x), \quad x_0 \in \mathbb{R}^*$$

- $f$  spojitá v  $x_0 \in \mathbb{R} \rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$
- $f$  nespojitá v  $x_0 \in \mathbb{R}$

# Výpočet limit

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x), \quad x_0 \in \mathbb{R}^*$$

- $f$  spojitá v  $x_0 \in \mathbb{R} \rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$
- $f$  nespojitá v  $x_0 \in \mathbb{R}$ : najdeme funkci  $g$ , která má na nějakém ryzím okolí bodu  $x_0$  stejné funkční hodnoty jako funkce  $f \rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = g(x_0)$

# Výpočet limit

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x), \quad x_0 \in \mathbb{R}^*$$

- $f$  spojitá v  $x_0 \in \mathbb{R} \rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$
- $f$  nespojitá v  $x_0 \in \mathbb{R}$ : najdeme funkci  $g$ , která má na nějakém ryzím okolí bodu  $x_0$  stejné funkční hodnoty jako funkce  $f \rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = g(x_0)$

$$\begin{aligned} & \left[ (\exists \eta)(\exists g)(\forall x \in D(f) \cap D(g)) \ (0 < |x - x_0| < \eta \Rightarrow f(x) = g(x)) \& (g \text{ spojitá v } x_0) \right] \\ & \qquad \qquad \qquad \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = g(x_0) \end{aligned}$$

# Výpočet limit

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x), \quad x_0 \in \mathbb{R}^*$$

- $f$  spojitá v  $x_0 \in \mathbb{R} \rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$
- $f$  nespojitá v  $x_0 \in \mathbb{R}$ : najdeme funkci  $g$ , která má na nějakém ryzím okolí bodu  $x_0$  stejné funkční hodnoty jako funkce  $f \rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = g(x_0)$

$$\left[ (\exists \eta)(\exists g)(\forall x \in D(f) \cap D(g)) (0 < |x - x_0| < \eta \Rightarrow f(x) = g(x)) \& (g \text{ spojitá v } x_0) \right] \\ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = g(x_0)$$

**Příklad:**  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 2x + 1}{x^2 - 1}$

# Výpočet limit

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x), \quad x_0 \in \mathbb{R}^*$$

- $f$  spojitá v  $x_0 \in \mathbb{R} \rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$
- $f$  nespojitá v  $x_0 \in \mathbb{R}$ : najdeme funkci  $g$ , která má na nějakém ryzím okolí bodu  $x_0$  stejné funkční hodnoty jako funkce  $f \rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = g(x_0)$

$$\left[ (\exists \eta)(\exists g)(\forall x \in D(f) \cap D(g)) (0 < |x - x_0| < \eta \Rightarrow f(x) = g(x)) \& (g \text{ spojitá v } x_0) \right] \\ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = g(x_0)$$

**Příklad:**  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 2x + 1}{x^2 - 1}$

$$x \neq 1 : \frac{x^2 - 2x + 1}{x^2 - 1} = \frac{(x - 1)^2}{(x - 1)(x + 1)} = \frac{x - 1}{x + 1},$$

# Výpočet limit

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x), \quad x_0 \in \mathbb{R}^*$$

- $f$  spojitá v  $x_0 \in \mathbb{R} \rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$
- $f$  nespojitá v  $x_0 \in \mathbb{R}$ : najdeme funkci  $g$ , která má na nějakém ryzím okolí bodu  $x_0$  stejné funkční hodnoty jako funkce  $f \rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = g(x_0)$

$$\left[ (\exists \eta)(\exists g)(\forall x \in D(f) \cap D(g)) (0 < |x - x_0| < \eta \Rightarrow f(x) = g(x)) \& (g \text{ spojitá v } x_0) \right] \\ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = g(x_0)$$

**Příklad:**  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 2x + 1}{x^2 - 1}$

$$x \neq 1 : \frac{x^2 - 2x + 1}{x^2 - 1} = \frac{(x-1)^2}{(x-1)(x+1)} = \frac{x-1}{x+1}, \quad g(x) = \frac{x-1}{x+1} \text{ je spojitá v } x_0 = 1$$

# Výpočet limit

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x), \quad x_0 \in \mathbb{R}^*$$

- $f$  spojitá v  $x_0 \in \mathbb{R} \rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$
- $f$  nespojitá v  $x_0 \in \mathbb{R}$ : najdeme funkci  $g$ , která má na nějakém ryzím okolí bodu  $x_0$  stejné funkční hodnoty jako funkce  $f \rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = g(x_0)$

$$\left[ (\exists \eta)(\exists g)(\forall x \in D(f) \cap D(g)) (0 < |x - x_0| < \eta \Rightarrow f(x) = g(x)) \& (g \text{ spojitá v } x_0) \right] \\ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = g(x_0)$$

**Příklad:**  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 2x + 1}{x^2 - 1} = 0$

$$x \neq 1 : \frac{x^2 - 2x + 1}{x^2 - 1} = \frac{(x-1)^2}{(x-1)(x+1)} = \frac{x-1}{x+1}, \quad g(x) = \frac{x-1}{x+1} \text{ je spojitá v } x_0 = 1$$

# Výpočet limit

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x), \quad x_0 \in \mathbb{R}^*$$

- $f$  spojitá v  $x_0 \in \mathbb{R} \rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$
- $f$  nespojitá v  $x_0 \in \mathbb{R}$ : najdeme funkci  $g$ , která má na nějakém ryzím okolí bodu  $x_0$  stejné funkční hodnoty jako funkce  $f \rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = g(x_0)$

$$\begin{aligned} & \left[ (\exists \eta)(\exists g)(\forall x \in D(f) \cap D(g)) \ (0 < |x - x_0| < \eta \Rightarrow f(x) = g(x)) \& (g \text{ spojitá v } x_0) \right] \\ & \qquad \qquad \qquad \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = g(x_0) \end{aligned}$$

- Využití ekvivalence limity funkce a limity posloupnosti

# Výpočet limit

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x), \quad x_0 \in \mathbb{R}^*$$

- $f$  spojitá v  $x_0 \in \mathbb{R} \rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$
- $f$  nespojitá v  $x_0 \in \mathbb{R}$ : najdeme funkci  $g$ , která má na nějakém ryzím okolí bodu  $x_0$  stejné funkční hodnoty jako funkce  $f \rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = g(x_0)$

$$\begin{aligned} & \left[ (\exists \eta)(\exists g)(\forall x \in D(f) \cap D(g)) (0 < |x - x_0| < \eta \Rightarrow f(x) = g(x)) \& (g \text{ spojitá v } x_0) \right] \\ & \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = g(x_0) \end{aligned}$$

- Využití ekvivalence limity funkce a limity posloupnosti

**Příklad:**  $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$

# Výpočet limit

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x), \quad x_0 \in \mathbb{R}^*$$

- $f$  spojitá v  $x_0 \in \mathbb{R} \rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$
- $f$  nespojitá v  $x_0 \in \mathbb{R}$ : najdeme funkci  $g$ , která má na nějakém ryzím okolí bodu  $x_0$  stejné funkční hodnoty jako funkce  $f \rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = g(x_0)$

$$\left[ (\exists \eta)(\exists g)(\forall x \in D(f) \cap D(g)) (0 < |x - x_0| < \eta \Rightarrow f(x) = g(x)) \& (g \text{ spojitá v } x_0) \right] \\ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = g(x_0)$$

- Využití ekvivalence limity funkce a limity posloupnosti

**Příklad:**  $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n\pi} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \sin n\pi = 0$$

# Výpočet limit

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x), \quad x_0 \in \mathbb{R}^*$$

- $f$  spojitá v  $x_0 \in \mathbb{R} \rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$
- $f$  nespojitá v  $x_0 \in \mathbb{R}$ : najdeme funkci  $g$ , která má na nějakém ryzím okolí bodu  $x_0$  stejné funkční hodnoty jako funkce  $f \rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = g(x_0)$

$$\left[ (\exists \eta)(\exists g)(\forall x \in D(f) \cap D(g)) (0 < |x - x_0| < \eta \Rightarrow f(x) = g(x)) \& (g \text{ spojitá v } x_0) \right] \\ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = g(x_0)$$

- Využití ekvivalence limity funkce a limity posloupnosti

**Příklad:**  $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n\pi} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \sin n\pi = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{(2n+1)\pi} = 0, \quad \sin \frac{1}{2}(2n+1)\pi = (-1)^n$$

# Výpočet limit

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x), \quad x_0 \in \mathbb{R}^*$$

- $f$  spojitá v  $x_0 \in \mathbb{R} \rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$
- $f$  nespojitá v  $x_0 \in \mathbb{R}$ : najdeme funkci  $g$ , která má na nějakém ryzím okolí bodu  $x_0$  stejné funkční hodnoty jako funkce  $f \rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = g(x_0)$

$$\left[ (\exists \eta)(\exists g)(\forall x \in D(f) \cap D(g)) (0 < |x - x_0| < \eta \Rightarrow f(x) = g(x)) \& (g \text{ spojitá v } x_0) \right] \\ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = g(x_0)$$

- Využití ekvivalence limity funkce a limity posloupnosti

**Příklad:**  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{1}{x}}{x}$  neexistuje

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n\pi} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \sin n\pi = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{(2n+1)\pi} = 0, \quad \sin \frac{1}{2}(2n+1)\pi = (-1)^n$$

# Výpočet limit

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x), \quad x_0 \in \mathbb{R}^*$$

„Standardní limity:“

# Výpočet limit

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x), \quad x_0 \in \mathbb{R}^*$$

„Standardní limity:“

- $\lim_{x \rightarrow \infty} (a_n x^n - a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0) = \text{sgn}(a_n) \infty$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} (a_n x^n - a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0) = \text{sgn}(a_n) (-1)^n \infty$

# Výpočet limit

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x), \quad x_0 \in \mathbb{R}^*$$

„Standardní limity:“

- $\lim_{x \rightarrow \infty} (a_n x^n - a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0) = \operatorname{sgn}(a_n) \infty$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} (a_n x^n - a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0) = \operatorname{sgn}(a_n) (-1)^n \infty$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_n x^n - a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0}{b_m x^m - b_{m-1} x^{m-1} + \cdots + b_1 x + b_0} = \begin{cases} 0, & m > n \\ \frac{a_n}{b_m}, & m = n \\ \operatorname{sgn}\left(\frac{a_n}{b_m}\right) \infty, & m < n \end{cases}$$
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{a_n x^n - a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0}{b_m x^m - b_{m-1} x^{m-1} + \cdots + b_1 x + b_0} = \begin{cases} 0, & m > n \\ \frac{a_n}{b_m}, & m = n \\ \operatorname{sgn}\left(\frac{a_n}{b_m}\right) (-1)^{n+m} \infty, & m < n \end{cases}$$

# Výpočet limit

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x), \quad x_0 \in \mathbb{R}^*$$

„Standardní limity:“

$$\bullet \lim_{x \rightarrow \infty} a^x = \begin{cases} \infty, & a > 1 \\ 1, & a = 1 \\ 0, & 0 < a < 1, \end{cases} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = \begin{cases} 0, & a > 1 \\ 1, & a = 1 \\ \infty, & 0 < a < 1 \end{cases}$$

# Výpočet limit

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x), \quad x_0 \in \mathbb{R}^*$$

„Standardní limity:“

- $\lim_{x \rightarrow \infty} a^x = \begin{cases} \infty, & a > 1 \\ 1, & a = 1 \\ 0, & 0 < a < 1, \end{cases}$        $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = \begin{cases} 0, & a > 1 \\ 1, & a = 1 \\ \infty, & 0 < a < 1 \end{cases}$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \log_a x = \begin{cases} \infty, & a > 1 \\ -\infty, & 0 < a < 1 \end{cases}$

# Výpočet limit

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x), \quad x_0 \in \mathbb{R}^*$$

„Standardní limity:“


- $\lim_{x \rightarrow \infty} a^x = \begin{cases} \infty, & a > 1 \\ 1, & a = 1 \\ 0, & 0 < a < 1, \end{cases}$        $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = \begin{cases} 0, & a > 1 \\ 1, & a = 1 \\ \infty, & 0 < a < 1 \end{cases}$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \log_a x = \begin{cases} \infty, & a > 1 \\ -\infty, & 0 < a < 1 \end{cases}$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} x^a = \begin{cases} \infty, & a > 0 \\ 1, & a = 0 \\ 0, & a < 0 \end{cases}$

# Výpočet limit

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x), \quad x_0 \in \mathbb{R}^*$$

„Standardní limity:“

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$




# Výpočet limit


$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x), \quad x_0 \in \mathbb{R}^*$$

„Standardní limity:“

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$



- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$



## Příklady

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{6 - 2x - 2x^2}{3x^2 + 4x - 3}$$

## Příklady

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{6 - 2x - 2x^2}{3x^2 + 4x - 3}$$

Funkce je spojitá v bodě  $x_0 = -2$

## Příklady

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{6 - 2x - 2x^2}{3x^2 + 4x - 3} = \frac{6 + 4 - 8}{12 - 8 - 3} = 2$$

Funkce je spojitá v bodě  $x_0 = -2$

## Příklady

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{6 - 2x - 2x^2}{3x^2 + 4x - 3} = \frac{6 + 4 - 8}{12 - 8 - 3} = 2$$

Funkce je spojitá v bodě  $x_0 = -2$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^2 + 2x - 1}{2x^2 + 3x + 1}$$

## Příklady

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{6 - 2x - 2x^2}{3x^2 + 4x - 3} = \frac{6 + 4 - 8}{12 - 8 - 3} = 2$$

Funkce je spojitá v bodě  $x_0 = -2$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^2 + 2x - 1}{2x^2 + 3x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(3x - 1)(x + 1)}{(2x + 1)(x + 1)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x - 1}{2x + 1} = \frac{-4}{-1} = 4$$

## Příklady

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{6 - 2x - 2x^2}{3x^2 + 4x - 3} = \frac{6 + 4 - 8}{12 - 8 - 3} = 2$$

Funkce je spojitá v bodě  $x_0 = -2$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^2 + 2x - 1}{2x^2 + 3x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(3x - 1)(x + 1)}{(2x + 1)(x + 1)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x - 1}{2x + 1} = \frac{-4}{-1} = 4$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(x - 1)^2}$$

## Příklady

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{6 - 2x - 2x^2}{3x^2 + 4x - 3} = \frac{6 + 4 - 8}{12 - 8 - 3} = 2$$

Funkce je spojitá v bodě  $x_0 = -2$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^2 + 2x - 1}{2x^2 + 3x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(3x - 1)(x + 1)}{(2x + 1)(x + 1)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x - 1}{2x + 1} = \frac{-4}{-1} = 4$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(x - 1)^2} = \infty$$

## Příklady

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{6 - 2x - 2x^2}{3x^2 + 4x - 3} = \frac{6 + 4 - 8}{12 - 8 - 3} = 2$$

Funkce je spojitá v bodě  $x_0 = -2$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^2 + 2x - 1}{2x^2 + 3x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(3x - 1)(x + 1)}{(2x + 1)(x + 1)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x - 1}{2x + 1} = \frac{-4}{-1} = 4$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(x - 1)^2} = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x^2 - 1}$$

## Příklady

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{6 - 2x - 2x^2}{3x^2 + 4x - 3} = \frac{6 + 4 - 8}{12 - 8 - 3} = 2$$

Funkce je spojitá v bodě  $x_0 = -2$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^2 + 2x - 1}{2x^2 + 3x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(3x - 1)(x + 1)}{(2x + 1)(x + 1)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x - 1}{2x + 1} = \frac{-4}{-1} = 4$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(x - 1)^2} = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x^2 - 1} \text{ neexistuje}$$

## Příklady

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{6 - 2x - 2x^2}{3x^2 + 4x - 3} = \frac{6 + 4 - 8}{12 - 8 - 3} = 2$$

Funkce je spojitá v bodě  $x_0 = -2$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^2 + 2x - 1}{2x^2 + 3x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(3x - 1)(x + 1)}{(2x + 1)(x + 1)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x - 1}{2x + 1} = \frac{-4}{-1} = 4$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(x - 1)^2} = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x^2 - 1} \text{ neexistuje}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 - 3x + 2}{7 - 4x^3}$$

## Příklady

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{6 - 2x - 2x^2}{3x^2 + 4x - 3} = \frac{6 + 4 - 8}{12 - 8 - 3} = 2$$

Funkce je spojitá v bodě  $x_0 = -2$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^2 + 2x - 1}{2x^2 + 3x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(3x - 1)(x + 1)}{(2x + 1)(x + 1)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x - 1}{2x + 1} = \frac{-4}{-1} = 4$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(x - 1)^2} = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x^2 - 1} \text{ neexistuje}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 - 3x + 2}{7 - 4x^3} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 - \frac{3}{x^2} + \frac{2}{x^3}}{\frac{7}{x^3} - 4} = \frac{2 - 0 + 0}{0 - 4} = -\frac{1}{2}$$

## Příklady

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^{\frac{3}{2}} - 2x}{2x^2 + 4}$$

## Příklady

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^{\frac{3}{2}} - 2x}{2x^2 + 4} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{3}{\sqrt{x}} - \frac{2}{x}}{2 + \frac{4}{x^2}} = 0$$

## Příklady

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^{\frac{3}{2}} - 2x}{2x^2 + 4} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{3}{\sqrt{x}} - \frac{2}{x}}{2 + \frac{4}{x^2}} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2^{x-2} - 3^{x+1}}{2^{x-2} + 3^{x-1}}$$

## Příklady

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^{\frac{3}{2}} - 2x}{2x^2 + 4} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{3}{\sqrt{x}} - \frac{2}{x}}{2 + \frac{4}{x^2}} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2^{x-2} - 3^{x+1}}{2^{x-2} + 3^{x-1}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^{x-2} - 3^3}{\left(\frac{2}{3}\right)^{x-2} + 3} = -9$$

## Příklady

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^{\frac{3}{2}} - 2x}{2x^2 + 4} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{3\sqrt{x}}{2} - \frac{2}{x}}{2 + \frac{4}{x^2}} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2^{x-2} - 3^{x+1}}{2^{x-2} + 3^{x-1}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^{x-2} - 3^3}{\left(\frac{2}{3}\right)^{x-2} + 3} = -9$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

## Příklady

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^{\frac{3}{2}} - 2x}{2x^2 + 4} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{3}{\sqrt{x}} - \frac{2}{x}}{2 + \frac{4}{x^2}} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2^{x-2} - 3^{x+1}}{2^{x-2} + 3^{x-1}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^{x-2} - 3^3}{\left(\frac{2}{3}\right)^{x-2} + 3} = -9$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(e^x)^2 - 1}{(e^x)^2 + 1} = -1$$

## Příklady

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^{\frac{3}{2}} - 2x}{2x^2 + 4} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{3}{\sqrt{x}} - \frac{2}{x}}{2 + \frac{4}{x^2}} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2^{x-2} - 3^{x+1}}{2^{x-2} + 3^{x-1}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^{x-2} - 3^3}{\left(\frac{2}{3}\right)^{x-2} + 3} = -9$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(e^x)^2 - 1}{(e^x)^2 + 1} = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + x}}{x}$$

## Příklady

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^{\frac{3}{2}} - 2x}{2x^2 + 4} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{3}{\sqrt{x}} - \frac{2}{x}}{2 + \frac{4}{x^2}} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2^{x-2} - 3^{x+1}}{2^{x-2} + 3^{x-1}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^{x-2} - 3^3}{\left(\frac{2}{3}\right)^{x-2} + 3} = -9$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(e^x)^2 - 1}{(e^x)^2 + 1} = -1$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + x}}{x} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 \left(1 + \frac{1}{x}\right)}}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{|x| \sqrt{1 + \frac{1}{x}}}{x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \operatorname{sgn}(x) \sqrt{1 + \frac{1}{x}} = -1 \end{aligned}$$

## Příklady

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^{\frac{3}{2}} - 2x}{2x^2 + 4} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{3}{\sqrt{x}} - \frac{2}{x}}{2 + \frac{4}{x^2}} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2^{x-2} - 3^{x+1}}{2^{x-2} + 3^{x-1}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^{x-2} - 3^3}{\left(\frac{2}{3}\right)^{x-2} + 3} = -9$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(e^x)^2 - 1}{(e^x)^2 + 1} = -1$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + x}}{x} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 \left(1 + \frac{1}{x}\right)}}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{|x| \sqrt{1 + \frac{1}{x}}}{x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \operatorname{sgn}(x) \sqrt{1 + \frac{1}{x}} = -1 \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \cos \frac{1}{x}$$

## Příklady

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^{\frac{3}{2}} - 2x}{2x^2 + 4} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{3}{\sqrt{x}} - \frac{2}{x}}{2 + \frac{4}{x^2}} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2^{x-2} - 3^{x+1}}{2^{x-2} + 3^{x-1}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^{x-2} - 3^3}{\left(\frac{2}{3}\right)^{x-2} + 3} = -9$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(e^x)^2 - 1}{(e^x)^2 + 1} = -1$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + x}}{x} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 \left(1 + \frac{1}{x}\right)}}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{|x| \sqrt{1 + \frac{1}{x}}}{x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \operatorname{sgn}(x) \sqrt{1 + \frac{1}{x}} = -1 \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \cos \frac{1}{x} = 0$$

# Příklady

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{x}$$

## Příklady

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 3 \frac{e^{3x} - 1}{3x} = 3 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{3x} = 3$$

## Příklady

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 3 \frac{e^{3x} - 1}{3x} = 3 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{3x} = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\frac{\pi}{2} - x}$$

## Příklady

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 3 \frac{e^{3x} - 1}{3x} = 3 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{3x} = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\frac{\pi}{2} - x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin(\frac{\pi}{2} - x)}{\frac{\pi}{2} - x} = 1$$

## Příklady

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 3 \frac{e^{3x} - 1}{3x} = 3 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{3x} = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\frac{\pi}{2} - x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin(\frac{\pi}{2} - x)}{\frac{\pi}{2} - x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\operatorname{tg} 5x}$$

## Příklady

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 3 \frac{e^{3x} - 1}{3x} = 3 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{3x} = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\frac{\pi}{2} - x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin(\frac{\pi}{2} - x)}{\frac{\pi}{2} - x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\operatorname{tg} 5x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x \cos 5x}{5 \sin 5x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x}{\sin 5x} \frac{\cos 5x}{5} = \frac{1}{5}$$

## Příklady

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 3 \frac{e^{3x} - 1}{3x} = 3 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{3x} = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\frac{\pi}{2} - x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin(\frac{\pi}{2} - x)}{\frac{\pi}{2} - x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\operatorname{tg} 5x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x \cos 5x}{5 \sin 5x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x}{\sin 5x} \frac{\cos 5x}{5} = \frac{1}{5}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x+1} - \sqrt{x})$$

## Příklady

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 3 \frac{e^{3x} - 1}{3x} = 3 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{3x} = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\frac{\pi}{2} - x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin(\frac{\pi}{2} - x)}{\frac{\pi}{2} - x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\operatorname{tg} 5x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x \cos 5x}{5 \sin 5x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x}{\sin 5x} \frac{\cos 5x}{5} = \frac{1}{5}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x+1} - \sqrt{x}) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+1-x}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} = 0$$