

Lineární diferenciální rovnice druhého řádu

Petr Liška

Masarykova univerzita

24.11.2022

Definice

Nechť $p(x), q(x), r(x)$ jsou spojité funkce na nějakém otevřeném intervalu I . Rovnici

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = r(x) \quad (1)$$

nazýváme *lineární diferenciální rovnici druhého řádu*. Navíc, je-li $r(x) \equiv 0$, jedná se o *homogenní lineární diferenciální rovnici druhého řádu*. Řešením nazveme každou funkci φ , která má na intervalu I spojité derivace prvního i druhého řádu a po dosazení do (1) přejde v identitu.

Úloha nalézt řešení rovnice (1), které splňuje v bodě $x_0 \in I$ *počáteční podmínky*

$$y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y_1, \quad y_0, y_1 \in \mathbb{R},$$

se nazývá *počáteční (Cauchyova) úloha*.

Věta o existenci a jednoznačnosti

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0 \quad (2)$$

Věta

Nechť jsou funkce $p(x), q(x)$ spojité na nějakém otevřeném intervalu I . Pak existuje právě jedno řešení rovnice (2), které je definované na I a splňuje počáteční podmínky $y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y_1$, kde $x_0 \in I$.

$$L[y](x) = y''(x) + p(x)y'(x) + q(x)y(x)$$

Lemma

1.

$$L[cy](x) = cL[y](x), \quad c \in \mathbb{R}$$

2.

$$L[y_1 + y_2](x) = L[y_1](x) + L[y_2](x)$$

Věta

1. Je-li y_p partikulárním řešením rovnice (2), pak je i $c \cdot y_p$ pro $c \in \mathbb{R}$ partikulárním řešením této rovnice.
2. Jsou-li y_1, y_2 partikulární řešení rovnice (2), pak i jejich libovolná lineární kombinace $c_1y_1 + c_2y_2$ je řešením pro $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.

Wronskián

Věta

Mějme dvě partikulární řešení y_1, y_2 HLDRL druhého řádu, která jsou definovaná na intervalu I . Jestliže

$$\mathcal{W}(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y'_1(x) & y'_2(x) \end{vmatrix} \neq 0 \quad \forall x \in I,$$

pak $y_o = c_1 y_1 + c_2 y_2$ je obecným řešením příslušné HLDRL druhého řádu, $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.

Definice

Determinant $\mathcal{W}(y_1, y_2)$ nazýváme *wronskián funkcií y_1, y_2* . Jestliže $\mathcal{W}(y_1, y_2) \neq 0$, pak řešení y_1 a y_2 tvoří tzv. *fundamentální systém řešení HLDRL druhého řádu*.

Lineárně nezávislá řešení

Definice

Funkce y_1, y_2 se nazývají *lineárně závislé* na intervalu I , jestliže existuje reálné číslo K , pro které platí

$$y_1 = K \cdot y_2 \quad \forall x \in I.$$

V opačném případě řekneme, že funkce y_1, y_2 jsou lineárně nezávislé.

Věta

Funkce y_1, y_2 jsou lineárně nezávislé na nějakém intervalu I , právě tehdy když $\mathcal{W}(y_1, y_2) \neq 0$ na intervalu I .

Věta

Jsou-li y_1, y_2 lineárně nezávislá řešení HLDR druhého řádu, pak platí, že $y_o = c_1 y_1 + c_2 y_2$ je obecným řešením též rovnice.

Homogenní lineární diferenciální rovnice druhého řádu s konstantními koeficienty

$$y'' + py' + qy = 0, \quad p, q \in \mathbb{R}. \quad (3)$$

Uvážíme tzv. *charakteristickou rovnici*

$$\lambda^2 + p \cdot \lambda + q = 0.$$

V závislosti na řešení charakteristické rovnice jsou možné tři případy:

1. $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$, $\lambda_1 \neq \lambda_2$ potom obecné řešení (3) je

$$y_o = c_1 e^{\lambda_1 x} + c_2 e^{\lambda_2 x}.$$

2. $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$, $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$ potom obecné řešení (3) je

$$y_o = c_1 e^{\lambda x} + c_2 x e^{\lambda x}.$$

3. $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C}$, $\lambda_{12} = \alpha + \beta i$ potom obecné řešení (3) je

$$y_o = c_1 e^{\alpha x} \sin \beta x + c_2 e^{\alpha x} \cos \beta x.$$