

# 10. Společenstva

## E3101 Úvod do matematického modelování



Lotkův-Volterrův systém  
Maticové populační modely

# Mezidruhové vztahy



		Vliv první populace na druhou		
		záporný	neutrální	kladný
Vliv druhé populace na první	Druhá populace je vůči první	záporný	konkurent (kompetice)	predátor parazit
	záporný	neutrál	amensál	
	neutrální			

# Společenstva 3 a více populací



- Opět vyjdeme ze stejné rovnice (diskrétní a spojité) pro růst populace i:

$$N_i(t + h) = N_i(t) + r_i \cdot N_i(t) \cdot h, N_i(0) = N_0$$

- Vzájemné ovlivňování populací budeme modelovat tak, že růstový koeficient i-té populace  $r_i$  závisí na velikostech všech populací tvořících společenstvo (včetně i-té), tedy:

$$r_i = r_i(N_1, N_2, \dots, N_i, \dots, N_n), i \in \{1, \dots, n\}$$

- Pokud budeme předpokládat lineární závislost:

$$r_i = a_i + \sum_{j=1}^n b_{i,j} \cdot N_j$$

- půjde o systém tzv. Lotka-Volterrových rovnic.

# Společenstva 3 a více populací



- Interpretace koeficientů  $a_i$ ,  $b_{i,j}$  je následující:
  - $a_i$ : vnitřní koeficient růstu i-té populace. Pokud  $a_i > 0$ , izolovaná i-tá populace by v daném prostředí rostla,  $a_i < 0$ , izolovaná i-tá populace by v daném prostředí vymírala.
  - $b_{i,i}$ : síla vnitrodruhové konkurence nebo kooperace. Pokud  $b_{i,i} < 0$ , jedná se o vnitrodruhovou konkurenci, pokud  $b_{i,i} > 0$ , jedná se o vnitrodruhovou kooperaci.
  - $b_{i,j}$ : síla vlivu j-té populace na růst i-té.
    - $b_{i,j} > 0 \dots$  j-tá populace je komensálem i-té,
    - $b_{i,j} < 0 \dots$  j-tá populace je amensálem i-té,
    - $b_{i,j} = 0 \dots$  j-tá populace je k i-té neutrální.

# Model konkurence tří populací



- $N'_1(t) = N_1(t) \cdot (\alpha_1 + \beta_{1,1} \cdot N_1(t) + \beta_{1,2} \cdot N_2(t) + \beta_{1,3} \cdot N_3(t)),$   
 $N'_2(t) = N_2(t) \cdot (\alpha_2 + \beta_{2,1} \cdot N_1(t) + \beta_{2,2} \cdot N_2(t) + \beta_{2,3} \cdot N_3(t)),$   
 $N'_3(t) = N_3(t) \cdot (\alpha_3 + \beta_{3,1} \cdot N_1(t) + \beta_{3,2} \cdot N_2(t) + \beta_{3,3} \cdot N_3(t)),$

$$N_1(0) = N_0_1,$$

$$N_2(0) = N_0_2,$$

$$N_3(0) = N_0_3,$$

- Řešte model pro:

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 1$$

$$\beta_{1,1} = \beta_{2,2} = \beta_{3,3} = -0,01$$

$$\beta_{1,2} = \beta_{2,3} = \beta_{3,1} = -0,015$$

$$\beta_{2,1} = \beta_{3,2} = \beta_{1,3} = -0,003$$

# Model konkurence tří populací (1 predátor)



- $N'_1(t) = N_1(t) \cdot (\alpha_1 + \beta_{1,1} \cdot N_1(t) + \beta_{1,2} \cdot N_2(t) + \beta_{1,3} \cdot N_3(t)),$

$$N'_2(t) = N_2(t) \cdot (\alpha_2 + \beta_{2,1} \cdot N_1(t) + \beta_{2,2} \cdot N_2(t) + \beta_{2,3} \cdot N_3(t)),$$

$$N'_3(t) = N_3(t) \cdot (\alpha_3 + \beta_{3,1} \cdot N_1(t) + \beta_{3,2} \cdot N_2(t) + \beta_{3,3} \cdot N_3(t)),$$

$$N_1(0) = N_0_1,$$

$$N_2(0) = N_0_2,$$

$$N_3(0) = N_0_3,$$

- Řešte model pro:

$$\alpha_1 = 1; \alpha_2 = 2; \alpha_3 = -1,5$$

$$\beta_{1,1} = \beta_{2,2} = -0,005; \beta_{3,3} = 0$$

$$\beta_{1,2} = -0,0001; \beta_{2,3} = -0,02; \beta_{3,1} = 0,03$$

$$\beta_{2,1} = -0,01; \beta_{3,2} = 0,002; \beta_{1,3} = -0,03$$

# Maticový zápis modelu



- $N'_1(t) = N_1(t) \cdot (\alpha_1 + \beta_{1,1} \cdot N_1(t) + \beta_{1,2} \cdot N_2(t) + \beta_{1,3} \cdot N_3(t)),$
- $N'_2(t) = N_2(t) \cdot (\alpha_2 + \beta_{2,1} \cdot N_1(t) + \beta_{2,2} \cdot N_2(t) + \beta_{2,3} \cdot N_3(t)),$
- $N'_3(t) = N_3(t) \cdot (\alpha_3 + \beta_{3,1} \cdot N_1(t) + \beta_{3,2} \cdot N_2(t) + \beta_{3,3} \cdot N_3(t)),$

$$N_1(0) = N_0_1,$$

$$N_2(0) = N_0_2,$$

$$N_3(0) = N_0_3,$$

- Zápis modelu vykazuje určitou pravidelnost, které lze efektivně využít pro zjednodušení práce pomocí matic.
- Tři typy vstupních parametrů lze sjednotit do matic o jednom (= vektorů) nebo více sloupcích:  $N_{0i}, \alpha_i$  a  $\beta_{i,j}$  plus stavový vektor  $N_i$ .

# Maticový zápis modelu



- Přepsáním rovnic pak získáme následující zápis:

$$\begin{aligned}N'(t) &= \text{diag}(N(t)) \times (A + B \times N(t)), \\N(0) &= N_0,\end{aligned}$$

- Kde platí (pro  $K$  populací ve společenstvu):

$$N(t) = \begin{pmatrix} N_1(t) \\ \vdots \\ N_K(t) \end{pmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_K \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} \beta_{1,1} & \cdots & \beta_{1,K} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \beta_{K,1} & \cdots & \beta_{K,K} \end{pmatrix}$$

A  $\text{diag}()$  je funkce pro vytvoření diagonální matice.

# Domácí úkol č. 5 (do 21. 12. 2023)



- Sestavte libovolný maticový model o nejméně třech populacích, který bude symetrický (populace budou zaměnitelné) a pro  $t \rightarrow \infty$  se hodnoty modelu neustálí (model bude buď pravidelně oscilovat nebo bude chaotický).
  - Vykreslete graf závislosti velikostí populací na čase, kde každá populace bude reprezentována čarou jiné barvy.
  - Zaregistrujte se na Metacentrum + stáhněte si FileZilla nebo jiný FTP klient a PSPad nebo jiný textový editor, který umí zobrazovat linuxové konce řádků (ne notepad z Windows).