

# Apomixe

Rostlinná embryologie, podzim 2023  
Mgr. Hana Cempírková, Ph.D.







MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY





INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tato prezentace je spolufinancována  
Evropským sociálním fondem  
a státním rozpočtem České republiky


# Vegetativní (asexuální) rozmnožování




Vegetative propagules in angiosperms: (a) Eyes of potato; (b) Rhizome of ginger; (c) Bulbil of *Agave*; (d) Leaf buds of *Bryophyllum*; (e) Offset of water hyacinth



(a) A stem cutting (with bud) planted in soil



(b) Stem cutting develops roots and shoot



# Apomixe u kvetoucích rostlin

objev apomixe (Smith, 1841) =  
samičí rostliny *Alchornea ilicifolia*  
(Euphorbiaceae) z Austrálie

tvořily semena v Kew Gardens  
v Londýně (bez přítomnosti  
samčích rostlin)



1908 Winkler termín apomixis = "substitution of sexual  
reproduction by an asexual multiplication process without  
nucleus and cell fusion"

současný náhled: apomixis je synonymem termínu  
"agamospermie" (Richards, 1997)

# Apomixe (apomixis)


- nepohlavní rozmnožování rostlin semeny
- vyskytuje se přirozeně u stovek druhů (více než 400 a u více než 40 čeledí), časté obzvlášť u čeledí *Asteraceae*, *Rosaceae* a u *Poaceae*
- Apomiktická embrya vznikla pouze z buněk mateřských pletiv vajíčka, NE splynutím vaječné a spermatické buňky
- apomiktická semena obsahují embryo, která jsou genetickými kopiemi mateřské rostliny = velký význam v případě, že mateřská rostlina je hybrid
- velké využití ve šlechtění pro produkci hybridních semen - umožňuje enormní snížení času (i nákladů)
- možnost produkovat plodiny adaptované na různé podmínky klimatické i environmentální

# Apomiktická embrya

- Nejméně tři vývojové odlišnosti od somatické embryogeneze:
  - AE se vytváří v **diferencované struktuře**
  - AE se vytváří v nebo **poblíž gametofytic.** struktur a bez kalusové fáze, která je typická pro somatickou embryogenezi
  - Vývoj AE je téměř **neodlišitelný** od normálních embrií, což ne vždy platí pro somatická emb.

# Srovnání pohlavního rozmnožování a apomixe

## Sporophytic generation ( $2n$ )



## Gametophytic generation ( $1n$ )



Flowering plant

Seed



Endosperm


Embryo

Primary endosperm nucleus

Mitosis without fertilization

Autonomous division  
or fertilization

Double  
fertilization



Polar nuclei

Egg cell

Megagametophyte

Pollen grain

Sperm cells


Microgametophyte

# Význam apomixe

- umožňuje tvorbu velkých geneticky uniformních populací
- zachovává hybridní vigor (vlastnosti získané hybridizací) v následných semenných generacích
- plánuje se její využití v zemědělství:
  - rychlá tvorba a množení nejlepších odrůd
  - redukce nákladů a času při šlechtění
  - překonání problémů spojených s pohlavním rozmnožováním, jako jsou opylovači, kros-kompatibilita
  - redukce přenosu virů u vegetativně množených plodin

# Význam apomixe pro produkci hybridních semen

při pohlavním  
rozmnožování v F2  
dochází k  
segregaci znaků



# Mechanismy apomixe

- existence buněk schopných tvořit embryo bez předcházející meiózy (**apomeióza**)
- spontánní tvorba embrya nezávislá na oplození (**partenogeneze**)
- schopnost autonomně produkovat endosperm nebo využít endosperm vyvíjející se po oplození


Koltunov 1993

# Původ apomiktického embrya

- **sporofytická dráha** - embryo vzniká přímo z nuclu nebo integumentu vajíčka = **adventivní embryonie**
- **gametofytická dráha** - vytváří se zárodečný vak:
  - diplosporie** - zárodečný vak vzniká přímo z mateřských buněk megaspor (*Antennaria*, *Cortaderia*) (vůbec neproběhne meióza)
  - nebo po narušení meiózy (*Taraxacum*)
- aposporie** - zárodečný vak vzniká z buněk nuclu (*Hieracium*)

# Diplosporie a aposporie

vývoj z megasporocytu:




- typ *Taraxacum* - v jádře megasporocytu začne probíhat meiotická profáze, ale díky poruchám vznikne tzv. **restituční diploidní jádro**, které se dělí mitoticky (*Chondrilla, Arabis*)  
= **meiotická diplosporie**
- u typu *Antennaria* je meióza úplně redukovaná (*Calamagrostis, Poa, Rubus, Eupatorium*)  
= **mitotická diplosporie**
- typ *Hieracium* - vývoj zárodečného vaku z buňky nucelu, meióza neprobíhá (*Artemisia, Hypericum, Alchemilla, Ranunculus, Crepis*)  
= **aposporie**


Erdelská (1981), podle Rodkiewicza (1973)


# Adventivní embryonie

- Embrya vznikají z buněk nucelu nebo **vnitřního integumentu** (ne ze zárodečného vaku)
- V jednom vajíčku mohou být adventivní embrya i zygotické (vzniklé splynutím gamet)
- Embrya vrůstají do zárodečného vaku
  - Mohou vznikat i v neoplozeném vajíčku, ale většinou je jejich **vývoj závislý na oplození centrálního jádra ZV** pro vznik endospermu (výživa)




# Schéma některých typů apomixe





# Srovnání pohlavního rozmnožování a apomixe

upr. podle  
Koltunov 1995



# Proč apomixe fixuje určitý genotyp


- protože pro tvorbu zárodečného vaku nebo vaječné buňky není nutná meióza
- chybí tak možnost rekombinace alel
- samčí gametofyt nepřispívá ke genetické výbavě embrya
- apomixe vylučuje potřebu událostí považovaných za nezbytné pro úspěšnou produkci semen

přesto jsou produkována životašchopná semena !

# Apomixe a prostředí (sukcese)

apomixe a sexuání rozmnožování se nemusí vždy vyloučovat:

- u **obligátních apomiktů** je pohlavní reprodukce vyloučena, protože všechna semena mají genotyp matky
- u **fakultativních apomiktů** mohou být získána jak zygotická, tak klonální semena - pohlavní a apomiktický způsob rozmnožování tak může koexistovat



# Vliv samčího gametofytu

- **Autonomní apomixie** – průběh nezávisle na opylení a prorůstání pylové láčky
- **Indukovaná apomoxie** – vliv samčího gametofytu

# Vliv samčího gametofytu

**Automixie** – speciální případ partenogeneze, normální zárodečný vaku s redukovaným počtem chromozómů, ale před vstupem do embryogeneze se chromozomy vaječné buňky bez oplodnění zdvojnásobí (endomiticky nebo splynutím s jinou haploidní buňkou zárod. vaku)

**Pseudogamie** – indukovaná apomixie, nutná účast samčího gametofytu a oplození centrálního jádra kvůli vývoji endospermu (např. adventivní embryonie, aposporie)

**Semigamie** – spermatická buňka pronikne do vaječné buňky, ale jádra nesplynou. Jádra se dělí samostatně a výsledkem je chiméra poskládaná z částí samičího a samčího genomu.

# Shrnutí

