

Tkáňové kultury

E-mail: jipa@sci.muni.cz
Tel: 532 146 223 / 116

Tkáňové kultury (= TK, Tissue culture - TC)

– růst živočišných buněk a tkání *in vitro*

1885 – ROUX, kuřecí embryonální buňky v solném roztoku

1940 – EARLE, první kontinuálně kultivovaná linie, buňky myší pojivové tkáně, jejím subklonem je dnešní linie L929

Provozování tkáňových kultur spočívá v zajištění optimálních podmínek pro růst a přežívání kultivovaných buněk / tkání!

(Pro jednoduchost se dále budou uvažovat jen buňky, problematika tkání a orgánů bude stručně zmíněna na závěr.)

FYZIKÁLNÍ, CHEMICKÉ a **BIOLOGICKÉ** faktory, které je třeba regulovat za běžných laboratorních podmínek.


Různé druhy záření, tlak, různá pole, vibrace,...

- dodržet podmínky na které jsou buňky zvyklé/přizpůsobené

TEPLOTA


Buňky se kultivují při optimální teplotě pro organismus, z kterého byly izolovány. Pro buněčné linie odvozené od člověka a běžných laboratorních zvířat (myš, krysa, makak, pes,...) je to většinou 37°C. Pro buněčné linie odvozené od poikilotermních živočichů (ryby, hmyz, háďátko - *Caenorhabditis*) od 10 do 25°C.

Elops




Teplota modifikuje biochemické děje

- s vyšší teplotou se urychlují chemické reakce
- v závislosti na teplotě se mění i afinita substrátu k enzymům – K_m (Michaelis-Menten koeficinet)



Změna velikosti K_m pro acetylcholin k acetylcholinesterázu (AChE)
P – hlaváč, Rt – pstruh duhový, M – cípal, L -Elops

Závislost K_m na teplotě pro pyruvát a LDH u různých obratlovců
Bt – tuňák obecný, R – králík, Ray – rejnok, M – hlaváč (Gobii)



Některé organismy mají tak více enzymových isoform pro stejnou reakci pro snadnější regulaci homeostáze za různých teplot!

Na **CHEMICKÉ** faktory lze nahlížet jako na média (jejich komponenty) v kterých buňky rostou a plyny, které tato média obklopují případně jsou v nich rozpuštěny.

Složení médií

Veškeré komponenty použité pro přípravu médií musí být vysoké kvality, s minimem nežádoucích příměsí (minimální chemická čistota p.a. – pro analýzu)

Základem je **voda** a v ní rozpuštěné **anorganické soli**. Soli jsou zdrojem nezbytných iontů, a hrají významnou úlohu v zajištění vhodného **pH** (optimum většinou **7.2-7.4**) a **osmotického tlaku / Osmomolarita** (optimum většinou **280-320 mOsmol/L**). Nejzákladnější ionty obsažené v médiích jsou: **Na⁺, K⁺, Mg²⁺, Ca²⁺, Cl⁻, SO₄²⁻, PO₄³⁻, HCO₃⁻**.

Osmotický tlak je roven koncentracím rozpuštěných iontů/molekul

$$\underline{1 \text{ M NaCl}} = 1 \text{ Osm/L Na}^+ + 1 \text{ Osm/L Cl}^- = \underline{2 \text{ Osm/L}}$$

$$\underline{1 \text{ M CaCl}_2} = 1 \text{ Osm/L Ca}^{2+} + 2 \text{ Osmol/L Cl}^- = \underline{3 \text{ Osm/L}}$$

$$\underline{1 \text{ M glukósy}} = \underline{1 \text{ Osm/L}}$$

Esenciální látky pro růst buněk

Média musí také obsahovat **sacharidy** (většinou glukózu, jako zdroj energie), **aminokyseliny** (esenciální i neesenciální), **vitaminy** a **stopové prvky**.

Většina zejména savčích buněk vyžaduje

Insulin (příjem glukózy) **Transferin** (příjem železa) **Selen** (nezbytný pro funkci oxidačně-redukčních enzymů) – také tzv. minimální přídavek do médií

Další doplňky

Lipidy (mastné kyseliny), steroidní látky, hormony, cytokiny, peptidy, proteiny extracelulární matrix, proteiny séra, nukleosidy,... Mnohé z těchto látek jsou suplovány přídavkem **séra** (5 - 10 - 20%), v některých případech i jinými zdroji málo charakterizovaných směsí proteinů a dalších látek. Významnými doplňky jsou ochranné látky jako **2-β-merkaptoetanol** (snižuje oxidativní stres a může sloužit i jako zdroj síry) a **antibiotika** (ochrana proti mikroorganismům případně selekční agens)

Základní média v tkáňových kulturách

Základem jsou tzv. **Earliho soli**: chlorid sodný, chlorid draselný, chlorid vápenatý, síran horečnatý, dihydrogenfosfát sodný

BME with EBSS – základní (basal) médium s Earliho solemi

Alfa MEM – alfa modifikované Eaglovo médium

DMEM – Dulbekovo MEM, běžné pro adherentní buněčné linie

RPMI 1640 – zejména buňky hematopoetického původu

IMDM – Iscovovo modifikované Dulbeccovo médium,
vhodné pro rychle rostoucí buňky (v základu neobsahuje Fe ionty)

Hamovo F12 – médium bohaté živinami, často v kombinaci 1:1 s DMEM
jako základ pro kultury bez séra

| Components | Molecular Weight | Concentration (mg/L) | mM |
|---|------------------|----------------------|----------|
| Amino Acids | | | |
| Glycine | 76 | 30 | 0.4 |
| Glycyl-L-Glutamine | 221 | 806 | 8.66 |
| L-Arginine hydrochloride | 211 | 84 | 0.898 |
| L-Cysteine 2HCl | 818 | 68 | 0.201 |
| L-Histidine hydrochloride-H2O | 210 | 42 | 0.2 |
| L-Isoleucine | 131 | 106 | 0.802 |
| L-Leucine | 131 | 106 | 0.802 |
| L-Lysine hydrochloride | 183 | 146 | 0.798 |
| L-Methionine | 149 | 30 | 0.201 |
| L-Phenylalanine | 165 | 66 | 0.4 |
| L-Serine | 106 | 42 | 0.4 |
| L-Threonine | 119 | 96 | 0.798 |
| L-Tryptophan | 204 | 16 | 0.0784 |
| L-Tyrosine | 181 | 72 | 0.398 |
| L-Valine | 117 | 94 | 0.803 |
| Vitamins | | | |
| Choline chloride | 140 | 4 | 0.0288 |
| D-Calcium pantothenate | 477 | 4 | 0.00839 |
| Folic Acid | 441 | 4 | 0.00907 |
| Inosinamide | 122 | 4 | 0.0328 |
| Pyridoxine hydrochloride | 204 | 4 | 0.0196 |
| Riboflavin | 376 | 0.4 | 0.00106 |
| Thiamine hydrochloride | 337 | 4 | 0.0119 |
| Triiodothyronine | 180 | 7.2 | 0.04 |
| Inorganic Salts | | | |
| Calcium Chloride (CaCl2-2H2O) | 147 | 264 | 1.8 |
| Ferric Nitrate (Fe(NO3)3·9H2O) | 404 | 0.1 | 0.000248 |
| Magnesium Sulfate (MgSO4-7H2O) | 246 | 200 | 0.818 |
| Potassium Chloride (KCl) | 76 | 400 | 5.33 |
| Sodium Bicarbonate (NaHCO3) | 84 | 3700 | 44.06 |
| Sodium Chloride (NaCl) | 58 | 6400 | 110.84 |
| Sodium Phosphate monobasic (NaH2PO4-2H2O) | 164 | 141 | 0.918 |
| Other Components | | | |
| D-Glucose (Dextrose) | 180 | 4500 | 26 |
| Phenol Red | 376.4 | 15 | 0.0389 |

DMEM – high glucose



Sérum

- nejčastěji bovinní fetální*, ale i jiné zdroje

- lidské, koňské, kozí, myší,...
- embryonálí (fetální), novorozenecká, dospělá

*fetální => nízká hladina nízkoafinitních imunoglobulinů (protilátek)

- různé stupně kvality

- testy na přítomnost endotoxinů
- testy na snášenlivost konkrétním typem buněk
- testy na přítomnost virů
-


- různé země původu (USA, Austrálie,...)

- různé šarže (lot number)

normální x inaktivní sérum

- inaktivace séra = 30 (45) minut při 56 °C
=> inaktivace komplementu atd...





Při přípravě médií je pH nastaveno/doladěno HCl (1M) a NaOH (1M).

pH v kultuře se mění v důsledku metabolismu buněk, zejména produkcí laktátu a CO_2


V průběhu kultivace je udržováno:

- 1) Přítomnými ionty, zejména fosfátovými (z fosforečnanů)
- 2) Proteiny s pufracními schopnostmi
- 3) **Systémem $\text{H}_2\text{CO}_3 / \text{CO}_2$**
- 4) Alternativně silně pufrujícími látkami jako je HEPES, BES, TES

K orientační detekci pH média v kultuře slouží fenolová červeň přidávaná do médií.



Phenol red, 40 µM in cell culture medium (DMEM)



Wikipedia

Pufrační systém H_2CO_3 / CO_2 (NaHCO_3)



<http://www2.biomed.cas.cz/d331/vade/ph.html>

Kultivace : **otevřená** – s výměnou plynů (zejména přísun CO_2 z vnějšku)

uzavřená – bez výměny plynů (používá se ~ ½ množství NaHCO_3)

- Při otevřeném systému kultivace se nejčastěji udržuje atmosféra s navýšeným obsahem CO_2 , standardně 5% CO_2 (regulovaný přísun ze zásobní bomby) a **95% vody** (regulovaný přísun, nebo častěji spontánním odparem ze zásobníku).

V některých speciálních případech je vhodné použít polotekutá až pevná média

Takové médium se připraví přídavkem:

- Agaru (je třeba dát pozor na přehřátí složek média během přípravy, teplota by neměla být vyšší jak 40°C)
- Metylcelulósy
- Kolagenu (transparentní, buňky lze barvit některými histologickými barvivy)
- Fibrinogenu (po aktivaci -> fibrin / fibrinová síť)
- je možné použít i čistě syntetické polymery, např. metakryláty (hydrogely)

Trvanlivost a uchování médií a jejich doplňků

!doporučení výrobce – dodavatele!

- **Solné roztoky** jsou stabilní i při R.T. (room temperature $\sim 20^{\circ}\text{C}$)
- **Většina složek média (aminokyseliny, vitaminy, sacharidy,...)** je stabilní po dobu jednoho roku při 4°C a tmě
- **Glutamin** v roztoku se nejpozději po 3 měsících začne rozkládat = je třeba ho přidávat samostatně ze zamražené zásoby. Jeden rok při 4°C se ale ještě považuje za akceptovatelný, možno nahradit médii s Glutamax a pod.
- **Sérum** při 4°C až 2 měsíce, při -20°C až 3 roky
- **Obecně při teplotách pod -70°C je vše stabilní minimálně 1 rok**
- **Stabilita** je závislá na tekutosti / zmrzlosti roztoku, což je ovlivněno složením a koncentrací rozpouštěných komponent. Např. soli a glycerol posouvá bod tuhnutí k nižším teplotám (při -20°C není 10% roztok glycerolu úplně zmrzlý) a DMSO k vyšším teplotám (tuhne už při $\sim +6^{\circ}\text{C}$)

Biologické faktory – v kultuře roste ještě něco navíc než požadujeme = čistota kultury / sterilita

- **Jiné buněčné linie** (zkreslení výsledků buněčnou specializací, dominance invazní buněčné linie = zánik původní buněčné linie)
- **Plísně, kvasinky, bakterie** (toxiny, vyčerpání média = zkreslení výsledků, úhyn buněk, ohrožení experimentátora)
- **Viry** (zkreslení výsledků, úhyn buněk, ohrožení experimentátora)

1. PREVENCE + MONITORING!

2. LÉČENÍ

PREVENCE

PROVOZ

- Laboratoř TC (LTC) je pokud možno oddělená od ostatních prostor, nevětrá se přímo okny, ale pokud možno přes ventilační systém s filtrací
- Pravidelně se provádí úklid a desinfekce povrchů (prostředky na bázi chloru – SAVO, Jodu – Ajatin, 70% EtOH nebo isopropylalkohol,...)
- LTC je periodicky vysvěcována germicidní (širokospektré UV) lampou
- Pracovníci LTC používají pracovní oblečení určené jen pro LTC a před vlastní prací si desinfikují ruce příslušnými prostředky (minimálně použití 70% EtOH)
- S kulturami se pracuje pokud možnou pouze ve Flow-boxu

MATERIÁL

Čisté materiály se podle své odolnosti / vlastností sterilizují-desinfikují:
(čistý z čistých surovin nebo po důkladném omytí speciálními detergenty)

autoklávováním (120°C, 20-30 minut)

– solné roztoky, některé pufry, agar, želatina/kolagen, některý plastik,..

suchým teplem (180°C, 3 až 4h)

– sklo, vzácně některý plastik (do 120°C)

zářením gama (vzácně i UV – jen povrchy)

– plastik, sklo

filtrováním

- vzduch (HEPA filtry s póry 0,3 µm), roztoky hlavně média a séra běžně přes filtry s póry 0,2 µm)

omytím (2-5% aldehydy, 70% EtOH, 2-5% fenol, 5-10% peroxid vodíku,....)

– nástroje, pracovní plochy, některý plastik, sklo (celkově může být málo účinné a požkozující čištěný materiál)

plamenem

-kovy, sklo

parami alkylačních činidel

- někdy kombinace s autoklávováním (etylén oxid), speciální aplikace jako dekontaminace filtrů flow-boxů, dekontaminace místností (formaldehyd), vždy problém pro obsluhu!

Významným prevenčním agens v médiích jsou antibiotika.

Kritéria pro antibiotika:

- nesmí inhibovat růst a ani ovlivňovat metabolismus buněk
- musí ochraňovat kulturu po celou dobu experimentu
- netoxické a bezpečné pro uživatele
- kompatibilní s ostatními složkami média
- rozpustné v netoxických rozpouštědlech

a) Ochranné proti mikroorganismům

Nejčastěji preventivně *Penicilin/Streptomycin* nebo *Gentamycin*,
léčení a speciální aplikace *Tetracyklin* , *Sparfloxacin*,...

b) Selekcí (viz. Příprava transgenních linií)

Geneticin (G418), *Hygromycin*, *Puromycin*

c) Speciální

Mitomycin C (- blokue replikaci DNA, DNA crosslinker)

| Antibiotikum | likviduje | mechanismus účinku | mechanismus rezistence |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| Penicilin (samostatně se neužívá) | G+ | ISBS | |
| Penicilin G | G+ | ISBS | |
| Ampicilin | G+, G- | | |
| Penicilin/streptomycin | G+, G- | | |
| Penicilin/streptomycin/neomycin | G+, G- | | |
| Gentamycin | G+, G-, mykoplazmata | IP, aminoglykosidové | |
| Kanamycin | G+, G-, mykoplazmata | IP, aminoglykosidové | |
| Streptomycin | G+, G- | IP, aminoglykosidové | mutace v genu pro S 12 ribozomální protein, inaktivace prostřednictvím aminoglykosidové transferázy (Podává se obvykle v kombinaci, kvůli vysokému riziku vzniku rezistence.) |
| Neomycin | G+, G- | IP, aminoglykosidové | |
| Paromomycin | G+, G-, ř. protozoa, omezeně helminti | IP, aminoglykosidové | |
| Spektinomycin | G-, G+ (gonokoky) | IP, bakteriostatický účinek s trukturou podobné aminoglykosidům. | mutace v genu pro ribozomální protein S5. |
| Tylosin | G+, mykoplazmata | IP, makrolidové | |
| Tetracyklin | G+, G- | IP | ztráta permeability buněčné stěny |
| Mytomycin C | G+, G- | I synt. DNA | |
| Polymyxin | G- | Polypeptid s hydrofobním koncem, který funguje jako kationický detergent. Vazba na lipid A bakteriálních LPS, vytváří póry do cytoplazmatické membrány | |
| Amphotericin B (makrolidové) | kvasinky, plís ně | vazba na steroly membrány hub, vytváří kanály do buněčné membrány | |
| Nystatin | kvasinky, plís ně | vazba na steroly membrány hub, vytváří kanály do buněčné membrány | |

Přehled nejčastěji používaných antibiotik
G+ ... grampozitivní bakterie
G- ... gramnegativní bakterie
IP ... inhibuje proteosyntézu
ISBS ... inhibuje syntézu bakteriální stěny

MONITORING

- **V kultuře nebo v zásobních roztocích něco roste co tam nemá být**
(plísně = chomáčky; kvasinky = pučící buňky, řetízky; bakterie = drobné útvary, kulovité až vláknité, někdy řetízky)
- **Dochází k rychlému vyčerpání média (rychle mění barvu z červené na žlutou = pokles pH)**
- **Buňky špatně rostou, nemají správný tvar, adherentní se pouští podkladu**
- **Mikroskopické barvení na celkovou DNA** (zviditelnění mikroorganismů, zejména endoparaziti)
- **Stanovení specifických antigenů (Imunocytochemie, western blot)**
- **Detekce specifických sekvencí pro jednotlivé organismy PCR metodou**
- **Kontrolní kultivací médií samotných nebo po přídavku specifických substrátů**
- **Výsledky experimentů nejsou reprodukovatelné / jsou chaotické**
- **Buňky jsou citlivější ke stresu**



LÉČENÍ

- Likvidace zasažené kultury
- Kombinací antibiotik
- Kultivací buněk v kompatibilním organismu
(např. v břišní dutině = ascites)



?

Chomáček plísně v kultuře



Kvasinky
+
Buňky (HL-60)

Mycoplasma

- Běžným VIS mikroskopem prakticky nejsou vidět
- Intracelulární bezestěně bakterie (trojvrstevná cytoplasmatická membrána)

DETEKCE (je třeba kultivovat bez antibiotik – možné přežívání na pozadí):

- **Vitální barvení na DNA (Hoechst)**
- **Detekce specifických DNA sekvencí pomocí PCR**
- **In situ hybridizace (RNA , DNA)**
- Měření enzymatické aktivity, systémy s transgenními buňkami (fy. Invivogene,...)
- (Inkorporace uracilu (mycoplasma) X uridinu (eukaryontní buňky))

ZDROJE:

- **infikované buňky v TC!**
- práce se zvířaty v laboratoři TC
- pracovníci laboratoře TC

LÉČENÍ:

- **Kombinací antibiotik**
- Pasážováním buněk v kompatibilním organismu (ascites – volně v břišní dutině)

Survival of MG on Various Substances

| | | | |
|----------|---------|----------|----------|
| Cotton | 4 days | Feathers | 4 days |
| Rubber | 2 days | Hair | 3 days |
| Straw | 2 days | Ear | 4 hours |
| Shavings | 8 hours | Nose | 1 day |
| Wood | 1 day | Skin | <4 hours |
| Feed | 4 hours | Buffer | 1 day |

Viabilita některých druhů mycoplasmat za různých podmínek

Investigations into the survival of *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma synoviae*, and *Mycoplasma iowae* on materials found in the poultry house environment. N.H. Christensen, Christine A. Yavari, A.J. McBain, and Janet M. Bradbury, Avian Pathology (1994) 23:127-143.

Survival of MS on Various Substances

| | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| Cotton | 2 days | Feathers | 3 days |
| Rubber | 8 hours | Hair | 8 hours |
| Straw | 12 hours | Ear | 4 hours |
| Shavings | 4 hours | Nose | 12 hours |
| Wood | 12 hours | Skin | 0 hours |
| Feed | 0 hours | Buffer | NT |


Survival of MG under Various Conditions

| | |
|--------------------------|----------------|
| Sunlight | <15 to 120 min |
| UV light | 30 - 90 min |
| Well water with 1% serum | 7 days |
| Well water | 4 - 5 days |
| 50% soil extract | 1 - 3 days |
| Dry at 4° C | 61 days |
| Dry at 20° C | 10 - 14 days |


Survival of MS under Various Conditions

| | |
|--------------------------|---------------|
| Sunlight | 30 to 120 min |
| UV light | 30 - 60 min |
| Well water with 1% serum | 1 - 2 days |
| Well water | 1 - 2 days |
| 50% soil extract | 1 - 2 days |
| Dry at 4° C | 51 - 77 days |
| Dry at 20° C | 10 - 21 days |

Obecné schéma léčení buněčných linií v LTK na mycoplasma




Příklad postupu léčení buněčné kultury na mycoplasma
přípravkem BM-cyclin fy Roche




Účinnost komerčně dostupných antibiotik v léčení kultur napadených mycolasmaty

Uphoff & Drexler 2001




n – počet testovaných buněčných linií

Zdravá buněčná kultura



Buněčná kultura infikovaná mycoplasmaty



(vitální barvení pomocí Hoechst 33258)

MycoAlert® Mycoplasma Detection Kit



MycoZap™ Mycoplasma Elimination Reagent



Základní vybavení laboratoře tkáňových kultur




CO₂ inkubátor




Inverzní mikroskop

Flow-box / laminární box - základní




Flow-box / laminární box – biohazard,



Průtokový cytometr / Flow-cytometer (FACS)

Počítač částic








- Inkubátor / termostat s regulací teploty a složení atmosféry
- Flow-box = laminární box
- Inverzní mikroskop, nejlépe s fázovým kontrastem (Nomarského – vnitřní struktura buněk; Hoffmanův (reliéfní) – plastické znázornění povrchů)
- Počítač částic (hemocytometr, Bürkrova komůrka, Coulter Counter, FACS,...)
- Lednice a mrazáky
- Kontejner s tekutým N₂ (-196°C), nebo extrémně hluboko-mrazící box (-150°C a méně)
- Autokláv (parní sterilizátor), horkovzdušný sterilizátor
- Centrifuga
- Pipetor / Pipetus (manuální nebo elektronický)
- Automatické pipety
- Technické zázemí – umývárna, sklad, šatna,...

BUŇKY V TC


Podle způsobu kultivace

- **Adherentní** (většina, rostou přichyceny k podkladu)
- **Suspenzní** (zejména buňky krve a jejich deriváty, volně se vznášejí v médiu)

Adherentní – (linie HaCaT)



Suspenzní – (linie HL60)





100 μm



Buňky a jejich vlastnosti (v TC).

**PROLIFERACE x DIFERENCIACE
x APOPTÓZA**


PROLIFERACE = dělení buněk




DIFERENCIACE = rozrůžňování buněk



Hierarchie hematopoézy



Apoptóza (+ nekróza) - smrt buňky x viabilita buněk



Podle původu a vlastností

- Primokultury

Buňky izolované většinou ze zdravé tkáně

(obecně zdravý genom, ale většinou omezené možnosti kultivace/dělení buněk)

- Permanentní linie

Nejčastěji buňky izolované z nádorů, ale mohu být i ze zdravé tkáně, případně ze zdravé tkáně a imortalizované (většina chyby v genomu -> nestabilita, jsou ale nesmrtelné), adaptace na podmínky *in vitro*!!!

| PRIMOKULTURY | PERMANENTNÍ LINIE |
|----------------------------------|------------------------------|
| heterogení | klon |
| omezená životnost (H.I.) | nesmrtelné |
| Většinou náročnější na kultivaci | Obecně snadno kultivovatelné |
| variabilita izolací | genetická nestabilita |

| BUŇKY | | |
|---|---|---|
| NORMÁLNÍ | IMORTALIZOVANÉ | NÁDOROVÉ |
| diploidní | diploidní / aneuploidní | diploidní / aneuploidní /polyploidní |
| senescence / Hayflick limit | nesmrtelnost | nesmrtelnost |
| Růst závislý na kontaktu s podložkou (anchorage-dependent) | Růst závislý na kontaktu s podložkou (anchorage-dependent) | Růst je nezávislý na kontaktu s posdložkou (anchorage-independent) |
| ++/- specifické růstové faktory | +/- specifické růstové faktory | +--- specifické růstové faktory |
| netvoří nádory | netvoří nádory | tvoří nádory |

RŮST BUNĚK V TC

- A) Buňky se v kultuře nedělí – je třeba periodicky měnit kultivační médium (terminálně diferencované, postmitotické buňky, často u primokultur)
- B) Buňky se v kultuře dělí = **proliferují** – je třeba je pasážovat (ředit a měnit médium, většina buněk primokultur a permanentních linií)

Pasážování – periodické „ředění buněk“, obecně spojené i s výměnou média


Adherentní linie* – mechanicky nebo **enzymatickým štěpením** vazeb buňky / substrát; buňka / buňka
Enzymy - **trypsin**, collagenáza,..; inaktivace spec. inhibitory, vyředěním, nadbytkem proteinů (např. sérem)
Pomocné látky – EDTA (zejména vychytávání Ca^{2+})

Suspenzní linie – prostým ředěním


* Ve většině případů je u adherentních linií nutno počítat s jejich zvýšenými nároky na kvalitu podkladu, na kterém rostou. Běžně se používá ošetření 0.01 – 0.1 % roztokem želatiny (prasečí, hovězí) v dH_2O . Podle potřeby a typu buněk se používají ale i ostatní proteiny ECM.

Pasážování buněk pomocí tzv. trypsinizace (enzymatické rozvolnění)

konfluentní buňky (100%)



rozvolněné konfluentní buňky




rozvolnění buněk deplecí Ca^{2+} iontů
(chelatony např. EDTA)




růst kultury

nová pasáž (konfluence ~20%)



enzymaticke štěpení
např. trypsinem


enzymaticky rozvolněné buňky
(suspenze)



část buněk na novou misku,
do nového média



Proliferaci buněk v kultuře charakterizuje **růstová křivka** s 3 fázemi



Dále je buněčná proliferace charakterizována:

Buněčná - denzita – počet buněk na ml nebo cm^2

- **konfluence** – počet buněk na plochu u adherentních linií (b. / cm^2 , častěji „%“ plochy)

Generační dobou - doba mezi dvěma mitózami / rozdeleními buňky = délka buněčného cyklu

Doubling time – čas potřebný ke zdvojnásobení buněk v populaci

Hayflickův limit – v případě většiny primokultur počet možných dělení, buněčně specifické (senescence – stárnutí buněk, „quiescence – klid/spánek buněk“)

Analýza buněčné proliferace


Počítáním buněk




- v mikroskopu (Bürkrova komůrka / hemocytometr)
- přístroji (Coulter counter – počítač částic, FACS – , průtokový cytometr, u většiny přístrojů potřeba vnitřního standardu)

Přírůstek v množství DNA (lze použít i pro jednotlivou buňku)

- Inkorporace ^3H thymidinu (měří se přírůstek radioaktivity, celkový, nebo u jednotlivé buňky)
- Inkorporace BrdU (bromdeoxyuridinu, analog thymidinu), množství BrdU se stanoví pomocí protilátky (lze na populaci i jednotlivé buňce), nověji EdU (5-ethynyl-2'-deoxyuridine)
- Celkové množství DNA v buňce -> stanovení fáze buněčného cyklu

Průtokový cytometr (Flow-cytometer / FACS)





Přírůstek celkových proteinů

- nepoužitelné u buněk produkujících velké množství extracelulární matrix (ECM)

Stanovení enzymatické aktivity (enzymy permanentních metabolických drah)

- testy využívající tetrazoliové soli (např. MTT, WST-1), které jsou redukovány na barevné formazany, které se dají stanovit spektrofotometricky (různé tetrazoliové soli jsou různě citlivé pro jednotlivé enzymatické (oxidačně redukční, NADP) systémy a i vhodné pro různé typy buněk)
- Stanovení celkového množství ATP


Stanovení exprese specifických proteinů spřažených s proliferací

- imunohistochemicky (jednotlivé buňky)
- western blotem (celkově v populaci)

(PCNA, Ki-67, cykliny, inhibitory na cyklinech závislých kináz (cyklin-dependentní kinázy),...


Nedílnou součástí sledování proliferační aktivity buněk je i detekce jejich životaschopnosti = **viability**, která je spojená s buněčnou smrtí = **apoptózou**, případně s **nekrózou**


Analýza viability a apoptózy






A) Testy založený na kompaktnosti zdravé buňky a jejím „správném“ chování / funkci

- Morfologické změny (apoptická tělíska, výběžky, ...)
- Schopnost vylučovat barviva živými buňkami (eosin, bromfenolovou modř pro detekci ve VIS, propidium iodid pro fluorescenci: mikroskopicky, FACS)
- Enzymatická aktivita, nejčastěji esterázy (fluorescein diacetát pro fluorescenci: mikroskopicky, FACS, možno kombinovat s propidium iodidem)
- U adherentních buněk lze hodnotit počet adherovaných a plovoucích (mrtvých / apoptických buněk)
- Změny ve struktuře cytoplasmatické membrány -> anexin / fosfatidylseriny






Annexin assay




B) Testy založeny na stanovení biochemických a molekulárně biologických parametrů

- Fragmentace DNA (elektroforeticky = tzv. apop. žebříček DNA, in situ = TUNEL assay, Comet assay)
- Aktivita specifických proteáz = kaspásy, detekce fragmentace substrátů kaspás
- Hladiny pro- a anti-apoptických proteinů rodiny Bcl-2
- Kompaktnost mitochondrií (změny v polarizaci m. membrány, vylití cytochromu c)




TUNEL assay, red - nuclei, green apoptosis



TUNEL – Terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling

Comet assay



Eosin (Trypan blue) stain of viability






Figure 1 - Photomicrographs showing the classification of *Ctenomys torquatus* blood cells in the comet assay. **A**, Class 0, undamaged; **B**, class 1; **C**, class 2; **D**, class 3; **E**, class 4, maximum damage; **F**, apoptotic cell. Bar = 10 µm.

A

| BLEO mU/ml | 0 | 5 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| % viability ¹ | 86 ±36 | 76 ±5 | 73 ±4.8 | 63 ±2.5 | 51 ±9 | 43 ±3 | 27 ±3.5 |
| [³ H] thymidine ² | 3868 ±479 | 2675 ±215 | 6998 ±682 | 12711 ±820 | 42624 ±2010 | 63226 ±11300 | 74276 ±10900 |

1 - % viable cells out of total cells

2 - [³H] thymidine release assay (DPM)**B****C****D**

Diferenciace buněk



V průběhu kultivace (pasážování) buněk se volbou vhodných podmínek snažíme, aby si buňky dlouhodobě zachovali stabilní genotyp i fenotyp. Přitom u nádorových linií je udržení stabilního genotypu už z principu problematické. Změny kultivačních podmínek mohou vést k nestabilitě již tak obecně nestabilního geneotypu u nádorových linií, ale vedou zejména ke změně fenotypu => diferenciaci, a to jak cílené tak náhodné.

DIFERENCIACE JE PRAKTICKY VŽDY SPOJENA I SE ZMĚNOU PROLIFERAČNÍCH PARAMETRŮ, PŘÍPADNĚ I S APOPTÓZOU.

Parametry analýzy diferenciace:

- změny v morfologii buněk
- změny v expresi genů: detekce specifických mRNA a specifických proteinů (v časných stádiích zejména transkripční faktory, později zejména strukturní proteiny a enzymy)
- funkční testy (fagocyty – fagocytóza; nervy – přenos signálu, depolarizace membrány, produkce mediátorů; svaly – odpověď na stimulus, kontrakce; epitely - produkce mucinů;.....; **transplantace** a sledování jak se transplantované buňky zapojí do funkce dané tkáně)


Účinek séra na RA indukovanou neurální diferenciaci EC buněk



RT-PCR analýza exprese
liniově specifických genů


Účinek séra na RA indukovanou neurální diferenciaci EC buněk

Nediferencované buňky EC






- ◆ buněčná jádra
- ◆ cytokeratin EndoA pozitivní buňky – entoderm
- ◆ N-CAM pozitivní buňky - neurony

Diferencované buňky EC monovrstva + RA - sérum




Diferencovane buňky EC monovrstva + RA + sérum






Elektrofyziologické parametry kardiomyocytů jako součást identifikace jejich fenotypu

Akční potenciál atriálního kardiomyocytu



Akční potenciál ventrikulárního kardiomyocytu



Zdroje buněk v TC

A) Tkáňová banka nebo darem

např. American Tissue Culture Collection (www.atcc.com)

B) Příprava kmenů (populace) nebo klonů (z jednotlivé buňky) z nádorů

Izolace nádoru, jeho enzymatická disociace na buněčnou suspenzi,
kultivace buněk ve vhodných podmínkách, selekce zajímavých kmenů, klonů
a jejich charakterizace v průběhu kultivace -> linie musí vykazovat dostatečnou stabilitu
v průběhu kultivace, aby byla zachována reprodukovatelnost výsledků.

Popis nově získané linie by měl obsahovat co nejvíce její charakteristik.

Původ (typ nádoru, věk a pohlaví dárce, způsob získání, počet pasáží od jejího
ustanovení, charakterizace fenotypu i genotypu,...)


C) Příprava primokultur z živočišných tkání

Příprava myších embryonálních fibroblastů

MEF – mouse embryonic fibroblast

PEF – primordial embryonic fibroblast


- Připravují se nejčastěji z 13.5 denních embryí (11-13.5 dpc.)
- Gravidní samice se usmrtí a vypreparuje se děloha s embryí
- Z embryí se odstraní hlava a vnitřní orgány
- Zbytek embrya se enzymaticky a mechanicky rozruší a po odstranění kompaktních zbytků, se suspenze vyseje na kultivační misku
- Rozrostlé buňky se zamrazí (pasáž 0) a nebo se dále kultivují (~6-15 pasáží ~ 24-60 dnů, Hayflick limit)



Příprava stromálních buněk kostní dřeně BMSC – bone marow stromal cells


- Vypreparujeme stehenní kost, odstřihneme hlavice a propláchneme (např. injekční stříkačkou) vhodným kultivačním médiem do kultivační misky (lze i kost navrtat a odsát (např. injekční stříkačkou) = možné autotransplantace).
- Po 24 hodinách kultivace odstraníme médium se zbylými krevními elementy opláchneme a přidáme nové médium.
- Stromální buňky postupně vytváří nepravidelné kolonie fibroblastům podobných buněk
- Standardně je lze kultivovat minimálně 2-3 týdny

Pozn. potkaní a lidské rostou lépe jak myší



Příprava myších ES buněk

ES – embryonic stem, embryonální kmenové



Dlouhodobé uchování buněčných linií v TC

Permanentní kultivace

- selekce buněk s odlišnými vlastnostmi než měly ty původní
- časově a finančně náročné

- Empiricky je za stabilní považováno 10 – 30 pasáží v závislosti na buněčné linii a i na kultivačních podmínkách.
- Nádorové linie jsou obecně méně stabilní (poškozený genotyp) než primokultury (zde ale nevýhoda Hayflickova limitu).
- Výjimkou se v současné době zdají být myší ES buňky, u kterých jsou známy kultivační podmínky, kdy dlouhodobě (> 100 pasáží) v zásadě nemění své vlastnosti.

Zamražování buněk

Obecně v kultivačním médiu

- a) se zvýšeným obsahem séra (20-100%)
- b) se sérem (10-20-50%) s přídavkem DMSO (5-10%)
- c) vzácně se sérem (10-20-50%) a přídavkem glycerolu (10%)

Buňky je třeba zchlazovat postupně na $\sim -80^{\circ}\text{C}$, poté se přenesou do ultra-hlubokomrazícího boxu ($\sim -185^{\circ}\text{C}$) nebo do tekutého N_2 (-196°C) k trvalému uchování. Je vhodné pro zamražení používat vysoké koncentrace buněk $\sim >10^7$ buněk na ml média.

Postupné zchlazování

- V lázni s isopropylalkoholem (R.T.), přenos přímo do hlubokomrazícího boxu (~ -80°C), teplota klesá rychlostí ~ 1°C za 1 minutu
- Zanořováním do par N₂
- V termoisolačním materiálu (např. pěnový polystyren) přímo do hlubokomrazícího boxu, po 3 hodinách k trvalému uchování
- V termoisolačním materiálu na ~ 2-4h do mrazícího boxu (-20°C), pak na 3 hodiny do hlubokomrazícího boxu, následně k trvalému uchování
- Teplota nesmí kolísat, zejména k vyším teplotám

Rozmražování buněk

Buňky je třeba rychle převést z hlubokého zamražení ($\sim 190^{\circ}\text{C}$) na kultivační teplotu, opláchnout zamražovací médium (centrifugací) a vyset k další kultivaci. Druhý den po vysetí je vhodné vyměnit kultivační médium za nové a odstranit tak zbytky buněk, které zamražení/rozmražení nepřežily.

Kryo-zkumavky



Dewarovy nádoby



Přeprava buněk

- V zamraženém stavu v tekutém N₂ (v termosce, dálková, lokální přeprava)
- V zamraženém stavu v isolačním boxu se suchým ledem (CO₂)
(na krátké i velké vzdálenosti, zásilkové společnosti mívají i službu s doplňováním suchého ledu)
- Živé v kultuře, v kultivační nádobce s nadbytkem média
(v závislosti na buněčném typu 1 – 3 dny), každopádně i zde je se třeba vyhnout teplotním výkyvům
buňky nesmí zmrznou ani se přehřát => 0-40°C
- Tkáně (s výjimkou krve) se přepravují podchlazené (ne zmrzlé)
ve výživných médiích, často s kryo-protektivy

Synchronizace buněk v buněčném cyklu

Fyzikální metody

- Setřásání mitotických buněk u adherentních kultur
- Centrifugace (G₀/G₁ buňky jsou nejlehčí)
 - a) v gradientu
 - b) elutrace (centrifugace s protiproudem média)
- FACS, sortování pomocí flow-cytometru
- Membránové vymývání (zdokonalená metoda setřásání)
- Kontaktní inhibice


Chemické metody

- Deprivace odstraněním růstových faktorů (sérem)
- Deprivace odstraněním iso-leucinu z média
- Deprivace odstraněním Ca²⁺
- Přídavek hydroxyurei, inhibice RNA syntézy -> blok DNA syntézy
- Dvojitý thymidinový blok
- Mitotické jedy, inhibují reorganizaci mikrotubulů / dělícího vřeténka (kolchicin, kolcemid, nocodazol, ...) – zejména zviditelnění chromozomů, karyotypyzace

Srovnání synchronizace v buněčném cyklu deprivací sérem (**A**) a kontaktní inhibicí (**B**)


A

Serum Deprivation




B

Contact Inhibition




Příklad rozjezdu buněk synchronizovaných deprivací sérem
myší fibroblasty linie NIH/3T3




Princip dvojitého bloku přídavkem nadbytku thymidinu

- nadbytek thymidinu blokuje průchod S-fází buněčného cyklu, blokuje DNA syntézu







Elutrační kyveta / hylzna

- separace buněk pomocí protiproudého gradientu na speciální centrifuze - elutrátoru



Fucci system

(fluorescent ubiquitination-based cell cycle indicator; Sakue-Sawano et al., 2008)



Současná kultivace více buněčných typů


- Produkce růstových faktorů s parakrinním účinkem
- Vhodné mechanické vlastnosti podkladu atd.

V případě přímého kontaktu odlišení buněk na základě jejich vlastností

- Exprese specifických proteinových markerů na povrchu buněk
- Selekce díky expresi nějakého proteinu (enzymu, fluoreskujících proteinů,...)
- Inhibice mitotické aktivity jednoho typu buněk (gama zářením, Mytomycinem C,...)

Pokud je třeba maximálně minimalizovat riziko vzájemné kontaminace

- Buňky v kultuře jsou odděleny polopropustnými membránami




3-D kultivace

Dostupnost živin a odstraňování zplodin metabolismu je limitující, většina buněk v TK je předurčena určitému fenotypu ~ netvoří cévy


Difúzní koeficienty (cm² / s) pro O₂ a CO₂ pro různé biologické materiály


| | O ₂ | CO ₂ |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| vzduch (0°C) | 0,178 | 0,139 |
| (20°C) | 0,20 | |
| voda (20°C) | 20x10 ⁻⁶ | 18x10 ⁻⁶ |
| (37°C) | 33x10 ⁻⁶ | |
| lidské plíce (37°C) | 23x10 ⁻⁶ | |
| svaly (20°C) | 14x10 ⁻⁶ | |
| kůže mloka (25°C) | 14x10 ⁻⁶ | |
| pojivová tkáň (20°C) | 12x10 ⁻⁶ | |
| rosol žabího vajíčka (20°C) | 10,2x10 ⁻⁶ | |
| obal žraločího vajíčka (15°C) | 3,0x10 ⁻⁶ | |
| kůže úhoře (14°C) | 2,4x10 ⁻⁶ | |
| obal lososí jikry (5-15°C) | 1,8x10 ⁻⁶ | |
| Chitin (20°C) | 0,7x10 ⁻⁶ | |

Collagen-coated glass (2D)




Collagen gel (3D)






Kultivace na propustných a porézních materiálech

A




B

AB-positive cells ($\times 10^4$)




C

AB-positive cells ($\times 10^4$)



D

fold increase in number of cells after de-stacking



4 h after de-stacking and 4 days later








Figure 1b: Cell sheet engineering– using temperature-responsive polymer.







Sféroidy & Organoidy

*neurosféry
mamosféry
embryoidní tělíska*



embryoidní tělíska







Tkáňové řezy - na pomezí kultivace buněk a tkání/orgánů


Vlastnosti (výhody x nevýhody)

- Dospělé, zdravé buňky, podobné buněčným primokulturám
- Žádné nebo omezené schopnosti expanze
- Zachování kontaktů mezi buňkami jako v tkáni
- Morfologie buněk jako v tkáni
- Částečné zachování 3D struktury tkáně (limit pro difúzi O₂, tloušťka řezu – max 300µm)
- Studie více odpovídají studiím na tkáních než jak je tomu u buněčných linií
- Velmi omezená dostupnost lidských vzorků, ale lepší jak pro tkáně/orgány
- Výrazně jednoduší kultivace než tkání/orgánů
-atd.

- **Kultivace na mřížce** = přísun média/živin z obou stran řezu
- **Nízký sloupec media nad vzorkem** = dostečný přísun O₂
- **Vysoký sloupec média pod vzorkem** (mřížkou) = dostatečná pufrační kapacita pro pH a zplodiny metabolismu + dostatek substrátů pro metabolismus







Maund et al., 201

Přístroje pro tkáňové řezy

Krumdieck tissue slicer



Vibratome



Imortalizace buněk

Proč?

- převedení primokultur v permanentní linie
- zjednodušení kultivačních podmínek

a) Spontánně – pomalé, často málo účinné


b) Cíleně

- fyzikálními faktory: Gama záření, Rentgenové záření (záření X), teplota
- chemickými faktory: NiCl, NiSO₄, Dimethylsulphate, N-methyl-N-nitrosouera (MNU), benzo[a]pyrene diol epoxide, 4-nitroquinoline 1-oxide (4NQO)
- biologickými faktory: **viry** - virus Epstein Barrové, virus myší leukémie, virus Rousova sarkomu, SV40
vektory (plasmidy / viry) exprimujícími transformující protein, např. antigen SV40 large T nebo adenovirus E1A,..

Cílené genetické manipulace

Změny genetické informace, vložením, poškozením nebo vypnutím genu / genů

- Vektory plasmidové a virové
- Chemicky nebo fyzikálně – viz. imortalizace




a) Infekcí – viry

b) Chemicky


- lipofekce: obalení vektoru s lipidami a fúze komplexu s cytoplasmatickou membránou
 - Ca^{2+} precipitace: vysrážení vektoru na povrchu buněk v komplexu s Ca^{2+} a jeho pohlcení buňkou endocytózou
 - transfekce pomocí dextranu: komplex vektor / dextran spojený diethylaminoethylem je endocytován do buňky
 - transferofekce: vektor je navázán na transferin a přes transferinový receptor endocytován do buňky
- c) Mikroinjikace
- d) Elektroporace - narušení buněčné membrány elektrickým výbojem a difuze vektoru do buňky
- e) Nucleofekce - elektroporace v kombinaci s chemií, přenos vektoru do jádra
- f) Biolisticky – vektor navázaný na partikuli (zlato, wolfram) je vstřelen do tkáně, buněk

Vnesení vektoru do buněk


Lipofekce





Elektroporace & nukleofekce



Biolistika



Mikromanipulátor



Selekce buněčných klonů

Adherentní buňky pod selekčním antibiotikem, při dostatečné nízké účinnosti transfekce nebo jejich konfluenci tvoří samostatné kolonie, které lze mechanicky, případně za pomoci proteáz (trypsin, kolagenáza) oddělit

Suspenzní buňky pod selekčním antibiotikem je třeba rozklonovat mezním ředěním (někdy potřeba i u adherentních), nebo růst v polotekutém / viskózním médiu (agar apod.)

Nejběžnější selekční antibiotika pro savčí buňky

G418 / Neomycin, Hygromycin B, Puromycin

Dodatek – TKÁNĚ a ORGÁNY

Tkáně umíme kultivovat / připravovat jen velice omezeně, většinou jde pouze o uchování po určitou dobu, podobně jako orgány.

U orgánů je již aktuální otázka přívodu živin, kyslíku a odvodu metabolitů a CO₂. Orgány je tedy třeba mít metabolicky utlumeny (podchlazením) a nebo napojeny na oběh s živinami simulující krevní zásobení.

V současné době je zvládnutá problematika krve (lze zamrazit), částečně pak epidermis / kůže a jaterní tkáně. Intenzivně se studují možnosti využití buněk pankretu (Langernhansových ostrůvků) z prasat. Velkým příslibem pro transplantace jsou také buňky a tkáně připravené z kmenových buněk.

Epidermis – primokultury prasečích / lidských keratinocytů pěstované na syntetických nosičích se používají k regeneraci poškození epidermis po popáleninách apod.

Částečné úspěchy jsou při přípravě umělých jater, kdy separované hepatocyty jsou vysety do reaktoru na rozvodné potrubí z polopropustných membrán. Celý takový bioreaktor pak připomíná skutečná játra s krevní oběhem a odvodem žluči. Hepatocyty se však zatím nedaří dostatečně efektivně zamražovat k dlouhodobému uskladnění a tak využití podle potřeby.



Rostlinné explantáty

RNDr. Helena Lipavská, Ph.D.

Podobné tkáňovým kulturám

- Nároky na čistotu / sterilitu
 - Práce v laminárních boxech
 - Růst za sterilních podmínek +/-
 - Speciální inkubátory, klimaboxy – světelný režim
 - Živné půdy s agarem (pevné), v závislosti na typu +/- glukóza





Organogeneze in vitro





Somatická embryogeneze



Pylová embryogeneze



Založení kultury a její regulace



Doporučená literatura:

- Lesko, J. a kol.: Práce s tkanivovými kulturami, Bratislava, Vydavatelstvo slovenskej akademie ved 1975, s. 212.
- Alberts, B. a kol.: Základy buněčné biologie. Úvod do molekulární biologie buňky. Ústí nad Labem, Espero Publishing 1998, 630 s.
- Alberts, B. a kol.: Molekular biology of the cell. New York & London, Garland Publishing, Inc. 1994, 1294 s.
- Spector, D. L. a kol.: Cells. A laboratory manual. Volumes 1, 2, 3. New York, Cold Spring Harbor Laboratory Press 1998, 3 197 s.
- Cellis, J. E. a kol.: Cell Biology. A laboratory handbook. San Diego, London, Academic Press Inc. 1994, 1714 s.
- Sambrook, J. a kol.: Molecular Cloning. A laboratory manual. New York, Cold Spring Harbor Laboratory Press 1989, 1832 s.
- Ausubel, F. a kol.: Short Protocols in Molecular Biology. USA, Published by John Wiley & Sons Inc. 1995, 728 s.