

Lineární algebra

M1030 Matematika pro biology
24. a 31. 10. 2024

Základní pojmy

Motivace

Matice a vektory

„Klasifikace“ matic

Operace s maticemi

Řešení soustav rovnic – Gaussova eliminace

Determinanty

Řešení soustav rovnic – Cramerovo pravidlo

Regulární matice

Aplikace – maticové populační modely

Základní pojmy


Motivace

- Eulerův model růstu populace: $x(t+1) = rx(t)$
 $x(t)$... velikost populace v čase t
 r ... růstový koeficient ($r = 1 + b - d$, b porodnost, d úmrtnost)



- Caswellův model růstu populace strukturované podle plodnosti:

$$\begin{aligned}x(t+1) &= \sigma_1(1 - \gamma)x(t) + f y(t) \\y(t+1) &= \sigma_1\gamma x(t) + \sigma_2 y(t)\end{aligned}$$



$x(t)$... množství juvenilních jedinců

$y(t)$... množství plodných jedinců

f ... očekávané (průměrné) množství potomků plodného jedince za jednotku času

γ ... $P(\text{juvenilní jedinec během časové jednotky dospěje})$

σ_1 ... $P(\text{juvenilní jedinec přežije časovou jednotku})$

σ_2 ... $P(\text{plodný jedinec přežije časovou jednotku})$

Motivace

- Eulerův model růstu populace: $x(t+1) = rx(t)$
- Caswellův model růstu populace strukturované podle plodnosti:

$$\begin{aligned}x(t+1) &= \sigma_1(1 - \gamma)x(t) + f y(t) \\y(t+1) &= \sigma_1\gamma x(t) + \sigma_2 y(t)\end{aligned}$$

Označení: $\mathbf{x}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$, $\mathbf{R} = \begin{pmatrix} \sigma_1(1 - \gamma) & f \\ \sigma_1\gamma & \sigma_2 \end{pmatrix}$

Motivace

- Eulerův model růstu populace: $x(t+1) = rx(t)$
- Caswellův model růstu populace strukturované podle plodnosti: $\mathbf{x}(t+1) = \mathbf{R}\mathbf{x}(t)$

$$\begin{aligned}x(t+1) &= \sigma_1(1 - \gamma)x(t) + f y(t) \\y(t+1) &= \sigma_1\gamma x(t) + \sigma_2 y(t)\end{aligned}$$

Označení: $\mathbf{x}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$, $\mathbf{R} = \begin{pmatrix} \sigma_1(1 - \gamma) & f \\ \sigma_1\gamma & \sigma_2 \end{pmatrix}$

Matice a vektory

Matice typu (m, n) ... tabulka čísel o m řádcích a n sloupcích

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1,n-1} & a_{1,n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2,n-1} & a_{2,n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3,n-1} & a_{3,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m-1,1} & a_{m-1,2} & a_{m-1,3} & \dots & a_{m-1,n-1} & a_{m-1,n} \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \dots & a_{m,n-1} & a_{m,n} \end{pmatrix}$$

Matice a vektory

Matice typu (m, n) ... tabulka čísel o m řádcích a n sloupcích

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1,n-1} & a_{1,n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2,n-1} & a_{2,n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3,n-1} & a_{3,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m-1,1} & a_{m-1,2} & a_{m-1,3} & \dots & a_{m-1,n-1} & a_{m-1,n} \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \dots & a_{m,n-1} & a_{m,n} \end{pmatrix}$$

Příklady:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 3,1415927 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} \sigma_1(1-\gamma) & f \\ \sigma_1\gamma & \sigma_2 \end{pmatrix}, \quad C = (7)$$

A je matice typu $(2, 3)$, B a R jsou matice typu $(2, 2)$, C je matice typu $(1, 1)$.

Matice a vektory

Matice typu (m, n) ... tabulka čísel o m řádcích a n sloupcích

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1,n-1} & a_{1,n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2,n-1} & a_{2,n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3,n-1} & a_{3,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m-1,1} & a_{m-1,2} & a_{m-1,3} & \dots & a_{m-1,n-1} & a_{m-1,n} \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \dots & a_{m,n-1} & a_{m,n} \end{pmatrix}$$

Příklady:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 3,1415927 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} \sigma_1(1-\gamma) & f \\ \sigma_1\gamma & \sigma_2 \end{pmatrix}, \quad C = (7)$$

A je matice typu $(2, 3)$, B a R jsou matice typu $(2, 2)$, C je matice typu $(1, 1)$.

Číslo lze považovat za speciální případ matice, matice jsou zobecněním čísel.

Matice a vektory

Matice typu (m, n) ... tabulka čísel o m řádcích a n sloupcích

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1,n-1} & a_{1,n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2,n-1} & a_{2,n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3,n-1} & a_{3,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m-1,1} & a_{m-1,2} & a_{m-1,3} & \dots & a_{m-1,n-1} & a_{m-1,n} \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \dots & a_{m,n-1} & a_{m,n} \end{pmatrix}$$

m -rozměrný sloupcový vektor je matice typu $(m, 1)$, $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ \vdots \\ v_m \end{pmatrix}$

Matice a vektory

Matice typu (m, n) ... tabulka čísel o m řádcích a n sloupcích

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1,n-1} & a_{1,n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2,n-1} & a_{2,n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3,n-1} & a_{3,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m-1,1} & a_{m-1,2} & a_{m-1,3} & \dots & a_{m-1,n-1} & a_{m-1,n} \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \dots & a_{m,n-1} & a_{m,n} \end{pmatrix}$$

m -rozměrný sloupcový vektor je matice typu $(m, 1)$, $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ \vdots \\ v_m \end{pmatrix}$

n -rozměrný řádkový vektor je matice typu $(1, n)$,

$$\mathbf{w} = (w_1 \quad w_2 \quad w_3 \quad \dots \quad w_n) = (w_1, w_2, w_3, \dots, w_n)$$

„Klasifikace“ matic

Řekneme, že matice A typu m, n je

„Klasifikace“ matic

Řekneme, že matice A typu m, n je

- čtvercová řádu n , pokud $m = n$

„Klasifikace“ matic

Řekneme, že matice A typu m, n je

- čtvercová řádu n , pokud $m = n$

$$\begin{pmatrix} 8 & 0 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 3,1415927 & \frac{1}{2} \\ \frac{2}{3} & 0 & -\frac{3}{2} \end{pmatrix}, \dots$$

„Klasifikace“ matic

Řekneme, že matice A typu m, n je

- čtvercová řádu n , pokud $m = n$
- horní trojúhelníková, pokud $(\forall i, j) i > j \Rightarrow a_{ij} = 0$

„Klasifikace“ matic

Řekneme, že matice A typu m, n je

- čtvercová řádu n , pokud $m = n$
- horní trojúhelníková, pokud $(\forall i, j) i > j \Rightarrow a_{ij} = 0$

$$\begin{pmatrix} 8 & -4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 3,1415927 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \dots$$

„Klasifikace“ matic

Řekneme, že matice A typu m, n je

- čtvercová řádu n , pokud $m = n$
- horní trojúhelníková, pokud $(\forall i, j)i > j \Rightarrow a_{ij} = 0$
- dolní trojúhelníková, pokud $(\forall i, j)i < j \Rightarrow a_{ij} = 0$

„Klasifikace“ matic

Řekneme, že matice A typu m, n je

- čtvercová řádu n , pokud $m = n$
- horní trojúhelníková, pokud $(\forall i, j)i > j \Rightarrow a_{ij} = 0$
- dolní trojúhelníková, pokud $(\forall i, j)i < j \Rightarrow a_{ij} = 0$

$$\begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 3,1415927 & 0 \end{pmatrix}, \quad \dots$$

„Klasifikace“ matic

Řekneme, že matice A typu m, n je

- čtvercová řádu n , pokud $m = n$
- horní trojúhelníková, pokud $(\forall i, j)i > j \Rightarrow a_{ij} = 0$
- dolní trojúhelníková, pokud $(\forall i, j)i < j \Rightarrow a_{ij} = 0$
- diagonální, pokud $(\forall i, j)i \neq j \Rightarrow a_{ij} = 0$
(je současně horní i dolní trojúhelníková)

„Klasifikace“ matic

Řekneme, že matice A typu m, n je

- čtvercová řádu n , pokud $m = n$
- horní trojúhelníková, pokud $(\forall i, j)i > j \Rightarrow a_{ij} = 0$
- dolní trojúhelníková, pokud $(\forall i, j)i < j \Rightarrow a_{ij} = 0$
- diagonální, pokud $(\forall i, j)i \neq j \Rightarrow a_{ij} = 0$
(je současně horní i dolní trojúhelníková)

$$\begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3,1415927 & 0 \end{pmatrix}, \quad \dots$$

„Klasifikace“ matic

Řekneme, že matice A typu m, n je

- čtvercová řádu n , pokud $m = n$
- horní trojúhelníková, pokud $(\forall i, j)i > j \Rightarrow a_{ij} = 0$
- dolní trojúhelníková, pokud $(\forall i, j)i < j \Rightarrow a_{ij} = 0$
- diagonální, pokud $(\forall i, j)i \neq j \Rightarrow a_{ij} = 0$
(je současně horní i dolní trojúhelníková)
- symetrická, pokud je čtvercová a $(\forall i, j)a_{ij} = a_{ji}$

„Klasifikace“ matic

Řekneme, že matice A typu m, n je

- čtvercová řádu n , pokud $m = n$
- horní trojúhelníková, pokud $(\forall i, j)i > j \Rightarrow a_{ij} = 0$
- dolní trojúhelníková, pokud $(\forall i, j)i < j \Rightarrow a_{ij} = 0$
- diagonální, pokud $(\forall i, j)i \neq j \Rightarrow a_{ij} = 0$
(je současně horní i dolní trojúhelníková)
- symetrická, pokud je čtvercová a $(\forall i, j)a_{ij} = a_{ji}$

$$\begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 3,1415927 & -\frac{1}{2} \\ 3 & -\frac{1}{2} & 7 \end{pmatrix}, \quad \dots$$

„Klasifikace“ matic

Řekneme, že matice A typu m, n je

- čtvercová řádu n , pokud $m = n$
- horní trojúhelníková, pokud $(\forall i, j)i > j \Rightarrow a_{ij} = 0$
- dolní trojúhelníková, pokud $(\forall i, j)i < j \Rightarrow a_{ij} = 0$
- diagonální, pokud $(\forall i, j)i \neq j \Rightarrow a_{ij} = 0$
(je současně horní i dolní trojúhelníková)
- symetrická, pokud je čtvercová a $(\forall i, j)a_{ij} = a_{ji}$
- nulová, pokud $(\forall i, j)a_{ij} = 0$, $O = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

„Klasifikace“ matic

Řekneme, že matice A typu m, n je

- čtvercová řádu n , pokud $m = n$
- horní trojúhelníková, pokud $(\forall i, j)i > j \Rightarrow a_{ij} = 0$
- dolní trojúhelníková, pokud $(\forall i, j)i < j \Rightarrow a_{ij} = 0$
- diagonální, pokud $(\forall i, j)i \neq j \Rightarrow a_{ij} = 0$
(je současně horní i dolní trojúhelníková)
- symetrická, pokud je čtvercová a $(\forall i, j)a_{ij} = a_{ji}$
- nulová, pokud $(\forall i, j)a_{ij} = 0$, $O = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
- jednotková, pokud $a_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j, \end{cases}$ $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Operace s maticemi

A ... matice typu (m, n)

Operace s maticemi

A ... matice typu (m, n)

1. unární operace (matice \mapsto matice; A \mapsto B)

Operace s maticemi

A ... matice typu (m, n)

1. unární operace (matice \mapsto matice; A \mapsto B)

- *Transpozice matice:* $A^T = A' = B$

Matice B je typu (n, m) , $b_{ij} = a_{ji}$

Operace s maticemi

A ... matice typu (m, n)

1. unární operace (matice \mapsto matice; A \mapsto B)

- *Transpozice matice:* $A^T = A' = B$

Matice B je typu (n, m) , $b_{ij} = a_{ji}$

Příklady:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 3,14 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 3,14 \\ 3 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 8 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}^T = (1 \quad -2 \quad 3), \quad \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 3 & \frac{7}{8} \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 3 & \frac{7}{8} \end{pmatrix}$$

Operace s maticemi

A ... matice typu (m, n)

1. unární operace (matice \mapsto matice; A \mapsto B)

- *Transpozice matice:* $A^T = A' = B$

Matice B je typu (n, m) , $b_{ij} = a_{ji}$

Platí: čtvercová matice A je symetrická $\Leftrightarrow A = A^T$.

Operace s maticemi

A ... matice typu (m, n)

1. unární operace (matice \mapsto matice; A \mapsto B)

- *Transpozice matice:* $A^T = A' = B$

Matice B je typu (n, m) , $b_{ij} = a_{ji}$

Platí: čtvercová matice A je symetrická $\Leftrightarrow A = A^T$.

- *Opačná matice:* $-A = B$

Matice B je téhož typu (m, n) , $b_{ij} = -a_{ij}$

Operace s maticemi

A ... matice typu (m, n)

1. unární operace (matice \mapsto matice; A \mapsto B)

- *Transpozice matice:* $A^T = A' = B$

Matice B je typu (n, m) , $b_{ij} = a_{ji}$

Platí: čtvercová matice A je symetrická $\Leftrightarrow A = A^T$.

- *Opačná matice:* $-A = B$

Matice B je téhož typu (m, n) , $b_{ij} = -a_{ij}$

Příklad:

$$-\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 3,14 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -3 \\ 2 & -3,14 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Operace s maticemi

A ... matice typu (m, n)

1. unární operace (matice \mapsto matice; A \mapsto B)

- *Transpozice matice:* $A^T = A' = B$

Matice B je typu (n, m) , $b_{ij} = a_{ji}$

Platí: čtvercová matice A je symetrická $\Leftrightarrow A = A^T$.

- *Opačná matice:* $-A = B$

Matice B je téhož typu (m, n) , $b_{ij} = -a_{ij}$

Operace s maticemi

A ... matice typu (m, n)

2. vnější operace (číslo, matice \mapsto matice; $c, A \mapsto B$)

Operace s maticemi

A ... matice typu (m, n)

2. vnější operace (číslo, matice \mapsto matice; $c, A \mapsto B$)

- Násobení matice číslem (skalárem): $cA = B$

Matice B je téhož typu (m, n) , $b_{ij} = ca_{ij}$

Operace s maticemi

A ... matice typu (m, n)

2. vnější operace (číslo, matice \mapsto matice; $c, A \mapsto B$)

- Násobení matice číslem (skalárem): $cA = B$

Matice B je téhož typu (m, n) , $b_{ij} = ca_{ij}$

Příklad:

$$-\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 3,14 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -1 & -\frac{3}{2} \\ 1 & -1,57 & -\frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

Operace s maticemi

$A \dots$ matice typu (m, n)

2. vnější operace (číslo, matice \mapsto matice; $c, A \mapsto B$)

- *Násobení matice číslem (skalárem):* $cA = B$

Matice B je téhož typu (m, n) , $b_{ij} = ca_{ij}$

Platí

$$-A = (-1)A$$

Operace s maticemi

A ... matice typu (m, n)

3. binární operace (matice, matice \mapsto matice; A, B \mapsto C)

Operace s maticemi

A ... matice typu (m, n)

3. binární operace (matice, matice \mapsto matice; A, B \mapsto C)

- *Součet matic:* $A + B = C$

Obě matice B a C jsou téhož typu (m, n) , $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$

Operace s maticemi

A ... matice typu (m, n)

3. binární operace (matice, matice \mapsto matice; A, B \mapsto C)

- *Součet matic:* $A + B = C$

Obě matice B a C jsou téhož typu (m, n) , $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$

Příklady:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 3,14 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & -1 & -2 \\ -1 & 0,86 & \frac{2}{4} \end{pmatrix} = \\ = \begin{pmatrix} 1+3 & 2+(-1) & 3+(-2) \\ -2+(-1) & 3,14+0,86 & -\frac{1}{2}+\frac{2}{4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ -3 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

Operace s maticemi

A ... matice typu (m, n)

3. binární operace (matice, matice \mapsto matice; A, B \mapsto C)

- *Součet matic:* $A + B = C$

Obě matice B a C jsou téhož typu (m, n) , $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$

Příklady:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 3,14 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & -1 & -2 \\ -1 & 0,86 & \frac{2}{4} \end{pmatrix} = \\ = \begin{pmatrix} 1+3 & 2+(-1) & 3+(-2) \\ -2+(-1) & 3,14+0,86 & -\frac{1}{2}+\frac{2}{4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ -3 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ \frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & \frac{3}{2} \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 2 \end{pmatrix}$$

Operace s maticemi

A ... matice typu (m, n)

3. binární operace (matice, matice \mapsto matice; A, B \mapsto C)

- *Součet matic:* $A + B = C$

Obě matice B a C jsou téhož typu (m, n) , $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$

Platí: A je čtvercová $\Rightarrow A + A^T$ je symetrická

Operace s maticemi

A ... matice typu (m, n)

3. binární operace (matice, matice \mapsto matice; A, B \mapsto C)

- *Součet matic:* $A + B = C$

Obě matice B a C jsou téhož typu (m, n) , $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$

Platí: A je čtvercová $\Rightarrow A + A^T$ je symetrická

Vlastnosti sčítání matic:

Operace s maticemi

A ... matice typu (m, n)

3. binární operace (matice, matice \mapsto matice; A, B \mapsto C)

- *Součet matic:* $A + B = C$

Obě matice B a C jsou téhož typu (m, n) , $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$

Platí: A je čtvercová $\Rightarrow A + A^T$ je symetrická

Vlastnosti sčítání matic:

$$(A + B) + C = A + (B + C) \quad \text{asociativita}$$

Operace s maticemi

A ... matice typu (m, n)

3. binární operace (matice, matice \mapsto matice; A, B \mapsto C)

- *Součet matic:* $A + B = C$

Obě matice B a C jsou téhož typu (m, n) , $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$

Platí: A je čtvercová $\Rightarrow A + A^T$ je symetrická

Vlastnosti sčítání matic:

$$\begin{array}{ll} (A + B) + C = A + (B + C) & \text{asociativita} \\ A + B = B + A & \text{komutativita} \end{array}$$

Operace s maticemi

A ... matice typu (m, n)

3. binární operace (matice, matice \mapsto matice; A, B \mapsto C)

- *Součet matic:* $A + B = C$

Obě matice B a C jsou téhož typu (m, n) , $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$

Platí: A je čtvercová $\Rightarrow A + A^T$ je symetrická

Vlastnosti sčítání matic:

$$\begin{array}{ll} (A + B) + C = A + (B + C) & \text{asociativita} \\ A + B = B + A & \text{komutativita} \\ A + O = O + A = A & \text{existuje neutrální prvek} \end{array}$$

Operace s maticemi

A ... matice typu (m, n)

3. binární operace (matice, matice \mapsto matice; A, B \mapsto C)

- *Součet matic:* $A + B = C$

Obě matice B a C jsou téhož typu (m, n) , $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$

Platí: A je čtvercová $\Rightarrow A + A^T$ je symetrická

Vlastnosti sčítání matic:

$(A + B) + C = A + (B + C)$	<i>asociativita</i>
$A + B = B + A$	<i>komutativita</i>
$A + O = O + A = A$	<i>existuje neutrální prvek</i>
$A + (-A) = O$	<i>ke každé matici existuje opačný prvek</i>

Operace s maticemi

A ... matice typu (m, n)

3. binární operace (matice, matice \mapsto matice; A, B \mapsto C)

- *Součet matic:* $A + B = C$

Obě matice B a C jsou téhož typu (m, n) , $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$

Platí: A je čtvercová $\Rightarrow A + A^T$ je symetrická

Vlastnosti sčítání matic:

$(A + B) + C = A + (B + C)$	<i>asociativita</i>
$A + B = B + A$	<i>komutativita</i>
$A + O = O + A = A$	<i>existuje neutrální prvek</i>
$A + (-A) = O$	<i>ke každé matici existuje opačný prvek</i>

Matice spolu s operací sčítání tvoří Abelovskou grupu.

Operace s maticemi

A ... matice typu (m, n)

3. binární operace (matice, matice \mapsto matice; A, B \mapsto C)

- *Součet matic:* $A + B = C$

Obě matice B a C jsou téhož typu (m, n) , $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$

Operace s maticemi

A ... matice typu (m, n)

3. binární operace (matice, matice \mapsto matice; A, B \mapsto C)

- *Součin matic:* $AB = C$

Matice B je typu (n, p) a matice C je typu (m, p)

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + a_{i3}b_{3j} + \cdots + a_{in}b_{nj} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}$$

Operace s maticemi

A ... matice typu (m, n)

3. binární operace (matice, matice \mapsto matice; A, B \mapsto C)

- *Součin matic:* $AB = C$

Matice B je typu (n, p) a matice C je typu (m, p)

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + a_{i3}b_{3j} + \cdots + a_{in}b_{nj} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}$$

Příklady:

Operace s maticemi

A ... matice typu (m, n)

3. binární operace (matice, matice \mapsto matice; A, B \mapsto C)

- *Součin matic:* $AB = C$

Matice B je typu (n, p) a matice C je typu (m, p)

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + a_{i3}b_{3j} + \cdots + a_{in}b_{nj} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}$$

Příklady:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -3 & 1 \\ 6 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 5 \end{pmatrix},$$

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -3 & 1 \\ 6 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 + 0 \cdot (-3) & 2 \cdot 2 + 0 \cdot 5 \\ -3 \cdot 1 + 1 \cdot (-3) & -3 \cdot 2 + 1 \cdot 5 \\ 6 \cdot 1 + 2 \cdot (-3) & 6 \cdot 2 + 2 \cdot 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -6 & -1 \\ 0 & 22 \end{pmatrix},$$

BA ... nelze vynásobit

Operace s maticemi

A ... matice typu (m, n)

3. binární operace (matice, matice \mapsto matice; A, B \mapsto C)

- *Součin matic:* $AB = C$

Matice B je typu (n, p) a matice C je typu (m, p)

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + a_{i3}b_{3j} + \cdots + a_{in}b_{nj} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}$$

Příklady:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 5 \end{pmatrix},$$

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 & 19 \\ -7 & 8 \end{pmatrix}, \quad BA = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 7 \\ -11 & 1 \end{pmatrix}$$

Operace s maticemi

A ... matice typu (m, n)

3. binární operace (matice, matice \mapsto matice; A, B \mapsto C)

- *Součin matic:* $AB = C$

Matice B je typu (n, p) a matice C je typu (m, p)

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + a_{i3}b_{3j} + \cdots + a_{in}b_{nj} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}$$

Příklady:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Operace s maticemi

A ... matice typu (m, n)

3. binární operace (matice, matice \mapsto matice; A, B \mapsto C)

- *Součin matic:* $AB = C$

Matice B je typu (n, p) a matice C je typu (m, p)

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + a_{i3}b_{3j} + \cdots + a_{in}b_{nj} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}$$

Příklady:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -3 \\ 1 & -1 & 3 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A^2 = AA = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -3 \\ 1 & -1 & 3 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 & -3 \\ 1 & -1 & 3 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -3 \\ 1 & -1 & 3 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Operace s maticemi

A ... matice typu (m, n)

3. binární operace (matice, matice \mapsto matice; A, B \mapsto C)

- *Součin matic:* $AB = C$

Matice B je typu (n, p) a matice C je typu (m, p)

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + a_{i3}b_{3j} + \cdots + a_{in}b_{nj} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}$$

Vlastnosti násobení matic:

Operace s maticemi

A ... matice typu (m, n)

3. binární operace (matice, matice \mapsto matice; A, B \mapsto C)

- *Součin matic:* $AB = C$

Matice B je typu (n, p) a matice C je typu (m, p)

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + a_{i3}b_{3j} + \cdots + a_{in}b_{nj} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}$$

Vlastnosti násobení matic:

$$(AB)C = A(BC) \quad \text{asociativita}$$

Operace s maticemi

A ... matice typu (m, n)

3. binární operace (matice, matice \mapsto matice; A, B \mapsto C)

- *Součin matic:* $AB = C$

Matice B je typu (n, p) a matice C je typu (m, p)

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + a_{i3}b_{3j} + \cdots + a_{in}b_{nj} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}$$

Vlastnosti násobení matic:

$$(AB)C = A(BC) \quad \text{asociativita}$$

$m = n \Rightarrow AE = EA = A$ k čtvercové matici existuje neutrální prvek

Základní pojmy

Řešení soustav rovnic – Gaussova eliminace

Příklad

Soustava lineárních rovnic

Gaussova eliminační metoda

Řešitelnost soustavy lineárních rovnic

Úplná eliminace s výběrem hlavního prvku

Závěrečná poznámka

Determinanty

Řešení soustav rovnic – Cramerovo pravidlo

Regulární matice

Aplikace – maticové populační modely

Řešení soustav rovnic – Gaussova eliminace

Příklad

$$2x + 3y = 7$$

$$x + 2y = 4$$

Příklad

$$2x + 3y = 7$$

$$x + 2y = 4$$

$$x + 2y = 4$$

$$2x + 3y = 7$$

Příklad

$$2x + 3y = 7$$

$$x + 2y = 4$$

$$x + 2y = 4 \quad | \cdot (-2)$$

$$2x + 3y = 7$$

Příklad

$$2x + 3y = 7$$

$$x + 2y = 4$$

$$x + 2y = 4 \quad | \cdot (-2)$$

$$2x + 3y = 7$$

$$-2x - 4y = -8$$

$$2x + 3y = 7$$

Příklad

$$2x + 3y = 7$$

$$x + 2y = 4$$

$$x + 2y = 4 \quad | \cdot (-2)$$

$$2x + 3y = 7$$

$$-2x - 4y = -8$$

$$2x + 3y = 7 \quad +$$

Příklad

$$2x + 3y = 7$$

$$x + 2y = 4$$

$$x + 2y = 4 \quad | \cdot (-2)$$

$$2x + 3y = 7$$

$$-2x - 4y = -8$$

$$2x + 3y = 7 \quad +$$

$$x + 2y = 4$$

$$-y = -1$$

Příklad

$$2x + 3y = 7$$

$$x + 2y = 4$$

$$x + 2y = 4 \quad | \cdot (-2)$$

$$2x + 3y = 7$$

$$\begin{array}{r} -2x - 4y = -8 \\ 2x + 3y = 7 \end{array} \quad +$$

$$x + 2y = 4$$

$$-y = -1$$

$$y = 1, \quad x = 4 - 2 \cdot 1 = 2$$

Příklad

$$2x + 3y = 7$$

$$x + 2y = 4$$

$$x + 2y = 4 \quad | \cdot (-2)$$

$$2x + 3y = 7$$

$$\begin{array}{r} -2x - 4y = -8 \\ 2x + 3y = 7 \end{array} \quad +$$

$$x + 2y = 4$$

$$-y = -1$$

$$y = 1, \quad x = 4 - 2 \cdot 1 = 2$$

Příklad

$$2x + 3y = 7$$

$$x + 2y = 4$$

$$x + 2y = 4 \quad | \cdot (-2)$$

$$2x + 3y = 7$$

$$\begin{array}{r} -2x - 4y = -8 \\ 2x + 3y = 7 \end{array} \quad +$$

$$x + 2y = 4$$

$$-y = -1$$

$$y = 1, \quad x = 4 - 2 \cdot 1 = 2$$

Označení: $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $x = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 7 \\ 4 \end{pmatrix}$

Soustava rovnic: $Ax = b$

Příklad

$$2x + 3y = 7$$

$$x + 2y = 4$$

$$x + 2y = 4 \quad | \cdot (-2)$$

$$2x + 3y = 7$$

$$\begin{array}{r} -2x - 4y = -8 \\ 2x + 3y = 7 \end{array} \quad +$$

$$x + 2y = 4$$

$$-y = -1$$

$$y = 1, \quad x = 4 - 2 \cdot 1 = 2$$

Označení: $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $x = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 7 \\ 4 \end{pmatrix}$

Soustava rovnic: $Ax = b$

Ještě stručnější zápis: $\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 3 & 7 \\ 1 & 2 & 4 \end{array} \right)$

Příklad

$$\begin{aligned} 2x + 3y &= 7 \\ x + 2y &= 4 \end{aligned}$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 3 & 7 \\ 1 & 2 & 4 \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned} x + 2y &= 4 & | \cdot (-2) \\ 2x + 3y &= 7 \end{aligned}$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 7 \end{array} \right)$$

$$\begin{array}{r} -2x - 4y = -8 \\ 2x + 3y = 7 \end{array} \quad +$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} -2 & -4 & -8 \\ 2 & 3 & 7 \end{array} \right)$$

$$\begin{array}{l} x + 2y = 4 \\ -y = -1 \end{array}$$

$$y = 1, \quad x = 4 - 2 \cdot 1 = 2$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & -1 \end{array} \right)$$

Označení: $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $x = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 7 \\ 4 \end{pmatrix}$

Soustava rovnic: $Ax = b$

Ještě stručnější zápis: $\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 3 & 7 \\ 1 & 2 & 4 \end{array} \right)$

Soustava lineárních rovnic

Soustava (systém) m lineárních rovnic o n neznámých:

$$\begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \qquad \vdots \qquad \ddots \qquad \vdots \qquad \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{array}$$

Soustava lineárních rovnic

Soustava (systém) m lineárních rovnic o n neznámých:

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ \vdots &\quad \vdots \quad \ddots \quad \vdots \quad \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m \end{aligned}$$

Maticový zápis: $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \dots \text{ matici soustavy} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \dots \text{ vektor pravých stran}$$
$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \dots \text{ vektor neznámých}$$

Soustava lineárních rovnic

Soustava (systém) m lineárních rovnic o n neznámých:

$$\begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \qquad \vdots \qquad \ddots \qquad \vdots \qquad \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{array}$$

Maticový zápis: $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$

Všechny informace o systému jsou obsaženy v *rozšířené matici soustavy*

$$(\mathbf{A}|\mathbf{b}) = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right)$$

Gaussova eliminační metoda

Elementární řádkové transformace matic:

- výměna (přehození) řádků
- vynásobení řádku nenulovým číslem
- přičtení jednoho řádku k jinému

Gaussova eliminační metoda

Elementární řádkové transformace matice:

- výměna (přehození) řádků
- vynásobení řádku nenulovým číslem
- přičtení jednoho řádku k jinému

Označení: $A \sim B \dots$ „matice B vznikla z matice A pomocí elementárních transformací.“

Gaussova eliminační metoda

Elementární řádkové transformace matice:

- výměna (přehození) řádků
- vynásobení řádku nenulovým číslem
- přičtení jednoho řádku k jinému

Označení: $A \sim B \dots$ „matice B vznikla z matice A pomocí elementárních transformací.“

Algoritmus metody:

1. Užitím elementárních řádkových transformací převedeme rozšířenou matici soustavy na vhodnou horní trojúhelníkovou.
2. Výslednou matici přepíšeme do tvaru soustavy rovnic a vypočítáme jednotlivé složky řešení.

Gaussova eliminační metoda

Příklady:

$$\begin{aligned}3x + y &= 0 \\x - 2y + 4z &= 1 \\2x + y - z &= -1\end{aligned}$$

Gaussova eliminační metoda

Příklady:

$$\begin{aligned}3x + y &= 0 \\x - 2y + 4z &= 1 \\2x + y - z &= -1\end{aligned}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right)$$

Gaussova eliminační metoda

Příklady:

$$\begin{aligned}3x + y &= 0 \\x - 2y + 4z &= 1 \\2x + y - z &= -1\end{aligned}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right)$$

přehození 1. a 2. řádku

Gaussova eliminační metoda

Příklady:

$$3x + y = 0$$

$$x - 2y + 4z = 1$$

$$2x + y - z = -1$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -3 & 6 & -12 & -3 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim$$

vynásobení 1. řádku číslem -3

Gaussova eliminační metoda

Příklady:

$$\begin{aligned}3x + y &= 0 \\x - 2y + 4z &= 1 \\2x + y - z &= -1\end{aligned}$$

$$\begin{array}{ccc|c}3 & 1 & 0 & 0 \\1 & -2 & 4 & 1 \\2 & 1 & -1 & -1\end{array} \sim \begin{array}{ccc|c}1 & -2 & 4 & 1 \\3 & 1 & 0 & 0 \\2 & 1 & -1 & -1\end{array} \sim \begin{array}{ccc|c}-3 & 6 & -12 & -3 \\3 & 1 & 0 & 0 \\2 & 1 & -1 & -1\end{array} \sim \\ \sim \begin{array}{ccc|c}-3 & 6 & -12 & -3 \\0 & 7 & -12 & -3 \\2 & 1 & -1 & -1\end{array}\end{array}$$

přičtení 1. řádku ke 2.

Gaussova eliminační metoda

Příklady:

$$\begin{aligned}3x + y &= 0 \\x - 2y + 4z &= 1 \\2x + y - z &= -1\end{aligned}$$

$$\begin{array}{ccc|c}3 & 1 & 0 & 0 \\1 & -2 & 4 & 1 \\2 & 1 & -1 & -1\end{array} \sim \begin{array}{ccc|c}1 & -2 & 4 & 1 \\3 & 1 & 0 & 0 \\2 & 1 & -1 & -1\end{array} \sim \begin{array}{ccc|c}-3 & 6 & -12 & -3 \\3 & 1 & 0 & 0 \\2 & 1 & -1 & -1\end{array} \sim \\ \sim \begin{array}{ccc|c}-3 & 6 & -12 & -3 \\0 & 7 & -12 & -3 \\2 & 1 & -1 & -1\end{array} \sim \begin{array}{ccc|c}-2 & 4 & -8 & -2 \\0 & 7 & -12 & -3 \\2 & 1 & -1 & -1\end{array}\end{array}$$

vynásobení 1. řádku číslem $\frac{2}{3}$

Gaussova eliminační metoda

Příklady:

$$3x + y = 0$$

$$x - 2y + 4z = 1$$

$$2x + y - z = -1$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -3 & 6 & -12 & -3 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim$$
$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} -3 & 6 & -12 & -3 \\ 0 & 7 & -12 & -3 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 4 & -8 & -2 \\ 0 & 7 & -12 & -3 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 4 & -8 & -2 \\ 0 & 7 & -12 & -3 \\ 0 & 5 & -9 & -3 \end{array} \right) \sim$$

přičtení 1. řádku k 3.

Gaussova eliminační metoda

Příklady:

$$3x + y = 0$$

$$x - 2y + 4z = 1$$

$$2x + y - z = -1$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -3 & 6 & -12 & -3 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim$$
$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} -3 & 6 & -12 & -3 \\ 0 & 7 & -12 & -3 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 4 & -8 & -2 \\ 0 & 7 & -12 & -3 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 4 & -8 & -2 \\ 0 & 7 & -12 & -3 \\ 0 & 5 & -9 & -3 \end{array} \right) \sim$$
$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 0 & 7 & -12 & -3 \\ 0 & 5 & -9 & -3 \end{array} \right)$$

vynásobení 1. řádku číslem $-\frac{1}{2}$

Gaussova eliminační metoda

Příklady:

$$3x + y = 0$$

$$x - 2y + 4z = 1$$

$$2x + y - z = -1$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -3 & 6 & -12 & -3 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim$$
$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} -3 & 6 & -12 & -3 \\ 0 & 7 & -12 & -3 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 4 & -8 & -2 \\ 0 & 7 & -12 & -3 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 4 & -8 & -2 \\ 0 & 7 & -12 & -3 \\ 0 & 5 & -9 & -3 \end{array} \right) \sim$$
$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 0 & 7 & -12 & -3 \\ 0 & 5 & -9 & -3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 0 & 35 & -60 & -15 \\ 0 & 5 & -9 & -3 \end{array} \right)$$

vynásobení 2. řádku číslem 5

Gaussova eliminační metoda

Příklady:

$$3x + y = 0$$

$$x - 2y + 4z = 1$$

$$2x + y - z = -1$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -3 & 6 & -12 & -3 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim$$
$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} -3 & 6 & -12 & -3 \\ 0 & 7 & -12 & -3 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 4 & -8 & -2 \\ 0 & 7 & -12 & -3 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 4 & -8 & -2 \\ 0 & 7 & -12 & -3 \\ 0 & 5 & -9 & -3 \end{array} \right) \sim$$
$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 0 & 7 & -12 & -3 \\ 0 & 5 & -9 & -3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 0 & 35 & -60 & -15 \\ 0 & 5 & -9 & -3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 0 & 35 & -60 & -15 \\ 0 & -35 & 63 & 21 \end{array} \right) \sim$$

vynásobení 3. řádku číslem -7

Gaussova eliminační metoda

Příklady:

$$\begin{array}{l} 3x + y = 0 \\ x - 2y + 4z = 1 \\ 2x + y - z = -1 \end{array}$$

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -3 & 6 & -12 & -3 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \\ & \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -3 & 6 & -12 & -3 \\ 0 & 7 & -12 & -3 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 4 & -8 & -2 \\ 0 & 7 & -12 & -3 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 4 & -8 & -2 \\ 0 & 7 & -12 & -3 \\ 0 & 5 & -9 & -3 \end{array} \right) \sim \\ & \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 0 & 7 & -12 & -3 \\ 0 & 5 & -9 & -3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 0 & 35 & -60 & -15 \\ 0 & 5 & -9 & -3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 0 & 35 & -60 & -15 \\ 0 & 0 & 3 & 6 \end{array} \right) \sim \end{aligned}$$

přičtení 2. řádku k 3.

Gaussova eliminační metoda

Příklady:

$$\begin{aligned}3x + y &= 0 \\x - 2y + 4z &= 1 \\2x + y - z &= -1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) &\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -3 & 6 & -12 & -3 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \\&\sim \left(\begin{array}{ccc|c} -3 & 6 & -12 & -3 \\ 0 & 7 & -12 & -3 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 4 & -8 & -2 \\ 0 & 7 & -12 & -3 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 4 & -8 & -2 \\ 0 & 7 & -12 & -3 \\ 0 & 5 & -9 & -3 \end{array} \right) \sim \\&\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 0 & 7 & -12 & -3 \\ 0 & 5 & -9 & -3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 0 & 35 & -60 & -15 \\ 0 & 5 & -9 & -3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 0 & 35 & -60 & -15 \\ 0 & -35 & 63 & 21 \end{array} \right) \sim \\&\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 0 & 35 & -60 & -15 \\ 0 & 0 & 3 & 6 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 0 & 7 & -12 & -3 \\ 0 & 0 & 3 & 6 \end{array} \right)\end{aligned}$$

vynásobení 2. řádku číslem $\frac{1}{5}$

Gaussova eliminační metoda

Příklady:

$$\begin{array}{l} 3x + y = 0 \\ x - 2y + 4z = 1 \\ 2x + y - z = -1 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -3 & 6 & -12 & -3 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \\ \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -3 & 6 & -12 & -3 \\ 0 & 7 & -12 & -3 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 4 & -8 & -2 \\ 0 & 7 & -12 & -3 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 4 & -8 & -2 \\ 0 & 7 & -12 & -3 \\ 0 & 5 & -9 & -3 \end{array} \right) \sim \\ \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 0 & 7 & -12 & -3 \\ 0 & 5 & -9 & -3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 0 & 35 & -60 & -15 \\ 0 & 5 & -9 & -3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 0 & 35 & -60 & -15 \\ 0 & -35 & 63 & 21 \end{array} \right) \sim \\ \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 0 & 35 & -60 & -15 \\ 0 & 0 & 3 & 6 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 0 & 7 & -12 & -3 \\ 0 & 0 & 3 & 6 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 0 & 7 & -12 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right) \end{array}$$

vynásobení 3. řádku číslem $\frac{1}{3}$

Gaussova eliminační metoda

Příklady:

$$\begin{aligned}3x + y &= 0 \\x - 2y + 4z &= 1 \\2x + y - z &= -1\end{aligned}$$

$$\begin{array}{l} \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -3 & 6 & -12 & -3 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \\ \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -3 & 6 & -12 & -3 \\ 0 & 7 & -12 & -3 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 4 & -8 & -2 \\ 0 & 7 & -12 & -3 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 4 & -8 & -2 \\ 0 & 7 & -12 & -3 \\ 0 & 5 & -9 & -3 \end{array} \right) \sim \\ \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 0 & 7 & -12 & -3 \\ 0 & 5 & -9 & -3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 0 & 35 & -60 & -15 \\ 0 & 5 & -9 & -3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 0 & 35 & -60 & -15 \\ 0 & -35 & 63 & 21 \end{array} \right) \sim \\ \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 0 & 35 & -60 & -15 \\ 0 & 0 & 3 & 6 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 0 & 7 & -12 & -3 \\ 0 & 0 & 3 & 6 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 0 & 7 & -12 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right)\end{array}$$

$$\begin{aligned}x - 2y + 4z &= 1 \\7y - 12z &= -3 \\z &= 2\end{aligned}$$

Gaussova eliminační metoda

Příklady:

$$\begin{aligned} 3x + y &= 0 \\ x - 2y + 4z &= 1 \\ 2x + y - z &= -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) &\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -3 & 6 & -12 & -3 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \\ &\sim \left(\begin{array}{ccc|c} -3 & 6 & -12 & -3 \\ 0 & 7 & -12 & -3 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 4 & -8 & -2 \\ 0 & 7 & -12 & -3 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 4 & -8 & -2 \\ 0 & 7 & -12 & -3 \\ 0 & 5 & -9 & -3 \end{array} \right) \sim \\ &\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 0 & 7 & -12 & -3 \\ 0 & 5 & -9 & -3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 0 & 35 & -60 & -15 \\ 0 & 5 & -9 & -3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 0 & 35 & -60 & -15 \\ 0 & -35 & 63 & 21 \end{array} \right) \sim \\ &\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 0 & 35 & -60 & -15 \\ 0 & 0 & 3 & 6 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 0 & 7 & -12 & -3 \\ 0 & 0 & 3 & 6 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 0 & 7 & -12 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x - 2y + 4z &= 1 \\ 7y - 12z &= -3 \\ z &= 2 \end{aligned}$$

$$z = 2$$

Gaussova eliminační metoda

Příklady:

$$\begin{aligned} 3x + y &= 0 \\ x - 2y + 4z &= 1 \\ 2x + y - z &= -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) &\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -3 & 6 & -12 & -3 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \\ &\sim \left(\begin{array}{ccc|c} -3 & 6 & -12 & -3 \\ 0 & 7 & -12 & -3 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 4 & -8 & -2 \\ 0 & 7 & -12 & -3 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 4 & -8 & -2 \\ 0 & 7 & -12 & -3 \\ 0 & 5 & -9 & -3 \end{array} \right) \sim \\ &\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 0 & 7 & -12 & -3 \\ 0 & 5 & -9 & -3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 0 & 35 & -60 & -15 \\ 0 & 5 & -9 & -3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 0 & 35 & -60 & -15 \\ 0 & -35 & 63 & 21 \end{array} \right) \sim \\ &\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 0 & 35 & -60 & -15 \\ 0 & 0 & 3 & 6 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 0 & 7 & -12 & -3 \\ 0 & 0 & 3 & 6 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 0 & 7 & -12 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x - 2y + 4z &= 1 \\ 7y - 12z &= -3 \\ z &= 2 \end{aligned}$$

$$z = 2, y = \frac{1}{7}(-3 + 12 \cdot 2) = 3$$

Gaussova eliminační metoda

Příklady:

$$\begin{aligned} 3x + y &= 0 \\ x - 2y + 4z &= 1 \\ 2x + y - z &= -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) &\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -3 & 6 & -12 & -3 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \\ &\sim \left(\begin{array}{ccc|c} -3 & 6 & -12 & -3 \\ 0 & 7 & -12 & -3 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 4 & -8 & -2 \\ 0 & 7 & -12 & -3 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 4 & -8 & -2 \\ 0 & 7 & -12 & -3 \\ 0 & 5 & -9 & -3 \end{array} \right) \sim \\ &\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 0 & 7 & -12 & -3 \\ 0 & 5 & -9 & -3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 0 & 35 & -60 & -15 \\ 0 & 5 & -9 & -3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 0 & 35 & -60 & -15 \\ 0 & -35 & 63 & 21 \end{array} \right) \sim \\ &\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 0 & 35 & -60 & -15 \\ 0 & 0 & 3 & 6 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 0 & 7 & -12 & -3 \\ 0 & 0 & 3 & 6 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 0 & 7 & -12 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x - 2y + 4z &= 1 \\ 7y - 12z &= -3 \\ z &= 2 \end{aligned}$$

$$z = 2, y = \frac{1}{7}(-3 + 12 \cdot 2) = 3, x = 1 - 4 \cdot 2 + 2 \cdot 3 = -1$$

Gaussova eliminační metoda

Příklady:

$$2x + 3y - z = -12$$

$$x + 2y + z = 9$$

$$5x + 8y + 2z = 15$$

Gaussova eliminační metoda

Příklady:

$$2x + 3y - z = -12$$

$$x + 2y + z = 9$$

$$5x + 8y + 2z = 15$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & -12 \\ 1 & 2 & 1 & 9 \\ 5 & 8 & 2 & 15 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 9 \\ 0 & 1 & 3 & 30 \\ 0 & -2 & -3 & -30 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 9 \\ 0 & 1 & 3 & 30 \\ 0 & 0 & 3 & 30 \end{array} \right)$$

Gaussova eliminační metoda

Příklady:

$$2x + 3y - z = -12$$

$$x + 2y + z = 9$$

$$5x + 8y + 2z = 15$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & -12 \\ 1 & 2 & 1 & 9 \\ 5 & 8 & 2 & 15 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 9 \\ 0 & 1 & 3 & 30 \\ 0 & -2 & -3 & -30 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 9 \\ 0 & 1 & 3 & 30 \\ 0 & 0 & 3 & 30 \end{array} \right) \sim$$
$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 10 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 10 \end{array} \right)$$

Gaussova eliminační metoda

Příklady:

$$2x + 3y - z = -12$$

$$x + 2y + z = 9$$

$$5x + 8y + 2z = 15$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & -12 \\ 1 & 2 & 1 & 9 \\ 5 & 8 & 2 & 15 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 9 \\ 0 & 1 & 3 & 30 \\ 0 & -2 & -3 & -30 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 9 \\ 0 & 1 & 3 & 30 \\ 0 & 0 & 3 & 30 \end{array} \right) \sim$$
$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 10 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 10 \end{array} \right)$$

$$z = 10, y = 0, x = -1$$

Gaussova eliminační metoda

Příklady:

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 + 3x_3 &= 5 \\2x_1 - x_2 + x_3 + x_4 &= 4 \\x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 &= -1 \\x_1 + 3x_2 + 3x_3 - x_4 &= 5\end{aligned}$$

Gaussova eliminační metoda

Příklady:

$$\begin{array}{lcl} x_1 + 2x_2 + 3x_3 & = 5 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 + x_4 & = 4 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 & = -1 \\ x_1 + 3x_2 + 3x_3 - x_4 & = 5 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 & 5 \\ 2 & -1 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & 3 & -1 & 5 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 & 5 \\ 0 & -5 & -5 & 1 & -6 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & -6 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & -4 & -6 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & -6 \end{array} \right) \sim \\ \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -9 & 9 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right) \sim \\ \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right) \end{array}$$

$$x_1 = 1, x_2 = -1, x_3 = 2, x_4 = -1$$

Řešitelnost soustavy lineárních rovnic

Příklad:

$$\begin{array}{l} x + 2y = 4 \\ 2x + 3y = 7 \end{array} \quad \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 7 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \quad \begin{array}{l} x + 2y = 4 \\ y = 1 \end{array} \quad y = 1, \quad x = 2$$

Řešitelnost soustavy lineárních rovnic

Příklad:

$$\begin{array}{l} x + 2y = 4 \\ 2x + 3y = 7 \end{array} \quad \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 7 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \quad \begin{array}{l} x + 2y = 4 \\ y = 1 \end{array} \quad y = 1, \quad x = 2$$

$$\begin{array}{l} x + 2y = 4 \\ 2x + 4y = 7 \end{array} \quad \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & 7 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad \begin{array}{l} x + 2y = 4 \\ 0 = 1 \end{array}$$

Řešitelnost soustavy lineárních rovnic

Příklad:

$$\begin{array}{l} x + 2y = 4 \\ 2x + 3y = 7 \end{array} \quad \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 7 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \quad \begin{array}{l} x + 2y = 4 \\ y = 1 \end{array} \quad y = 1, \quad x = 2$$

$$\begin{array}{l} x + 2y = 4 \\ 2x + 4y = 7 \end{array} \quad \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & 7 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad \begin{array}{l} x + 2y = 4 \\ 0 = 1 \end{array}$$

úloha je neřešitelná

Řešitelnost soustavy lineárních rovnic

Příklad:

$$\begin{array}{l} x + 2y = 4 \\ 2x + 3y = 7 \end{array} \quad \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 7 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \quad \begin{array}{l} x + 2y = 4 \\ y = 1 \end{array} \quad y = 1, \quad x = 2$$

$$\begin{array}{l} x + 2y = 4 \\ 2x + 4y = 7 \end{array} \quad \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & 7 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad \begin{array}{l} x + 2y = 4 \\ 0 = 1 \end{array}$$

úloha je neřešitelná

$$\begin{array}{l} x + 2y = 4 \\ 2x + 4y = 8 \end{array} \quad \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & 8 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad \begin{array}{l} x + 2y = 4 \\ 0 = 0 \end{array}$$

Řešitelnost soustavy lineárních rovnic

Příklad:

$$\begin{array}{l} x + 2y = 4 \\ 2x + 3y = 7 \end{array} \quad \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 7 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \quad \begin{array}{l} x + 2y = 4 \\ y = 1 \end{array} \quad y = 1, \quad x = 2$$

$$\begin{array}{l} x + 2y = 4 \\ 2x + 4y = 7 \end{array} \quad \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & 7 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad \begin{array}{l} x + 2y = 4 \\ 0 = 1 \end{array}$$

úloha je neřešitelná

$$\begin{array}{l} x + 2y = 4 \\ 2x + 4y = 8 \end{array} \quad \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & 8 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad \begin{array}{l} x + 2y = 4 \\ 0 = 0 \end{array}$$

úloha je řešitelná, řešení není jednoznačné;
druhou neznámou volíme jako parametr: $x = 4 - 2y$

Řešitelnost soustavy lineárních rovnic

Hodnost matice A, $h(A)$:

počet nenulových řádků v matici, která vznikne z matice A Gaussovou eliminací.

Řešitelnost soustavy lineárních rovnic

Hodnost matice A , $h(A)$:

počet nenulových řádků v matici, která vznikne z matice A Gaussovou eliminací.

Kronckerova-Capelliho věta:

Soustava m lineárních rovnic o n neznámých

$$Ax = b.$$

Řešitelnost soustavy lineárních rovnic

Hodnost matice A , $h(A)$:

počet nenulových řádků v matici, která vznikne z matice A Gaussovou eliminací.

Kronckerova-Capelliho věta:

Soustava m lineárních rovnic o n neznámých

$$Ax = b.$$

$$h(A) < h(A|b) \Rightarrow \text{úloha nemá řešení}$$

$$h(A) = h(A|b) < n \Rightarrow \text{úloha má řešení, řešení není jednoznačné}$$

$$h(A) = h(A|b) = n \Rightarrow \text{úloha má jednoznačné řešení}$$

Řešitelnost soustavy lineárních rovnic

Hodnost matice A , $h(A)$:

počet nenulových řádků v matici, která vznikne z matice A Gaussovou eliminací.

Kronckerova-Capelliho věta:

Soustava m lineárních rovnic o n neznámých

$$Ax = b.$$

$h(A) < h(A|b)$ \Rightarrow úloha nemá řešení

$h(A) = h(A|b) < n$ \Rightarrow úloha má řešení, řešení není jednoznačné

$h(A) = h(A|b) = n$ \Rightarrow úloha má jednoznačné řešení

Ve druhém případě lze řešení vyjádřit pomocí $n - h(A)$ parametrů.

Řešitelnost soustavy lineárních rovnic

Příklad:

$$2x + 3y + z = 1$$

$$x + 4y - 2z = 3$$

$$x + 3y - z = 2$$

Řešitelnost soustavy lineárních rovnic

Příklad:

$$2x + 3y + z = 1$$

$$x + 4y - 2z = 3$$

$$x + 3y - z = 2$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & -2 & 3 \\ 1 & 3 & -1 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -3 & 3 & -3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Řešení není jednoznačné, $y = 1 + z$, $x = 1 - 2y = 1 - 2(1 + z) = -1 - 2z$

Úplná eliminace s výběrem hlavního prvku

Předpokládáme, že matice soustavy je typu m, n , tj. jedná se o soustavu m rovnic o n neznámých.

Pro zjednodušení zápisu budeme v rozšířené matici soustavy prvky v posledním sloupci značit symboly $a_{i,j+1}$.

Algoritmus úpravy rozšířené matice soustavy:

1. $j := 1$ (indexu j přiřad' hodnotu 1)
2. mezi prvky $a_{j,j}, a_{j+1,j}, a_{j+2,j}, \dots, a_{m,j}$ najdi $a_{k,j}$ takový, že $(\forall i = j, j + 1, j + 2, \dots, m) |a_{k,j}| \geq |a_{i,j}|$ (v j -tém sloupci najdi prvek s největší absolutní hodnotou, příslušný řádek považuj za k -tý)
3. pokud $|a_{k,j}| = 0$, jdi na krok 7.
4. přehod' j -tý a k -tý řádek
5. j -tý řádek vynásob číslem $\frac{1}{a_{j,j}}$
6. dělej pro každé $i \neq j$: k i -tému řádku přičti j -tý řádek násobený číslem $-a_{i,j}$
7. $j := j + 1$ (index j zvětší o 1)
8. pokud $j \leq m$, jdi zpět na krok 2., jinak konec

Úplná eliminace s výběrem hlavního prvku

Příklad:

$$\begin{aligned}3x - 2y + 4z &= 5 \\-5x + 7y - 8z &= 2 \\5x - 6y + 7z &= -3\end{aligned}$$

Úplná eliminace s výběrem hlavního prvku

Příklad:

$$\begin{aligned}3x - 2y + 4z &= 5 \\-5x + 7y - 8z &= 2 \\5x - 6y + 7z &= -3\end{aligned}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -2 & 4 & 5 \\ -5 & 7 & -8 & 2 \\ 5 & -6 & 7 & -3 \end{array} \right)$$

Úplná eliminace s výběrem hlavního prvku

Příklad:

$$\begin{array}{l} 3x - 2y + 4z = 5 \\ -5x + 7y - 8z = 2 \\ 5x - 6y + 7z = -3 \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -2 & 4 & 5 \\ -5 & 7 & -8 & 2 \\ 5 & -6 & 7 & -3 \end{array} \right)$$

Úplná eliminace s výběrem hlavního prvku

Příklad:

$$\begin{aligned}3x - 2y + 4z &= 5 \\-5x + 7y - 8z &= 2 \\5x - 6y + 7z &= -3\end{aligned}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -2 & 4 & 5 \\ -5 & 7 & -8 & 2 \\ 5 & -6 & 7 & -3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -5 & 7 & -8 & 2 \\ 3 & -2 & 4 & 5 \\ 5 & -6 & 7 & -3 \end{array} \right)$$

Úplná eliminace s výběrem hlavního prvku

Příklad:

$$\begin{aligned}3x - 2y + 4z &= 5 \\-5x + 7y - 8z &= 2 \\5x - 6y + 7z &= -3\end{aligned}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -2 & 4 & 5 \\ -5 & 7 & -8 & 2 \\ 5 & -6 & 7 & -3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -5 & 7 & -8 & 2 \\ 3 & -2 & 4 & 5 \\ 5 & -6 & 7 & -3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{7}{5} & \frac{8}{5} & -\frac{2}{5} \\ 3 & -2 & 4 & 5 \\ 5 & -6 & 7 & -3 \end{array} \right)$$

Úplná eliminace s výběrem hlavního prvku

Příklad:

$$\begin{aligned}3x - 2y + 4z &= 5 \\-5x + 7y - 8z &= 2 \\5x - 6y + 7z &= -3\end{aligned}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -2 & 4 & 5 \\ -5 & 7 & -8 & 2 \\ 5 & -6 & 7 & -3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -5 & 7 & -8 & 2 \\ 3 & -2 & 4 & 5 \\ 5 & -6 & 7 & -3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{7}{5} & \frac{8}{5} & -\frac{2}{5} \\ 3 & -2 & 4 & 5 \\ 5 & -6 & 7 & -3 \end{array} \right) \sim$$
$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{7}{5} & \frac{8}{5} & -\frac{2}{5} \\ 0 & \frac{11}{5} & -\frac{4}{5} & \frac{31}{5} \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right)$$

Úplná eliminace s výběrem hlavního prvku

Příklad:

$$\begin{aligned}3x - 2y + 4z &= 5 \\-5x + 7y - 8z &= 2 \\5x - 6y + 7z &= -3\end{aligned}$$

$$\begin{array}{ccc|c}3 & -2 & 4 & 5 \\-5 & 7 & -8 & 2 \\5 & -6 & 7 & -3\end{array} \sim \begin{array}{ccc|c}-5 & 7 & -8 & 2 \\3 & -2 & 4 & 5 \\5 & -6 & 7 & -3\end{array} \sim \begin{array}{ccc|c}1 & -\frac{7}{5} & \frac{8}{5} & -\frac{2}{5} \\3 & -2 & 4 & 5 \\5 & -6 & 7 & -3\end{array} \sim \\ \sim \begin{array}{ccc|c}1 & -\frac{7}{5} & \frac{8}{5} & -\frac{2}{5} \\0 & \frac{11}{5} & -\frac{4}{5} & \frac{31}{5} \\0 & 1 & -1 & -1\end{array} \sim \begin{array}{ccc|c}1 & -\frac{7}{5} & \frac{8}{5} & -\frac{2}{5} \\0 & 1 & -\frac{4}{11} & \frac{31}{11} \\0 & 1 & -1 & -1\end{array}\end{array}$$

Úplná eliminace s výběrem hlavního prvku

Příklad:

$$\begin{aligned}3x - 2y + 4z &= 5 \\-5x + 7y - 8z &= 2 \\5x - 6y + 7z &= -3\end{aligned}$$

$$\begin{array}{l}\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -2 & 4 & 5 \\ -5 & 7 & -8 & 2 \\ 5 & -6 & 7 & -3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -5 & 7 & -8 & 2 \\ 3 & -2 & 4 & 5 \\ 5 & -6 & 7 & -3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{7}{5} & \frac{8}{5} & -\frac{2}{5} \\ 3 & -2 & 4 & 5 \\ 5 & -6 & 7 & -3 \end{array} \right) \sim \\ \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{7}{5} & \frac{8}{5} & -\frac{2}{5} \\ 0 & \frac{11}{5} & -\frac{4}{5} & \frac{31}{5} \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{7}{5} & \frac{8}{5} & -\frac{2}{5} \\ 0 & 1 & -\frac{4}{11} & \frac{31}{11} \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \\ \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{12}{11} & \frac{39}{11} \\ 0 & 1 & -\frac{4}{11} & \frac{31}{11} \\ 0 & 0 & -\frac{7}{11} & -\frac{42}{11} \end{array} \right)\end{array}$$

Úplná eliminace s výběrem hlavního prvku

Příklad:

$$\begin{aligned}3x - 2y + 4z &= 5 \\-5x + 7y - 8z &= 2 \\5x - 6y + 7z &= -3\end{aligned}$$

$$\begin{array}{l} \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -2 & 4 & 5 \\ -5 & 7 & -8 & 2 \\ 5 & -6 & 7 & -3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -5 & 7 & -8 & 2 \\ 3 & -2 & 4 & 5 \\ 5 & -6 & 7 & -3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{7}{5} & \frac{8}{5} & -\frac{2}{5} \\ 3 & -2 & 4 & 5 \\ 5 & -6 & 7 & -3 \end{array} \right) \sim \\ \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{7}{5} & \frac{8}{5} & -\frac{2}{5} \\ 0 & \frac{11}{5} & -\frac{4}{5} & \frac{31}{5} \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{7}{5} & \frac{8}{5} & -\frac{2}{5} \\ 0 & 1 & -\frac{4}{11} & \frac{31}{11} \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \\ \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{12}{11} & \frac{39}{11} \\ 0 & 1 & -\frac{4}{11} & \frac{31}{11} \\ 0 & 0 & -\frac{7}{11} & -\frac{42}{11} \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{12}{11} & \frac{39}{11} \\ 0 & 1 & -\frac{4}{11} & \frac{31}{11} \\ 0 & 0 & 1 & 6 \end{array} \right)\end{array}$$

Úplná eliminace s výběrem hlavního prvku

Příklad:

$$\begin{aligned}3x - 2y + 4z &= 5 \\-5x + 7y - 8z &= 2 \\5x - 6y + 7z &= -3\end{aligned}$$

$$\begin{array}{l} \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -2 & 4 & 5 \\ -5 & 7 & -8 & 2 \\ 5 & -6 & 7 & -3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -5 & 7 & -8 & 2 \\ 3 & -2 & 4 & 5 \\ 5 & -6 & 7 & -3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{7}{5} & \frac{8}{5} & -\frac{2}{5} \\ 3 & -2 & 4 & 5 \\ 5 & -6 & 7 & -3 \end{array} \right) \sim \\ \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{7}{5} & \frac{8}{5} & -\frac{2}{5} \\ 0 & \frac{11}{5} & -\frac{4}{5} & \frac{31}{5} \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{7}{5} & \frac{8}{5} & -\frac{2}{5} \\ 0 & 1 & -\frac{4}{11} & \frac{31}{11} \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \\ \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{12}{11} & \frac{39}{11} \\ 0 & 1 & -\frac{4}{11} & \frac{31}{11} \\ 0 & 0 & -\frac{7}{11} & -\frac{42}{11} \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{12}{11} & \frac{39}{11} \\ 0 & 1 & -\frac{4}{11} & \frac{31}{11} \\ 0 & 0 & 1 & 6 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \end{array} \right)\end{array}$$

Úplná eliminace s výběrem hlavního prvku

Příklad:

$$\begin{aligned}3x - 2y + 4z &= 5 \\-5x + 7y - 8z &= 2 \\5x - 6y + 7z &= -3\end{aligned}$$

$$\begin{array}{l} \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -2 & 4 & 5 \\ -5 & 7 & -8 & 2 \\ 5 & -6 & 7 & -3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -5 & 7 & -8 & 2 \\ 3 & -2 & 4 & 5 \\ 5 & -6 & 7 & -3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{7}{5} & \frac{8}{5} & -\frac{2}{5} \\ 3 & -2 & 4 & 5 \\ 5 & -6 & 7 & -3 \end{array} \right) \sim \\ \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{7}{5} & \frac{8}{5} & -\frac{2}{5} \\ 0 & \frac{11}{5} & -\frac{4}{5} & \frac{31}{5} \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{7}{5} & \frac{8}{5} & -\frac{2}{5} \\ 0 & 1 & -\frac{4}{11} & \frac{31}{11} \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \\ \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{12}{11} & \frac{39}{11} \\ 0 & 1 & -\frac{4}{11} & \frac{31}{11} \\ 0 & 0 & -\frac{7}{11} & -\frac{42}{11} \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{12}{11} & \frac{39}{11} \\ 0 & 1 & -\frac{4}{11} & \frac{31}{11} \\ 0 & 0 & 1 & 6 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \end{array} \right)\end{array}$$

$$x = -3, y = 5, z = 6$$

Závěrečná poznámka

Elementárním řádkovým transformacím matice A odpovídá násobení matice A jistou maticí zleva.

Závěrečná poznámka

Elementárním řádkovým transformacím matice A odpovídá násobení matice A jistou maticí zleva.

- Vynásobení p -tého řádku číslem c : matice R,

$$r_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \neq p \\ c, & i = j = p \\ 0, & \text{jinak} \end{cases}$$

Závěrečná poznámka

Elementárním řádkovým transformacím matice A odpovídá násobení matice A jistou maticí zleva.

- Vynásobení p -tého řádku číslem c : matice R,

$$r_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \neq p \\ c, & i = j = p \\ 0, & \text{jinak} \end{cases}$$

vynásobení 2. řádku číslem -2 :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 3 & 0 & -2 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \\ -6 & 0 & 4 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Závěrečná poznámka

Elementárním řádkovým transformacím matice A odpovídá násobení matice A jistou maticí zleva.

- Vynásobení p -tého řádku číslem c : matice R,

$$r_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \neq p \\ c, & i = j = p \\ 0, & \text{jinak} \end{cases}$$

- Přičtení p -tého řádku ke q -tému: matice S,

$$s_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \text{ nebo } i = p \text{ a } j = q \\ 0, & \text{jinak} \end{cases}$$

Závěrečná poznámka

Elementárním řádkovým transformacím matice A odpovídá násobení matice A jistou maticí zleva.

- Vynásobení p -tého řádku číslem c : matice R,

$$r_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \neq p \\ c, & i = j = p \\ 0, & \text{jinak} \end{cases}$$

- Přičtení p -tého řádku ke q -tému: matice S,

$$s_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \text{ nebo } i = p \text{ a } j = q \\ 0, & \text{jinak} \end{cases}$$

přičtení 2. řádku ke 3.: $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 3 & 0 & -2 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 3 & 0 & -2 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

Závěrečná poznámka

Elementárním řádkovým transformacím matice A odpovídá násobení matice A jistou maticí zleva.

- Vynásobení p -tého řádku číslem c : matice R,

$$r_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \neq p \\ c, & i = j = p \\ 0, & \text{jinak} \end{cases}$$

- Přičtení p -tého řádku ke q -tému: matice S,

$$s_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \text{ nebo } i = p \text{ a } j = q \\ 0, & \text{jinak} \end{cases}$$

- Přehození p -tého a q -tého řádku: matice T,

$$t_{ij} = \begin{cases} 1, & p \neq i = j \neq q, \text{ nebo } i = p \text{ a } j = q, \text{ nebo } i = q \text{ a } j = p \\ 0, & \text{jinak} \end{cases}$$

Závěrečná poznámka

Elementárním řádkovým transformacím matice A odpovídá násobení matice A jistou maticí zleva.

- Vynásobení p -tého řádku číslem c : matice R,

$$r_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \neq p \\ c, & i = j = p \\ 0, & \text{jinak} \end{cases}$$

- Přičtení p -tého řádku ke q -tému: matice S,

$$s_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \text{ nebo } i = p \text{ a } j = q \\ 0, & \text{jinak} \end{cases}$$

- Přehození p -tého a q -tého řádku: matice T,

$$t_{ij} = \begin{cases} 1, & p \neq i = j \neq q, \text{ nebo } i = p \text{ a } j = q, \text{ nebo } i = q \text{ a } j = p \\ 0, & \text{jinak} \end{cases}$$

přehození 2. a 3. řádku:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 3 & 0 & -2 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \\ -1 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Závěrečná poznámka

Elementárním řádkovým transformacím matice A odpovídá násobení matice A jistou maticí zleva.

- Vynásobení p -tého řádku číslem c : matice R,

$$r_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \neq p \\ c, & i = j = p \\ 0, & \text{jinak} \end{cases}$$

- Přičtení p -tého řádku ke q -tému: matice S,

$$s_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \text{ nebo } i = p \text{ a } j = q \\ 0, & \text{jinak} \end{cases}$$

- Přehození p -tého a q -tého řádku: matice T,

$$t_{ij} = \begin{cases} 1, & p \neq i = j \neq q, \text{ nebo } i = p \text{ a } j = q, \text{ nebo } i = q \text{ a } j = p \\ 0, & \text{jinak} \end{cases}$$

Základní pojmy

Řešení soustav rovnic – Gaussova eliminace

Determinanty

Determinant čtvercové matice řádu 2

Determinant čtvercové matice řádu 3

Řešení soustavy tří rovnic o třech neznámých

Determinant čtvercové matice řádu n

Řešení soustav rovnic – Cramerovo pravidlo

Regulární matice

Aplikace – maticové populační modely

Determinanty

Determinant čtvercové matice řádu 2

Motivace: řešení soustavy 2 rovnic o 2 neznámých dosazovací metodou

Determinant čtvercové matice řádu 2

Motivace: řešení soustavy 2 rovnic o 2 neznámých dosazovací metodou

$$ax + by = e$$

$$cx + dy = f$$

Determinant čtvercové matice řádu 2

Motivace: řešení soustavy 2 rovnic o 2 neznámých dosazovací metodou

$$ax + by = e$$

$$cx + dy = f$$

$$y = \frac{f - cx}{d}$$

Determinant čtvercové matice řádu 2

Motivace: řešení soustavy 2 rovnic o 2 neznámých dosazovací metodou

$$ax + by = e$$

$$cx + dy = f$$

$$y = \frac{f - cx}{d}$$

$$ax + \frac{b}{d}(f - cx) = e$$

$$(ad - bc)x = ed - bf$$

Determinant čtvercové matice řádu 2

Motivace: řešení soustavy 2 rovnic o 2 neznámých dosazovací metodou

$$ax + by = e$$

$$cx + dy = f$$

$$y = \frac{f - cx}{d}$$

$$ax + \frac{b}{d}(f - cx) = e$$

$$(ad - bc)x = ed - bf \quad \text{předpokládejme, že } ad - bc \neq 0$$

Determinant čtvercové matice řádu 2

Motivace: řešení soustavy 2 rovnic o 2 neznámých dosazovací metodou

$$ax + by = e$$

$$cx + dy = f$$

$$y = \frac{f - cx}{d}$$

$$ax + \frac{b}{d}(f - cx) = e$$

$$(ad - bc)x = ed - bf \quad \text{předpokládejme, že } ad - bc \neq 0$$

$$x = \frac{ed - bf}{ad - bc}$$

Determinant čtvercové matice řádu 2

Motivace: řešení soustavy 2 rovnic o 2 neznámých dosazovací metodou

$$ax + by = e$$

$$cx + dy = f$$

$$y = \frac{f - cx}{d}$$

$$ax + \frac{b}{d}(f - cx) = e$$

$$(ad - bc)x = ed - bf \quad \text{předpokládejme, že } ad - bc \neq 0$$

$$x = \frac{ed - bf}{ad - bc}$$

$$y = \frac{1}{d} \left(f - \frac{c(ed - bf)}{ad - bc} \right) = \frac{1}{d} \frac{adf - ced}{ad - bc} = \frac{af - ce}{ad - bc}$$

Determinant čtvercové matice řádu 2

Motivace: řešení soustavy 2 rovnic o 2 neznámých dosazovací metodou

$$\begin{aligned} ax + by &= e \\ cx + dy &= f \end{aligned} \quad \text{je-li } ad - bc \neq 0 \quad \text{pak} \quad x = \frac{ed - bf}{ad - bc}, \quad y = \frac{af - ce}{ad - bc}$$

Determinant čtvercové matice řádu 2

Motivace: řešení soustavy 2 rovnic o 2 neznámých dosazovací metodou

$$\begin{aligned} ax + by &= e \\ cx + dy &= f \end{aligned} \quad \text{je-li } ad - bc \neq 0 \quad \text{pak} \quad x = \frac{ed - bf}{ad - bc}, \quad y = \frac{af - ce}{ad - bc}$$

Matice soustavy $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, vektor pravých stran $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix}$

Determinant čtvercové matice řádu 2

Motivace: řešení soustavy 2 rovnic o 2 neznámých dosazovací metodou

$$\begin{aligned} ax + by &= e \\ cx + dy &= f \end{aligned} \quad \text{je-li } ad - bc \neq 0 \quad \text{pak} \quad x = \frac{ed - bf}{ad - bc}, \quad y = \frac{af - ce}{ad - bc}$$

Matice soustavy $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, vektor pravých stran $b = \begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix}$

Determinant matice A:

$$\det A = |A| = \det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

Determinant čtvercové matice řádu 2

Motivace: řešení soustavy 2 rovnic o 2 neznámých dosazovací metodou

$$\begin{aligned} ax + by &= e \\ cx + dy &= f \end{aligned} \quad \text{je-li } ad - bc \neq 0 \quad \text{pak} \quad x = \frac{ed - bf}{ad - bc}, \quad y = \frac{af - ce}{ad - bc}$$

Matice soustavy $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, vektor pravých stran $b = \begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix}$

Determinant matice A:

$$\det A = |A| = \det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

Pokud $\det A \neq 0$, pak jediné řešení dané soustavy rovnic je:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} e & b \\ f & d \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}} = \frac{ed - bf}{ad - bc}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a & e \\ c & f \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}} = \frac{af - ce}{ad - bc}.$$

Determinant čtvercové matice řádu 2

Příklad:

$$\begin{aligned}2x + 3y &= 7 \\x + 2y &= 4\end{aligned}$$

Determinant čtvercové matice řádu 2

Příklad:

$$\begin{aligned}2x + 3y &= 7 \\x + 2y &= 4\end{aligned}$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 2 \cdot 2 - 3 \cdot 1 = 1 \neq 0,$$

Determinant čtvercové matice řádu 2

Příklad:

$$\begin{aligned}2x + 3y &= 7 \\x + 2y &= 4\end{aligned}$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 2 \cdot 2 - 3 \cdot 1 = 1 \neq 0,$$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 7 & 3 \\ 4 & 2 \end{vmatrix}}{1} = 7 \cdot 2 - 3 \cdot 4 = 2, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 7 \\ 1 & 4 \end{vmatrix}}{1} = 2 \cdot 4 - 7 \cdot 1 = 1.$$

Determinant čtvercové matice řádu 3

Řešení soustavy tří rovnic o třech neznámých dosazovací metodou:

$$ax + by + cz = k$$

$$dx + ey + fz = l$$

$$gx + hy + jz = m$$

Determinant čtvercové matice řádu 3

Řešení soustavy tří rovnic o třech neznámých dosazovací metodou:

$$ax + by + cz = k$$

$$dx + ey + fz = l$$

$$gx + hy + jz = m$$

$$z = \frac{1}{j}(m - gx - hy)$$

Determinant čtvercové matice řádu 3

Řešení soustavy tří rovnic o třech neznámých dosazovací metodou:

$$ax + by + cz = k$$

$$dx + ey + fz = l$$

$$gx + hy + jz = m$$

$$z = \frac{1}{j}(m - gx - hy)$$

$$ax + by + \frac{c}{j}(m - gx - hy) = k$$

$$dx + ey + \frac{f}{j}(m - gx - hy) = l$$

Determinant čtvercové matice řádu 3

Řešení soustavy tří rovnic o třech neznámých dosazovací metodou:

$$ax + by + cz = k$$

$$dx + ey + fz = l$$

$$gx + hy + jz = m$$

$$z = \frac{1}{j}(m - gx - hy)$$

$$ax + by + \frac{c}{j}(m - gx - hy) = k$$

$$dx + ey + \frac{f}{j}(m - gx - hy) = l$$

$$(aj - cg)x + (bj - ch)y = kj - cm$$

$$(dj - fg)x + (ej - fh)y = lj - fm$$

Determinant čtvercové matice řádu 3

Řešení soustavy tří rovnic o třech neznámých dosazovací metodou:

$$ax + by + cz = k$$

$$dx + ey + fz = l$$

$$gx + hy + jz = m$$

$$z = \frac{1}{j}(m - gx - hy)$$

$$(aj - cg)x + (bj - ch)y = kj - cm$$

$$(dj - fg)x + (ej - fh)y = lj - fm$$

Determinant čtvercové matice řádu 3

Řešení soustavy tří rovnic o třech neznámých dosazovací metodou:

$$ax + by + cz = k$$

$$dx + ey + fz = l$$

$$gx + hy + jz = m$$

$$z = \frac{1}{j}(m - gx - hy)$$

$$(aj - cg)x + (bj - ch)y = kj - cm$$

$$(dj - fg)x + (ej - fh)y = lj - fm$$

O jednoznačné řešitelnosti dané soustavy rovnic tedy rozhoduje

$$\begin{aligned} \det \begin{pmatrix} aj - cg & bj - ch \\ dj - fg & ej - fh \end{pmatrix} &= \\ &= ae j^2 - a j f h - c g e j + c g f h - (b j^2 d - b j f g - c h d j + c h f g) = \\ &= j(aej + bfg + cdh - ceg - afh - bdj) \end{aligned}$$

Determinant čtvercové matice řádu 3

$$\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & j \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & j \end{vmatrix} = aej + bfg + cdh - ceg - afh - bdj$$

Determinant čtvercové matice řádu 3

$$\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & j \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} \color{red}{a} & b & c \\ d & \color{red}{e} & f \\ g & h & \color{red}{j} \end{vmatrix} = \color{red}{aej} + bfg + cdh - ceg - afh - bdj$$

Determinant čtvercové matice řádu 3

$$\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & j \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a & \color{red}{b} & c \\ d & e & \color{red}{f} \\ \color{red}{g} & h & j \end{vmatrix} = aej + \color{red}{bfg} + cdh - ceg - afh - bdj$$

Determinant čtvercové matice řádu 3

$$\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & j \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a & b & \color{red}{c} \\ \color{red}{d} & e & f \\ g & \color{red}{h} & j \end{vmatrix} = aej + bfg + \color{red}{cdh} - ceg - afh - bdj$$

Determinant čtvercové matice řádu 3

$$\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & j \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a & b & \color{red}{c} \\ d & \color{red}{e} & f \\ \color{red}{g} & h & j \end{vmatrix} = aej + bfg + cdh - \color{red}{ceg} - afh - bdj$$

Determinant čtvercové matice řádu 3

$$\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & j \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} \color{red}{a} & b & c \\ d & \color{red}{e} & \color{red}{f} \\ g & \color{red}{h} & j \end{vmatrix} = aej + bfg + cdh - ceg - \color{red}{afh} - bdj$$

Determinant čtvercové matice řádu 3

$$\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & j \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a & \color{red}{b} & c \\ \color{red}{d} & e & f \\ g & h & \color{red}{j} \end{vmatrix} = aej + bfg + cdh - ceg - afh - \color{red}{bdj}$$

Determinant čtvercové matice řádu 3

$$\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & j \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & j \end{vmatrix} = aej + bfg + cdh - ceg - afh - bdj$$

Determinant čtvercové matice řádu 3

$$\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & j \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & j \end{vmatrix} = aej + bfg + cdh - ceg - afh - bdj$$

Sarrusovo pravidlo:

$$\begin{array}{ccc|cc} \oplus & \oplus & \oplus & & \\ \searrow & \searrow & \searrow & & \\ a & b & c & a & b \\ d & e & f & d & e \\ g & h & j & g & h \\ \nearrow & \nearrow & \nearrow & & \\ \ominus & \ominus & \ominus & & \end{array} = aej + bfg + cdh - gec - hfa - jdb$$

Determinant čtvercové matice řádu 3

$$\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & j \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & j \end{vmatrix} = aej + bfg + cdh - ceg - afh - bdj$$

Sarrusovo pravidlo:

$$\begin{array}{ccc|cc} \oplus & \oplus & \oplus & & \\ \searrow & \searrow & \searrow & & \\ a & b & c & a & b \\ d & e & f & d & e \\ g & h & j & g & h \\ \nearrow & \nearrow & \nearrow & & \\ \ominus & \ominus & \ominus & & \end{array} = aej + bfg + cdh - gec - hfa - jdb$$

Laplaceův rozvoj determinantu podle 1. řádku:

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & j \end{vmatrix} = aej + bfg + cdh - ceg - afh - bdj = \\ = a(ej - fh) - b(dj - fg) + c(dh - eg)$$

Determinant čtvercové matice řádu 3

$$\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & j \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & j \end{vmatrix} = aej + bfg + cdh - ceg - afh - bdj$$

Sarrusovo pravidlo:

$$\begin{array}{ccc|cc} \oplus & \oplus & \oplus & & \\ \searrow & \searrow & \searrow & & \\ a & b & c & a & b \\ d & e & f & d & e \\ g & h & j & g & h \\ \nearrow & \nearrow & \nearrow & \ominus & \ominus \\ \ominus & \ominus & \ominus & & \end{array} = aej + bfg + cdh - gec - hfa - jdb$$

Laplaceův rozvoj determinantu podle 1. řádku:

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & j \end{vmatrix} = aej + bfg + cdh - ceg - afh - bdj = \\ = a(ej - fh) - b(dj - fg) + c(dh - eg) = a \begin{vmatrix} e & f \\ h & j \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} d & f \\ g & j \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix}$$

Řešení soustavy tří rovnic o třech neznámých

$$\begin{aligned} ax + by + cz &= k \\ dx + ey + fz &= l \\ gx + hy + jz &= m \end{aligned}$$

Pokud $D = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & j \end{vmatrix} \neq 0$ pak má daná soustava rovnic jednoznačné řešení;

složky řešení jsou dány výrazy

$$x = \frac{1}{D} \begin{vmatrix} k & b & c \\ l & e & f \\ m & h & j \end{vmatrix}, \quad y = \frac{1}{D} \begin{vmatrix} a & k & c \\ d & l & f \\ g & m & j \end{vmatrix}, \quad z = \frac{1}{D} \begin{vmatrix} a & b & k \\ d & e & l \\ g & h & m \end{vmatrix}$$

Řešení soustavy tří rovnic o třech neznámých

$$\begin{aligned}2x + 3y + z &= 1 \\x + 2y + z &= -1 \\x + y - z &= 4\end{aligned}$$

Řešení soustavy tří rovnic o třech neznámých

$$\begin{aligned}2x + 3y + z &= 1 \\x + 2y + z &= -1 \\x + y - z &= 4\end{aligned}$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -4 + 3 + 1 - (2 + 2 - 3) = -1 \neq 0$$

Řešení soustavy tří rovnic o třech neznámých

$$\begin{aligned}2x + 3y + z &= 1 \\x + 2y + z &= -1 \\x + y - z &= 4\end{aligned}$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -4 + 3 + 1 - (2 + 2 - 3) = -1 \neq 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -2 + 12 - 1 - (8 + 1 + 3) = -3, \quad \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 4 & -1 \end{vmatrix} = 2 + 1 + 4 - (-1 + 8 - 1) = 1,$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 4 \end{vmatrix} = 16 - 3 + 1 - (2 - 2 + 12) = 2.$$

Řešení soustavy tří rovnic o třech neznámých

$$\begin{aligned}2x + 3y + z &= 1 \\x + 2y + z &= -1 \\x + y - z &= 4\end{aligned}$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -4 + 3 + 1 - (2 + 2 - 3) = -1 \neq 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -2 + 12 - 1 - (8 + 1 + 3) = -3, \quad \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 4 & -1 \end{vmatrix} = 2 + 1 + 4 - (-1 + 8 - 1) = 1,$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 4 \end{vmatrix} = 16 - 3 + 1 - (2 - 2 + 12) = 2.$$

$$x = 3, \quad y = -1, \quad z = -2$$

Determinant čtvercové matice řádu n

Výpočet pomocí Laplaceova rozvoje podle 1. řádku:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} =$$

Determinant čtvercové matice řádu n

Výpočet pomocí Laplaceova rozvoje podle 1. řádku:

$$\begin{vmatrix} \color{red}{a_{11}} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \color{red}{a_{22}} & a_{23} & \cdots & \color{red}{a_{2n}} \\ a_{31} & \color{red}{a_{32}} & \color{red}{a_{33}} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \color{red}{a_{n2}} & a_{n3} & \cdots & \color{red}{a_{nn}} \end{vmatrix} =$$

$$= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

Determinant čtvercové matice řádu n

Výpočet pomocí Laplaceova rozvoje podle 1. řádku:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \color{red}{a_{12}} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ \color{red}{a_{21}} & a_{22} & \color{red}{a_{23}} & \cdots & \color{red}{a_{2n}} \\ \color{red}{a_{31}} & a_{32} & \color{red}{a_{33}} & \cdots & \color{red}{a_{3n}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \color{red}{a_{n1}} & a_{n2} & \color{red}{a_{n3}} & \cdots & \color{red}{a_{nn}} \end{vmatrix} =$$

$$= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{32} & \color{red}{a_{33}} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

Determinant čtvercové matice řádu n

Výpočet pomocí Laplaceova rozvoje podle 1. řádku:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \color{red}{a_{13}} & \cdots & a_{1n} \\ \color{red}{a_{21}} & a_{22} & a_{23} & \cdots & \color{red}{a_{2n}} \\ \color{red}{a_{31}} & a_{32} & a_{33} & \cdots & \color{red}{a_{3n}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \color{red}{a_{n1}} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & \color{red}{a_{nn}} \end{vmatrix} =$$

$$= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} - \dots$$

Determinant čtvercové matice řádu n

Výpočet pomocí Laplaceova rozvoje podle 1. řádku:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & \textcolor{red}{a_{1n}} \\ \textcolor{red}{a_{21}} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \textcolor{red}{a_{31}} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \textcolor{red}{a_{n1}} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} =$$

$$= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} - \cdots$$

$$\cdots + (-1)^{n+1} a_{1n} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2,n-1} \\ a_{31} & a_{32} & \cdots & a_{3,n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n,n-1} \end{vmatrix}$$

Determinant čtvercové matice řádu n

Výpočet pomocí Laplaceova rozvoje podle 1. řádku:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} =$$

$$= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} - \cdots \\ \cdots + (-1)^{n+1} a_{1n} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2,n-1} \\ a_{31} & a_{32} & \cdots & a_{3,n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n,n-1} \end{vmatrix}$$

Determinant čtvercové matice řádu n

Determinant čtvercové matice A řádu 1 je číslo $|A| = a_{11}$

Determinant čtvercové matice A řádu n je číslo

$$|A| = a_{11}|A_{11}| - a_{12}|A_{12}| + a_{13}|A_{13}| + \cdots + (-1)^{n+1}|A_{1n}|$$

kde A_{1j} označuje matici, která vznikne z matice A vynecháním prvního řádku a j tého sloupce.

Determinant čtvercové matice řádu n

Determinant čtvercové matice A řádu 1 je číslo $|A| = a_{11}$

Determinant čtvercové matice A řádu n je číslo

$$|A| = a_{11}|A_{11}| - a_{12}|A_{12}| + a_{13}|A_{13}| + \cdots + (-1)^{n+1}|A_{1n}|$$

kde A_{1j} označuje matici, která vznikne z matice A vynecháním prvního řádku a j tého sloupce.

Obecněji: Determinant čtvercové matice A řádu n je číslo

$$|A| = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} |A_{ij}| = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} |A_{ij}|$$

kde A_{ij} označuje matici, která vznikne z matice A vynecháním i -tého řádku a j tého sloupce.

Determinant čtvercové matice řádu n

Příklad:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 3 & -1 \end{vmatrix} =$$

Determinant čtvercové matice řádu n

Příklad:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 3 & -1 \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 3 & -1 \end{vmatrix}$$

Determinant čtvercové matice řádu n

Příklad:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 3 & -1 \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 3 & -1 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & -1 \end{vmatrix}$$

Determinant čtvercové matice řádu n

Příklad:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 3 & -1 \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 3 & -1 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & -1 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & -1 \end{vmatrix}$$

Determinant čtvercové matice řádu n

Příklad:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 3 & -1 \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 3 & -1 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & -1 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & -1 \end{vmatrix} =$$

$$= 1 + 6 + 6 - (3 - 6 - 2) - 2[-2 + 2 + 3 - (1 + 12 - 1)] + 3[-4 - 2 + 3 - (2 + 12 + 1)] = -18$$

Základní pojmy

Řešení soustav rovnic – Gaussova eliminace

Determinanty

Řešení soustav rovnic – Cramerovo pravidlo

Soustava n rovnic o n neznámých

Regulární matice

Aplikace – maticové populační modely

Řešení soustav rovnic – Cramerovo pravidlo

Soustava n rovnic o n neznámých

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

Pokud $|\mathbf{A}| \neq 0$, pak soustava rovnic má jediné řešení, jehož složky jsou dány rovnostmi

$$x_i = \frac{1}{|\mathbf{A}|} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1,i-1} & b_1 & a_{1,i+1} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2,i-1} & b_2 & a_{2,i+1} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{n,i-1} & b_n & a_{n,i+1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Soustava n rovnic o n neznámých

Příklad: Najděte čtvrtou složku řešení soustavy rovnic

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 + 3x_3 &= 5 \\2x_1 - x_2 + x_3 + x_4 &= 4 \\x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 &= -1 \\x_1 + 3x_2 + 3x_3 - x_4 &= 5\end{aligned}$$

Soustava n rovnic o n neznámých

Příklad: Najděte čtvrtou složku řešení soustavy rovnic

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 + 3x_3 &= 5 \\2x_1 - x_2 + x_3 + x_4 &= 4 \\x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 &= -1 \\x_1 + 3x_2 + 3x_3 - x_4 &= 5\end{aligned}$$

$$\left| \begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 3 & -1 \end{array} \right| = -18 \neq 0$$

Soustava n rovnic o n neznámých

Příklad: Najděte čtvrtou složku řešení soustavy rovnic

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 + 3x_3 &= 5 \\2x_1 - x_2 + x_3 + x_4 &= 4 \\x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 &= -1 \\x_1 + 3x_2 + 3x_3 - x_4 &= 5\end{aligned}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 3 & -1 \end{vmatrix} = -18 \neq 0$$

$$\begin{aligned}\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 5 \\ 2 & -1 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 3 & 5 \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} -1 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & 3 & 5 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 5 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & 5 \end{vmatrix} - 5 \begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \end{vmatrix} = \\&= -5 - 3 + 24 - (12 + 3 + 10) - 2(10 - 1 + 12 - (4 - 6 + 5)) + 3(20 + 1 + 12 - (8 - 6 - 5)) - \\&\quad - 5(12 - 1 + 3 - (2 + 6 - 3)) = 18\end{aligned}$$

Soustava n rovnic o n neznámých

Příklad: Najděte čtvrtou složku řešení soustavy rovnic

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 + 3x_3 &= 5 \\2x_1 - x_2 + x_3 + x_4 &= 4 \\x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 &= -1 \\x_1 + 3x_2 + 3x_3 - x_4 &= 5\end{aligned}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 3 & -1 \end{vmatrix} = -18 \neq 0$$

$$\begin{aligned}\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 5 \\ 2 & -1 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 3 & 5 \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} -1 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & 3 & 5 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 5 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & 5 \end{vmatrix} - 5 \begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \end{vmatrix} = \\&= -5 - 3 + 24 - (12 + 3 + 10) - 2(10 - 1 + 12 - (4 - 6 + 5)) + 3(20 + 1 + 12 - (8 - 6 - 5)) - \\&\quad - 5(12 - 1 + 3 - (2 + 6 - 3)) = 18\end{aligned}$$

$$x_4 = \frac{18}{-18} = -1$$

Základní pojmy

Řešení soustav rovnic – Gaussova eliminace

Determinanty

Řešení soustav rovnic – Cramerovo pravidlo

Regulární matice

Inverzní matice

Definice a vlastnosti

Aplikace – maticové populační modely

Regulární matice

Inverzní matice

Inverzní matice A^{-1} k čtvercové matici A řádu n:

$$AA^{-1} = A^{-1}A = E$$

Inverzní matice

Inverzní matice A^{-1} k čtvercové matici A řádu n:

$$AA^{-1} = A^{-1}A = E$$

Užití:

$$Ax = b$$

Inverzní matice

Inverzní matici A^{-1} k čtvercové matici A řádu n:

$$AA^{-1} = A^{-1}A = E$$

Užití: $Ax = b$ | násobení maticí A^{-1} zleva

Inverzní matice

Inverzní matici A^{-1} k čtvercové matici A řádu n:

$$AA^{-1} = A^{-1}A = E$$

Užití:

$$\begin{aligned} Ax &= b \mid \text{násobení maticí } A^{-1} \text{ zleva} \\ x &= A^{-1}b \end{aligned}$$

Inverzní matice

Inverzní matice A^{-1} k čtvercové matici A řádu n:

$$AA^{-1} = A^{-1}A = E$$

Výpočet: $X = A^{-1}$

Inverzní matice

Inverzní matice A^{-1} k čtvercové matici A řádu n:

$$AA^{-1} = A^{-1}A = E$$

Výpočet: $X = A^{-1}$ | násobení maticí A zleva

Inverzní matice

Inverzní matice A^{-1} k čtvercové matici A řádu n:

$$AA^{-1} = A^{-1}A = E$$

Výpočet: $X = A^{-1}$ | násobení maticí A zleva

$$AX = E$$

Inverzní matice

Inverzní matici A^{-1} k čtvercové matici A řádu n :

$$AA^{-1} = A^{-1}A = E$$

Výpočet: $X = A^{-1}$

$$AX = E$$

j-tý sloupec matic:

$$A \begin{pmatrix} x_{1j} \\ x_{2j} \\ \vdots \\ x_{j-1,j} \\ x_{jj} \\ x_{j+1,j} \\ \vdots \\ x_{nj} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

Inverzní matice

Inverzní matice A^{-1} k čtvercové matici A řádu n :

$$AA^{-1} = A^{-1}A = E$$

Výpočet: $X = A^{-1}$

$$AX = E$$

j -tý sloupec matic:

$$A \begin{pmatrix} x_{1j} \\ x_{2j} \\ \vdots \\ x_{j-1,j} \\ x_{jj} \\ x_{j+1,j} \\ \vdots \\ x_{nj} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

To je soustava n rovnic o n neznámých. Je jednoznačně řešitelná, pokud $h(A) = n$.

Inverzní matice

Inverzní matice A^{-1} k čtvercové matici A řádu n :

$$AA^{-1} = A^{-1}A = E$$

Výpočet: $X = A^{-1}$

$$AX = E$$

j -tý sloupec matic:

$$A \begin{pmatrix} x_{1j} \\ x_{2j} \\ \vdots \\ x_{j-1,j} \\ x_{jj} \\ x_{j+1,j} \\ \vdots \\ x_{nj} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

To je soustava n rovnic o n neznámých. Je jednoznačně řešitelná, pokud $h(A) = n$. Inverzní matici najdeme řešením n soustav n lineárních rovnic o n neznámých.

Inverzní matice

Příklady:

Inverzní matice

Příklady:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Inverzní matice

Příklady:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 4 & -3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -5 & 1 & -2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 10 & 5 & 0 & 5 \\ 0 & -5 & 1 & -2 \end{array} \right) \sim$$
$$\sim \left(\begin{array}{cc|cc} 10 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 5 & -1 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0,1 & 0,3 \\ 0 & 1 & -0,2 & 0,4 \end{array} \right)$$

Inverzní matice

Příklady:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 4 & -3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -5 & 1 & -2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 10 & 5 & 0 & 5 \\ 0 & -5 & 1 & -2 \end{array} \right) \sim \\ \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 10 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 5 & -1 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0,1 & 0,3 \\ 0 & 1 & -0,2 & 0,4 \end{array} \right)$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 0,1 & 0,3 \\ -0,2 & 0,4 \end{pmatrix} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$$

Inverzní matice

Příklady:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 4 & -3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -5 & 1 & -2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 10 & 5 & 0 & 5 \\ 0 & -5 & 1 & -2 \end{array} \right) \sim \\ \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 10 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 5 & -1 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0,1 & 0,3 \\ 0 & 1 & -0,2 & 0,4 \end{array} \right)$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 0,1 & 0,3 \\ -0,2 & 0,4 \end{pmatrix} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$$

Obecně platí:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

Inverzní matice

Příklady:

$$B = \begin{pmatrix} -3 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & -6 \\ 6 & 5 & -9 \end{pmatrix}$$

Inverzní matice

Příklady:

$$B = \begin{pmatrix} -3 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & -6 \\ 6 & 5 & -9 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{l} \left(\begin{array}{ccc|ccc} -3 & 3 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & -6 & 0 & 1 & 0 \\ 6 & 5 & -9 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 3 & -3 & -4 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 15 & -2 & 4 & 3 & 0 \\ 0 & 11 & -1 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \\ \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 3 & -3 & -4 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 15 & -2 & 4 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 7 & -14 & -33 & 15 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccccc} 3 & -33 & 0 & -9 & -6 & 0 & 0 \\ 0 & 105 & 0 & 0 & -45 & 30 & 0 \\ 0 & 0 & 7 & -14 & -33 & 15 & 0 \end{array} \right) \sim \\ \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -11 & 0 & -3 & -2 & 0 \\ 0 & 21 & 0 & 0 & -9 & 6 \\ 0 & 0 & 7 & -14 & -33 & 15 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccccc} 1 & -11 & 0 & -3 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 0 & 0 & -3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 7 & -14 & -33 & 15 & 0 \end{array} \right) \sim \\ \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 7 & 0 & 0 & -21 & -47 & 22 & 0 \\ 0 & 7 & 0 & 0 & -3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 7 & -14 & -33 & 15 & 0 \end{array} \right) \end{array}$$

$$B^{-1} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} -21 & -47 & 22 \\ 0 & -3 & 2 \\ -14 & -33 & 15 \end{pmatrix}$$

Definice a vlastnosti

Čtvercová matice A řádu n je *regulární*, pokud $h(A) = n$.

Definice a vlastnosti

Čtvercová matice A řádu n je *regulární*, pokud $h(A) = n$.

Ekvivalentně: $pokud |A| \neq 0$.

Definice a vlastnosti

Čtvercová matice A řádu n je *regulární*, pokud $h(A) = n$.

Ekvivalentně: pokud $|A| \neq 0$.

Je-li matice A regulární, pak k ní existuje matice inverzní.

Definice a vlastnosti

Čtvercová matice A řádu n je *regulární*, pokud $h(A) = n$.

Ekvivalentně: pokud $|A| \neq 0$.

Je-li matice A regulární, pak k ní existuje matice inverzní.

Vlastnosti násobení regulárních matic:

Definice a vlastnosti

Čtvercová matice A řádu n je *regulární*, pokud $h(A) = n$.

Ekvivalentně: pokud $|A| \neq 0$.

Je-li matice A regulární, pak k ní existuje matice inverzní.

Vlastnosti násobení regulárních matic:

$$(AB)C = A(BC) \quad \text{asociativita}$$

Definice a vlastnosti

Čtvercová matice A řádu n je *regulární*, pokud $h(A) = n$.

Ekvivalentně: pokud $|A| \neq 0$.

Je-li matice A regulární, pak k ní existuje matice inverzní.

Vlastnosti násobení regulárních matic:

$$(AB)C = A(BC) \quad \text{asociativita}$$

$$AE = EA = A \quad \text{existuje neutrální prvek}$$

Definice a vlastnosti

Čtvercová matice A řádu n je *regulární*, pokud $h(A) = n$.

Ekvivalentně: pokud $|A| \neq 0$.

Je-li matice A regulární, pak k ní existuje matice inverzní.

Vlastnosti násobení regulárních matic:

$$(AB)C = A(BC) \quad \text{asociativita}$$

$$AE = EA = A \quad \text{existuje neutrální prvek}$$

$$AA^{-1} = E \quad \text{ke každé regulární matici existuje inverzní prvek}$$

Definice a vlastnosti

Čtvercová matice A řádu n je *regulární*, pokud $h(A) = n$.

Ekvivalentně: pokud $|A| \neq 0$.

Je-li matice A regulární, pak k ní existuje matice inverzní.

Vlastnosti násobení regulárních matic:

$$(AB)C = A(BC) \quad \text{asociativita}$$

$$AE = EA = A \quad \text{existuje neutrální prvek}$$

$$AA^{-1} = E \quad \text{ke každé regulární matici existuje inverzní prvek}$$

Regulární matice spolu s operací násobení tvoří grupu.

Základní pojmy

Řešení soustav rovnic – Gaussova eliminace

Determinanty

Řešení soustav rovnic – Cramerovo pravidlo

Regulární matice

Aplikace – maticové populační modely

Leslieho populace


Populace strukturovaná podle stádií

Obecná strukturovaná populace

Aplikace – maticové populační modely

Leslieho populace


Patrick Holt Leslie (1900–1972)



Leslieho populace

$x_i(t)$ – počet samic věku i měsíců; přesněji věku z intervalu $(i - 1, i]$ měsíců

p_i – podíl samic věku i , které přežijí do dalšího měsíce




Leslieho populace

$x_i(t)$ – počet samic věku i měsíců; přesněji věku z intervalu $(i - 1, i]$ měsíců

p_i – podíl samic věku i , které přežijí do dalšího měsíce

$$x_{i+1}(t+1) = p_i x_i(t), \quad i = 1, 2, \dots, k-1$$




Leslieho populace

$x_i(t)$ – počet samic věku i měsíců; přesněji věku z intervalu $(i - 1, i]$ měsíců

p_i – podíl samic věku i , které přežijí do dalšího měsíce

f_i – očekávaný počet dcer, které během měsíce porodí samice věku i měsíců

$$x_{i+1}(t+1) = p_i x_i(t), \quad i = 1, 2, \dots, k-1$$



Leslieho populace


$x_i(t)$ – počet samic věku i měsíců; přesněji věku z intervalu $(i - 1, i]$ měsíců

p_i – podíl samic věku i , které přežijí do dalšího měsíce

f_i – očekávaný počet dcer, které během měsíce porodí samice věku i měsíců

$$x_1(t+1) = f_1 x_1(t) + f_2 x_2(t) + \cdots + f_k x_k(t)$$

$$x_{i+1}(t+1) = p_i x_i(t), \quad i = 1, 2, \dots, k-1$$



Leslieho populace

$x_i(t)$ – počet samic věku i měsíců; přesněji věku z intervalu $(i - 1, i]$ měsíců

p_i – podíl samic věku i , které přežijí do dalšího měsíce

f_i – očekávaný počet dcer, které během měsíce porodí samice věku i měsíců

$$x_1(t+1) = f_1 x_1(t) + f_2 x_2(t) + \cdots + f_k x_k(t)$$

$$x_{i+1}(t+1) = p_i x_i(t), \quad i = 1, 2, \dots, k-1$$

$$\begin{pmatrix} x_1(t+1) \\ x_2(t+1) \\ x_3(t+1) \\ \vdots \\ x_{k-1}(t+1) \\ x_k(t+1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1 & f_2 & f_3 & \dots & f_{k-1} & f_k \\ p_1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & p_2 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & p_{k-1} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \\ \vdots \\ x_{k-1}(t) \\ x_k(t) \end{pmatrix}$$

Leslieho populace

$x_i(t)$ – počet samic věku i měsíců; přesněji věku z intervalu $(i - 1, i]$ měsíců

p_i – podíl samic věku i , které přežijí do dalšího měsíce

f_i – očekávaný počet dcer, které během měsíce porodí samice věku i měsíců

$$x_1(t+1) = f_1 x_1(t) + f_2 x_2(t) + \cdots + f_k x_k(t)$$

$$x_{i+1}(t+1) = p_i x_i(t), \quad i = 1, 2, \dots, k-1$$

$$\begin{pmatrix} x_1(t+1) \\ x_2(t+1) \\ x_3(t+1) \\ \vdots \\ x_{k-1}(t+1) \\ x_k(t+1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1 & f_2 & f_3 & \dots & f_{k-1} & f_k \\ p_1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & p_2 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & p_{k-1} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \\ \vdots \\ x_{k-1}(t) \\ x_k(t) \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{x}(t+1) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t)$$

Populace strukturovaná podle stádií

Leonard Lefkowitch (1929–2010)



Populace strukturovaná podle stádií

Obojživelníci: vajíčko – pulec – dospělý jedinec



Populace strukturovaná podle stádií

Obojživelníci: vajíčko – pulec – dospělý jedinec

Hmyz: vajíčko – larva – kukla – imago



Populace strukturovaná podle stádií

k – počet stádií

$x_i(t)$ – počet jedinců stadia i v čase t ($i = 1$ – „novorozenci“)

q_i – podíl jedinců stadia i , kteří přežijí období a nepromění se; $0 < q_i < 1$

p_i – podíl jedinců stadia i , kteří se během období přemění na stadium $i + 1$;

$$0 < p_i \leq 1,$$

$$p_i + q_i \leq 1, \quad i = 1, 2, \dots, k$$

f_i – očekávaný počet „novorozenců“, které vyprodukuje jedinec stadia $i > 1$; $f_i \geq 0$

Populace strukturovaná podle stádií

k – počet stádií

$x_i(t)$ – počet jedinců stadia i v čase t ($i = 1$ – „novorozenci“)

q_i – podíl jedinců stadia i , kteří přežijí období a nepromění se; $0 < q_i < 1$

p_i – podíl jedinců stadia i , kteří se během období přemění na stadium $i + 1$;

$$0 < p_i \leq 1,$$

$$p_i + q_i \leq 1, \quad i = 1, 2, \dots, k$$

f_i – očekávaný počet „novorozenců“, které vyprodukuje jedinec stadia $i > 1$; $f_i \geq 0$

$$x_1(t+1) = \sum_{j=2}^k f_j x_j(t), \quad x_i(t+1) = q_i x_i(t) + p_i x_{i-1}(t), \quad i = 2, 3, \dots, k$$

Populace strukturovaná podle stádií

k – počet stádií

$x_i(t)$ – počet jedinců stadia i v čase t ($i = 1$ – „novorozenci“)

q_i – podíl jedinců stadia i , kteří přežijí období a nepromění se; $0 < q_i < 1$

p_i – podíl jedinců stadia i , kteří se během období přemění na stadium $i + 1$;

$$0 < p_i \leq 1,$$

$$p_i + q_i \leq 1, \quad i = 1, 2, \dots, k$$

f_i – očekávaný počet „novorozenců“, které vyprodukuje jedinec stadia $i > 1$; $f_i \geq 0$

$$x_1(t+1) = \sum_{j=2}^k f_j x_j(t), \quad x_i(t+1) = q_i x_i(t) + p_i x_{i-1}(t), \quad i = 2, 3, \dots, k$$

$$\begin{pmatrix} x_1(t+1) \\ x_2(t+1) \\ x_3(t+1) \\ \vdots \\ x_k(t+1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q_1 & f_2 & \dots & f_{k-1} & f_k \\ p_1 & q_3 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & p_2 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & p_{k-1} & q_k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \\ \vdots \\ x_k(t) \end{pmatrix}$$

Populace strukturovaná podle stádií

k – počet stádií

$x_i(t)$ – počet jedinců stadia i v čase t ($i = 1$ – „novorozenci“)

q_i – podíl jedinců stadia i , kteří přežijí období a nepromění se; $0 < q_i < 1$

p_i – podíl jedinců stadia i , kteří se během období přemění na stadium $i + 1$;

$$0 < p_i \leq 1,$$

$$p_i + q_i \leq 1, \quad i = 1, 2, \dots, k$$

f_i – očekávaný počet „novorozenců“, které vyprodukuje jedinec stadia $i > 1$; $f_i \geq 0$

$$x_1(t+1) = \sum_{j=2}^k f_j x_j(t), \quad x_i(t+1) = q_i x_i(t) + p_i x_{i-1}(t), \quad i = 2, 3, \dots, k$$

$$\begin{pmatrix} x_1(t+1) \\ x_2(t+1) \\ x_3(t+1) \\ \vdots \\ x_k(t+1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q_1 & f_2 & \dots & f_{k-1} & f_k \\ p_1 & q_3 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & p_2 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & p_{k-1} & q_k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \\ \vdots \\ x_k(t) \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{x}(t+1) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t)$$

Obecná strukturovaná populace

Příklad: Populace *Dipsacus sylvestris*



Obecná strukturovaná populace

Příklad: Populace *Dipsacus sylvestris*

Časová jednotka: rok

Třídění:	třída	popis
	1,2	semena dormantní 1.rok, dormantní 2. rok
	3,4,5	růžice malá, střední, velká
	6	kvetoucí rostlina



Obecná strukturovaná populace

Příklad: Populace *Dipsacus sylvestris*

Časová jednotka: rok

Třídění:

třída	popis
1,2	semena dormantní 1.rok, dormantní 2. rok
3,4,5	růžice malá, střední, velká
6	kvetoucí rostlina

$$\begin{pmatrix} x_1(t+1) \\ x_2(t+1) \\ x_3(t+1) \\ x_4(t+1) \\ x_5(t+1) \\ x_6(t+1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 322,38 \\ 0,966 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0,013 & 0,010 & 0,125 & 0 & 0 & 3,448 \\ 0,007 & 0 & 0,125 & 0,238 & 0 & 30,170 \\ 0,001 & 0 & 0,036 & 0,245 & 0,167 & 0,863 \\ 0 & 0 & 0 & 0,023 & 0,750 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \\ x_4(t) \\ x_5(t) \\ x_6(t) \end{pmatrix}$$

